

TIGHT BINDING AND TEXT PROBLEM

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_204464

UNIVERSAL
LIBRARY

- 1 NOV 1951 9/сек В.В.Н.

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. T610
Accession No. T3207
Author శ్రీమంతుల సోదరి
Title ఆనుభవ విశుద్ధి 2.5.03.5000

This book should be returned on or before the date last marked below.

అనుభవ పశువైద్య చింతామణి



గ్రంథకర్త :

పశువైద్యవార్య, r

యేజెళ్ల శ్రీరాములు చౌ

ఇండియా గవర్నమెంటు ఆల్ ఎగ్రికల్చరల్ రిస్

రైవ్ స్టాంపు నంబరు (ఫీల్డ్).

ఆంధ్రజాతీ అప్రెంటిస్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్,

సహదేవ జైద్య పాఠశాల ప్రొఫెసరు.

1945

ప్రకాశకులు :

ది మోడరన్ పబ్లిషర్స్, తెనాలి.

కాపీరైట్

[మొదట 10-0-0.]

తృతీయ ముద్రణ
(*War Addition*)

పల్లెనున్న లైను ప్లాకులను
శేఖండ తీసికొనరాదు.

తెనాలి లక్ష్మీ పవర్ ప్రెస్ నందు
ముద్రితం బడినది.

OPINIONS

Anubhava Pasuvydyā Chintamini is a most welcome Telugu work on cattle, their diseases and treatment. The author is Dr. Yejella Sreeramulu Choudari, Founder and Veterinary Doctor-in charge of the Ayurveda Veterinary Hospital and School. He has published several other works in Telugu such as Pasuvydyā Vastuguna Deepika, Pasu Netra Chikitsa, Pasu varana Chikitsa, etc. He has also promised to publish Pasuvydyā Sastra by Sahadeva and Aswavydyā Sastra in Telugu. The present work is a Practical treatise, illustrated, with exhaustive information on several important points generally not dealt with in books written in Indian languages. The first chapter deals with maintenance of cattle, cattle-dealers, pastures and such other introductory matters. The second chapter deals with important points of cattle in health and what the stock-owners and the doctors should observe in dealing with cattle. The third chapter deals with the various breeds of cattle. The fourth one deals anatomy and physiology—rare things in the books of this kind in the local languages but very important subjects which every stock owner should know. The fifth chapter deals with the normal condition of cattle and the deviation from this with a view to help the diagnosis. It also gives information as to the different forms and modes of administering medicines. The sixth chapter deals with the disease of blood and the seventh with obstetrics. The eighth chapter deals with the diseases of elementary tract, liver, etc. The ninth deals with the various diseases of the nervous system. The tenth is devoted to diseases of respiratory system. The eleventh deals with those of the head and the twelfth with the diseases of eyes. The thirteenth chapter deals with diseases of urinary system. The fourteenth chapter is devoted to the Oedematus and other swellings of various parts or organs. The fifteenth chapter deals with the various growths, tumours and neoplasms. The sixteenth chapter deals with the maintenance of milch cattle and the several diseases affecting them. In the course of this chapter, the milk, its several products, the milkmen and the vessels also receive attention. Treatment of wounds is dealt with in the seventeenth chapter.

Feeding and rearing of calves receive attention in the eighteenth chapter. Their diseases also are dealt with in the same chapter. Diseases of throat, ears and teeth are dealt with in the nineteenth chapter. Diseases of locomotor system dislocations and fractures, are dealt with in the twentieth and twenty first chapters respectively. Castration by Burdizzo and other methods is dealt with in the twenty-second chapter. Criminal poisoning, its diagnosis and treatment are also found in the same chapter. Skin diseases are dealt with in the twenty-third chapter. Reptiles including various poisonous snakes and insects and their bites are dealt with in the last and the twenty-fourth chapter.

The author while dealing in all these aspects has adopted what is best both in the ancient Indian system and modern Allopathy, in his experience. He is himself an agriculturist, and has devoted much of his time, energy and attention to improving, treating and maintaining cattle. He has also been training a number of rural veterinary practitioners in his veterinary School at Angalur. An addition of a glossary of several Telugu names of each drug would proved very useful as one and the same drug is known by different names in different parts of the country. This book is a store house of useful veterinary knowledge and should therefore prove of great practical value to every Telugu knowing stock-owner, veterinary student and practitioner. This book further proves—if proof is ever required—that it is quite possible to write works in Indian vernaculars on modern scientific subjects, for the benefit of the vast number of people in this country. If this country should derive benefit from the modern veterinary science, a number of such books in the local vernaculars and workers of the type of Dr. Yejella Sreeramulu Chowdari should come up all over the country.

This book in Telugu deserves to find a place in every library, school, panchayat and co-operative society. We have great pleasure in recommending this also to every Telugu knowing Veterinary practitioner and student, to include it in his library.

(Sd.) M. S. SASTRY, G. B. V. C.,
General Secretary,

All-India Veterinary Association.
who has been awarded a Gold Medal by the
Bombay Veterinary College
Golden Jubilee Celebration Committee
in appreciation of his services. Newly elected
Treasurer, the A. I. V. A.

Visited to-day. Very much pleased to see Dr Sriramulu taking interest in the rendering veterinary aid. He treats both medicinal and surgical cases of a minor nature. I am glad to know from him the interest he takes in educating the ryots regarding the protective measure adopted by the Veterinary Department against the common contagious diseases. He has also shown me to day a few of his publications. He takes great pains to show a great zeal in his attempts to render service to dumb creation. He deserves encouragement.

(Sd.) C. V. RATNAM,
Dt. Veterinary Officer, Bezwada.

Visited the Ayurvedic cattle hospital conducted by M.R.Ry. Yejella Sriramulu Garu. It is gratifying to note that he has treated 2917 cattle during the year. He takes great interest in cattle welfare and deserves every encouragement.

(Sd.) K. B. NATESA IYAR,
Ag Dpt Veterinary Officer, Bezwada.

To-day I have visited the Veterinary Dispensary conducted by M. R. Ry. Yejella Sriramulu Garu. It is the dispensary in which the treatment of cattle is done by Ayurvedic line in a very good and satisfactory manner. He has greatly improved his knowledge in Veterinary science and he is also training up students (about 16 in number) who have come to the institution from different parts. I am very glad to say that the institution has been registered by the Government and as a result of that more students have joined the institution. He is giving a satisfactory treatment in both medical and surgical cases. He has also got a good knowledge about contagious diseases of cattle.

(Sd.) K. M. PERANNAM,
Touring Veterinary Asst Surgeon, Gudivada.

We are very much pleased to visit the Ayurvedic Veterinary Dispensary and college owned and run by Dr. Y. Sriramulu. There are about 16 students in this college who are taught veterinary science on Ayurvedic lines. He is treating cases with great interest. He deserves encouragement,

(Sd.) N. V. SUBBARAO, G. M. V. C.,
Veterinary Surgeon,
(Sd.) S. SRINIVASA RAO,
Municipal Veterinary Asst. Surgeon, Bezwada.

I have visited Ayurvedic Veterinary Dispensary, and am glad to note that it has improved by leaps and bounds in a very short time. I find him doing immense good work to dumb animals. He has much improved the Ayurvedic Veterinary Science by contributing many books and deserves encouragement from all quarters.

(Sd.) R. VEERASWAMY NAIDU.


Touring Veterinary Asst. Surgeon, Bezwada.

N. B.—Opinions of other eminent persons of high rank such as the Chief Secretary and other Ministers of the Madras Government the Congress Leaders, Rajahs, Provincial and Central M. L. As, District Board Presidents, and officials belonging to the Health, Revenue, Agriculture, and Education Departments, etc. are omitted here, for want of space. Many important resolutions to give full support to this System and treatment, were passed at several meetings, including the All India Kisan Sabha. Testimonials and certificates of genuine thankfulness for the good publications produced and their inestimable value in times of need, are received in an abundant measure. Opulent landlords and Zamindars showed their genuine love and sincerity of support, for the institution, by sending their candidates for training. Advices are even now given orally and through correspondence to many a difficult case. A monthly journal by name "Pasu Samrakshana" has been started and run for many a year, and did much service to Veterinary science, but unfortunately, it has now been stopped from publication, owing to lack of funds and financial backing.

కాశ్యతోద్ధారకులు




శ్రీశ్రీశ్రీ ప్రసాదు రాజా
యార్లగడ్డ శివరామప్రసాద్ బహద్దర్
జమీందారుగారు, B. A., M. L. A.,
చల్లపల్లి



శ్రీయంవర్తి శ్రీరామయ్యచౌదరిగారు
ల్యాండులాడు,
యలవర్తి (తెనాలి తాలూకా)



శ్రీగుంటపల్లి నారాయణచౌదరిగారు
ల్యాండులాడు,
పెదనొట్టిపాడు (గుంటూరు జిల్లా)



డాక్టర్ యేజ్శ శ్రీరాములు
ఆయన తండ్రి రాఘవయ్యగారు

పశు వైద్య గ్రంథమాల, తెనాలి.

శాశ్వతోద్ధారకులు

మ. రా. శ్రీమతు రాజా యార్లగడ్డ శివరామప్రసాద్ బహద్దర్ జమీందారుగారు,

M. L. A., చల్లపల్లి.

- ,, డాక్టర్ ఉప్పల సుందరరామయ్యచౌదరిగారు, M.B.B.S. బ్యాంకర్, తెనాలి.
- ,, యలవర్తి శ్రీరాములుచౌదరిగారు, ల్యాండులార్డు & బ్యాంకర్, తెనాలి.
- ,, గుంటుపల్లి నూర్యనారాయణచౌదరిగారు, ల్యాండులార్డు & బ్యాంకర్, పెదగొట్టిపాడు.

ఉద్ధారకులు

మ. రా. శ్రీమిల్లుట సీతారామశాస్త్రిగారు, ల్యాండులార్డు, తుంచవరం.

- ,, గొట్టుముక్కల రామకృష్ణయ్యచౌదరిగారు, చింతాయపాలెం.
- ,, వేగేపిఠ కనకయ్య వెంకట సత్యనారాయణరాజుగారు, ప్రొఫ్రయిటర్, పాండువ్వ (ప. గోదావరి).

మహారాజపోషకులు

మ. రా. శ్రీ ఆలపాటి వెంకట్రామయ్యగారు, యడ్లపల్లి.

- ,, మన్నె సత్యనారాయణగారు, యడ్లపల్లి.
- ,, అలపర్తి సత్యనారాయణగారు, యడ్లపల్లి.
- ,, వేదాంతం లక్ష్మీనారాయణ పతులుగారు, బి. ఏ., బి. యా., తెనాలి.
- ,, కోగంటి సోమయ్య, సన్నపనేల సోమయ్యగారు తెనాలి.
- ,, వేజెళ్ల రాఘవయ్యగారు, తెనాలి.
- ,, కోగంటి తాతయ్యగారు, మునిసిపల్ కౌన్సిలర్ తెనాలి.
- ,, నిమ్మగడ్డ చంద్రశేఖరరావుగారు, వో నేపూడి.
- ,, గోవాడ రంగ నాయకులుగారు, మాచవరం.
- ,, ఆచంట బుచ్చిరాయుడుగారు, ఆస్పికిట్ల.
- ,, పిడికిటి సీతారామయ్యగారు, గుండిమెడ.
- ,, కోగంటి నూర్యనారాయణగారు, క్రొవ.
- ,, బొన్నలగడ్డ పుల్లయ్యగారు, క్రొవ. [కొమ్మదిక్కాల.
- ,, పశువైద్యాచార్య గుంటూరి వెంకట ఆప్పలసంసిహారాజుగారు,

మ. రా. ౧౧ మద్దూరి నాగిరెడ్డిగారు, బ్రాహ్మణగొట్టూరు.

- ,, వెనిగండ్ల రామకృష్ణయ్యగారు - కోనెల్లాడి.
- ,, మద్దూరి జగపతిరావు పంతులుగారు, మున్నంగి.
- ,, చోడవరపు వెంకటమల్లారావుపంతులుగారు, మున్నంగి.
- ,, పశువైద్యాచార్య జి. లక్ష్మణరెడ్డిగారు, బ్రాహ్మణగొట్టూరు.
- ,, పాలమూల వీరరామచంద్రరావుగారు, కిరీతరం.
- ,, కొల్లిపర వెంకటసుబ్బయ్యగారు, పెనమర్ల.
- ,, కోగంటి వెంకటసుబ్బయ్యగారు-తెనాలి.

రా బ పోషకులు.

మ. రా. ౧౨ డాక్టర్ సి. హెచ్. మురళీ గొప్పగారు, కేపల్లె.

- ,, కోగంటి శివయ్యగారు, తెనాలి.
- ,, కోగంటి తిరుపతియ్యగారు, తెనాలి.
- ,, రావి వెంకటయ్యగారు, తెనాలి.
- ,, రావి చినఅత్తయ్యగారు, తెనాలి.
- ,, యర్రా వెంకటసుబ్బయ్యగారు, తెనాలి.
- ,, ఎరకరాజు కనకరాజుగారు, కొడితినాశ.
- ,, ఆచమళ్ల పిచ్చయ్యగారు, యడ్లపల్లి.
- ,, ఆలపర్తి వెంకయ్యగారు, యడ్లపల్లి.
- ,, ఆలపర్తి నాగభూషణరావు, యడ్లపల్లి.
- ,, ఆలపర్తి వెంకటేశ్వర్లుగారు, యడ్లపల్లి.
- ,, మునుపూరి నువ్వారామయ్యగారు, యడ్లపల్లి.
- ,, చాసరి లింగయ్యగారు, యడ్లపల్లి.
- ,, చాసరి సుబ్బయ్యగారు, యడ్లపల్లి.
- ,, ఆలపాటి నారాయణగారు, యడ్లపల్లి.
- ,, ఆలపర్తి వెంకట్రామయ్యగారు, యడ్లపల్లి.
- ,, గొట్టుమక్కల అప్పయ్యగారు, మొలిపాడ.
- ,, కొరుమంచి బసయ్యగారు, కం. కొంమూరు.
- ,, కొరుమంచి వెంకటసుబ్బయ్యగారు, కం. కొంమూరు.
- ,, గాదిరెడ్డి వున్నారెడ్డిగారు, మున్నూరు.
- ,, పశువైద్యాచార్య వేజళ్ల వెంకటనరసయ్యగారు, వేజళ్లవాడిలంక.
- ,, వేజళ్ల వెంకటసుబ్బయ్యగారు, పల్లెకోన.

మ. రా. శ్రీ వేజల్ వెంకటసుబ్బయ్యగారు, రుద్రవరం.

- „ వేజల్ వెంకట్రామయ్యగారు, రుద్రవరం.
- „ ఎడ్ల సాంబయ్యగారు, చిలువూరు.
- „ గడ్డిపాటి కోటయ్యగారు, ప్యాపర్రు.
- „ బెల్లం రాఘవయ్యగారు, కేశవరావు.
- „ కొమ్మారెడ్డి బాపయ్యగారు, పోతునూరు.
- „ పరుచూరు బసవయ్య చౌదరిగారు, ల్యాండులూరు వడ్లనూడి.
- „ మండలపు శంకరరావుగారు, నడిగడ్డపాలెం.
- „ ఆన్నే వెంకటనారాయణగారు-చిలువూరు.
- „ కొనేరు సరసింహారావుగారు-గొడవర్రు.
- „ తలశిల నానుసుయ్యగారు, నా గాయలంకి.
- „ వేమూరు వీర రాఘవయ్యగారు-నేలపాడు.
- „ సకృతి అంజయ్యగారు, తెనాలి.



శ్రీ ముదునూరు గోపాలరాజుగారి ఎద్దులజత
వెంగడుర్రు - ప. గో. జిల్లా.

ప్రథమ ముద్రణ పీఠిక

శ్రీ ప్రొఫెసర్ : ఆచార్య : ఎన్. జి. రంగారావు, ఎం. ఎల్. ఏ.,
(నెంటర్) డి. డి.

ఇంగ్లీషువారికి గుఱుములు, అరబ్బులకు ఒంటెలు యెంత ముఖ్యమో, మనదేశపు వ్యవసాయవలకు పశువులంత ముఖ్యము. పశువులు లేనిచో నిలగిరిజిల్లా మానూరు తాలూకా రైతులవలె ప్రజలే చిన్నగడ్డపారలతో భూమిని కృశ్యగించి సొట్లగట్టి విత్తవములు వేయుట, మాగాని భూముల దమ్ముచేసి విత్తవములవేయు టాదిగాఁగల సకల మైన పశుకృత్యముల చేయవలసియుండును. ప్రజలు మనుష్య కృత్యములు చేయుటకు బదులు పశుకృత్యముల నొనర్పవలసివచ్చు టెంత యన్యాయమో, అనాగరికసితియో, గ్రహించుకొనుట నులభము. అట్టి అనాగరికసితినుండి హిందువుల బయల్పడటదీసి వారికి సాంఘిక మానసిక వికాస మొనర్చుట కవకాశమిచ్చినందువలననే హిందువులు త్వారకాలమునుండియు పశువులన్న విశ్వాసపూర్వకముగ ప్రేమను జూపెట్టుచుండిరి.

మనుష్యులకు సర్వసాధారణముగా స్నేహభావముగా నుండదగు జంతువుల ప్రేమించుట పెంచుట వారిపండు సాంఘిక యలనాటులలో నొక్కటైయున్నది. అరబ్బులు గుఱుములను, ఫ్రెంచివారు ఇంగ్లీషువారు వీల్లులు, మక్కలను, రాజులు జమీందారులు లేళ్ళు పిట్టలను, తుదకు మనదైరాగులు కానజాలను, ఎట్లుపెంచుచున్నారో! అటులే మన రైతులు వారి శ్రీమంతుల ఆవునూడల సావటయంగు, ఎద్దులను బోషించుటయంగు తమ ప్రేమభావములను జూపెట్టుకొనుచున్నారు. ఆవు చిక్కిన దన్ను, ఎద్దు పెట్టెగొట్టిపన్ను, వేద జబ్బుపడినదన్ను, హృదయావేదన మొందని రైతు, వానిభార్య, తుదకు నుచున్నవీయులంతయు కాపించును. ఆ చిక్కి కమ్మనినుఖిముగు దూడలు, నూడిపెయ్యల, పెదలుటకు మనసాప్యక, కాళ్ళురాక, తనాతహాపడుగున్న పల్నాటి రాజ్యప్రధానమంత్రు కాబోవు శ్రీ జిశ్మీనారాయణగారి “నాయకురాలు” పత్రికై తుయొక్క గృహిణియందును మూర్తీధరించుచున్నది.

ధనికుడగు, అదృష్టవ్రాముడగు, యోగ్యుడగురైతు ఏ గ్రామమునందు చనిపోయినను వానికి క్రింద పేరు బహుకాలము నిలుపుటకై మన ప్రజ లొకడు దేశముల నలంప్రక్కల అంబోతెగ్గలను వేయుచున్నారు. రైతుల యభిప్రాయమునందింప నపాఠకాలు, దేవాలయములు బావులు కుళములు కంటే తమ తమ గాఢముల పశువుల క్షేమసంరక్షణము జాత్యాభివృద్ధియే కేర నిల్పుటకు ముఖ్యముగు దాగులు. ఒక అంబోతెద్దు చని పోయినప్పుడు జరుగు యుత్సవము ప్రజలందరు ఆయాంబోతెద్దన కొనంగు వారకులు

అదినమున గాగ్రమునందెల్లడల వెల్వెడు విచారమును గాంచినవారెల్లరకు పరిజాసామాన్యమునందు తెలిసి తెలియకయే పశువులవృద్ధినిగూర్చి, వాని శుభమునుగూర్చి ఎంతటి యాతురత క్రద్ధయున్నది గ్రాహ్యముకాగలదు. కాని మన దురదృష్టవశాత్తు యీ కాలపు విద్య నభ్యసించువారు, విద్యాధికులు, రైతులన్నవారికి ప్రేమముగ జీవములన్న, వారికి సంపదల పాడిపంట నొసంగు పశువులన్న ఉదాసీనభావముతో నున్నారు. శ్రీ కృష్ణారావుగారి “సంక్రాంతి” నందలి “ధాన్యలక్ష్మి” సంక్రాంతి కొక్క మొరపు మొరసిపోయినది. శ్రీ రామిరెడ్డిగారి కృషీవలునిభార్య మాత్రము ఆధునిక కవిత్వరస సృష్టియందు కళకళలాడుచున్నది. కాని పోతన్నగారి రాజాలనే నిక్కరించు ఆత్మ గౌరవము సంరక్షణచేసుకొను “హలిమడు” నునుతిగారి స్వాతంత్ర్యప్రియుడగు “పది గల యెద్దుల గట్టుకొను” రైతునకు సరియగు సృష్టి మన ప్రస్తుతపు భావకవిత్వరస కల్పనాప్రపంచమునందేలకో కానము. కవిత్వము కావన్నను రైతుల శ్రేయముకై, వారి పాడిపంటల వృద్ధికై, వారి గడపల పసిమికై, వారి శ్రీలక్ష్మిలక్ష్మిలక్ష్మిలక్ష్మికానమునకై, నుపయోగపడు ఈ పశువైద్యచింతామణిని శ్రీరాములుచొదరిగారు యీ మాపముగా నిచ్చినందులకు సంతసము.

ఒకానొకప్పుడు ప్రజలు వెండి బంగారముల నాణెములకు బదులు ముద్రలు తయారుచేసిన పశువుల నే ధనముగా నుపయోగించుకొనుచుండెడివారు. ఇప్పటికిని అఫ్రికా యందలి కొన్ని జాతులవారు మొన్న మొన్నటివరకు భద్రాచలపు టానిగాగల యడవుల యందలి రైతులును మీకంతధనమున్నది? యను ప్రశ్నకు మాకు నూరు, రెండువూరుల పశువు లున్నవను సమాధానము నిచ్చుచుండెడివారు. భూములు లోహములు ధనముగా పరిగణింపబడకముందే పశువులు ధనమై యుండెడివి.

ఇప్పుడు తదితర వస్తువులే ధనమును యభిప్రాయము. పశువులు ఎరుములు మేకలు భూమివలననే రైతులకు సర్వసంపదల నిచ్చును. భూమికి తగునట్లు ఎరువు నొసంగి దానిని క్రద్ధగా సాగుచేయుచో యెటుల పంటల బొందలేమో అటులనే పశువుల సక్రమముగా మేసి సంరక్షణచేయుచో లాభము నొందజాలము. పైరులకు పట్టిన చీడపురుగుల నున్నపురియ మున్నగువానితో చంపిచో నెటుల పంట పండివో అటులనే పశువులకు వచ్చు జబ్బులకు జాగ్రత్తగా మందువేయనిచో రైతులు నష్టము బొందుదురు. పశుధనమును కాపాడుట వృద్ధిచేయుట, రైతుల శ్రేయమునకు ముఖ్యము. కాని మన ప్రజాప్రతినిధులు ప్రభుత్వము ఇప్పటికి కూడ నిండుగా యీ విషయములను గ్రహించు నుండుటవలననే కాశ్రీకముగా తయారుకాబడిన వ్యవసాయమున నుపయోగించు ఎద్దుల నివ్వగలుగు ఆముఠెద్దులనుగాని, పాలను పొచ్చుగానిచ్చు ఆవుల నివ్వగలుగు ఆముఠెద్దులనుగాని మన ప్రజల కందుబాటులో నుండుటకు ప్రయత్నముచేయుటలేదు.

మన పశువులను పెద్దకోగము, దోమ్మ, గుర్రక గాలివంటు తగిలి పశువైద్యము లక్షలకొలది నట్లను కలుగుచున్నను పశుకోగ చికిత్సలను ఆధమును పశుతి సిద్ధాంత నొక్కరినైనను విప్పిరుదుటలేదు. పశునే యాధాగముగా కలిపి యీ జేశమునందంతటి యశ్రద్ధ పశుసాత్విభీష్ణునిగూర్చుకొందు జాతయు విచారకరజీవుము. ఈ చింత నాణిని జదివినవారైనను యీ విషయము గ్రహించి రైతులకు వారి పశువులకు క్షేమకర ములగు మార్గముల వెదకుదురగాక !

ఈ గ్రంథమును చదివినవారికి పశువులకు తగులు జాడ్యములలో వందకు తొంబది తొమ్మిదిపాళ్ళు అంటువ్యాధులని ముఖ్యముగా తోచు విషయము. రెండవది అపాయ కరమగు వ్యాధులు కలిసిన వారి లక్షణముల వెంటనే గ్రహించుట చాలా గుర్తుగవని తెలియుచున్నది. అయినను ఈ గ్రంథము ద్వారా తెలియు మరొక్కవిషయము జాగ్రత్తగానుండు రైతులకు స్వేచ్ఛము గల్గించునదిగానున్నది. ఏ గొప్పవ్యాధికలిగినను, కలుగబోవుచున్నను, ముందు పశువులకు తీవ్రజ్వరము కలుగుచుండును. జ్వరము తగు లుటయే యాలస్యముగా ఈ గ్రంథమును బాగుగా చదివి యనుభవముతో నైక్యము బొందించుకొనిన రైతుల సాయముతో రోగిలక్షణముల కనుగొని వానికి తగు చికిత్సల చేయుట సాధ్యమగును. ఈ మూడువిషయముల నింత ములభముగా తెల్పికందులకే చొదరిగాను వందయులు.

గ్రంథకర్త పడిన శ్రమఫలము నిరదశలయుననిన, పాపములు బాధము పొంద వలయుననిన, జబ్బుపడిన పశువులను తరితూ పశువులనుగి మరయుగానుండుట పశుధను ధర్మము. మన రైతులితివరకు చాల యశ్రద్ధను తెలివితప్పవను గూపెట్టుచున్నారు. ఈ ముభ్యాసమును గూవునాపవలయుననిన పశుతి విద్యాధిపతుడు యీగ్రంథమును చదివి సాధ్యమైనంతవరకు రైతులకు జాడ్యములనావు సక్రమమగు మార్గముల జూపెట్టు టవలెనము.

ఈ గ్రంథమునందు జెప్పబడిన ముందులు హెచ్చుభాగము అనుభవముజెందిన రైతులకు తెలిసియున్నవే. అవన్నియు పశుతి బహుదనండును దొరకు చొరయుగు మందులు, కాన నివ్యాధిలు తప్పుక యీ మందులను ప్రచారములోనికి అధికముగా తెచ్చి సాంఘికసేవను చేయుచురగాక ! జిల్లాబోర్డులు తమతమ పాఠశాలలనుండలి యుపాధ్యాయులందరిచేతను, యీ గ్రంథమును శ్రద్ధగా చదివించి రైతులకు సహాయము చేయించవలయును. సానికసంఘ సభ్యత్వమునకై వేలకువేలు ఖర్చుపెట్టు రైతాంగపు నాయకులు తమ శ్రమను సార్థకమొనర్చుటకై నను యిట్టి గ్రంథమును పోలమందు పరిచారమునకు తెచ్చుట శర్మము. తుదిమాట గ్రంథకర్త యీ పశువైద్యచింతామణిని పక్కటిండుటద్వారా సాంఘిక సేవను అత్యున్నతముగా చేయగలుగుచున్నారు.

ద్వితీయ ముద్రాణ పీఠిక

శ్రీ బెజవాడ రామచంద్రారెడ్డిగారు బి. ఏ., సి. బి. ఇ.

ప్రసిద్ధెంటు: మద్రాసు లేజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్.

శ్రీయుత యశశ్శ్రీ శ్రీరాములుచౌదరిగారు “ అనుభవ పశువైద్యచింతామణి ” యనుగ్రంథమును రచించి వైద్యవాఙ్మయమునకేకాక అంగ్రదేశములోని రయితు సముదాయమున కత్యంతమును మేలొనగూర్చిరి. కలకాలము ప్రేమపూరితమైన శృతజ్ఞతా పాశములతో రయితు పర్లమును గట్టివైచుకొనిరి. అనుభవము వలన సంపాదించిన జ్ఞానమును వారు కొంతకాలము వార్తాపత్రికల మూలమునను, ఇంతకు బూర్వమే వెలువడిన కొన్నిగ్రంథముల మూలమునను బ్రచురపరచిరి. పశుచికిత్సయందు వీరికంత యభిరుచి కలదో రయితులకాజ్ఞానమును బోధించుటకును అంత యుత్సాహము కలదనుటకు ఈగ్రంథరచన ప్రచురణములవలన గల్గిన శాశ్వతోపయోగ మే తార్కాణము. గ్రంథము యొక్క ప్రాశస్త్యము శాసనయోగము పరిశీలించినంతటనే విదితమగును.

ఆచ్యుటచ్చుట గ్రామవాసులలోనుండి పశుచికిత్సకులు పూర్వాచారము వలన గలిగిన యాధ్యమచేత స్వకీయానుభవ విజ్ఞానము లోకమునపరుయు క్తిమగు రూపమున శాశ్వత మైనర్వక ఆత్మికులుంబుపోషణచే పునూర్జముగా నెంచి అర్థసంగ్రహణకు విజ్ఞానసంపాదనమునకు పర్యవసానమొనరించుచి, తిద్విజ్ఞానమును గుప్తపాది ముగదొంగుటచే, ఆ సేవచికిత్సకుల యనుభవకాభము భగతిభూతమునను ముగ్ధుగిపోయెను. అట్టియనుభవమును గ్రంథస్థ మునర్చుటకు వలయు భూమిపరిచయభావము వలన కొందఱజ్ఞానము నిరసయోగ మై శైధిల్యమును బొందెను.

మనదేశమున పశుగణ మెక్కువగాగలదు. రయితులసంఖ్యయు చాలగలదు. ఒక చికిత్సకుని శ్లోయముగ బోషింపగల పశుగణమును పెంచెడి వైద్యురయితుల సంఖ్యయే యెక్కువగాగలదు. అట్టివారు తమ పశువులను భగ్నచికిత్స చేయుచుకొనగలవారలే గాని ద్రవ్యమొసంగి వైద్యునిపోషణమునకు దొడ్వడువారరదు. వివేచితమైన వెలలకు పశువులను కొనుటకు పశుగణపడినట్లు కొన్నియూకలిచ్చి నానికి చికిత్స చేయంగుకొనుట కింకను రయితులు చక్కగా నలవాటుపడలేదు, అదియునుగాక ప్రభుత్వమువారిచే నియమింపబడిన “ వెటరినరీ ” వైద్యులసంఖ్య మిక్కిలికొంచెముగా నుండుటచే నారి వలన నుపయోగము రయితుల కందరికిని అందుబాటులోలేదు. ఇన్నిచోటు లంగును అట్టి వైద్యమునకు ప్రోత్సాహము కలుగకున్నది. “ వెటరినరీ ” వైద్యము కేవలము మౌనద్రవ్యము

పదతికి విరోధమయినదనయు, అందువలన నిరపయోగమయినదనియు, సనేహులకు ప్రమయింకను గలదు.

ఈ పరిస్థితులను చక్కబరచుటకు గాబోలు ఆంధ్రరయులు తెప్పవగా లాభపడుటకో యన శ్రీరాములుచౌదరిగారిని శ్రీరామచంద్రుడే రచనకు బ్రోత్సాహపరచెను. ఈగ్రంథముయొక్క యుపయోగము త్వరలో నాంధ్రదేశమునకు ఆంధ్రరయులను పృథక్పడునటు నిస్సందేహము. ఇయ్యది ప్రతిరయులకువద్ద నుండవలసిగి. ప్రతిగ్రామ పాఠశాల వున్న భారతాగారములలోనుండి సానిక సంఘములు రయులసంఘమునకు దోడ్పడుట యవసరము. ప్రతిగ్రామోద్వోగి కార్యస్థానమునందు చౌదరిగారి గ్రంథము నుంచి రయులు కొరిసప్పుడు చగువుకొనుట కనువేర్పరచినచో ప్రభుత్వమువారును రయుల, కృతజ్ఞులను బాతులయ్యెదరు.

ప్రతి భక్తాయుక్తేంద్ర వైద్యశాలకును సానిక సంఘము లీగ్రంథములను సరఫరా చేయుట యుచితము. చౌదరిగారి ప్రయత్నమునకు ఫలము రయులందరకు ఈగ్రంథము అందుబాటులో నుండుటయే. వాగ్గ్రంథములుగల గ్రామగ్రంథాలయములు రయులకు మఱితయుపయోగకారులుగ నుండగలవు.

శ్రీయుత శ్రీరాములుచౌదరిగారికి ఆయురారోగ్యములను దైవము ప్రసాదించి, యింక నిట్టి యనుభవ చిక్తేన్ గ్రంథములను రచించుటకు ధీసంపదలను గల్గించి దీనించు గాత.

గ్రంథాలయాల కల్పతరువు

పాతేని కొత్తని, అన్నికెముల నుంచి గ్రంథాలు, పత్రికల పాత్రసంచికలు, గ్రంథాలయాల కుడికరించు రిజిస్టరు వగైరా కావాలంటే—


గ్రంథాలయ పుస్తకశాల,

పటమట (వయా) బెజవాడ చిరునామాకు వ్రాయండి.


బ్రాంచి : తెనాలి

—, మావద్ద దొరకు ముఖ్యగ్రంథములు :—


1. బ్రిటిష్ మహాయుగము
2. వైదికశిలము
3. సభలత
4. ఆనాడు చనువైద్యులంతామణి మున్నగు పశువైద్యగ్రంథములు
5. గోపేటి జోగిరాజుగారి వ్యవసాయ శాస్త్రగ్రంథములు
6. ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ సంఘమువారి అన్ని ప్రయత్నములు



అంధ్రశాసిత పుస్తకాల విద్యార్థిబృందము — తేనాలి.



శ్రీ గుంటుపల్లి సూర్యనారాయణగారి వద్ద ఎడ్లప్రభ
పెదగొట్టిపాడు, గుంటూరు జిల్లా.



శ్రీ కన్నెగంటి జగ్గయ్యగారి ఆవు.
నాలుగు దూడలను ఒకేవర్షాయము పెట్టినది. అయితానగరం గుం.జి.

తొలి పలుకు

శ్రీ యేశ్వర్య శ్రీ రామలుకాదరిగారు రైతుబిడ్డ వ్యవసాయము పశుసంపదలకు హక్కుదారుడు. భారతావనిని పోషించుకర్త శవరమునకు ఆలంకారప్రాయముడు. ఈయన అనుభవ పశువైద్య చింతామణి రచించడమంటే నిజముగా తన జన్మధర్మాన్ని నెరవేర్చడమే. జీవితాన్ని సుకృత పరచుకొండమే.

ఇది యమాల్యగ్రంథము. పశువుల విషయములో ఇది చింతామణిగా గుపచరించవలెనని శ్రీ రామలుగారు చేసికొనిన సంకల్పము పూర్ణముగా నెరవేర్చడానికి వారీ రచనలో బాగా పాటుపడినారు. విషయ మొక్కటికూడా చదవకుండా చేర్చడానికి పరిశ్రమ చేసినారు. ప్రాచీన పశుసంరక్షణలో వారంగింది లోకములోని ముఖ్యప్రాంతాల పశు సంపదను వర్ణిస్తూ గ్రంథాన్ని ఇంగుడిమూడు భాగాలుగా విభజించి స్వప్రాచీనర్యాచీన విజ్ఞానాన్ని మణిహరంగా గూర్చి తెలుగు లలికి కానుకగా సమర్పించినారు.

అనేకపశుసంతతుల శరీరకాస్త్రం, శల్యకాస్త్రం, సిండ్లోత్పత్తిక్రమం; ఆహార క్రమం, ఆరోగ్యనారోగ్యపరిస్థితులు, రోగముల నివారణ చికిత్సలు, చికిత్సాద్రవ్యాల పరికరాల వర్ణనలు మొదలయిన విషయాలేగాక పచ్చికబయళ్ళు, పాడిపత్రిశ్రమలు, లోళ్ళ పరిశ్రమ, సకరాలలో పాడిపశువుల జరిగే అవచారాలు, సద్వయ్యవ్యవస్థ వైద్యులకై చాలు వ్యగ్రరా విషయాలన్నిటిలో విశదించినారు. ఈ గ్రంథాన్ని పశువైద్య విజ్ఞానసర్వస్వమని పరిగించినా తప్పుగా దేవు.

పశువైద్యంలో స్వోచ్ఛక్తి ప్రథమస్థాన మాక్రమిస్తుంది. శ్రీ రామలుకాదరిగారు ఆపదాచారాన్ని ఆలంబించినారు. రోగానికి చికిత్స చేయడానికింటే రోగం రాకుండా చూడడం వైద్యుని విధియనేని వీరు చక్కగా స్పష్టపరిచినారు. ఇదియే కాస్త్ర గుణం. ప్రాతము రోత్రాలు అంటే మొదలుగాగల విషయాలను వివరించి వారంటే ప్రజలు సరిగా ఆర్థించేమని వినియోగించుకోవలెనని హెచ్చరించడానికే యశజము స్పష్టము. ఈ ప్రాచీన వైద్యములో ఇతరజ్ఞులు విధానానికీకూడా ఆధారమున్నదని వీరు పరిశోధించి వివరించినారు. మనశాస్త్రాలలో ఇరుడి జ్ఞానము విషయంలో వీరికడవిశేషమున భక్తి. ఇది యసురటం చేసిన వీరు అభివన సహజేవానికులు గావడం పొగగిరి.

అయితే వీరిని లోకపరిపర విశ్వాసభోగిగాదు. వారిమాటలలోనే వారి యశి ప్రాయముకు చెప్పడంబూచిరి. “కొండల వైద్యులు తమ కాస్త్రమే ప్రపంచములో గుప్తకాస్త్రములకంటే మించినదని ఏవో విధముగ గుప్త పాతుకు స్రవయ్యింతురు. ఇట్టి యశిమానము కొంతవరకుండవలసినదేగాని మంచిచెడ్డల నాలోచింపక తాబట్టిన కుంజేటికి మూడు కాళ్ళేయవారికి శ్రోత్రనిషయములు బోధిండుట చాలకష్టము”.

తెలిసీతెలియక వైద్యము చేసి లోకాన్ని మోసపుచ్చేవారి యెడల వీరకిల యానే దన గ్రంథములో మాటిమాటికి కరుణిస్తూనేవుంటుంది. “సూత్రవాయా పశులగు పశు వైద్యులు తగినంత శాస్త్రజ్ఞానముకలిగి చాల అనుభవముతో చికిత్స చేయవలెనగాని ... వైద్యమంతా నాకే తెలియును గర్భముతో తెలిసీతెలియని పుడుగుబోన చింపరాదు. అట్లుచింపిన నీకేగాక నీకు పుంబమునకు గూడ నుపాధిపాతము పుట్టుకొనుట చాలాకష్టం.

ఇతరవైద్య పద్ధతులను వినియోగించుకొనే నిషయంలో వీరికి సహాయదారాశయాలున్నవి. “ఇప్పటికాల పరిస్థితులనుబట్టి అన్నిరకముల వైద్య శాస్త్రము గ్రహించి ఏరియుపయోగకరముగా నుండునో దానినే స్వీకరించు” అని వీరి ముఖ్యప్రతిపాదక. కాబట్టి వీరు తనగ్రంథములో సామాన్య పశువుల రోగముల చికిత్సలు నివారణములను పాడి పశువులలోగల చికిత్సల సందర్భములలోను గూడల రోగచికిత్సల సందర్భములలోనూ వీరు అంగ్లేయవైద్యశాస్త్రములలోని వివరాలన్నిటినీ గూడ ఇచ్చినారు. ద్రవ్య జ్ఞానంకే పస్తు గూల వివరం భాగంలోని వీరు అంగ్లేయవైద్యజ్ఞానాన్నిచ్చే ప్రయత్నించారు. ఆ సమయంలోను గురించి వ్రాయడంలో వీరు ఇతర జాతీయాల చేసిన పరిశోధనల తత్ఫలముల వివరించుటకు వెనుదీయలేదు. విషతర్రాన్ని గురించి వ్రాస్తూ 1903 వ సంవత్సరంలో క్వీన్స్ లాండులో కలిగిన యనుభవాలను వ్రాసి నానా లే మ్యూజి-ముదాహరణగా ఇప్పుడవుతుంది. చిత్తాకర్షకమునకు సుదాహరణగా పోలీస్ యిన్స్పెక్షన్ సెంటిన్స్ వ్రాసిన సంగతి ఆవులను రంగరింపజేసి పాలిస్తూ పిత్తము కేయింపడటం. ఇయ్యంబులలో ప్రయోగిస్తున్నారట! చేపని పశువులకుడ చేపానిచ్చి తిన్నగా నాటి వుంటుంది!

రైతులకు వీరేదీప సలహాలని కోర్కె ఉన్న ముగ్గురి సేవక. “సామాన్యముగా పశువులకు సంభవించు రోగములలో చాలావరకు ఏ చికిత్సయు లేకుండానే శ్శపోవును! అన్నారం. మానవవైద్యంలోనూగూ ఇది జరిగే. ఎలరాలనుచి చేసామని ఆమోమునకే కొద్దిరోగాలకు నుదులే పలికేను. నీర్వి శ్చికిత్సలేవైద్యులు శ్రీ గాములను టి గారెనలో యొకరిద్దరేయుందురు.

“ఒక్కొక్క వ్యాధికి ఇన్ని చికిత్సలెందులకా మని అనుకూలపరచాడున్నాడు. పల్లెగామములలో అన్నిరకముల వస్తువులు అందుబాటులో నుండుట కష్టము. అందుచేత మీకే వస్తువు దొరుకునో దానినే తెచ్చి చికిత్స చేయుదురుగాక” అన రైతు చింతాని సన్నిహితంగా ఉండే వస్తువు నుపయోగించమని పోత్సహించేదానికంటే మనము చేయగల మేలులేదు.

“వైద్యులలో కొంతమంది అతిగర్వముగానుండురు. వారి యింటిదట్టు తిరిగి నవ్వుటికి ఒక్కొక్కసమయములో రారు. ఇట్టివారితో వైద్యముచేయించుట పొర

బాటేగానుండ ఆ రైతునకుగూడ మహాపాతకము దట్టుకొనును." రైతుబిడ్డ వ్యవసాయంగానుంచి వచ్చే యీమాటలు అన్ని సర్గాల వైద్యులు గ్రహించవలసియుండును. వైద్యము విశ్వకర్తపూజ. సమ్రాతకు తావలము కాదగినది. భూతదయలేని వైద్యున కి సమ్రాతరాదని మీరు పూజచేయు చాటివారు.

శాస్త్రసంగ్రహమున పరిశోధన పశుచికిత్సకు ఆధారమని శ్రీరాములుగారు బహుస్పష్టంగా విశదీకరించినారు. మూఢాచారాలను పేర్కొని ఖండించివైచి వారు. పెద్దరోగమునుగురించి వ్రాస్తూ "ఈ వ్యాధికి గ్రామజాతరలుచేసి జంతువులను బలినిచ్చుచున్నారనిన ఆతరువాత మూలతపోన" వ్నారోకచోట.

రోగనిదానము, మోతాదులు, వైద్యరాలకు గురించి మీరు వ్రాసిన విషయాలు చదివితే సరిశోధనలుచేసి కంత గట్టిగా పోరో స్పష్టమవుతుంది.

తన్నుగురించి తాను ఏమివ్రాసుచున్నానో చూడండి.

"నా" ఇంటిలో సందర్శనమునంచి న వైద్యములో ప్రశంసమున్నది. ఈ వైద్యపరిశోధనకొరకు కొన్నిసేపు మాటలు ఖర్చుపెట్టి మెన్నో గ్రంథములు పరిశీలించి తటాకపడుచున్నప్పటికీ ఇంకా చాలా అనుభవం కావలసేమాయని అప్పుడప్పుడు సంశయపడుట తలపెట్టుచున్నాను."

ఇంత వివేచనశక్తిగల శ్రుతునితో రైతులో లోపల శత్రువులు పరిపరిచి దోపయోగార్హము అయిన ఆ ఆసుధను పశువైద్యుని తానుజేరి వ్రాసుచున్నాననిన ఆంధ్ర భూమిని నొప్పు మిద్యునునవలెను. విషయగూఢాభిషేకము యీ వైద్యరాజుకు విశ్వవిజయమాలమగుచు విశ్వకర్త మహాప్రసాదము గలగు మెలుకు సంకేతముకేను.

ఈ గ్రంథములో కొన్ని ఖట్టాలు చలవనా చిత్రాలై చూపుకోదానికి అవకాశమున్నది. శ్రీరాములుగారి పాండిత్యమేగాక వ్యవసాయ కూడా అట్టి ఖట్టాలలో పరిస్పృటమవుతున్నాము. వారిని వట్టి వైద్యవృత్తిగాక దేశభక్తుడయి సంఘాభ్యుదయ దృష్టియనెడల గుఱవవుతుంటుంది.

మన భాగవతములో ఆత్మప్రాచీనకాలమునుంచి పర్వత శాస్త్ర గౌరవమునలన బెట్టుచు నూతన పరిశోధనల ఫలములను తిలకింపక సత్యాన్వేషణదృష్టితో స్వీకరించు శ్రీరాములు చిద్రబోటి సమ్రాటులు మనశోమునలన బయలకనుచు గుఱవలెను.

మ ద్వా సు
26—7—45

}

నిత్యసత్యాన్వేషి

గ. హరిన ర్వాత్తమ రావు ఎం. ఏ.,

ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ సంఘాధ్యక్షులు.

విన్నపము

“ గోవుమాలచ్చిమికి కోటిదణాలు
మనిసికై నాలేని మంచిపోకిళ్లు ”

భారతదేశము కృషీవలుల దేశము. వ్యవసాయమే భారతీయులకు ప్రాణాధారము. వ్యవసాయమునకు మూలము పశుసంతానము. పశుసంతానమెంత వృద్ధిలోనున్న భారతదేశమంత పాడిగంటలతోగలగి భాసిలును. భారతవరము ప్రపంచమునకు బాడియావు. భారతదేశమునకు యిష్టదేవతగోమాత. భారతీయులన్న ధనము గోధనము. అందుచేతనే భారతీయులు గోవులను శ్రద్ధాభక్తులతో పాలింతురు. పూజింతురు. భారతీయులు గోపాలురు. కృష్ణభగవానుడు గోపాలుడు. గీతామృతముగ్రోలు భారతీయులు గోసంతక్షణారము దీక్షవహించుట శుభావహము పరమధర్మము. సహజేవుడు పశుపాలనా దీక్షాదక్షుడు. పశువైద్య చికిత్సాప్రవీణుడు.

పశుపాలన యుగము మానవజాతి వికాసమునకు బ్రారంభము. ఆకాలమందు పశువులేభాగ్యము. పశువులే జీవనాధారము. పశువులున్నవారు భాగ్యవంతులు. పశువులులేనివారు గర్భదరిదులు. ఆకాలమందు గోదానమే దానములలో గొప్పదానము. పుణ్యకార్యములలో గొప్పపుణ్యకార్యము. ఆకాలమందు గోహత్య ధనోపరాక్షస కృత్యము. మంభీసక హేతువు. గోపాలము గాయత్రీమంత్ర జపత్యమని వేదములు కీర్తించెను. ఉపనిషత్తు లుపన్బద్ధించెను. పురాణములు ప్రకటింపగా. ఋషులుపాలించిరి. భూతదయ పురస్కారాధరము. ఆహార పరమధర్మమని మరలుచాడెను. పుగత్యము నశించెను. మానవత్వము లేరైతెను.

కలియుగము ప్రారంభమాయెను. సూత్రవస్తుపృష్టి విలసిల్లెను. మానవవికాసము నకై గ్రాతగ్రాతమార్గములు త్రొక్కిబడెను. కృషివాణిజ్యాదులు ప్రబలెను. పాడిగంటలు పరిల్లెను. యంత్రము లవతరించెను. పశుపోషణలేగ్గెను. జీవహింస జీవధర్మమాయెను.

అయ్యో! ఇంకేమి వస్తుదును! వనదేశదౌర్భాగ్యస్థితి? జాతీయవికాసమునకు దోడ్పడిన పశుసంతతి, ఆరీకౌఠ్యుడయ్యునకు సహాయపడిన పశుసంతతి, వ్యవసాయము నకు మూలాధారమైన పశుసంతతి, తుదకు ప్రాణాధారమైన పశుసంతతి కృశించి నశింప దినములు వచ్చెనుగాదా? ఋషులు పూజించిన ధేనువులు కనాయినాని నిశితఖిన్నమునకు గురికావలసి వచ్చెనుగాదా? హరిహరా! శ్రీహరి!! ఎక్కడ నున్నావురా! కృష్ణ!! గోపాలా!!! రాక్షసకృత్యముగా జలందిన గోహత్య రారవాడినకహేతువుగ పరిగణించిన గోపధనము సత్యకృత్య మాయెనుగా! కలికాలము!! వివాళకాలము!!!

మంచిమంచి గోవులు మంచిమంచి కోడెలు తక్షణవయస్సులోనున్న మంచిమంచి పెయ్యలు విదేశీయ వధ్వనానములందు “ ఆంభా ” అని అడులుచున్నవి. ఎక్కడ మాచిన పశుగోల! కడుపునిండ మేలేలేదు. తిడుగుటకు తగిన స్థలములేవు. నిలువనడలేదు.

అబ్బంబానారణ్యము లేమాయెనో! ఆ యాలమండలేమాయెనో! ఆ గోపాలులేమాయెనో! నేడు ఆరణ్యములన్నియు చేధింపబడుచున్నవి. బీళ్ళన్నియు నేద్యములగుచున్నవి. కాని ఆళ కంతములేదు. మనదారిద్ర్యమునకు దీరలేదు. కిగవులకు లెక్కలేదు. పెద్దలు చెప్పినమాట వ్యర్థమగునా? పశుగోలయున్నంతకాలము శిశువులగోలలేప్పుడు. శిశుగోలయున్న దేశము క్షీణించును. ఒకప్రక్క పశుగోల, మరొకప్రక్క శిశుగోల! ఇంక దేశమెట్లు బాగుపడును? బిడ్డలకు కమ్మనిపాలులేవు. కమ్మనిపెరుగులేదు. కమ్మని వెన్నలేదు. కమ్మనినేయిలేదు. ఇంకబాతి నర్జీర్యముగా కలుగును? రోగములేల వీడించవలెను? పృథ్వీదేవత సృత్యమేలసేయదు? బిడ్డలకు పాలుకొపలిన దబ్బాపాలు! నేయి కొపలిన క్రావుతొనిండిననేయి! పశుగోలలేని దేశమే, శిశుగోలదేశమే, స్వర్గతుల్యము. ఆదేశమందు లక్ష్మీతాండవమాడుచుండును. విజ్ఞానమువెల్లి విరియును. స్వాతంత్ర్య దేవత ప్రత్యక్షమగును. ఆచారి భాగ్యభాగ్యము లనుభవించును. ఇందుకు తార్కాణము జర్నలి, అప్రీయియా, అమెరికా దేశములే.

కాబట్టి మనదేశము స్వర్గతుల్యముగ నుండవలెనన్న, మఖిక్షముగ నుండవలెనన్న, పాడిపంటలతో నిండి తులతూగవలెనన్న, బహుసంరక్షణ గావింపవలయును. మంచి మంచి ఆబోతులను పెంచవలయును. అందువలన పశుసంతానము వృద్ధియగును. బలముగల కోడెమాడలు, అండచండములుగల స్త్రీలు, నేడు దొరకుటే కష్టము. కారణము మన అశ్రద్ధయే! ఆలక్ష్యమే! అజ్ఞానమే! పూర్వులు చుక విధిగా మంచి శుభలక్షణములుగల ఆబోతులను ప్రతిగ్రామమునందును పరమభక్తిశ్రద్ధలతో పోషించెడివారు. ఇప్పు డాశ్రద్ధలేదు. ఆబోతులున్నను వానిని పోషింపక మీదు మిక్కిలి ఏ గంగిరెడ్ల వానితో, ఏ లంబాడిలతో, తరుముదురు. ఆందుచేతనే మనకి గతిపట్టినది.

పశుపోషణకై ప్రభుత్వమువారు శ్రద్ధవహించుట పరిమధగ్గుము. పూర్వము చంద్రగుప్తుని రాజ్యములో ఆహోకచక్రవర్తి సామ్రాజ్యములో పరితీ పల్లెయందును ప్రతి పట్టణమందును గోశాలలు పశుచికిత్సాలయములు నెలకొల్పబడెను. పశువుల మేతకై విశాలమైన బయలుండెడివి. ఇది చరిత్ర ప్రసిద్ధమైన విషయము. ఇప్పుడెప్పుడో మన ప్రభుత్వమువారు కూడ నచ్చులచ్చుట జంతువైద్యశాలల నెలకొల్పుచున్నారు. సంతోషము! ఏడులక్షలగ్రామములుగల భారతదేశములో ఏముఖ్యపట్టణములయందో పశువైద్యాలయములను స్థాపించిన ఏమిప్రయోజనమో కొంచె మూహించుడు. పశువులవారికిను తగు శ్రద్ధవహించి విడివిగా పశువైద్యశాలలను స్థాపించవలసియుండును. ప్రభుత్వము మీద ఆధారపడియుండుటకంటె ప్రజలే స్వశక్తితో నిట్టి కార్యమునకు బూనుట సర్వవిధముల శ్రేయస్కరమని నిన్నుచిందుచున్నాను. ఈ అనుభవ కళవైద్య చింతామణి, మా ఫార్మసీ మండలంతోనే ప్రతి గ్రామరైతు స్వశక్తితోనే వైద్యముచేసికొనవచ్చునని నా ఆభిప్రాయము. ఇదివరకు నేను వ్రాసిన గ్రంథములవ్యాస ఎంతో రైతుసేవ పశుసేవ జరిగినది. నేడు మరల ఈ చింతామణి నూతనరూపముదాల్చెను. మా ఆయుర్వేద పశువుల ఆస్పత్రి తరపున కొన్ని లోగములకు మందులను పరిశోధించితిమి. నా దగ్గర తగ్గిదైన విద్యాధులవలననే తేనెమి, ఈ గ్రంథములుమాది అనుభవము సంపా

దించిన రైతులవలననే లేనేమి వన పడెలగానుండు అనుభవపశువైద్యులవలననే లేనేమి ఈ 18 సంవత్సరములలో పశువులవహుడౌ శాస్త్రసమృద్ధిముగా వైద్యమున్నదాయను విషయము పూజాభిప్రాయము ఎల్లెడల నిప్పుటి సగిసితులతో చాటుచున్నది. గవర్నమెంటు వారు పశువైద్యమునకు ఖర్చుపెట్టెచట్టు ఈ సంగతులను యిచ్చి పనిచేయ మనండి. ఎంత ఉత్సాహముతో గ్రామపురస్థుల స్థానికేవలము లెమో చెప్పగలము.

ప్రభుత్వము లక్షలు ఖర్చుపెట్టి చేయుకార్యము ప్రజలు స్వయముగా, సులభముగా, సకాలముగా నిర్వహించుకొనగలరు. కొంచెము విచారించిచూడుడు. కొటి ఖర్చుపెట్టి దేవాలయములు కట్టించిన దెవరు? తటాకముల త్రవ్వించిన దెవరు? ధర్మశాలలు నిర్మించిన దెవరు? ప్రజలు! ఆమాయకలగు ప్రజలు!! ఈ కలియుగమందు సంఘశక్తియే! నిజపై న దైవధర్మశక్తి!! ప్రజాశక్తియే!!

కాబట్టి రైతుసోదరులారా! మా సాంఘిక శక్తిని మేల్కొల్పుడు. పశువైద్యాలయముల ప్రతిగ్రామములోన స్వతంత్రముగా నాపింపుడు. చీడపార్డు, గురక, రోగములతో వంకలు వండలు మృతికొందుచున్నను, యేమిచేయుటకు దోచకున్నది. సకాలములో చికిత్సచేయుటకు తగిన పశువైద్యులు లేరు. మంచి మంచి మందుమాకులు లేవు. ఇక దైవముమీద భారమువేయుదురు. అమ్మవారికి ముకుత్రులు కట్టుదురు. జాతర! పోలేరమ్మజాతర!! యని కొలువులు కొలుచుదురు. వేలకవేలు గుప్పెడురు. వందలకు వందల జీవములను కొని పోషింతురు. అమ్మవారి సంబరమునకై గణాచారములు పూనుదురు. నిరపాయకములైన నోరులేని గొట్టెలను మేకలకు దున్నలను కోళ్ళకు నిర్దయులై, కరిసాత్తులై, కలుసాత్తులై యనుకింకరులవలె దాయన నరుకుదురు. రక్తపు జ్వరములు ప్రవహించును. గ్రామములు దురంధధూయిష్టములగును. పశువాద్యములు పోయినను పోకున్నను కలరాదేవత తిరిగి ప్రత్యక్షమగును. ఇది వాస్తవము. ఇంతకంటె భూరరాక్షసకృత్యమేమిన్నది? పజలకున్న ఈ మాధ్యము! ఈ దురాచారము!! రూపుమాసిపోవుటకు తగిన జ్ఞానమును భగవంతుడు ప్రసాదించుగాక!

మా ప శు వై ద్య స ం స్థ లు

1928 వ సంవత్సరములో పశువైద్య చింతామణి 1929 వ సంవత్సరములో పశువైద్య పన్నుగుణదీపిక 1930 లో పశుసేత్ర చికిత్స, పశుప్రణచికిత్స 1932 కోళ్ళ పరిశ్రమ, పశుసంరక్షణపుత్రక, 1933 లో అనుభవ పశువైద్య చింతామణి, 1934 నుంచి 1945 వరకు పశువైద్య కళాశాల, విద్యార్థుల ట్రెయినింగు, 1937లో పశువైద్యమునకు సంబంధించిన 22 పశువైద్య గ్రంథములు 1938 లో ఆంగ్లభాషిత పశువైద్య విద్యావీక్షము రిజిస్టరు చేయించుట, 1942 లో ఇండియా గవర్నమెంటువారు వారి ఎగ్జిల్యురలో రిసర్చ్ లెప్ ట్టుకు కమిటీకి నన్ను ఆనరరీ మెంబరుగా నియమించుకొనుట, 1943 నుంచి నేటివరకు సహజేన పశువైద్యపార్శ్వనీతి సంబంధించిన పశువుల గుట్టుముల మృదులు తయారుచేయుట మున్నగు పనులు జరిగినవి. చేయవలసిన పని

ఎంతో గలదు. మానవాయుశ్శేషమునకు ఎంతోమంది నేపచేయుచున్నారుగాని ఆయుశ్శేష పశువైద్యమునకు నేనొక్కడనే నా స్వకర్తితోనే తంటాలుపడుచున్నాను.

యింతియేగాక మానంశలయందు ప్రత్యేకశ్రద్ధ తీసికొని మాకన్నివిధముల సాయ పడుచున్న శ్రీ ఆచార్యరంగా, కల్లూరి చంద్రమూర్తి, నన్నపనేని వెంకట్రావుగార్లకు, ఈ చింతాసుజి ప్రింటింగునకు ఎక్కువ ప్రోత్సాహ పరచిన పట్టణవాస్తవ్యులగు శ్రీ కోగంటి తాతయ్య, యీ శివయ్య, యీ తిరుపతయ్య, ఆలపాటి వెంకట్రామయ్య గార్లకు, ఈ గ్రంథము సహాయముచేసిన తదితర మిత్రులకు మా సంసలను తెనాలి పట్టణముజేర్పిసెదిలగాదు నేటివరకు అత్యంతప్రేమతో తగు శ్రద్ధతో జూచుచు చక్కని సలహాలిచ్చుచు, ఈ గ్రంథముద్రణకు ప్రోత్సాహమిచ్చిన శ్రీ పాతూరి నాగభూషణం గార్కి, ఈ గ్రంథముద్రణకు ఎక్కువ విరాళమిచ్చి ప్రోత్సహించిన శ్రీ యలవర్తి శ్రీరాములు, గుంటుపల్లి నూర్యనారాయణగార్లకు నామనఃపూర్వకవందనము లర్పించుచున్నాను.

మూ డ వ కూ ర్పు

పదిసంవత్సరముల అనభవముమీది మరల తృతీయ ముద్రణ రచింప బూనితిని. ఈ యుద్ధపరిస్థితులలో సకాలమునకు కౌగితము దొరకక పోవుటవలన చాలఆలస్యమైనది. ఇదివరకు వ్రాసిన గ్రంథములకంటె పశుసేవ, రైతుసేవఎన్నో రెట్లు చేయగలవని నానమ్మిక. ఈ గ్రంథమునకు తోడ్పడిన గ్రంథకర్తలకు నావందనములు. బహుకార్య నిమగ్నతయ్యై తమవీరిక నొసంగిన శ్రీయుత గాడిచెల్లె మరీసశ్శోభనరావు ఎం. ఏ., గారికి మిక్కిలి కృతజ్ఞుడను. ఎంతో ఓర్పుతో కష్టించి ఈ గ్రంథమును ముద్రింపించి, యిచ్చిన లక్ష్మీ ప్రెస్ ప్రాప్రయిటర్ ఈ గ్రంథములో నున్న సొటోలుజేసి యిచ్చిన శ్రీ గోలి శేషయ్య, డి. యం. ఇ. యస్., ఆర్టిస్టుగారికి నా వందనములు.

ప్రోవడమవారికే కాలుజారునను న్యాయము పనునంది నా యీ గ్రంథములో సనేక పొరబాటులుండవచ్చును. నేనే పెద్దకాస్త్రవేత్తనని గర్వపడుటలేదు. నాకర్తీ యున్నంతవరకు నోరులేని పశువులకు నేవజేయ సంకల్పించుటే నా ప్రతిజ్ఞ.

ఆంధ్రరైతు సోదరులారా ! ఈ చింతాసుజిని అదరింపుడు. దీని ప్రయోజనము బాగుగా లోకమునకు వెల్లడింపుడు. జీవకార్యమును ప్రదర్శింపుడు. పశుసంరక్షణకు పూనుడు. పుణ్యాత్ములు కందు. ఇదియే నా తుది ప్రారస. భారతవర్షము భాగ్య భాగ్యములతో తులతూగునుగాక. తిరుగని పాడిపంటలతో పరలునుగాక.

ఇట్లు,

గృంథకర్త.

విషయ సూచిక

ప్రథమ భాగము

	పుట		పుట
ప్రాచీన పశు సంగ్రహము.....	1	కపిలియన్ జాతి	85
గోవులు.....	2	తంజావూరు జాతి	86
మహమ్మదీయుల పశుసంగ్రహము	6	కంగాయం జాతి	87
బుద్ధుని పశు సంగ్రహము	9	మధుర జాతి	89
అశ్వశాస్త్ర కృష్ణదేవరాయల పశుసంగ్రహము	11	గుంమారు జాతి	91
శివుల పశుసంగ్రహము	12	సింధుజాతి	92
పార్శ్వనాథి పశుసంగ్రహము	13	నాగపూర్ జాతి	94
విదేశీయుల పశుసంగ్రహము	18	పంజాబుజాతి	95
ప్రాచీన ఋషిశిష్యుల ధర్మసూత్రములు	21	తార్ పార్కూర్ జాతి	96
రెండవ భాగము		బొంబాయిజాతి	97
ప్రాచీన భారత శైలి	24	భగ్నాజాతి	98
పశుసంపద - సంపత్సేనాదాయము	26	హల్లీకర్ జాతి	99
భారత దేశములోని పశుసంఖ్య	27	దేవరకొటజాతి	100
చెన్నరాజధాని పశువులు	28	అలంబాడి జాతి	100
ఆంధ్రరాష్ట్రములోని పశుసంపద	30	బత్తూర్ జాతి	101
మూడవ భాగము		ద్యోమీజాతి	102
స్వస్థపక్షము	31	కిలారిజాతి	103
అపారపాదీయములు	32	కృష్ణవల్లిజాతి	104
పశుకాల - వివరములు	37	మెహవతిజాతి	105
కాలముల ననుసరించి పశుపోషణ	44	డజ్జాల్ జాతి	106
నాలుగవ భాగము		హరియాన్ జాతి	107
పశు గ్రాసము	45	షహివాల్ జాతి	108
పశువులశ్లేష్మ	53	విదేశీజాతులు	109
సిండులను తియ్యరు చేయుట	62	దున్నలు - శివజాతులు	119
గడ్డిజాతులు	65	ఆరవ భాగము	
కొడజాతులు	69	పశుపరీక్ష	124
అయిదవ భాగము		పశువుల కాపరి	125
పశు జాతులు	71	పశువుల వయస్సు కనుగొనుట	126
అమృతమహల్ జాతి	74	ప్రాచీన ఋషుల పోధ	127
సింగోలుజాతి	81	ముహూర్త చక్రములు	132
		మంచిగోవు తత్వములు	135

వృషభమునకుండవలసిన లక్షణములు	136
గౌతమ, దున్న వుండవలసిన లక్షణములు	137
అక్షిపణ లక్షణములు	138
కొమ్మల శుభాశుభ లక్షణములు	140
రంగులనుబట్టి శుభాశుభ లక్షణములు	141
సుశ్రవరీక్ష శుభమును కలుగ జేయునవి, ఫాటో	143
అక్షిపణగల సుర్లు - ఫాటో	146

ఏడవ భాగము

ద్రవ్యజ్ఞానము	149-189
---------------	---------

ఎనిమిదవ భాగము

అంగీయ పశువైద్య పస్త్యుగదీపిక	190-199
------------------------------	---------

తొమ్మిదవ భాగము

పశుదేహ నిర్మాణము	200
అసిపంజరపు భాగములు	201
కండర మండలము	214
జీర్ణ మండలము	216
రక్తిప్రసరణ మండలము	223
శ్వాస మండలము	229
నాడీ మండలము	230

పదియవ భాగము

పశుగోగ విజ్ఞానము	234
ప్రాచీన ఆయుర్వేద పశువైద్య చరిత్ర	235
గోగ విజ్ఞాన నూత్రములు	243
వైద్యులవలన ప్రమాదములు	248
తెలిసి తెలియని చికిత్సలు చేయరాదు	249
వైద్యములో కలుగుచుండు మార్పులు	250
వైద్యుడు తెలిసికొనవలసినవ్యాధిచరిత్ర	251
గోగములను పరీక్షింపవలసిన సాధారణ	

కాంశములు

గోగమునకు చేరు వెంటనే పెట్టరాదు	254
శీతోష్ణ పరిమాణములు తెలిసికొనుట	255
ధర్మామీటరుతో పరీక్షించుట	256

శ్వాసమాసము	257
సైతవ శాస్త్రతో పరీక్షించుట	259
నాడి పరీక్ష	260
శ్వాస పరీక్ష	262
అశోగ్య, అనాశోగ్య లక్షణములు	263
మఖి, నేత్ర, నాలుక పరీక్ష	264
మల, మాత్ర పరీక్ష	265

పదునొకండవ భాగము

భేషజకల్పము	266
జౌషధములు త్రాగిండు విధానము	269
జౌషధ నిర్ణయము చేయుటకు సాధనములు	272
రసములు	273
జౌషధములు చేయుట	274
క్షారకర్మ	275
శేష్యములు, తూనికలు, కొలతలు	276
మోతాదులు, సవ్యములు	278
ఘాతము, అంజనము	279
గంధావము, శిరోమర్దన, నడికాపులు	280
చూర్ణములు తయారు చేయుట	281
మాత్రలు చేయుట	283

పందెండవ భాగము

పశువులను పడగొట్టుట	284
మందులు త్రాగిండుట	287
ఎనిమాచేయు పద్ధతులు	288
వారలు చేయు పద్ధతులు	292
పాచిత్య, ఆయుర్వేద ఇంజెక్షన్సు	294
పదమూడవ భాగము	
పశువైద్య నూత్రములు	298
సూక్ష్మజీవుల చరిత్ర	303
పశుజాతికి హని కలుగ జేయు తగలు	309
ప్రేగులలో పుట్టు క్రిమిలు	322
లో అవయవముల జబ్బులు	326
అంటువ్యాధుల పటిక	327

పెదరోగము	పుట	పుట
దొమ్మరోగము	328	లిమరువారము
నెరడు దొమ్మ	343	ధనుర్వారము
సిటి దొమ్మ	345	అండవారము
చలి దొమ్మ	346	పక్షవారము
నాలి దొమ్మ	347	పదునాటవ భాగము
గాలికుంటు	348	పశునేత్ర చిత్రము
గురక	350	కంటి పువ్వులు
జెబ్బవారు	354	కంటి పొరలు
కురమ	357	అవిరి
మహుచి	359	కామెరు
	362	కంటిజబ్బు, కంటితెలుపు
పదునాలుగవ భాగము		కంటివిరుపు - నిరు
అజీర్తి	364	కంటి పునులు
కడుపుబ్బ	366	రేడికటి
కడుపునొప్పి	369	కండకలక
మలబడకము	370	చృష్టితగుట
విశేషములు	371	కంటిమాద
రక్త విశేషములు	373	కొయ్యగండలు - దుర్గాంశము
పొందురోగము	374	పదునేడవ భాగము
జలదారము	375	క్షయ
గర్భకూల	376	ఘర్భవ్యాస
కొరిజవ్యాధి	377	న్యూమోనియా
మలమూత్ర బంధరోగము	378	దగ్ధ
గుండ్రని పురుగులు	379	రొంప
రొమ్మ నొప్పి	380	ఉబ్బసము
రక్తకూల	381	కసిమిరి
పదునైడవ భాగము		ముఖబంతి
శుద్ధ వారము	382	వీసస రోగము
క్షీణవారము	385	యౌవనభుందము
ఎందు వారము	386	శిరోరోగములు
అమ వారము	387	పిచ్చి
శిరో వారము	388	పొడుగువారు
గర్భవారము	389	కొమ్ముదొల్లులు
వర్షవారము	390	ఎండచెబ్బ

పుట		పుట
433	మూర్తికావతిము - పాలశర్వరము	502
435	ఇరువదియవ భాగము	
437	వత్సభృత్యము	504
	మాడల పోషణ	506
438	మాడలప సంభవించు రోగములు	514
440	ఇరువదివకటవ భాగము	
441	పాడి పరిశ్రమ	528
442	పాడిపశువుల కష్టపక్షములు	533
443	పాడి పశువుల విశ్రాంతి	535
	పాడి పశువుల యారోగ్యము	536
445	పాడి పశువుల పరీక్ష	537
447	సంతలలో మోసపుచేరములు	538
451	పాడెండినవి - గొడ్డుబోతువి	539
452	కవుడువలన కలుగు వ్యాధులు	540
454	గ్రామభోజులు ఉపయోగించుట	541
457	పలువిధముల వడిలి	542
458	పాలుపితుకు యంత్రము	544
	పొగుగు - క్షీరనాళముల వర్ణన	547
467	పాలలో నుండు వస్తువులు	548
468	పాలవర్ణన - విదేశముల పాడి	550
473	పాలలోని వాసనలు - గుణములు	552
477	పాలశువుల పాల గుణములు	556
479	వెన్న గుణములు	557
482	పెత్తన గుణములు	558
486	పాడిగేదెమీద వచ్చు ఆదాయము	559
489	పాడిపశువుల రోగములు	561
490	ఇరువదిరెండవ భాగము	
492	శస్త్రవైద్యము	565
493	గాయములలోని రుగ్మములు	577
495	శస్త్ర, క్రేటు, వంటు గాయములు	580
496	కట్టు, కట్టు, చికిత్సలు	581
499	ప్రణములు- పిండికట్టు-వత్తులెక్కించుట	584
499	కణకులు - అద్రుగణకులు	586
501	నిమకలు విరుగుట - చికిత్సలు	589
	మూర్తిరోగములు	
గర్భముగర్భము	438	
శిశువేదము	440	
అతిమూర్తిము	441	
వీక్షి-వ్యము	442	
విరుదరుప	443	
పదునెనిమిదవ భాగము		
కపోద్భూతి	445	
శస్త్రములచేయు విషయయోగములు	447	
పరిగిడి	451	
లేలేబొన్నతిన్న లక్షణములు	452	
విషమూత్రమింది యుండునవి	454	
లూతలు	457	
సర్పముల చికిత్స - చికిత్సలు	458	
పందొమ్మిదవ భాగము		
ప్రసవతంత్రము	467	
పశుగర్భ నిర్మాణము	468	
ప్రసవకాల పట్టిక	473	
గర్భములో పిండిము పెరుగు విధము	477	
మాడి పశువులకు వచ్చు రోగములు	479	
పశువు ప్రసవించు కీటులు	482	
ప్రసవము, బొడ్డుత్రాడు	486	
మావి	489	
మీయిదిగుట - చికిత్స	490	
మావిని తీపిచేయు పద్ధతులు	492	
ప్రసవించు లేక పశు అవస్థలు	493	
కవలమాడలు	495	
రెండుతలల మాడి	496	
గర్భమునందు మాడ చనిపోవుట	499	
ఆకాల ప్రసవము	499	
రక్తిద్రవము - మైల పడకపోవుట	501	

ఎముకలు తొలగుట - చికిత్సలు	595	చెవియాద	611
జెబ్బుకుడక వారుట	596	తలయాద	612
కాలు చెల్లపోవుట	597	పంపర - చేరువాపు	613
చెనుటగుల	598	అఱువాపు	614
తెలుగులు	599	గంగిడోలు వాపు	615
మోర్లునిగుట	600	బుడకొట్టుట - పట్కారుతో పట్టుట	616
మలిమిడి	601	గొంతుకు అడ్డముపడుట	618
గిట్టల క్రుళ్లుకు	602	చెవిలో నీము	620
కాలిగొట్టు - మందగుడి	603	దంకిరోగములు	621
గిట్టలపుండు	604	తామర - గజ	622
పురుగు తొలచుట	605	కాలిన బొబ్బలు	623
పులిపిరికాయలు, మెడనరముపట్టుట	606	నసిమిరి - రోకనసిమిరి	624
ఇరువదిమూడవ భాగము		పొడలు - వెంట్రుకలూడుట	625
రోకయాద	607	గోమారులు - బుడపుంజాలు	626
కొమ్ముయాద	608	జోరీగలు - మిన్నలులు	628
పాగ్గపుయాద	610		

శుద్ధ పత్రము

పంక్తి	పుట	తప్పు	ఒప్పు
2	27	21 $\frac{1}{2}$ కోట్లు	25 కోట్లు
3	27	2 $\frac{1}{2}$ కోట్లు	1 $\frac{1}{2}$ కోట్లు
14	200	పై పటము నందు	201 వ పేజీలో పటమును
,,	217	జీర్ణకోశము పొటో	ప్రేమల ఫొటో
19	479	పై పటమున	480 వ పేజీలో జీర్ణకోశము
11	503	32 ద్రాముల	3 ద్రాముల [ఫొటో]
13	503	3 ఔన్సులు	ఒక నేరు
2	525	$\frac{1}{2}$ తులము	$\frac{1}{4}$ తులము
4	525	ఒక చుక్క	6 చుక్కలు
7	589	16 ఔన్సులు	$\frac{1}{2}$ ఔన్సు
6	600	6 తులములు	12 తులములు
6	600	సబ్బు 2 తులములు	1 తులము
9	626	ఫిన్లెల్ అర్థ నేరు	2 ఔన్సులు
10	626	వేడినీరు నేరు	2 నేరు

అనుభవసశువైద్యచింతామణి

ప్రథమభాగము

ప్రాచీనపశుసంరక్షణ

“ సంపదలగూర్చి వ్యవసాయ సాధకముల
సాంపులంగూర్చి సాభాగ్య శోభగూర్చి
విమల విఖ్యాతితోగూడి వెలయునట్టి
పసులపోషణ పల్లెకు బాలవెల్లి ”

నల్లాపు లొకచోట నట్టాడుచుండంగ
గట్టాపు లొకచోట గంతులిడగ

పుల్లాపు లొకచోట బూరిమేయుచునుండ
వెల్లాపు లొకచోట వెన్నువిఱువ

బట్టాపు లొకచోట బాతాడుచుండంగ
బయ్యాపు లొకచోట బరుగులెత్త

బొంతాపు లొకచోట బొంగి పొర్లుచునుండ
మైలాపు లొకచోట మసలుచుండ

బాపనాపులు నొకచోట నేపున గావ
బొల్లియాపులు నొకచోట మల్లంప
నందడినిగొల్పు నాపుల మంజుపుడు
కటకటా ! కానిపింపవు గ్రామములను—“పల్లెటూరు”

పశురక్షణ భారతీయుల పత్రమైత్తమ ధర్మమై యున్నది. ఇయ్యది అత్యంత సనాతనముగ ఆగృధర్మము. ఈక్షణ భారతీయులకు మతధర్మముగా స్థిరముగా నేర్పడి యున్నది. హిందువులు, బౌద్ధులు, జైనులు మున్నగు మతములవారందరును గోవును అబోతును పరమధర్మితో నారాధింపదురు. ప్రాచీనులగు నార్యులకు వ్యవసాయమే ప్రధానకృషిగా నుండిటచే, నంగులకు వ్యవధముల సహాయ మత్యవసరముగటచే పశు వధవలన తమవృత్తికి భంగము కలుగఁచు నమ్మకముతో గోవధ మహాపాతకమని వారు కఠినముగా విధించిరిని కొందఱుఁగదురు. పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, మీఠా మున్నగు గోరసములు ప్రాణాధారముగ నాహారములుగా నేర్పడుటచే నిట్టియుత్తమాహారముల నొసగు గోవధ వధించుట మహాపాతకముగా విధింపబడెనని కొందఱుఁగదురు.

గోమయము మిక్కిలి పరిశుద్ధమనియు క్రిమిసంహరికమనియు మనపూర్వుల కత్యంతసమ్మకముగలదు. గృహాంగణములను సుభ్రష్టమచుటకు గోమయమిళితముగ ఉదకమునే యిప్పుటికిని గ్రామములందు పలువురు వాడుచుందురు. గోమూత్ర మాషధముగ పరిగణింపబడినది. సంజావ్యాధి, మాత్రకృచ్ఛము వ్యాధులుగలవారు గోమూత్రమును పానముజేసి విగతరోగులగుచున్నారు.

సామాన్యము, దుఃస్వేపము, అగ్ని, గోవు అనునవి పూర్వాచారపరాయణులకు పరమపూజ్యములు. ఉదకమున నిమగ్నలేపగనే గోవును చూచినపిదప గోప్రసక్షిణ మొనరించుట ప్రబలముగ నగు చారముగానున్నది. పుణ్యస్థానముల గోవు మహాలక్ష్మియని పనువుపంజమలతో, పుష్పములపలతో నలంకరించి నిత్యమును ముఖ్యముగా కొన్ని ప్రత్యేకదినములందు నారాధించెదరు. భిక్షులు భిక్షిపూరితులై స్వయముగా లేతపచ్చికల గ్రహించి శ్రద్ధతో గోవులగును గోపత్నీములనును చేతులారమేపుదురు. అందువలన తమకు తరుణాపాయము కలుగునని నిశ్చయముగా నమ్ముదురు. సాక్షాత్పరమదవతారమనియు పురాణపురుషుడనియు, గోరక్షకుఁడనియు, గౌతాచార్యుడనియు, పరమధర్మితో నారాధింపబడుచున్న శ్రీకృష్ణభగవానునిచుద్ధ కొన్నిలక్షల గోవులుండెనట. వారి కథల యందు గోపాలపరవృత్తుడు గోపాలబాలుడు అనునవి శ్రీకృష్ణున కన్వర నామములైనవి. ఆకఠిమనగూడ గోవులు పరమపూజనీయములైనవి.

అ.ది.క. మదహరించిన ప్రాచీన పురాణముల నూత్రముల గమనింపుడు.

గో పూ జ

గోభ్యో యజ్ఞాః ప్రసన్నంతే గోభ్యో దేవాస్సముత్థితాః

గోభ్యా వేదా స్సమ్మృతా స్సవడంగ పదక్రమాః॥ “భవ్యత్పురాణము”

గోవులపలన యజ్ఞములు గలుగుచున్నవి. గోవులవలననే దేవత ఉద్భవించిరి. గోవులనుండియే వేదములు బయలుదేరినవి.

పూజనీయతో గోపూజయే గొప్పది

అనాదేయా తృణం భుక్త్వాన్రవం త్యమదినం పయః

తుష్టి కృద్దేవతాదీనాం పూజ్యాగావః కథం న తాః॥

ఒకటియవండగనే ప్రతిదినము గడ్డిమేసి గోవులు త్రీగము నిచ్చుచుండును. దేవతలు మొదలగువారికిగూడ తృప్తిని గలిగించును. అందుచేత పూజలన్నిటిలో గోపూజయే పవిత్రమైనది కాబట్టి గోవు లెందుకు పూజింపఁగినవికావు?

యచ్ఛపాహత భూమేస్తు సూద్యతః పాంసుసంచయః


ప్రోధయే పురుషస్యైవో వంద్యా గావః కథం న తాః॥

గోవుడెక్కలు తగిలి మి మినుండి యెగిరిన ధూళి మాపవుల పాపము లన్నిటిని నశింపజేయునుగాదా! కాబట్టి గోవు లెందుకు పూజింపఁగినవికావు?

హరన్తి స్పర్శనాత్పాపం పయసాం పోషయంతియాః

ప్రాపయంతి దివం దత్తాః పూజ్యా గావః కథం న తాః॥

గోవులు స్పర్శవలన పాపములు పోగొట్టుచు, పోషిస్తుచు, పోషించుచు దాన మిచ్చినచో స్వర్గము నిప్పించును. ఇట్లు గోవు లెందుకు పూజింపఁగినవికావు?



గోవును పూజించుట

గోవులు సంరక్షించెనేని మనపాపములన్నియు పోవును

ఏకత్రపృథివీ సర్వా సశైల వనకాననా

తథా గౌర్జాయసీ సాక్షాదేక త్రోభయతోముఖా॥

కొండలలోను, జలములను అరణ్యములలోను గూడిన భూప్రదేశమంతయును నొకయెత్తును, గోవు ఒకయెత్తును అయినప్పటికి నుభయతోముఖియగు గోవే గౌరవముగా నుండును.

గవాంహితీరే వసతీహ గంగాపుష్పి స్తథాసాం రజసిప్రవృద్ధా
లక్ష్మీః కరీషేప్రణతోను ధర్మస్తాసాం ప్రణామం సతతంచ కుర్యాత్॥.

గోతీరమున గంగయుండును. గోవుల ధూళియందు పుష్పినొందించు గుణము గలదు. గోమయమునందు లక్ష్మీయుండును. గోవులపశువు సమస్కారమునందు ధర్మముండును. కాన గోవుల కల్గినవల సమస్కరించవలయును.

గామాభ్య నమస్కృత్య కుర్యాదస్తు ప్రదక్షిణం
ప్రదక్షిణీకృతా తేన సప్తద్విపా వసుంధరా॥

గోవు కనబడగానే నమస్కరించి ప్రదక్షిణము చేసినవానికి సప్తద్విపమలతో గూడిన భూమికి ప్రదక్షిణముచేసినంత పుణ్యముగలుగును.

వందనీయాశ్చ పూజ్యాశ్చ గావస్యేవ్యాశ్చ నిత్యశః
గవాంగోష్ఠే స్థితానాం తు యః కరోతి ప్రదక్షిణం
ప్రదక్షిణీకృతం తేన జగత్సదసదాత్మకం॥

గోవుల కలలుడు నమస్కరింపవలయును. పూజించవలెను. నేవించవలెను. గోశాలలోనున్న గోవులపశు ప్రదక్షిణముచేసినచో ప్రపంచమునకు ప్రదక్షిణముచేసినంత ఫలితముగలుగును.

తృణాని ఖాదన్తి వసన్త్యరణ్యే, పిబన్తిలోయా న్యపరిగ్రహాణి
దుహ్యన్తి వాహ్యన్తి పునన్తి పాపం గవాం రసైర్జీవతి జీవలోకః॥

గోవులు గడ్డితినును. అరణ్యములలో నుండును. తమంతటవియే నీరు త్రాగును. పాలనిచ్చును. బరువుల మోయును. పాపములనుండి విముక్తిజేయును. ప్రపంచమంతయు గోమూత పలననే జీవించుచున్నది.

తుష్టాస్తు గావశ్యమయంతి పాపం, దత్తాస్తు గావస్త్రిదివంనయన్తి
సంరక్షితా శ్చోపనయన్తి విత్తం గోభిర్నతుల్యం ధనమస్తి కించిత్ ॥

గోవులు సంతసించేనేని మన పాపములన్నియు బోవును. గోవులను దాన
మిచ్చితమా మనందరిని స్వర్గలోకమునకు గొనిపోవును. గోవులను కాపాడినచో మనకు
కావలసినంత ధనము చేకూరును. కాబట్టి గోవులతో సమానమగు ధనములేదు.

గోమూత్రం గోమయం సర్పిఃక్షేరం దధి చ రోచనా
షడంగ మేతత్పరమం మాంగల్యం సర్వదా గవాం ॥ “గోసంరక్షణ”

గోమూత్రము, గోమయము, గోఘృతము, గోక్షీరము, గోరోచనము, ఈ
యాద్యులు మంగళప్రదములు.

గోప్రదానేన స్వర్గమాప్నోతి దశధేనుంగోలోకంశతప్రదశ్చబ్రహ్మలోకం
యథాకథం చిద్వత్వాగాం ధేనుంవాఽధేనుమేవవా
అరోగా మపరికిష్టాం దాతా స్వర్గే మహీయతే ॥

ఒక గోవును దానమిచ్చిన స్వర్గలోకమునకు, పదిగోవుల దానమిచ్చిన గో
లోకములోను, నూరు గోవుల దానమిచ్చిన బ్రహ్మలోకములోను నుండును. క్రొత్తగా
వీసిన దూడతోనూడిన గోవునుగాని, గోగము లేనిదియు, ఎట్టిక్షేతములు లేనిదియు నగు
గోవును వీరితిగానైన దానమిచ్చిన వాత స్వర్గమున నుండును.

ఘాసగ్రాసాదికం దేయం నిశి దీపం సభాస్వరః
ఇతిహాస పురాణానాం వ్యాఖ్యానం సోపవీణనం ॥

గోవులకు తగినంత ఆహారమియ్యవలెను. బాగుగా కౌంతిరిచ్చుచీపమును రాత్రుల
యందుంచవలయును. గోస్నాధిని ఇతిహాస పురాణములను జరుపవలెను. వీణాదుల
గానము చేయుచుండవలెను.

అస్మస్తుష్టే ర్యధాశక్త్యా సంసేవా చ యథాక్రమం
తాడనా క్రోశభేదాశ్చ స్వప్నైఽపి న కదాచన ॥

లోపల సంతోషించుచు యధాశక్తితో గోవులకు సేవజేయవలయును. కలలో
నైన గోవులను కొట్టరాదు. తిట్టరాదు. వివిధ మైన దుఃఖమును గోవులకు కలుగనియ
రాదు.

“మునిభావబోధిని”

మహమ్మదీయుల పశుసంరక్షణ

సీ॥ నదయులౌ నరులార ముదముతో గోమాత
 గాంచరే ప్రణతులర్పించువాడ
 చండాసోదరా చంపకు మాతల్లి
 బ్రోవవే నీకెంత పుణ్యమబ్బు
 తురక సోదరులార దుష్కృత్యములు మాని
 రక్షింపరండు గోరాజు నింక
 దివిజులారా ! మీకిదే నమస్కారంబు
 యజ్ఞుల కోయకుడయ్య దీని

గీ॥ మహిత శోభాయశస్సుల మాన్యులార
 గోవురక్షణశాలలు కొల్లలుగను
 సావనమొనర్చి కాపుడీ సౌరభంబు
 ఇహపరంబుల సౌఖ్యంబు లెంతురేని॥ “మూగతల్లి”

మతమునదలి గ్రుడ్డినమ్మకము మానవుల వాదనాకర్తిని దొంగిలించుచున్నది. వివేచనాకర్తిలేని మానవులు మతముచేతిలోని కీలుబొమ్మలు. గోసంబంధమైన హిందూ మహమ్మదీయ కలహములే దీనికి తార్కాణము. మతము విపరీతపట్టుదలలపై కారణమగు చున్నది. మహమ్మదీయులింకను గోవధను సాగింపవలెనని పట్టుపట్టుచో అది కేవలము మోఢ్యమే. బలుల సందర్భమునతప్ప గోవధ యొనగ్గవలెనని “కోరాక్ష”లో ఎచ్చటను చెప్పబడియుండలేదు. గోహింసవలన హిందువులు తమపై తిరుగబడుదురనియు దానికి ప్రతీకారముగా తాము హిందువుల సాత్తవహరిండుట, గృహములను కాల్చివేయుట, మున్నగు క్రూరకార్యములొనర్చుట కనువగునని మనదేశముపై గండైత్తివచ్చిన తురుష్కులు ప్రవేశపెట్టిన మతాచారమేగాని యిది అనాదినుఁ డియులేదు. ప్రస్తుతము హిందూ మహమ్మదీయ స్పర్థలపై ముఖ్యకారణము గోవునుగరించుట. హిందూ మహమ్మదీయ వైఖరులలో సంఘభావము కలిగినచో గోసంరక్షణసమస్య పరిష్కరింపబడినట్లే.

గోవును అదరించవలెనని యున్నను లేకపోయినను “బ్రక్రీదు” మున్నగు పండుగ దినములలో గోవధ తప్పనిసరియని కొరానులలోలేదు. విద్యాధివలగు తెండుమతముల వారు పరస్పర వైషమ్యములతేక బాగుగనే యున్నారు. కాని యిప్పుడువచ్చిన చిక్క-విద్యావిహీనులతోను, జ్ఞానహీనులతోను వారి మూఢపట్టుదలల వలననే అనేక అత్యా

చారాలు జరిగినవి. “ఇంస్టాం గోరక్షణ” అను గ్రంథములో మహమ్మద్ తనభార్య యగు “అమేషాతో” ఇట్లనినట్లున్నది:— గోవుపాలు చాలా ఆరోగ్యకరమైనవి. గోమాంసము రోగ హేతువు. దీనినిబట్టి మహమ్మద్ కూడ గుర్తించెనట.

అబులామనూద్ అను సాధు ఈరీతిగా చెప్పెను:—నలుబదిగోవులను జంపిన వాడొక ఖానీ చేసినవాడగుదున్నాడు. తనసౌఖ్యమునకై ఏజంతువునుగాని జంతునట్టి దురాత్ముడు దేవుని నివాసమగు ‘కాబా’ను నాశనపరచినవాడగును.

మహమ్మద్ మతముడైన ‘అలీ’ అనునతడు ఇబారీహీక్ అనుగ్రంథములో ఈరీతిగాచెప్పెను:—మీ దేవుడు పూజలలోని మాంసమునుగాని పశువుల రక్తముగాని ఒలడు. అతడు మీపవిత్రతను మాత్రమేకోరును. ఏమీ తెలియని మూగజంతువుల అనాధశరీరములకు గోరీలుగా చేసికొనకండి. చూచితిరా! మహమ్మదీయు లైనంతనే గోవధ చేయవలెనను విధి యేమియులేదు.

మహమ్మదీయ చక్రవర్తుల గోరక్షణ

ఫాహియాన్ :—విక్రమాదిత్యుని కాలమున ఫాహియాన్ అను చైనాదేశపు యాత్రికుడు మనదేశము చూడవచ్చెను. ఈతని కాలములో జంతుచికిత్సాలయముల నెలకొల్పెను. జీవహింస జరుగకుండ కాపాడెను.

ఫుయాన్ ఉద్దీదీన్ బల్బన్ :—ఈతని రాజ్యములో పూర్వము జరుగు చుండిన అనేక గురచారముల నణచెను. వ్యవసాయభివృద్ధికై గోహింస నణచుటకై చాలాపాటుపడెను.

ఫిరోజ్ షాహి:—మహమ్మద్ తుఘలక్ ఆసంతరమున ఫిరోజ్ షాహి రాజ్యము చేసెను. ఈతను మంచినమర్దుడు. రాజ్యపరిపాలన చక్కగా నెరిగినవాడు. పాశుకాలలు, జంతుచికిత్సాలయములు, ఆనకట్టలు కట్టించెను. ఈతని ప్రభుత్వము యిప్పటికిని జ్ఞాపకముంచుకొనతగియున్నది. గోహింస విషయమై చాలా పాటుపడెను.

బాబరు:—ముఖిల్ వంశపు మొదటి చక్రవర్తి బాబరు. ఈతను సింహాసనా రూఢుడై రాజ్యమేలిన కొలదికాలములో గోహత్యనిషయమై హిందువులయొక్క గాఢమగు శరితాపమును గ్రహించెను. తనవహారునిపేర వ్రాసిన మరణశాసనమునందు హిందువుల శునోధావమును గమనించి గోవధను మాన్పించుమని ఆదేశించెను. బాబరు స్వతసిద్ధముగ భారతీయ శుగాడు. అతనికి దేశమును జయించి కొంతకాలము పరిపాలించి హిందువుల మన్ననలను సంపాదించి ముసల్మాను రాజ్యమును స్థిరస్థాయిగ నెలకొల్పెను.

అక్కరు చక్రవర్తి

మహమ్మదీయ చక్రవర్తులలో శాంతిపురుషుడు అక్కరు చక్రవర్తి యనవచ్చును. అక్కరు తనరాజ్యమున పశుమాంసమును దినగూడదని ఆజ్ఞాపించెను. వ్యవసాయము పశుపోషణలలో శ్రద్ధవహించెను. ఫలశీ అనునది ఈతని కాలములోనే వుట్టివది. ఇతను గోవధను తూర్తిగ నాశనము చేసియు, హిందువులతో సంబంధ బాంధవ్యములు గావించి



అక్కరు గోవధను మాన్పుట

చియు, రాజ్యపరిపాలనలో హిందువులను సైన్యాధి పతులుగను, మంత్రులుగను నియమించియు, హిందువులయెడ నానుభూతి గలిగియుండునట్లు చేసెనని “వివిఅక్కరు” అను గ్రంథము తెలుపబడుచున్నది. అక్కరుపాదుషా యనంతరము జుంగ్గిర్ కాలమునగూడ అక్కరు జన్మదినోత్సవమును, దర్బారు ఉత్సవమును సక్రమముగ జరుపుచుండినపుడు జీవహింస వేటమా? మానెడివారట.

గోహత్యై సంకము

గోహత్యై మాన్పుటకు కసాయి మంత్రులపై గోవున కొక్కటికి 12 జేటల పన్ను తుహమ్మదీయ ప్రభువులు విధించిరి. గోహత్యై చక్రవర్తి కాలమున కటికవాం

జీవహింసను పోగొట్టుట కొద్దమతమే పునాది

డ్రందరు శీపన్నును తీసివేయుచుని గోలచేయగా రధుపగడెను. ఫిరోజిషా తుగ్లకు పరిపాలనకు పూర్వము రెండువందల సంవత్సరములుండి ఈ పన్ను అమలులో నుండెను. గోవధ తగదని శాశించుటకు బదులు ఈ పన్ను విధించిరి. దీనినే జిజారిపన్నుయందురు. మహమ్మద్ తుగ్లక్ కాలమున రాజమూనిరము నంగలి పంటకాలలో గోమాంసము వండుటగాని, రాజు దానిని భుజించుటగాని, మృగ్యముగ నుండెను. గ్రంథకర్తల పెక్కుండు మహమ్మదీయ చక్రవర్తుల సువాచులను చక్కగా పఠించియుండిరి. గోమాంసమును వాటియందు పచనమునర్చి నక్షైష్ణుడును ఎచ్చటను వ్రాయలేదు. రెండవ గయాజుద్దీన్ తుగ్లక్ కాలమున గుజరాతురాష్ట్రమున కధిపతిగ నియుమంపబడి పరిపాలనము గావించుచుండిన ఫిరోజుతోడనే ముల్క హింగువుల యభిప్రాయమును మన్నించి గోవధ కంగీకరింపలేదు ఈ దీక్షగా మహమ్మదీయుల సహుత్వణ యున్నట్లు తెలియుచున్నది.

బుద్ధుని పశుసంరక్షణ

సీ॥ భువి “నహింసాపరమోధర్మః” యనుచును

హింసామతం యెఱిగించుచుండె

“జలిచీమనేనియు జూదొక్కరా”దని

జైనులమతము శాసనమునేనె

“సర్వభూతములందు సమబుద్ధినుంట యు

చిత”మని బుద్ధుని మతముదెల్పు

“నొకచెంపగొట్ట వేటొకచెంప యి”మృని

క్రైస్తవమతము నిర్మునముగజాటె

గీ॥ దక్షిణ మతంబులెల్లగు విధ్యముగ న

హింసయే శ్రేష్ఠమనుచు ఏచించె దాన

గలుగు ఫలముల దలచోయగా దరంబె ?

యెఱిగిమానవుడది యనుష్ఠింపవలయు॥”

“గోవు”

భారతయుద్ధము జరిగినతరువాత అంబికాగురు పలు సంవత్సరములనాటికి రహారవి క్రీ. పూ. 500 సంవత్సరముల ప్రాంతమున భర హింసాసాసములగు పదనాగు స్వతంత్రరాష్ట్రములున్నట్లు తెలియుచున్నది. మహాసామ్రాజ్యముల వీరిలో చేరియున్నను క్రీ. పూ. 600 సంవత్సరముల నాటికి వీరి ప్రాముఖ్యత తగ్గిపోయెను. వీరి

సానమున కోసల, కాంచి, కాళాంచి, అవంతి, మగధ మున్నగు రాజ్యములు మిగుల ప్రఖ్యాతిగలిగియుండెను. బుద్ధుడు తనమతమును బోధించుటకు ఆరంభించినపుడు మగధ రాజ్యము గొప్పదశలోనుండెను. ఆ రాజ్యమును బిందిసారుడను రాజు పరిపాలించుచుండెను. అతడు బుద్ధుని రప్పించి అందరికి మతబోధ చేయించెను.



బుద్ధుడు తనకిష్యులతో పశుచికిత్సను చేయించుట

“అహింసా పరమోధర్మః” అను మహావాక్యమే ముఖ్యసిద్ధాంతముగాగల బౌద్ధ జైనమతములు గుర్తించినట్లు మానవ పశుజీవితముల పరిత్రాసము మరీయేయితర మతమును గుర్తించలేదు. యజ్ఞశూల బలులు మున్నగు కాండలేవియు ఈమతమునందు లేవు. పశుబలికన్నను ఆత్మబలియే సర్వోత్కృష్టమని బుద్ధుడు చాటెను. బుద్ధునికొలమున పశువు లత్యంతముగ వృద్ధిచెందినవి. బౌద్ధమత ప్రచారమువలన భూమేధము లదుగంటి నవి. జైనమతాదియందును, అశోక సామ్రాట్టులయొక్క ప్రేరణమువలనను జీవదయా శుల్క వర్ణిష్టధర్మనాది మానవ వైద్యకాలలతోపాటు పశువైద్యకాలలు గోసంక్షేమ సంఘములను సేవించి చక్కని దేశీయచికిత్సలను బుద్ధుడు తనకిష్యులతో కగరయిండి చెప్పినాడట. బుద్ధునికొలములొని పశుచికిత్స చాలాకలదుగాని గ్రంథ విస్తరణగునని తెలుపలేదు.

సాక్షివారికి వృషభక్షాత్రమే పరిత్రసంకముట

అశోక చక్రవర్తి పశుసంరక్షణ

హిందూమతము ఒకశాఖగా నున్నపుడు బౌద్ధమతమును గొప్పమతముగా అభివృద్ధి చేసినది అశోకచక్రవర్తియే. లోక ప్రఖ్యాతిజెందిన ఇండియా చక్రవర్తలలో అశోక మహారాజే మొదటివాడు. బౌద్ధసీతులను ఆయా దేశ భాషలలో రాతి స్తంభములపైన చెక్కించి స్తంభములను వివిధప్రాంతములందు నాటించెను. వీటినే అశోకశిలాశాసనము లందురు. ఈతని కాలములో పశువుల కాలనిర్ణయము ప్రకారము మేవుటలో జాగ్రత్త గలిగియుండెను. గుఱ్ఱములు, ఏనుగులు, చేపలు, ఆటపక్షులు ప్రతి జీవజంతువునకు పశు వైద్యులగుండెడివారట. అశ్వదశాధికారి మున్నగు ప్రతియొక్కరు ఈ చక్రవర్తికాల ములో గొప్పపదవిని, గౌరవమును గలిగియుండెడివారు. ఈతని కాలములో ఎద్దులకు బుడ్డలు కొట్టుట మానించెనట. పశుజాతులకు వివిధరకమాల పేర్లుబెట్టి వృద్ధిలోనికి తీసి కొని వచ్చెనట. ఋతువుల ననుసరించి అరణ్యముల భాగించి పశువులను మేపుచుండుట, మజ్జిగను తుక్కులకు పుదులకు పోయిండుచుండుట, చోరులకు నపహరింపబడిన పశువు లను తీసికొనివచ్చినవారిని సత్కరించుట, పశువులకు వీటికన్నులు చేయించుట మున్నగు కార్యములెన్నోగలవు. రాజు తన పశు సిబ్బందికి వేగువేరు పచ్చికబీళ్ల నేర్పాటు గావించెడివాడు. ఏనుగులకొకబీడు, గుఱ్ఱములకొకబీడు, ఎద్దులకొకబీడు, లాటిపిట్టల కొకబీడు, ఈ రీతిగా జంతుజాతిని ప్రత్యేకసలములందు నియమించి మంచిపోషణ జరుగు నట్లు ఆజమాయిషీని తీసికొనుచుండెడివాడు. పశువధ చేయరాదనియు ప్రతిపక్షమున మొదటి 8, 14, 15, వ దినములందును, పండుగలందును ఆపవాసదినములందును, ఎద్దులకు గొట్టెలకు బుడ్డ కొట్టరాదని ఆజ్ఞాపించెడివాడు. అశోకని మరణమునకు మార్చి వర్షమునని పరిపాలనకు మధ్యనున్న కాలములో ఈ యుద్ధము జరుగములో తగినంత శ్రద్ధ తీసికొనినట్లు కన్పట్టుదు.

కాశ్మీర దేశమున ఆరవ శతాబ్దమున గోపానిత్యుడును, తొమ్మిదవ శతాబ్దమున అనంతవర్మయు, గుజరాతుదేశమున పండ్రెండవ శతాబ్దమున మహారాష్ట్రుడును ఈపశు రక్షణ విషయమై చాలాశ్రద్ధ తీసికొనిరి. ఛత్రపతి శివాజీ కాలమున మగల ఈ యుద్ధమును మంచియున్నతనీతి యందున్నట్లు “శివదీగ్విజయ”నను గ్రంథము తెలుపుచున్నది. అతను చంద్రగుప్తుని కాలములో గూడ పశుసంరక్షణ బాగుగా నుండెడినని తెలియుచున్నది.

కృష్ణదేవరాయల పశుసంరక్షణ

॥గీ॥ ఆంధ్రులకు ప్రియతముండయి యలరునట్టి

కృష్ణరాయలు మితిలేని కినుకబూని

గోవధం బాచరించెడి కుటిలమావుల

శమనపురి పాత కావుల నలుప లేదె ?

“గోవు”

బళ్లారిజిల్లాలో తుంగభద్రానదీతీరమున హంపియను నొక పట్టణముగలదు. 1509-1580 వ సం॥ వరకు కృష్ణదేవరాయలు విజయనగరమును పాలించుచుండెను. విజయనగర చక్రవర్తులలో ఇతడు మిగుల యుక్తముడు. అనేక రాజ్యములు జయించెను, అనేక గ్రంథముల రచించెను. దేవరాయల ఆస్థానమున ఆలసాని పెద్దన్న మనుచరిత్రను, నంది తిమ్మన పారిజాతాపహరణమును, తేనాలి రామకృష్ణుడు పాండురంగ విజయమును వ్రాసినటుల తెలియుచున్నది. శ్రీ చలపతి రాజాగారితో బళ్లారి కమ్మ మహాసభకు వెలినపుడు శ్రీ రాజాగారు సేను తదితర మిత్రులతో కలసి శిథిలమైన నగరము సంతను పరిశీలించితిమి. శిథిలమైన గట్టలు, పాలనింపు రాతితోట్లు, ఇంక గెన్నో చిత్రవిచిత్రపు మందిరములుగలవు. ఈతని కాలములో ప్రతిరోజు నాలుగువేల పృషభములు ప్రత్యేకముగ పోషింపబడుచుండెడివట. పెద్దపెద్ద తొట్టెలలో పాలుపోసి తగలవ ఏనుగుల పిల్లలకు, గుట్టపు సిల్లలకు పాలుపోసి త్రాగించెడివారట. బుష్టి మూలికా పర్వతము దగ్గరనున్న చిక్కని ఓషధులతో జంతుచికిత్స వైద్యులతో చేయించెడి వాడట.

శిఖుల పశుసంరక్షణ

అ॥ గోవు భూవధూటి కొంగుబంగారమే

యన్నమాట నేటి కంతరించె

పచ్చితురకయింటి పండుగకేనాడు

పిండివంటయయ్యె పిచ్చితల్లి !

“గోవు”

గోసంరక్షణమై హిందువులకున్న యభిప్రాయమునే శిఖులుగూడ బలపరచుచున్నారు. గోవుయొక్క పవిత్రతను, దీని శిఖుమతగ్రంథముగు “గ్రాందినాహెబ్” నందు యేమియు చెప్పబడియుండలేదు. వీరికి గోవునందుగల పూజాభావము హిందువులనుండి వచ్చినదియేగాని వేరొండుకాదు. గోషయమై వీరియభిప్రాయములు “గ్రాందినాహెబ్” నందున్న కొన్ని కథలనుబట్టి శిఖుసాంప్రదాయమును బట్టికూడ తెలిసికొనవచ్చును. గోపవిత్రత విషయములో హిందువులకంటె శిఖులకు మాధవిశ్వాసముగలదు. గోపధకు విధింపబడవలసిన శిక్ష మరణదండనకన్న యేమాత్రము తక్కువగానుండకూడదని వారినిశ్చితాభిప్రాయము. మహమ్మదీయులకు శిఖులకువచ్చు ధూర కలహములకుగల కారణము శిఖులకువచ్చు పట్టుదలయే. ఈ పట్టుదలవలననే వీరు మహమ్మదీయులతో పోరాడి అల్పసంఖ్యాకులచే ఓడిపోయి తమసామ్రాజ్యమును కోల్పోవలసినవారైరి. శిఖులకున్న గోసంరక్షణ పట్టుదల, గోపోషణ ఏమతములవారికి లేదనియే చెప్పవచ్చును.

పార్శ్వవారి పశుసంరక్షణ

“గీ॥ పామ నానాహమును వెనబాటదోలి

శ్వాసకాసలవిడిచి నిశ్చయముగాగ

నఖల ముఖ నేత్ర రోగములంటకుండ

స్వస్థవిత్తులైయుండు ప్రజలు ధరిత్రి.” “కామధేనువు”

పశుసంరక్షణ విషయమై హిందూమతమున కత్యంతసన్నిహిత సంబంధముగల పార్శ్వమతమువారి మతగ్రంథము “జెండుఆవేల్”¹ బోధింపబడిన కర్మకాండలు చాలవరకు వైదికకర్మకాండలను సోలియున్నవి. పార్శ్వమతప్రవక్తయగు జరాతుస్త్రుడు పశువధ మహాపాతకమని బోధించెను. పార్శ్వమతస్థులు గోవులకన్నను వృషభమే ఎక్కువ పవిత్రమైనదిగా నెంచుదురు. మానవసృష్టికి మూలము వృషభుడని క్రైస్తవమతస్థులు తలచునట్లు పశుసృష్టికి మూలము వృషభమే మొదటిదిని పార్శ్వవారి ఇమ్మకము. వృషభ వీర్యమువలన దంపతులు నానివలన 280 విధములగు తనితరజంతువులు పుట్టినట్లు వారి శాస్త్రమునందున్నది. హిందువులకు గోమూత్రము పెండ్లములలో చెప్పినరీతిగా ఎంత శుద్ధమైనదో పార్శ్వలకు వృషభమూత్రము అంతిమము ఎక్కువ పవిత్రవంతుమైనది. శరీరసంబంధముగ అంతశ్శుద్ధిగాని బాహ్యశుద్ధిగాని వృషభమూత్రమువలన చేయవచ్చును. మానవ శరీరమునగాని జంతుశరీరమునగాని తాకినవాగు వృషభమూత్రముచే పారిశుద్ధ్యము నొందుదురు.

ప్రసవించిన స్త్రీలు మొట్టమొదట బూడిదతోకిలిపిన వృషభమూత్రము 3, 6, 9 చుక్కలను త్రాగుదురు. తరువాత ఆయువతి గుడ్డములనుగాని ఆవులనుగాని మేకలను గాని పాలుసిండి దీరకలుపని గ్రాక్షరసమును మూడుదినములవరకు తీసికొనవలెను. మూడుదినముల పర్యంతము ఆమె తనబట్టలను, నవగ్రంథములను, దేహమును, నోటిని వృషభమూత్రముతో కడుగుకొనవలెను. ప్రాణము లేని శిశువుపుట్టిన స్త్రీలకై ఈపద్ధతి మొదట నేర్పబడెనను నేడు ప్రసవించిన ప్రతిపార్శ్వయువతయు ఈరీతిగా దేహవారి శుద్ధ్యము నొందుట యాచారమైపోయినది “కాప్రాక్షేక్షన్” అను అంగగ్రంథము తెలుపుచున్నది.

“తే ॥గీ॥ తురకలకు పుణ్యనగరమై వటలుచుండి

ఘనతనం గాంచిపట్టి మక్కాపురంబు

నందు వధశాల వైభాగమందు “పశు వృ

షభములందక్క సస్యముల్ చంపుడ”నుచు

వ్రాయబడియున్నదనుట కాహాదమెకద॥” “మూగతల్లి”

బక్రీదుపండుగరోజున మహాత్మాగాంధీగారు ఈ రీతిగా తెలిపిరి. బక్రీదు మహమ్మదీయులకు సంతోషదినము. హిందువులకు దుఃఖదినము. హిందువులకు దుఃఖమేల? గోమాత హిందువులకు దైవతుల్యము. ఈ సత్యమును మహమ్మదీయులు తెలిసికొని యుండియు వారు గోవులను బలులనుపేర వధించుచున్నారు. హిందువులందరి వలెనే నేనును గోవును ప్రేమించువాడనే. కాస్త్రీయపద్ధతులతో గోసంరక్షణము చేయుటకు నేనొక సంసరుకూడ సాపించితిని. కాని బక్రీదు సందర్భమున మహమ్మదీయులపై హిందువులు కింకపహించుటలో నే నేకీభవించియుండలేదు. మహమ్మదీయులు గోవులను వధించుటవలన అనవసరముగ హిందువుల మనస్సుకు నొప్పికలిగించుచున్నారు. ఇట్లుచేయుటకు వారి అజ్ఞానము, మూఠతయే కారణమనుటలో నందేహము లేదు. బక్రీదునాడు కాని ఏ ఇతరరోజున కాని మహమ్మదీయుడు గోవును వధింపవలెననుమత నియమ మెక్కడనులేదు. హిందువులు గోవును పూజించుచున్నారా? హిందువులు గోవును పూజించువారైనను వారే దానిని వధించుటకు మహమ్మదీయుల వశము చేయుచున్నారని కొందరు మహమ్మదీయులు వాదించుదురు. అట్లయినచో మహమ్మదీయులు అజ్ఞానముగను మూఠముగనున్నను వారు గోవులను వధించుటకు హిందువులే పరోక్షముగ కారణభూతులగుచున్నారు. ఎక్కడచూచినను గోవులను అమ్మువారు హిందువులే. అట్టితరీ హిందువుల దుఃఖమునకు కొపమునకు కారణముగ పడదు. సంపత్న రములో ఒక్కరోజున మహమ్మదీయులు వధించుచున్న గోవులకంటె హెచ్చుపథలకు హిందువుల అజ్ఞానమే కారణమగుచున్నది.

ఏటేటా జరుగుచున్న పశువధలు, పశువుల స్వాభావిక మరణములను గురించిన వృద్ధయ ద్రావక మగునట్టియు, సుప్రమాణ మగునట్టియు లెక్కలను నేను నేకరించితిని. 1935సం॥పు పశువుల లెక్కలనుబట్టి నూటికి 80పశువులు స్వభావమగు రోగములచే మరణించు చున్నవనియు 20 పశువులు వధింపబడుచున్నవనియు తేలుచున్నది. స్వాభావిక మరణముల సంఖ్య స్థలభేదములనుబట్టి మారుచున్నది. ఎక్కడ పశుగ్రాసమునకు అవకాశములు బాగుగనున్నవో, ఎక్కడ వ్యవసాయము జాగ్రత్తగ నడపబడుచున్నవో అక్కడ పశువులు స్వాభావిక మరణములు నూటికి 7 కంటెను తక్కువగనున్నవి. కరవు ప్రదేశములలో నూటికి 30 కంటెను హెచ్చుగనున్నవి. 1935 సం॥ లో బొంబాయి రాజధానిలో 742 లక్షల పశువులున్నట్లు లెక్కలవలన తెలియుచున్నది. వీటిలో 9 లక్షలు (నూటికి 12 వంతున) స్వాభావిక మరణములు పొందినవి. రెండులక్షలు (నూటికి 33 వంతున) వధింపబడినవి. 1935 వ సం॥ లో బ్రిటిష్ ఇండియా మొత్తము మీద (బెంగాల్, బీహార్, ఒరిస్సాలతో కలసి) 8 కోట్ల గోవులుండెను. 3 కోట్లకు పైగా నేడెలుండెను. 1935-1930 సం॥ లెక్కలకు పోల్చిచూచిన గోవుల అభివృద్ధి కంటె నేడెల అభివృద్ధి మూడురెట్లు పెరిగినదని కొనసగను.

సామాన్యముగ గోవుల యజమానులు హిందువులనుట అందరికి తెలిసిన విషయమే. వీరూ త్సమింపరాని తమ ఆజ్ఞాసమును పోగొట్టుకొన్న యెడల స్వాభావిక రోగముల వలన కలుగు అనేక మరణములను నులభముగ నివారించ కలుగుదురు. ప్రతిపంచత్వరము ఇన్ని మరణములు కలుగుటకు కారణమేమి? ఈ సంపదలొని విపరీతపు దుబారాను నివారించుటకు ఏమిచేయగలము, ఏమిచేయవలెను అను విషయములను గురించిన 2 భాగములు ఈ దిగువ నుదహరింపవలెనవి. ఒకప్పుడు గోసంపదనుబట్టియే మానవుల విశ్వరూపరిమితిని నిగ్గయించెడివారు. అట్టి గోసమితి నేటిమానవులకు పెద్దవరువైనది. ఇది నేటి కరస్పివిలువ దిగతీతవల నేయున్నది. కాని ఉన్న భేదమిదియే. పశుక్షీణతఅనగా నాణెపు విధానముతో సమతూగు గోవుల నాణెములవిలువ తగ్గుదల స్వప్రయత్నముచే నివారించ సాధ్యమైనది. ఈ ప్రయత్నము చూడువిధములు.

1. మహమ్మదీయులు తమ ఆహారముకొరకుకాని బలులకొరకుగాని గోవధన మానవలెనని బ్రతిమాలుటలో కత్తిని వర్ధిల్పరుపరాదు. అవిషయము వారి గౌరవమునకే వదలివేయవలెను.

2. గోవుల అభివృద్ధిపట్ల ప్రత్యేకశ్రద్ధ వహింపవలెను. ఇందుకుగాను గేదెపాలు నెయ్యి వాడుట మానవలెను.

3. సహజముగ చనిపోయినపశువుల చర్మమువాడుట, నాటి యితరభాగముల నన్నిటిని ఆహారముగాతప్ప ఇతరవిధముల పూర్తిగా ఉపయోగించుకొనుట, తోళ్లుతూరు పనిని మంచిసితిలోనికి తెచ్చుట.

అభివృద్ధికి కావలసిన సాధనములు జంతురక్షణకాలలలోను, గోకాలలలోను దేశమందంతటను సిద్ధముగ నేయున్నవి. కాని అచ్చటచ్చట ప్రబలిత దురభిప్రాయములను తొలగించి ఈ సంస్థలను సక్రమపద్ధతులపై నవవుట ఒక్కటియే అవశ్యకము.

“ నీ॥ పరిశుద్ధికినిగోవు వరబుద్ధికినిగోవు
కర్మల నంసిద్ధి కాకరము గోవు
హవ్యమునకు గోవు కవ్యమునకు గోవు
భోజనసిద్ధికి బూజక దియ
ఐహికసుఖసిద్ధి కాశ్రయమగు గోవు
పరలోకసుఖ లాభకరము గోవు
భోగయుక్తికి గోవు రోగముక్తికి గోవు
ఘనతప్రసిద్ధి సాధనముగోవు

తే॥ గీ॥ ఇష్టిధంబున జనులకు నెల్లవనులు

గోవువశమున నెప్పుడు కుదిరియుంట

గోవు జనులకు నెల్లడ నేవనీయ

మయ్యె బ్రత్యక్షదైవమై యహరహంబు॥”


“గోప్రభావము”

జంతువుల మరణములకు కారణములు


హిందూదేశములో లభించుచున్న హెచ్చుభాగము తోళ్ళు వధలకుగాక స్వభావ మగుమరణములకు పాల్పడిన జంతువులవే. ఈ దేశములో మాంసాహారులు తక్కువఅధు నందునను, హింసపట్ల ముఖ్యముగా పశువులను వధించుపట్ల సహజముగ ప్రతికూల భావము ఉండుటవలనను, హెచ్చుభాగము పశువులును, కొలదిభాగములు మేకలును, గొట్టెలును ముసలితనములోనే స్వభావముగ మరణించుచున్నవి పశుపోషణకు అవకా శము తక్కువగానున్నచోట్ల పశువులు ఆహారములేక సగముమాడి రోగములపాలై చని పోవుట తటస్థించుచున్నది. పశువులలో అంటువ్యాధులు ప్రబలినపుడు వాటిని నివారించు ప్రయత్నములు తక్కువగానున్నందునకూడ పశువులు హెచ్చుగ మరణించుచున్నవి. తరచుగా సంభవించు అనావృత్తి ఫలితముగ చెలరేగు కరవులవల్ల అనేకప్రదేశములలో పశువులు చనిపోవుచున్నవి. ఇవిగాక ఇతరప్రమాదములు పాముకాట్లు, కొండరాళ్ళవల్లన అపాయములు, రాళ్ళు కట్టలు విసరుటవలనగు అపాయములు, అడవియ్యగములవలన అపాయములు ఇవన్నియు మనకు లభించుచున్న తోళ్ళుకల్పిత్తికి కారణములు. ఆకలి మంటచే చనిపోవు జంతువులలో ఎక్కువభాగము మనుష్యులకు పనికిరాని జంతువులు కాని, వారిపని తీరిపోయిన జంతువులుకాని అయియున్నవి. సాధారణముగ వీటి మొగము చూచువారెవరును ఉండరు. అక్కడక్కడ లభించు కొలది పచ్చికమీదనే వీటి ఆధారము. స్వభావముగ చనిపోయిన జంతువుల చర్మము పలుచనై ఎండిపోయి కాగితము వలె పటుత్వములేక యుండునని రాయల్ కమిషన్ ఆఫ్ ఎగ్రికల్చర్ వారు తెలిపిరి.

తోళ్ల పరిశ్రమ


ఇండియా గోకల్ల తోళ్ల పరిశ్రమలో అనేక అవకాశములున్నవి. ప్రపంచములో కల్లముడితోళ్ళు లభించుటకుగల ఆదారములు మాత్రమే దేశములో హెచ్చు కలవు. ప్రపంచము మొత్తముమీద గోరొట్టెల పదికొట్టు. ఇందులో ఇండియాలో పదువారు కొట్టు. ప్రపంచములోనున్న గోరొట్టెల నాలుగుకొట్టు డెబ్బది లక్షలలో మూడు కొట్ట నలుబది లక్షలు ఇండియాలోనే ఉన్నవి. మొత్తము ఇరువదికొట్టు ముప్పది లక్షల మేకలలో ఇండియాలో అయిదు కొట్లు మూడులక్షలున్నవి. మొత్తము ఏబది




శ్రీ పాలడుగు వీరరామచంద్రరావుగారి ఛాలెంజి బండపట్టు గెలిచిన
గిత్తలు. చాల బహుమతులు బడసినవి. (శిరిపురం-గుం. జి.)




పైవారి పేరెన్నికగన్న వృషభరాజము



తోడా జాతి దున్న



పాలదూడలు



శ్రీ రావెళ్ల వెంకట్రాజయ్యగారి ఆశోకు
బెంగళూరు ప్రదర్శనములో బహుమతి పొందినది జాజ్వరం కృ. జి.

కోట ఏబదిలక్షల గొట్టెలలో ఇండియాలో నాలుగుకోట పదిలక్షలున్నవి. ఈ పశువుల వలన ప్రతిసాలున స్వయం కాబడుచున్న తోళ్లసంఖ్య అర్బాబుగాకనే మిదింపు చేయబడినది.

ఆవు చర్మములు 20000000 ముక్కలు

గేదె చర్మములు 350000 ,,

మేక చర్మములు 22000000 ,,

గొట్టె చర్మములు 11500000 ,,

ఇవిగాక ఇండియాలోని అడవులు సర్పములను అడవి బల్లలను ప్రసిద్ధములు. వీళ్లలో మొసళ్లకు తరుగులేదు. ఈ అడవి జంతువుల చర్మములకూడ కొంతకాలము నుండి వ్యాపారసామగ్రిగా పరిగణింపబడుచుండినవి.

ఇండియాకు కావలసిన అన్నిరకముల చర్మములను తయారుచేయుటకు ఇవి వీలుగా నున్నవి. ఆవు చర్మములు సామాన్య జనులకు కావలసిన చెప్పులకు చౌకగా గిట్టుచున్నవి. మేకతోళ్లు ధనికులకు స్త్రీ పురుషుల పాదరక్షల తపయోగపడుచున్నవి. ఇవి అతిమృదువుగానుండి ప్రపంచములో నాణ్యమైన తోళ్లలో ఒకటిగా ఎంచబడుచున్నవి. గొట్టె తోళ్లు లైనింగునకు గేదె చర్మములు పాదరక్షల అడుగుభాగములకును, ఇతర పరిశ్రమలకును ఉపయోగపడుచున్నవి. ఆవు చర్మములు ట్రంకు పెట్టెలకును నూటుకేసులకును, సంచులకును, పట్టీలకును, పటకాటనుకూడ ఉపయోగపడుచున్నవి. గొట్టె మేక తక్కిన ప్రాకడి జంతువుల చర్మములు అందమైన విలువగల వస్తువులకు పనికివచ్చుచున్నవి.

తోళ్లకు సంబంధించినంతవరకు మన దేశములో కావలసినదానికంటె అధికా త్వత్తి ఉన్నదని తలచుచున్నారము. ఇప్పటినిబట్టి నిజమేకాని ఈ దేశ ప్రజల జీవిత ప్రమాణము పెరిగినయెడల ఇప్పుడు లభించుచున్న చర్మములు ఈ దేశములోని ప్రజలకు మనిషికి సాలుకు ఒక చెప్పులజత వంతు నైనను సరిపోజాలవు. పాదరక్షలు నాగరికులైన వారికి వేషములలో భాగములు మాత్రమేకావు. అరొగ్యమాత్రముల ననుసరించి అవి అందరికి ఆవసరములు. ఇండియాలో ఏ కొలదిమందియో పాదరక్షలను ధరించ గలుగుచున్నారు. కోట్లకొలది డబ్బులేక పాదరక్షలు కొనుటకు డబ్బులేక పాదరక్షలు లేకయే తిరుగుచున్నారు. ఇండియా ప్రజల దారిద్ర్యము ఇండియా తోళ్లపరిశ్రమకేగాక పెక్కు ఇతర పరిశ్రమల బలహీనతకూడ కారణమగుచున్నది.

యుద్ధమునకు పూర్వము జర్మనీవారు మన ఆవు, గేదె తోళ్లను మేక తోళ్లను అమెరికావారు కొనుచుండిరి. ఈ విపరీతపు ఎగుమతులవలన ముడితోళ్లు మన దేశము

బుధవారం పుట్టినదున్న భూమినిదున్నిన; త్రొక్కిన తోడైపండును

లోని పరిశ్రమల వారికి కొవలసినన్ని దొరకుట దుర్లభమయ్యెడిది. యుద్ధ సందర్భమున తోలు ఎక్కువ అవసరమయ్యెను. ఇండియానుండి సప్లయిచేయమని కోరిరి. బ్రిటిషు సామ్రాజ్యము అవసరమును అప్పుడు గుర్తించెను. “హరిజన్”

విదేశీయుల పశుసంతకణ

“సీ॥ గోమాంసభక్షణం బేమానవునికైన
రుజనుగల్గింపజేయు రూఢిగాను
నాతోనయోగమై యాలజంపినవాడు
బ్రహ్మహత్యనుమించి పాపియగును
నితతోనయోగమ్ము నెంచి గోవులజంపి
మాంసమమ్మినవాడు మాసిపోవు
దనయుత దానుజచ్చిన గోవుమాంసమ్ము
దీనువాడు ఛండాలమునజరించు

గీ॥ నేవ్విధినిగాని గోవును నొవ్వజేసి
దాని మాంసమ్ముగాని దుగ్ధమ్ముగాని
మూత్ర పురీషముంగాని పుచ్చుకొన్న
వాడు నశించు బాపియై ననుభయందు.”

“మూగతల్లి”

ఆమెరికా నందు క్రైస్తవములందఱు మనోస్థియను రాజ్యముగలదు. అందు బ్రెస్బిటర్ కాలేజీఅను పేరుగల ఒక కృషివిద్యాలయము గలదు. దాని ప్రధానాధికారి “ఎల్విర్ జాన్ హెచ్ గెహార్స్ అనునతడు. ఈతను వ్యవసాయ సంబంధముగు గ్రంథము లెన్నెముకలు వ్రాసెను. అందుక గ్రంథము “టూయల్స్ ఫ్రాల్ మ్మ, ఫార్ క్యూకొనీస్ న్మ” అయినది. ఈ గ్రంథములయొక్క అరవ అధ్యాయమునందు పశుజాతి ‘ఉపయోగ మును బా చియు, నాకి మహత్వమును గురించినయు, గొప్ప పరిశీలనచేసెను. ఏ. డబ్లియం. బక్కెల్ తన “సాంయల్” అను గ్రంథములో పశువులకుచ్చి ‘ఉపయోగ ము’నొచ్చి. ఆమెరికా యూరపు విద్వాంసులు ఏబరిసంవత్సరములకు పూర్వము తెలిసి కొనిన కొనిన విషయములు భారతదేశ మహర్షులు ఆషేకవేల సంవత్సరములకు పూర్వము తెలిసికొనియుండిరి. ఈ విద్వాంసులు పశుభోజ్యము గోమహత్వమును తెలిసికొనినప్పటి నుండియు వారుగొంతయు ఇంకను జాగ్రత్తగా పోషించుచుండిరి. ఇప్పుడు అచ్చుట

కన్నులేనిదేమున్నతడు; పశువులేనిదే పెంటలేదు; పెంటలేనిదే పంటలేదు

గోవులు నివసించుటకుగాను రాత్రింబవళ్ళు చాలినంత నిర్గుంపారవువును పండుకొనుటకు తిరుగుటకు పశుశుభ్రమగు సలమును, నిద్రించుటకు పెట్టి గడ్డివాన్ములును లభించునట్టి ఏర్పాటులతో పశుశాలలు నిర్మింపబడుచున్నవి. ఆర్జే-పెన్సా-గో పశువులతివికేషముగా పోషింపబడుచున్నవి. ఆస్ట్రేలియా క్రేట్-బ్రిటనులో కేలెక్ జానులు పెంచబడుచున్నవి. ఆ దేశమందలి వ్యవసాయమున దుపయోగింపబడుచున్న పశువులను మాంసాహార సంపాదనకొరకు, పరిశ్రమాభివృద్ధికొరకు ఆహార సామగ్రిగా నున్నవి.

అంగేయులకు గొడుమాంసమునన ప్రీతి. కావుననే హిందూదేశ గోవధమున ల్గానులకంటె అతివికేషముగా అంగాధికారములకొరకు వామునబడుచున్నదని గాంధీ, మాలవ్య, దయానంద ప్రభృతులు నెలవెచ్చియుండిరి. సహాయము ఒకసందర్భమున సైనికులు గోగర్భముపైనే నడచుచుండురని చెప్పియున్నారు. అనగా గోమాంస భక్షణమునకే వారు యుద్ధవిశ్వాసురుడుండురని భావము. అంగేయులు గోవువధశాల అనేకీతులు పోషించి క్రొవ్వెక్కునటుల చేయుదురు. ఇటీవల చువ వేలొలది ఎడు దూడలు ప్రస్తుత యుద్ధములల్లవారికొరకు వధింపబడినవి. అందుచేతనే పశువులధర్మ, విలువపెరిగినది. కైతులా పశువులవిలువ తెలిసికొని చాలా జాగ్రత్తతో చూచుచున్నారు. పాశ్చాత్య లీ పశుమాంసమును అనేక విడివంటకములు తయారు చేయుదురు.

క్రీస్తు శకారంభమునకు పూర్వమే సిరియా మున్నగు ప్రాంతములందు ఆర్యా వరముననుండు పశుహరి కావనమొనరించి అరిష్టాను మహాసముగు వ్రాసియుండినను. హిందవులకు, గ్రీకులకు, రోమనులకు, విగ్రహీయులకు, హెబ్రెయలకు పశువులు వెండి బంగారములకంటె విశేషప్రియతమములుగా నుండుట నిజము. అవియే వారి కల్పతరువులు. కామధేనువులు. హెసాయిడ్ అను నొక ప్రాచీన గ్రీకు కవిశ్లోకుడు తన గ్రంథమునందు బుడులూగుటకు పాలములు దున్నుటకు తోడ్పడెడు నిండిన శోడెను కట్టుట యుక్తము. కాగణమేమన వీరి కావయన్ను పచ్చనపుకీ తన చిన్నతనపు చేష్టలు పొగురుబోతుతనము తగిన, అప్పుడు అవి చెప్పినట్లు వినును. లేకున్న కాడిని బండిని తునకలు తునకలుగా విరగగొట్టును. హిందువుల హెబ్రెయల గ్రంథములలో పశు పోషణావిధానమునుగూర్చి అనేక ప్రమాణములు గలవు. ఇప్పటికిని ఇండియాలోపా ప్రాప్త జగ్గువీ రహ్య బల్లెరియా రోమేనియా ప్రాంతములగు పాలముపనులు చక్క తెలుటకు పశువులే చాలావరకు దుపయోగపడుచున్నవి.

పశువులను బాధపెట్టుట

ఎన్ని పడరానివాట్లు పశువులను తమ బాధలను కార్యకొనుటకు పశువులకు నొడతగు. అట్టి మూగజంతువులను సదా కేమించునట్లు. ఈ విషయమున బాద, కైస మతాదర్శము లనుస్మరణీయములు. కృషికులు పశువులను బాధపెట్టుట తప్పునీ సరియే

పశువులమీద అన్ని రాబడులు పంతుమ్మిదికొట్ట రూపాయ 10 గ్రహించండి

నను ఆశాధలు సాధ్యమైనంత తక్కువగ నుండవలెను. ఇంగ్లండు మున్నగు దేశములలో పశువుల నెగుమతిచేయు విషయములో వానిని పెట్టు బాధలపరిమితములు. శక్తిలేక కదలని జంతువుల చెవులలో నూనెను పోయుట, చెవులలో గడ్డిత్రుక్కి నిప్పు అంటించుట, లోకలు విరుగడియుట మున్నగు అనేక ఘోరకృత్యములు చేయుచుండురు. పశువధవలన ప్రత్యక్షముగా గాకపోయినను పరోక్షముగావచ్చు నష్టము అనేకములు. కటికవృత్తి ఎక్కువగాయున్నచోటులనే నేరము నెక్కువగా జరుగుచుండుట అందరికీ తెలిసినవిషయమే. అండనుట తూర్పుభాగములో వందలకొలది కటిక దుకాణములు గలవు. ఆ పశువధ చేయునపుడు వాని నేడిరిక్తమునకై అనేకమంది బాలురు చెంబులు వుచ్చుకొని వెళ్ళుదురు. అచటివాణివిధమున చిన్నతనమునుండి క్రూరదృశ్యములను చూచుట కలవాటుపడినందున వారిలో చాలామంది కనివాత్తులు క్రూరాత్తులు తయారగుచున్నారు. అచట జరుగు నేరములను, క్రూరకృత్యములను హద్దులేదట. సంయుక్త రాష్ట్రములలో జరుగుచున్న హత్యానేరములు చాలావరకు కటికవృత్తియందున్నవారి చేతనే చేయబడుచున్నవి.

టాలుస్తాయికవి వర్ణన

ఈ కవిగారు వ్రాసిన ఒక గ్రంథములో ఈదిగువనీతిగా వర్ణింపబడినది. ఈ భయానకదృశ్య వర్ణనలు ప్రతివారును చదువదగినవే. “అది జాన్ మానసు. ఆరోజు బ్రీనిటీ పండుగను ముందు శుక్రవారము. కటికదుకాణముల బహారంతయు జనసమూహముతో క్రిక్కిరిసియుండెను. ఎదులు ఆవులు ఆవుమాడలు బండ్లను కట్టివేయబడి యుండెను. గుఱ్ఱపుబండ్లనుండి అనేక ఆవుమాడలు దుకాణములోనికి దింపబడుచుండెను. కొన్ని బండ్లు దుకాణములనుండి పశుశవములను మోసికొనిపోవుచుండెను.

నేలబడియున్న ద్వారమున కదురుగా దుకాణములలోనికి ఇద్దరు మనుష్యులు ఒక బలిసిన ఎదును బలవంతముగా లాగుకొనిపోయిరి. లోపలికి వెళ్ళినతోడనే ఒక కటికవాడు తన బలముకొలది ఆ ఎదు అట్లుపె ఒక్క దెబ్బవైచెను. వెంటనే అది భూమిపైబడి తన నాలుగుకాళ్ళలోను వెనుకభాగముతోను విలవిల కొట్టుకొనసాగెను. తక్షణమే మరియొక కటికవాడు దాని కొమ్ములు పట్టుకొని తలను బొక్కబోర్లగా త్రిప్పెను. ఇంతలో ఇంకొకడు తన కత్తితో దాని గొంతుకును పరిపరకొనెను. రక్తసిక్తములగు బట్టలు ధరించిన ఒక వక్రవాడు ఆ ఎదు శుత్తుకనుండి ప్రవహించుచున్న రక్తము నొక పళ్ళెములోనికి పట్టెను. ఆ పళ్ళెము నిండుటతోడనే గానిని ఆబాలుడు అల్యూమినిమ్ ఫ్యాక్టరీకి తీసుకొనివెళ్ళెను. ఇటులనే మరొకపళ్ళెము నిండెను. కాని ఇంకను ఆయెద్దు పొట్ట వెనుకకొద్దు కొట్టుకొనుచునేయుండెను. రక్తము ప్రవహించుట ఆగిపోయినతోడనే కటికవాడికడు దాని తల పైకెత్తి చిగ్గుము పోలిచెను. తెలుపు సరములతోనున్న ఆ ఎరువుదేహము చూచుటకు వికృతముగా నుండెను. ఇంకను ఆ

యెద్దు కొట్టుకొనుచునే యుండెను. ఈట్లుగా ఒకగానితరువార నొకటిని చంపుదునే యుండిరి.” ఇట్టి ఘోరకృత్యములు కన్నులగ జూచిన యే మానవుని గుండెలు సమసిపోవు!

ప్రాచీన ఋషీశ్వరుల పశుధర్మ సూత్రములు

దివావ్యక్తవ్యతా పాలే రాత్రౌ స్వామిని తద్గృహే
యోగక్షేమేనృధా చేత్తుపాలో వ్యక్తవ్యతామితి ||

పగలంతయు పశువులన్నియు కాపరుల స్వాధీనములోనుంచి మేపుదురు. కాబట్టి వాని మంచిచెడ్డలన్నియు వాళ్ళ చూడవలయును. అందువలన నా పశువుల కేమైన ప్రమాదము వచ్చినపుడు కాపరులచే బాధ్యతవైయున్నది. సాయుకాలమునకు కాపరులు పశువులను తోలుకొనివచ్చి తమ యజమాని గృహముందు కట్టివేచి వెళ్ళుదురు. ఆ సమయములో యజమానిచే బాధ్యతయైయున్నది.

గోపః క్షీరభృతో యస్తు సదుహ్య స్తశతో వరాన్
గోస్వామ్యనుమతే భృత్యః సా స్వాత్వానే భృతేభృతః||

కాపరికి కూలి ఈయనిచే యజమానికి పనియివ్వల వాలను పిండియిచ్చి తాను ఒక ఆవుపాలను తనకూలికింద పిండుకొనవచ్చును.

నప్తం వినప్తం కృమిభిః శ్వహతిం విషమే మృతమ్
హీనం పురుషకారేణ ప్రదద్యాత్పాల ఏవతు||

కంటికి కనుపడనిది, పురుగులచే వక్కిలచే తినబడినది, పల్లవుగుంటలు మొదలగువానిలోబడి చచ్చినది, కాపరిలేనిది, పాడిపోయినది, యాన పశువును కాపరియే తెచ్చి ఈయవలెను.

విఘ్నవ్యతు హృతిం చోర్నపాలో దాగృ మర్తసే
యదిదేశేచ కాలేచ స్వామినః స్వస్య శింసతి||

దొంగలు దొంగిలించిన పశువులను అవిహరించిన ఆవిరముము కాపరి వెంటనే యజమానికి దగ్గరలోనున్నచో చేప్పినచో కాపరి సమ్యక్కొనవలసిన బాధ్యతలేదు.

నా వినీతై ర్రవజేన్దురై ర్ని చ సుద్వ్యాధి కీడితైః
న భిన్నశృంగాక్షిఖునై ర్న వాలధి విరూపితై ||

తుంటరివి, ఆకిలికోగములు గలవి, కొమ్ములులేనివి, గ్రుడ్డివి, గిట్టలులేనివి, తోకోలేనివి యగు వృషభములను గట్టిబండ్లలో ప్రయాణము చేయరాదు.

పంచ పశ్యన్యతే హంతి దశహంతి గవాన్యతే
శతమశ్వాన్యతే హంతి సహస్రం పురుషాన్యతే॥

చతుష్పాద జంతువువిషయమై అబద్ధమచెప్పినవాడు అయిదుగురు బంధువులను సరకిముని త్రోసినవాడగును. గోవుల విషయమై అబద్ధమాడినవాడు పదిమందిని, గుఱ్ఱముల విషయమై అబద్ధమాడినవాడు వందమందిని, మానవుల విషయమై అబద్ధమాడినవాడు వెయ్యిమంది బంధువులను జంపినపాపమును బొందును.

అనిర్దశాహా తా నూతా వృషా దేవశూం స్తథా
సపాలాన్వా విపాలాన్వా న దండ్యా న్మనురబ్రవీత్॥

ఈని పదిదినములు గూడ గడవని గోవులను, చక్రము శూలము యెడలగు నచ్చువేసి విడిచిన యెద్దులను, హరిహరాయులగు దేవతలకై అచ్చువేసిన యెద్దులను, గాపగులతోనున్నను లేకున్నను పాలములలోని సస్యములను దినుదున్నను వానిని దండింపరాదు.

క్షేత్రేష్వన్యేషు తు పశుస్సపాదం పణ మర్హతి
సర్వత్ర తు సదోదేయః క్షేత్రికస్యేతి ధారణా॥

మార్గగ్రామ సమీకేతర ప్రదేశములందలి పాలములలో గోవులు మేసినచో రూపాయి పాపలా జరిమానా విధించవలెను. తరువాత గోవులు తినిన మేలిఫలమును కొపరిగాని యజమానిగాని పాలము యజమానికి ఈయవలెను.

న వారయే ద్రాం ధయంతీం న చాచక్షేత కస్యచిత్
న దివీంద్రాయుధం దృష్ట్వా కస్యచిద్దర్శయే ద్బుధం॥

బిరు త్రాగుచున్న యావునుగాని, పాలు పుడుచుచున్న మాడనుగాని నివారింపరాదు. పాలు దీయునప్పుడు మాత్రము నివారింపవచ్చును. ఇతరుల చూడలు పాలు గుడుచునపుడు వారికి జెప్పరాదు. ఇంద్రధనస్సును ఆకాశమున జూచి యాదోషము నెరిగినవాడయి యుండియు ఇతరులకు మాపరాదు.

పిబంతీషు పి బేత్తోయం సం విశంతీషు సంవిశేత్
పతితాం పంకలగ్నాం వా సర్వప్రాణై సన ముద్ధరేత్॥

గడ్డగడ్డకు పుట్టెడుబిళ్ళు తాగినా రెడ్డి సేద్యము చేయవలయును


గోవులు త్రాగుటకు నీరుపోసినతరువాత తాను త్రాగవలయును. అది వరదైన తరువాత తాను పరుండవలయును. కోగముచేత క్రిందపడినను, బురదలో దిగబడినను శక్తికొలది ప్రయత్నించి లేవదీయవలెను.

**కులై: కాతైళ్ళ బధ్నీయా ద్దోపసుం దక్షిణాముఖమ్
పాశలగ్నాన్ని దధ్దేతు ప్రాయశ్చిత్తం న విద్యతే॥**

గోవును దర్భత్రాళ్లతోను, రెల్లుత్రాళ్లతోను దక్షిణాభిముఖముగ కట్టవలెను. ఈత్రాళ్లకు నిప్పుతగిలి కాలిపోయినను కొంచెము సంతాపము మాత్రమే కలుగును. కట్టి వేసి యుండగా గోవు అగ్నిదగ్గనుయ్యే శక్తి ప్రాయశ్చిత్త మేమియులేదు.

**కుూపూతే తటాబంధే నదీబంధే ప్రపాసూచ
పానీయేషు విపన్నానాం ప్రాయశ్చిత్తం న విద్యతే॥**

గోవులు నీరుత్రాగుటకై లోతుదిగుడు బావులలోనికి, మెట్లుకట్టియున్న పెద్ద తటాకములలోనికి, నదుల అనకట్టలలోనికి, నీరు త్రాగుటకై కట్టించిన పెద్ద రాతితోట్టి లోనికి దిగి మరణించిన యజమానికి ప్రాయశ్చిత్తము లేదు.



హరిత ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ సంస్థానానికి
హరితంబుల ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ సంస్థానానికి

హరిత సంస్థానానికి గ్రామీణ సంస్థానానికి

ప శు స ం ప ద

రె ం డ వ భా గ ము

ప్రాచీన భారత రైతు

“మలమల యెండలో మాడుచునుండి

వడవడ జలిలోన వడకుచునుండి

మూగపసులతోడ ముచ్చటల్ నలిపి

అంటు డొక్కలతోడ నాకలిమంట

నారుగాలంబును దీరిక లేక

దుస్థితిం దలచుచు దున్నుచునుండ

పదనారగా మేడి పైకిదున్నంగ

సుడిగొని యట్టిట్టు స్రుక్కుచునుండి

మఱి పండ్లబిగువుతో మాటాడలేక

దున్నుచుండెడి మాతి దుర్గతిజూడ”

“ఆచార్య రంగా”

ప్రాచీన భారతరైతు నితిగతులపై ఒకసారి దృష్టి ప్రసాదించిన విశదమగును. ఆతనెంత స్వతంత్రముగా, సంతోషముగా నుండువాడో, భారతదేశపు శాంతి సౌభాగ్యాలు కలిగి వరిలుదు యితరదేశాల దృష్టినికూడ ఆకర్షించుటకు ఆతను ఏరీతిగా కారకు డయ్యెనో మనకు గోచరించును. ప్రాచీనరైతు తన యింటబుట్టిన ఎద్దులతో సేద్యము చేసికొనుచు, తన పశువుల ఎరువుతో పొలమును బలపరుచుకొనుచు, మిగతా ఎరువును వంటచెరువుగా నుపయోగించుకొనుట, కష్టకాలములో ఉపయోగించుకొనుటకు తగిన ఆహారపదార్థముల నిలువచేసికొనుచు, పాలు నెయ్యి తానుత్రాగినంత వరకు త్రాగి మిగిలినవి సగరములలో అమ్ముకొని యింటిభిరువులకు కావలసిన ధనమును సంపాదించు కొనుచు జీవయాత్ర సాగించుచుండేవాడు. తన కుటుంబమునకు కావలసిన గుడ్డలు తానే స్వయముగా వడిలి తయారుచేసికొనెడివాడు. శరీరిగా అన్నివిధముల ఆరోగ్య స్వతంత్రమును, ఆనందమును, ఆనందవింశగలిగిడువాడు. సంతృప్తులు స్వయంపోషకు

చాలుక్రిందదన్ను బ్రతికినవాడు; చేనుక్రిందదన్ను చెడినవాడు లేడు

రైపి ఇట్టిరైతుల నుయ్యమైన దేశము మొత్తముమీద కాంతిసౌఖ్యముల వనుభవించినది. ఈ కాంతిసౌఖ్యములకు మూలాధారము ఏమిటని తెలిసికొనగా; పాడికి పాడిపశువులు, దుక్కికి ఎద్దులు, సంతానోత్పత్తికి ఆబోతులు, రైతులకు నిత్యావసరముగానుండేది గోగండువలెనే! ఆకాలములో పశుగ్రాసము ఎక్కువగానుండెడిది. పల్లెప్రక్కనే బీడుభూములుండెడివి. అందువలన ఎద్దులు, చిత్తనములు, ఎరువులు, మున్నగువాటిని కొనుటకు ఆప్పులు లేవలసిన ఆవుసరము కష్టపట్టెడిదికాదు. కాని రానురాను దురదృష్టవశమన యీ కాంతి సౌఖ్యములకు మూలాధారములైన పశువులసంఖ్య నానాటికి సన్నగిలుచున్నది. సాంప్రదాయ మగు బాటి పిసిమచున్నది. ఈ కాలములో రైతులు వ్యవసాయము చేయుటకు చాలావినుగుగానున్నారు. కూలియా విపరీతము. పశువులకు పెట్టు దావాగొర్రుల విపరీతమైనవలన కొంతమంది సశువులూ గి ఆహారము పశుచికిత్స లేక క్రొవచున్నవి. గాన రైతుల ప్రభుత్వము మీద చక్కనికొనవలెను.

ఎద్దులజత ఒకటికి బాడ్లమీదగాక 17 ఎకములభూమిని సాగుచేయగల వనుటన్న పుటికి యిప్పుడు తకంబై పోయినందులకు నేడు పశువుల మన్నది. అనగా శక్తి మి చివరికి చేయుచున్న పన్నుమాత్రం పాలము తక్కువగా ఉన్నట్లులేదన్నమాట. అందుచేత దుక్కి పెనులు కార్మికముగా చెప్పితిమి గుర్తుచున్నమాట. దానితోపాటు ఖీచించిపోవుచున్నవి. పాలమును చాలా విధముగా వినియోగించి ఎద్దులసంఖ్యను హెచ్చు చేయవలెను. ప్రతిసంవత్సరము 1967-72 వరకులుండే సేవారి వ్యవసాయమువలన రై పోవు ఎద్దులు సప్లయకొరతవు. అప్పుకొడల కలగలనిది నెప్పుడున్న 38312992 ఆవులుచాలవు. పైగా ఖిటిలో ఎక్కువ ఎద్దులను కొని మిగిలినవి కావలసిన ఎద్దుల సంఖ్యకు సరిపోవాలవు. ఈరీతిగా చెనుకోవలసి, పాలము మోర్చని ఎన్నియుండునో ఆసంఖ్యను పూడ్చుటకు సహాయార్హుల కొరతంబావాలవు. ఆ ఆవులలోనుండి నూటికి 20 పుద్దాప్రయమిచ్చి యీ సేవారిలో తినికొని మిగిలినవి గలదు. అందువలన వాటిని కాపాడుచుచుండులో మనము మిఘాప్రభుత్వ ప్రయత్నముకొన్ని కృషి మధ్య పోదు ప్యవధి ఎక్కువమువలనగూడ అగిన్ని పోల్చి పాలు చాలవు. కావట్టి రైతులు, ప్రభుత్వము పశుపృథ్వియన్యైడి మార్గము లాలోచించవలెను.

ఎద్దులములలో పశువుల పాత్రను ప్రస్తావించియున్నాము. అందుకు ఒక విధముగా పశువులుగా సుండును. అప్పుడు పశువులను వినియోగించుటకు వ్యవహరించును. దుక్కిచున్నట్లు పనికేవచ్చునని. పాలమపరివర్చించు. మూసము మునుపట్టునని. న్నట్లుపనికేవచ్చునని మంచిబలముగల పలుతర్కముగల ఎముకలను కలిగినట్లు పెంచుదురు. పాలు యిచ్చువాటిని ఎక్కువపాలుయిచ్చునట్లు పెంపొందించే వాటిపాలనుతీసి వెన్న జాన్న గడ్డపాలు తయారుచేసి మనదేశములకు “గొల్లభూమిమార్కు గడ్డపాలు, పోల్స్ కెన్న” నను నామములతో ఎగుమతి చేయుదురు. బాగుగా కండబట్టిన తరువాత చంపి

ఇనుకొనేదున్ని బాగుపడినవాడు; బంకనెలయిన్ని చేసినవాడు లేడు

ఆ మాంసమును డబ్బాలో పెట్టి విదేశములకు ఎగుమతి చేయుదురు. ఈ పరిశ్రమలకు పుట్టినిల్లు ఆస్ట్రేలియాదేశము. దీనినే ఇంగ్లీషులో “బేబీ బీఫ్ పరిశ్రమ” యందురు.

మనదేశములో మంచినీరముల పశువులు కొలదిగానున్నవి. ఒంగోలుజాతి పశువులు ప్రపంచములో ఎచ్చటనులేవని విదేశీయులే ఒప్పుకొనుచున్నారు. మెనూరు సంసానములోనున్న అమృతమహాల్ జాతి, కోయంబత్తూరు జిల్లాలోనున్న కంగాయంజాతి, బెంగాలు జిల్లాలోనున్న అలంబాడీజాతి, గుజరాతీ జిల్లాలోనున్న కాంక్రేజాతి, పంజాబుదేశములోనున్న ఠరియానా మహివాల్ జాతి మున్నగునవి మనదేశములో ప్రశస్తమైన జాతులుగా పరిగణింపబడుచున్నవి. శీతోష్ణపరిస్థితులనుబట్టి జాతులకూడ వృద్ధియగుచుండును. ఎక్కువవర్షములుపరియు మలబారు, బెంగాలు ప్రాంతములందుండు పశువులు పొట్టివిగానుండును. ఎక్కువ పొడిగానుండు సింధుప్రాంతములందుండు పశువులు బలముగాను, ఎత్తుగాను అందముగాను యుండును. మెనూరు ప్రాంతములందుండు పశువులు దృఢమగు ఎముకలుగలిగి ఎత్తుగా అందముగానుండును. ఒంగోలు ప్రాంతములందుండు పశువులు ఘాసాదిమెక్కువగా నుండుటవలన ఎత్తుగానుండును. దున్నలకు కేదెలకు వర్షము లెక్కువగు ప్రాంతము లందున్నను పరవాలేదు. బొంబాయిజిల్లా మాహిల్ అను గ్రామములోని కేదెలు పెద్దవిగ బలిష్ఠముగ నుండును. అచ్చట వర్షము లెక్కువగానుండును.

పశుసంపద సంవత్సరాదాయము

భారతదేశములోని పశుగణాభివృద్ధికిని, పాడిపరిశ్రమాభివృద్ధికిని సాధనోపాయములను సూచించుటకై ఒకకమిటీని ఈ మధ్యకాలములో నియమించిరి. కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీ డా॥ నార్సన్ సి. రైట్ గారు నమోదయినచి మార్చివరకు దేశములో పశువుల మొదలైన ఈ రీతిగా లెలిపిరి. సంవత్సరాదాయము పశువుల మూలముగ నుమారు 1900 కోట్ల రూపాయలని తేల్చిరి.

పాలుపెరుగు మొదలగువానివలన	810	కోట్లరూపాయలు
వ్యవసాయపనులవలన	612	,,
ఎరువులవలన	270	,,
వ్యవసాయేతర పనుల వలన	161	,,
తోళ్ళు చర్మము ఉన్ని మాంసము వలన	45	,,


పశుసంఖ్య - ప్రభుత్వసహాయము

రైతు సంపదకు పశుసంపదయే మూలాధారము. పశుసంపదలేని రైతుసంసారము ధాన్యములేని కొట్టమువంటిది. పశుసంపదను వృద్ధిచేయుటకు ప్రభుత్వము కొంత

పల్లందున్నినవాడు; పల్లకెక్కినవాడు కొకటే

పరకు సహాయపడుదున్నది. కాని రైతుకూడ శ్రద్ధతీసికొననిచే ఈ సహాయము పరిపూర్ణత పొందలేదు. రైతుప్రభుత్వమిచ్చిన సహాయముతోకొనినకాదు. ప్రభుత్వమునకు అది చేయుసహాయము సద్వినియోగపడు మార్గాలను రైతు నచ్చజెప్పవలెను. అప్పుడే ప్రభుత్వముయొక్క సహాయమును రైతు సక్రమముగా పొందగలుగును.

ప్రపంచము మొత్తంమీదనున్న పశువులసంఖ్య సుమారు 70 కోట్లు. భారత దేశములో పశుసంఖ్య 24½ కోట్లు. అందులో మద్రాసు రాజధానిలోని సంఖ్య 8 కోట్లు. ఆంధ్రరాష్ట్రములో దాదాపు 2½ కోట్లు ముందును. దేశములో పండు పంట కొరకు ప్రజలతోపాటు పశువులు పావులపడుచు ఉభయములు పాటుపడుచున్నారు. నేదెవారినికూడ కలుపుకొనిన దేశములో ప్రతివంద మనుష్యులకు 60 పశువులున్నవి.



ప్రపంచము మొత్తం 70 కోట్లు

ఇండియా 25 కోట్లు

మద్రాసు 8 కోట్లు ఆంధ్రదేశము 1½ కోట్లు

పశువుల సంఖ్య

భారతదేశములోని పశుసంఖ్య

భారతదేశ రైతునాయకులు, పశుసేనాభిలాషులు నగు శ్రీ ఆచార్యులంగా		
ఎం. ఎల్. ఎ. గారు భారతదేశములోని పశువుల విషయముల తెలిపియుండిరి.		
ఎదులు 4628307	లేగదూడలు 31653341	నేదెనూడిలు 11098661
కోడెలు 46762603	దున్నపాతులు 5193396	నాగర్లు 25349192
ఆవులు 30532054	నేదెలు 15116893	బంగారు 7506114

మడికిగట్టు; ఇండికి గుట్టు ముచ్చిది

భారత సంస్థానములలోని పశుసంఖ్య

ఎదులు	1863433	శేక మాడలు	9626580	గజెమాడలు	3756143
కోడెలు	11888808	దాన్నబోలు	1095342	వాగళ్ళు	5843276
ఆవులు	13430983	గేదెలు	1479781	బండ్లు	1827797

భారత వ్యవసాయము — పాటుపడు పశువులు

ఈక్రింద వివరించిన పశువుల సంఖ్యలను గ్రహించి, వీరిని పశుసంఖ్యలలో చేరువేసి, రాష్ట్రముల చొప్పున పశుసంఖ్యలను ఎంకిగలవోమని భావించి, ఇంతయుగాక ఆచటి జనసంఖ్యలను పశుసంఖ్యలను సంబంధము నూరు ఎకరముల భూమికి ఎన్నెన్ని సాధారణ పశువులు ఎన్నెన్ని ఎదులు గలవో వివరింపబడుచున్నది. (ప్రతిరాష్ట్రమునందు సహజముగ నున్న పశువుల సంఖ్యలను గ్రహించి, నిమిషపరిమితిని.

రాష్ట్రము	సాగుభూమి	పశువుల సంఖ్య	జనులకు పశుసంఖ్య
ఆస్సాం	5,945,000	5,785,000	76.1
బెంగాలు	23,528,000	25,491,000	54.6
బీహారు ఒరిస్సా	25,269,000	20,728,000	61.0
బొంబాయి	27,492,000	8,480,000	57.0
సింధు	4,125,000	2,326,000	70.9
బర్మా	17,046,000	6,267,000	47.4
మధ్యపరగణాలు	24,395,000	11,671,000	83.9
మద్రాసు	33,339,000	22,111,000	52.2
మంజూరు	26,940,000	15,237,000	73.7
సంయుక్త రాష్ట్రములు	35,121,000	31,046,000	68.4
మొత్తం	226,970,000	150,978,000	61.1

చెన్నరాజధాని పశువులు

చెన్నరాజధానిలోని పశువులు చాలా కాలమునుంచి నూరి పేరుప్రతిష్టలలో నున్నవి. ఇంకిన మైసూరు ఒంగోలు జిల్లాల ప్రాంతములలోని పశువులు ఎక్కువ సాంప్రదాయముగ నుండును. పశువులకు సామర్థ్యములు చూచుటకు రైతు కొన్ని సంతలకుకూడ పోవ వలెనగుననిపడుచున్నది. దక్షిణభారతములో పశువుల సంగతులు తిరుగువాడల్లి, మధుర తిరువల్వేలి మున్నగు జిల్లాలలోను ఉత్తరమున ఆనంతపురం బళ్ళారి మొదలగు జిల్లాలలో గలవు.

ఒంగోలుజిల్లా పశువులు చూచుటకు చాలాతీవ్రముగానుండును. కాని కొన్ని ప్రత్యేకపు పనులకుకూడ వినియోగింపబడును. కాని మైసూరు పశువులలో సర్వవిధముల

భేదించును. అని ఆకారములో నానా పెద్దవిగను మిక్కిలి విషయ విధేయతలు కలిగి యుండును. పెద్దబరువులు ఈ దృష్టిపై ఉపయోగించును కాని మైతూరు పశువులు రోడ్లమీద నడచుటకుమాత్రమే యుపయోగించును. ఇంకను బలవంతగల పాదములు కలిగి చాచవ్యవస్థగా మిక్కిలి భైర్యముగానుండును.

రాజానియొక్క శీతోష్ణసితి విప్రప్రాంతములలో విధిరూపములుగా నుండును. శీతోష్ణసితిగూడ పశువుల శిక్షణలకు కొంతవార్య గలుగజేయుచున్నది. కొయంబత్తూరు ఆలంబాడి పశువులు చాలాతెమ్మల పరలప నిక్రయించబడెను. దక్షిణ కొయంబత్తూరులోని పశువులు ఆలేరుపగవచ్చినయెడల పనిచేయును. దక్షిణదేశపు వేడిప్రాంతములలోని సామాన్య పశువులు పది లేక పండ్రెండు సంవత్సరముల పని చేయును. ఇంకను దక్షిణ దేశములో పాన్సా లాలాకొలొని పశువులు రెండు లేక మూడుసంవత్సరములే పనిచేయును. ప్రత్తిపాడు నల్లకగడి నేలలో అసగా తిరు నల్వేలి, దక్షిణరామనాడు, మధురకల్లూరులో కింగాయం పశువులుకూడ ఇప్పుడు వ్యవసాయవృత్తికి ఉపయోగపడుచున్నవి. ఆలేరుకపు పశువులు “మలయమాడు” అని ఆనంతవరం జిల్లాలో పిలువబడును. ఇవి పదిసంవత్సరములు పనిచేయును.

పశువులు చిన్నతనమునందు ఒక దేశమునుండి మరియొక దేశమునవచ్చిని పోబడిన యెడల ఆయాదేశపు శీతోష్ణసితులకు అని అలవాటగును. దక్షిణమలబారులోకూడ కొంతమొత్తముగల పశువులు మేపబడుచున్నవి. పడుమటి తీరమునందు నివసించు పశువులు కొంతకాలము పచ్చికడి బాగుగాతినును. చాలాకాలము ఆహారము లేక మల మల మాడును. కింగాయం, ఒంగోలు ప్రాంతపు భూములలో నున్న మెమ్మలగా నుండుటచే పశువుల ఎముకలు దృఢముగానుండును. అందుచేత మొదటిరకము పశువులుగా పరిగింపబడుచున్నవి. పడుమటితీరపు ప్రాంతము రిలగిరి ప్రాంతము గంగాం ప్రాంతములలో ప్రత్తిపాడు నల్లకగడి భూములు ప్రత్యేక తెలుపు భూములు, నూతుల వ్యవసాయపు మెట్టభూములుగలవు. ఎటినినాగి యెటుటకు చాలాపశువులు కావలెను. నల్లకగడి భూములలోని రైతులు పశువులను బాగ్రిత్రగా మేపుదురు. ఎట్టకేగడి భూములలో రైతులు మంచినీరును చురుకుగల పశువులను మేపుదురు. నూతులక్రింద పొలములు నాగుబడినీయు (ప్రదేశములలోని) ఎక్కువీటిని వాచివనంచి లాగవలసి యుండటవలన మంచినీరుగల ఎత్తులుండవలెను. కొయంబత్తూరులో నున్న నూతులు డి. త్తమండలములోని పెన్నెకొటలు నల్లకగడి భూములలోనున్న పెద్ద ఎత్తులే యుండవలెను.

ఆంధ్రరాష్ట్రములోని పశుసంపద (వేలలో)

ఈ క్రింది పట్టికను శ్రీ మా జీ పాన్సా మెంటర్ పెక్రటర్ యం. బాపిసీడుగారు వ్రాసిన ఆంధ్రసర్వస్వమునుంచి తీసికొనబడెను.

మార్గశిరమాసములో ముగియుటకు ప్రార్థించెదను

జిల్లా పేరు	ఎరులు	అవులు	మాడలు	దున్నలు	నేడలు	గొర్రెలు	మేకలు
విశాఖపట్టణము	411	316	222	267	241	603	363
తూర్పుగోదావరి	251	242	192	110	214	62	104
పశ్చిమగోదావరి	166	139	112	95	188	68	80
కృష్ణా	163	146	160	116	354	203	192
గుంటూరు	196	130	144	183	559	557	166
నెలూరు	226	242	138	142	356	1081	471
కర్నూలు	190	110	75	56	269	577	278
బళ్ళారి	200	114	103	31	130	350	238
ఆనంతపురం	243	153	135	50	135	1171	430
కడప	155	92	55	70	219	744	303
చిత్తూరు	353	344	320	46	153	962	549
మొత్తం	2254	2018	1456	1160	2198	6379	3174
మొత్తం ధర	178780	100900	29120	58300	83940	25516	9522
రూపాయలలో	రూ 70	50	20	50	30	4	3

షరా:- ఇంకను ఆంధ్రరాష్ట్రములో సుమారు 75 లక్షల కొట్లగలవు. వీటిలో అయిదవ వంతు విశాఖపట్నం జిల్లాలోనే యున్నది.

ఆంధ్రరాష్ట్రములో గవర్నమెంటువారి పశుచికిత్స

జిల్లా	తాలూకా	గ్రామములసంఖ్య	పశువుల అస్పత్రులు	పశువులసంచార వైద్యులు
విశాఖపట్నం	19	11547	7	13
తూర్పుగోదావరి	13	1920	8	9
పశ్చిమగోదావరి	7	715	4	6
కృష్ణా	9	981	6	8
గుంటూరు	9	926	5	6
నెలూరు	13	1621	3	10
కడప	9	889	4	5
కర్నూలు	9	796	4	11
బళ్ళారి	9	908	4	9
ఆనంతపురం	9	853	3	7
చిత్తూరు	10	2254	3	10

షరా:- వైస్రాయ్ లిక్విడ్ గా రిటివల 20 శేల పశువులున్న కేంద్రములో ఒక పశు వైద్యుడవసరమనిరి. ఈరీతిగా లెక్కించిన ఎంతమంది పశువైద్యులుండిన మన పశుసంతతి బాగుపడునో చదువరులు గ్రహించుదురుగాక.

స్వస్థవృత్తము

మూ డ ష భా గ ము

“కవ్య మాడించుచు గదురు గిట్టునద్రిప్పి
కామితార్థములిచ్చు కర్మభూమి

పైరుల్ పరిశ్రమల్ పలురకమ్ముల మించ
మక్కువ జూపించు మాతృభూమి

పసులకు గ్రానంబు ప్రజలకు బూనంబు
సమకూర్పజాలిన జన్మభూమి

గోవు మాణిక్యాల గొట్టు నాగళ్ళకు
బూజలనందించు పుణ్యభూమి

కటకటా! నేటికన్నియు గనులమూసి
బీవకళ గోలుపోయి నిస్తేజమెల్ల
కాలగర్భంబునందట్టై కలిసియుండె
బ్రౌభవం బణగాఱగా బల్లెటూళ్లు||”

“నల్లటూరు”

పశువు లాశోగ్యముగా నుండుటకు మంచి మేతయు త్రాగుటకు మంచి నీరును వీల్పుటకు శుభ్రమైన గాలియును అభించునటుల జేయుట మన కర్తవ్యము. పశువులను ఎండలో నుంచక తడియనియక కాపాడుచుండవలెను. పశువునకు దేహశోగ్యమున కంటె అధికమైన శ్రేయస్సులేదు. అట్టి ఆశోగ్యము లేనప్పుడు ఆపశువు శాత్రువుల పనిచేయజాలదు. ఒకవేళ చేయగలిగినను ఆపని పశువునకు మిక్కిలి శ్రమ నిషింపక పోదు. కాబట్టి ప్రతిరైతు తమపశువులను ఆశోగ్యస్థితిలో నుంచుట ముఖ్యధర్మముగ పరిగణించబడినది. గాలివలన దీపమునకు హాని కలుగనియ్యక మన ప్రయత్నపూర్వకముగా నెటుల కాపాడుచున్నామో అటులనే యుక్తమైన బొప్పిదాది వస్తువులను గుర్తెరింగి శోగములను మాన్పుటకు ప్రయత్నము చేయవలెను.


పుష్కమానమునందు పూసలుగ్రుచ్చ ప్రాద్దువుండదు

ఆహార పానీయములు

వివిధ దేశములయందు పశువుల కాహారముగ నుపయోగించు పదార్థములు వివిధములుగ నుండును. ఇట్టి పదార్థస్వభావము దేశముయొక్క శీతోష్ణస్థితిని బట్టియు ఆయా పశువులు చేయుపనులను బట్టియు మారుచుండును. దూడలుగానుండు వయస్సులో దేహముయొక్క సకలభాగములను వృద్ధిజేయుటకును పశువు బ్రతికినంతకాలము నిరంతరము ఆయా భాగములను తిరిగి బాగుచేయుటకు దేహవ్యాపారములకు సాధనముగ నుండుటకు ఆహార ముపయోగ మైయున్నది. పశువులకు పెట్టు ఆహారపదార్థములలో జీరణముకొగల మౌనకరపదార్థము లెంతయున్ననో ఉష్ణకరపదార్థము లెంతయున్ననో క్రొవ్వుపదార్థము లెంతయున్ననో విచారించవలయును. పశువులకు పెట్టు ఆహారపదార్థములలో యేయే ఘోష్య కలిపి పెట్టవలెనో నిర్ణయించుట ముఖ్యమైనవియై యున్నవి. ఆహారము విస్తారముగా దొరికు కొలములందు వేసవకొలచుచున్న పశువులకు పోషకగుణులక సమానముగా మేత మేవలయును. ఆ మేతి మలభముగ జీరణమగునదిగాను సారవంత మగునదిగాను ఉండువలయును గాని నిస్సాగ మైపోయియు బూజుపెట్టియు నట్టియు తుక్కుగల ముక్కినగడ్డ మొలగునని మేనరాదు. వేసవికాలమందు సరియైన మేతి దొరకకపోవుటచేత తుక్కుగడ్డకు దీర్ఘకాల విషమతములైన ఆహారములుతీసి పశువులు పలువిధరొగముల పాలగునున్నవి. జంతువుల జీర్ణకర్తృత్వమునుబట్టియును నెరుగువేయు జంతువులుదిన ఆహారములో చాలాభాగము ఎరువ త్రీయు చేసికొనగలవు. పాడిపశువులకు అది బలకరమగు భూమిగల పెట్టనవలయునైదు. ఈ జంతువులు తామతిను ఆహారములోని సారమును చూచుచు గ్రహించుచుగాని వారి శరీరపోషకు లగినబలమును పొందగలవు.


జంతువ వయస్సు మేరయొక్క పరిమాణమున జంతువులు పాలుపడుట ఈమూడును జీర్ణకర్తృత్వలో మార్పును గలిగింపవచ్చు. విచారకరమైన పాట పగులునట్లు మేపినను తక్కువకుమీసను ఎక్కువగా పుచ్చేయుచుననుచు విజృంభించి ఆహారము పెట్టినను ఎక్కువసారమును తీసికొనలేవు. మారు పోషకగడ్డనుండి సామాన్యస్థితిలో 70 పానుల సారముచుండు తీసికొనలేవు. పశువు నెనును జేయువయస్సులో ఏపక్షము ఆహారముగాని పుడసినదిగా నాహారము పుచ్చుటకు పుచ్చినచో అది పుచ్చుటకు అనుకూలముగాను పుచ్చుటకు గురైనదిగా నున్నచో పుచ్చుటకు పుచ్చినచో అది పుచ్చుటకు అనుకూలముగాను బట్టి జీర్ణకర్తృత్వ ముండును.

పశువును పోషించుటకు చవుకగానందు దాహకారము, మేతకారము ఎవరెవరేనూ హల నిచ్చుచుండరని పైత్రులాందోరవ పనుచుండును. హల అట్టివిషయములు పైత్రుయొక్క అనుభవముమీదనే తెలిసికొనుటమరదిదని ముఖ్యపాయము. పలువిధరకములగడ్డజాతులను, దాణాలను పైత్రు నిశ్చయముపాడుచుండును. అట్లుపాడుట పలన



అఖిలభారత పశుప్రదర్శనము - బెజవాడ


ఈ ప్రదర్శనములో డాక్టరు యేజెళ్ల శ్రీరాములుగారుకూడ పాల్గొన్నారు.



పాండువ్య మునసబుగారి సాంప్రదాయముగల ఎడ్డు.



శ్రీ మాదిసేని వీరరాఘవయ్యగారి ఎద్దులజత — జంపని గుం. జి.



శ్రీ గన్నంసేని వెంకయ్యగారి ఎద్దులజత — పూనూరు గుం. జి. 4



శ్రీ బెల్లం రాఘవయ్యగారి చక్కని కొడెలు — కేశవరావు గుం. జి.

తేజోవహరములు సరిపడినవో, ఏవిసరిపడుటలేదో గ్రహించి మార్పుకొనుచుండవలెను. గవర్న మెంటు వ్యవసాయమున రుమెంటువారు పలువిధరకముల దాణాలను కనిపెట్టుట, పశువు ఖరీదునకుమించిన ఖర్చును సామాన్యరైతు భరించలేకపోవుట కలుగుచున్నది గాన కృత్రిమ ఆహారములతో, పశువులను పోషించక స్వచ్ఛమగు గడ్డికాయలతో, దాణాలతో, పోషించుటవలెను. ఆయాదేశశీతోష్ణస్థితిగతుల బట్టికూడ ఆహారము పెట్టుచుండవలెను. ఒక ప్రాంతముందు పెట్టుఆహారపదార్థములు వేరొక ప్రాంతముంగు పెట్టిన సరిపడవు. ఒక ప్రాంతములో ఒక బొన్న చెపనూకపెట్టిన కొన్నిపానుల పాలుపడును. ఆరేతిగ నే మరొక ప్రాంతముందు వాషిన పుచ్చెయగు. కాబట్టి ఆయాదేశ శీతోష్ణస్థితిగతులను బట్టియు, ఇండియా గవర్న మెంటువారు పరిశోధనచేసిన ఈ పదార్థములేమైన యున్న వారిసలహాల ననుసరించి పెట్టుటవలెననుచు నేను సలహా నిచ్చుచున్నాను.

జీర్ణశక్తి కలుగుటకు పెట్టువస్తువులు

ప్రతిదినము పశువులను పెట్టుమేతతో తగినంత తెలికపిండి గోధుమల వగైరా కలుపుట మంచిది. తెలికాత ఉప్పును మాన ఆహారముతోచేర్చి పెట్టుటసూచితి. పశువెంటెబరువున్నదో గ్రహించి పడినదల పాన బరువును జాతువునకు రోజొకను ఆరపాను తూకముగల చమురుపదార్థములు పెట్టవలెను. గ్రేటరొయిచ్చు ఆహారములో నాలుగుపాళ్ల బరుడవలెను. ఆస్ట్రేలియాలో ఆహారముతో మె తిపిండి కలిపి పెట్టుట మంచిది. ప్రతిదినము పెట్టుఆహారములలో కొన్నిబలము గలిగియును. మరికొన్ని రోగములు పుట్టింపును. శనగ, కంది, పెస, జవ, గోబిచ్చెడు, మినుము, అలచంద, మున్నగు కాయధాన్యముల పొట్టు, చెత్త మున్నగునాటిలో మాంసకరపదార్థములుండుటవలన మంచిబలము కలుగజేయును.

రైతుల ఆకురక

ప్రతిరైతు మా పశువునకు ఏ ఆహారము పెట్టిన పాలిక్కును ఏమి మేసినబాగుగా బలియును. వాతముచేమకుండ పెట్టుకట్టిఆహారములేమి? యివి వివిధరకములుగా వైద్యులను సలహాలడుగుదురు. ఇట్టి సలహాలు రైతుల అనుభవము మీదనే తెలిసి కొనుటకుంచిదిగాని వైద్యుని నడిగి అనుభవములేని సలహా నిచ్చువార కొందరుందురు. తలచవలెను. రాగి, సజ్జ, మొక్కజొన్న, కొల్ల, పరిగ, ఆరిక మున్నగు కంకిధాన్యముల గడ్డియును చొప్పుయును అంతబలముగల వస్తువులుగావు. ఈసహజబలమును బలము ఉలపనొట్టు నవలెను. పరిగడ్డికంటె గోధుమగడ్డి బలకరమైనది. శనగలు వడ్డకంటె నెమ్మకబలము గలవి. కంకిధాన్యముల గడ్డి అన్నిటికన్న బలహీనుగా నుండును. కాయధాన్యముల గడ్డికంటె కంకిధాన్యముల పొట్టు బలమెక్కువనిచ్చును. చమురునిచ్చు ఆకురకములు, నువ్వులు మున్నగు గింజ ధాన్యములు బలకరమైనవి. ఈ చమురునిచ్చు గింజల

కంటే కాయధాన్యము లేకుంప బలకరముగా నుండును. కాయధాన్యముల కంటే తేలికపిండి, కొబ్బరిపిండి మున్నగునవి బలకరమైనవి.

ప్రతిధాన్యములోను నీరు, చమురు, మాంసకరపదార్థములు, ఉష్ణకరపదార్థములు నారవస్తువులు లేవ్వుకయుండును. పశువు జీర్ణముచేసికొనునప్పుడు మాంసకరపదార్థములు ఒకవిధమగు పంచదారగా మారిపోవును. ఉష్ణకరపదార్థములుగూడ మరొకవిధమగు పంచదారగానగును. చమరు విశేషముగానున్న పదార్థములు తేలికగా జీర్ణమగును. అందుచేత నువ్వులు మున్నగునవి త్వరితగా జీర్ణముకొవు.

ఒకపశువు తా మెంతబరువుగలదో దానిలో 20 వ వంతు బరువుగల మంచి వుస్టి గల ఆహారము పెట్టినయెడల అది సజీవముగ బ్రతికియుండగలదు. అంతకంటే అహార మెక్కువయిచ్చిన పలముపొచ్చును. కాబట్టి వందమణుగుల బరువు తూగుపశువునకు రోజునకు నాలుగువంతుల అహారిమిచ్చిన పాణిముతో నుండగలదు. 50 మణుగుల బరువుగలదానికి రోజుమణుగులు అహారిమిచ్చిన చాలును. అహార మెంతకావలయునో అంతను నాలుగురెట్లు నీరుకావలయును. నాలుగుమణుగుల పొడిఆహారము తినపశువు నకు 16 మణుగుల నీరు కావలెను. నెరుగువేయు బరువులకు పెట్టు ఆహారము కొంచెము తిడునుగాను వివరింపెను. మెత్తని ఆహారము పెట్టిన నెమరునకు తెచ్చికొనజాలవు. అందు చేతనే పశు విధిలోగములు కలుగుచుండును.

వాయువు

ఫుట్టిపడి మెదలు చెరిపోవువరకు మేలుకొన్నను నిగ్రహింపునున్నను ఎడతెగక వాయువుని గాలినివేల్చుటయే. కనుక పశుజాలము ప్రతుడుటకు వాయువే ప్రాణాధారిను. గాలి పొసకంటే కలవడు. అది నీరునట్లు స్పృగ్యరూపమున తేలియును. సముద్ర మంతయును నీటిమయమై యుండుటవలననే మనమందు భూమిగూడ వాయువుచేత నావల పడుచున్నది. గాలి ప్రతిపశువునకు ముఖ్యవరము. కొన్ని ప్రదేశములనుండి వెలువడి గాలి నుంచినదిగను మరికొన్ని ప్రదేశములనుండి వెలువడుగాలి చెడదగిన యుండదు. కొన్ని శ్వాసకోశములలోనికి వాయువును బీల్చుటకు జీవిండుటయే కష్టము. ఇహ శ్వాసకోశమునందు మూలభాగమగు ప్రాణవాయువు పశువుయొక్క జీవితా ధామైయున్నది. అవు శరీరమునందలి పోషణకును ఉష్ణతకును అనుకూలమగు గతుల మీద నుండవలయును. అట్లు ప్రతుడుటకు నరములకు సామాన్యముగా శరీరముంటికి బలము కలుగజేయునది నీరొప్పునగు వాయువు అవసరమైయున్నది. వాయువు చలనము లేకపోవుచుండుచేతనే కష్టము. ఒకప్పుడు మనికితోను విషయుతమైగూడ నుండును. అహారము పానీయము గాలి నీల్చుటవలన అనేక పశువులు మరణించుచున్నవి. కాబట్టి వాయువు ధారాళముగా నుండునట్లు పశువుల నుంచవలెను.

ఉత్తరాన ఆరిమినా, పాముకరిచినా తియక, కరిక విడువవు

జలము

పశువులు కల్పహేదకమును త్రాగుటచే ననేకకోగముల పాలగుచున్నవి. యజమానులు శ్రద్ధతీసికొనినయెడల వానిని నివారించవచ్చును. పశువుల కాహారముపైట్టి కొన్నిదినములుంచవచ్చునుగాని ఏటిని త్రాగించినచో ఒకదిండ్లమైనను నాచలేము. అట్లుండుటకు కారణము పశువుదేహములో విశేషభాగము జలమిచ్చును. ఒకపశువు ఆనేకశేర బరువుత్రాగుచున్నది. అందు జలమే పెక్కుగానుంచును. ఆజలములయే పోగొట్టినయెడల దేహము చాలతక్కువగా తూగును. పశువు దేహమున ఆనేకపక్షమున్నవాళ్ళగులు గలవు. వారిద్వారా భిక్షిని ద్రవ్యమును దేహమునందంతయు వ్యాపించుచున్నది. కనుక పశువు ఆహారమును తిప్పుకొని ఒకవిధమైన యాహారమును భుజింపవలసియున్నది. ఇటు తిని మేత ఆయా జీవకోశములందును బీజముగాని ప్రక్రియనుండు గర్భనాళములలో ప్రవహించి దేహమునకు తటస్థమయిపోయి కర్మము సండుండు అన్నిభాగములను పోషించును. ఇటు జీవకోశములందును బీజముచేతగా ములను దేహమునందు భాగములను ప్రక్రియ తీసికొనిపోయి చేర్చుకొనినవి. కాబట్టి ఇది సులభముగా బ్రహ్మ మటప జలమువలె ద్రవమయిండుననిన. కావున కర్మమునందు దెల్పుదు కొంతజలముగక, టత్వమని మెయున్నది. కర్మమునందు జలము తగినయెడల మరికొంతజలము దానికి జేర్చుకొనినవిని పశువువలె తెలుపుచున్నది. అందుచే మరల జలము త్రాగుచున్నది. కావున ఈరీతిగా జలముగైకొని దేహమందలి మిగిలినమును స్వేదరూపమునను కూత్రరూపమునను తొలగించును. పశువు త్రాగుజలము మరిశుభ్రముగా నుండవలెను. అట్లులేనిచో ఆశోగ్యముచెడి ఆనేకకోగములు పుట్టి మరలమునకు సిద్ధమగును. కాబట్టి రైతులు పశుపశువులను మరీకి వానన నందు చేర్చివెట్టలమైన ఏరు నొసంగి పశువు తిని పచ్చిచేయుదురు గాక.

శరీర పరిశ్రమ

పశువు తినునట్టి యాహారము పూర్తిగా ననాశముకలదికాక కొంతకాలమునకు పూర్ణమును వలసినంత పరిశ్రమ శరీరమునకు ఉండవలెను. నిర్దుష్టమైనది అవును. సుఖముగానుంచి మేపరాదు. అది చాలపొహలు. అది నిద్రాపట్టి అలసటవచ్చునట్లు పడుచుచుండును. కాబట్టి రైతులొకనియొక్కది నిరాహారము తీసికొని పరిశ్రమ నిర్దుష్టమగునట్లు యెడల అది మరీక్ష్మియగుచుండును. కావలెనదిగా నిద్రాపట్టి కొంతదూరము బేరగొడుండును. ఏరు బయటకు వెనుక పశువులయొక్క బిడ్డలను పాలిని స్వల్పభరిలకు తీసికొని మెపుదురు. ఆ పశువులు బిడ్డలకు పలమునకులుచట్లు కొన్నిదినముల దాణాదినములు కాసి స్వల్పరూపమున తినించును. యెదెత్తినతో యిచ్చి కొని దాచురు. వాటికి తగిన దేహ పరిశ్రమలేక తెలుపక కేదెత్తినా గిచ్చుకొనినవి. వాటిని రైతులు చూచి మిక్కిలి ప్రాంతజిది వెంటనే ఎందుభర్తవైననుసరించి పుచ్చి తీసికొని పుచ్చుదు.

తూర్పు కొంజునేస్తే నుక్కిఎద్దు రుక్కవేయును

తరువాత బండికట్టుట నాగలిడున్నట్లు తటస్థించును. తరువాత పశువునకు వగర్పు వాతము మున్నగు రోగములు సంభవించును. అంతటనుంచి మరల పశువు అస్వస్థులకు తీసికొని వచ్చి చికిత్సలు చేయించుదురు. శరీరము నే వాడిపశువులలోగూడ నుడును. కాబట్టి రైతులు చుక్కగా గమనించి మీ పశువులకు రోగినింత శరీరవైద్యము కలుగునట్లు జేయుదురుగాక.

విశ్రాంతి

కష్టపడి పనిచేసిన పశువునకు విశ్రాంతి అవును. విశ్రాంతివలన ఆలసట జెందిన అవయవములు తిరిగి అము జెంది యధాప్రకారముగా పనిచేయుటకు దార్జ్యము కలవగును. ఎల్లప్పుడు యిట్టిగ్గరి ముకరిముగా మేపు పశువునకు గూడ విశ్రాంతి యవసరము. శరీరమెట్లు విశ్రాంతి గోరునో పశువు జీర్ణరోగముగూడ అట్లే విశ్రాంతి గోరును. బుడ్డు కిరాయికిలోలు రైతులు పశువునకు విరామవీర్యము కలుగ జేసేవీచి వానిని రాత్రింబవర్స చంపుదురు. ఇట్టిరైతులు చాలామాధులని చెప్ప వచ్చును.

దేహమును కుట్రముగానుంచుట

ఉష్ణదేశములయందు స్వేద మెక్కువగానుండును. శరీరదేశమునందు ఉష్ణదేహమునను మూత్రముగుండును విశ్రాంతివలన కల్మషములు ఉష్ణదేశములయందు శరీర స్వేదమునండి బయటకు పోవును. కల్మషములు శరీరముమీదను నిలిచియుండిన యెడల శరీరముయొక్క వ్యాపారము గట్టిపెట్టును. మనదేశములో రైతులు పశువుల దేహమును శుభ్రపరచటలేదు. శుభ్రపరచినచో మడిజేరును. ఈమడ్డి ముడులవలన గజి తామర పాడ నునీమిరి మున్నగువ్యాధులుపుట్టును. గోమరులు మున్నెల్లులు ఈమడ్డి నాక్రమించుకొనును. పాటుపడుపశువులను పాడిపశువులను శుభ్రముగా లోమి కడుగవలెను. అప్పుడప్పుడు గేదెల శరీరమునకు మంచియూనెనుగాని అమువయ్యుగాని వ్యాసులెనుగాని రాచి ప్నానము చేయించిన చాలా ఆశ్చర్యముగానుండి పాలు బాగుగానుండును.

మోలీసు చేయుట

మనదేశములో పశువును మోలీసు చేయుట యొకవిధముగా చికిత్సాపద్ధతిగ చిరకాలమునుండి యెంచబడుచున్నది. ఈ వైద్యసంబంధముగు పరిశ్రమలు అనాది నుండియు వచ్చుచున్నవి. జెనుకులు కీళ్ళనావులు నరములసంబంధములగు వెన్నెముక సందర్భములందు తిమరువాతము పశువును పడగొట్టి లేపిసరియవాతను ఈ చికిత్సాపద్ధతులుపయోగపడుచున్నవి.

పశువు శరీరమంతటనుగాని లేక శరీరముయొక్క యే ప్రత్యేకభాగముయొక్కగాని పోషణమును బలపరచుటయునై వ్యాధివలన శరీరముయొక్క యే ప్రత్యేకస్థలము

నందెనను వాపులను వాపులల ఫలితములను తొలగి చెడి కార్యక్రమములం దధిక్షోదక
తను గలిగించుటయ్యునై యున్నది. ఇదియేగాక ఇందుములమున స్నాయువుల
యొక్క ముడుచుకొనుభక్తి అనుభవము చేసినయెడల మూల స్వస్థత పరచబడును.

శరీరముపైను చేతితో మెల్లగాజుక్కిన రక్తప్రసారమునందు మోటునే మారుచు
గవింతుచున్నది. చేతివేట్లు చుక్క నుట్టె కొంతమొత్తమునో నొల్లపెట్టి మెల్లగా నడిపి
నచో రక్తనాళముల యందుండిన రక్తము మందులవలన మరల నాయొత్తిడిని తీసివేయ
గనే రక్తము తొందరగా వెనుకకు తిరిగి ప్రసారమగుచున్నది. చుక్కమును బొటనవ్రేలు
నడును చూపుదున్నట్లునగు మధ్య గట్టిగా బుట్టించి మెలివేసినయెడల రక్త ప్రసార
మధికమగుచున్నది. చేతితోగాని చేళ్ళతోగాని చూచియుండల రక్తప్రసారము యొక్క
చురుకుదన మధికమై ఆ స్థానము ఎరువు నుగాను పును.

చేతితో నానూభాగములమీద నుగుట వలన అంతరకాలాభిముండదు. ఈ
మానీసుచయుపరిలో స్పృహయగువాడు ఎచ్చటనాపువలయున్నదియు తాపటవలన తెలిసి
కొనగలడు. ఇందుదువ్రుట తోముట పినుగుట నొక్కట ఒత్తుట పిండుట చిద్రు వంద
రగా కొట్టుట ముదలగు పదాలు గలవు. ఈ పదతులన్నియు శరీరమర్దనను సంబంధించి
యేయున్నవి. అంతరా త్రయములయొక్క అల్లికపై పనిచేయవలెనన్న ఎక్కువ
బలము నుపయోగించుటనీ యుండును. నొప్పిట, ఒత్తుట, పినుగుట తోముట
మున్నగు పదాలు చాలా వుపయోగకరములైయున్నవి.

పశుశాల

గ్రీష్మ వృక్షాకులం వేశ్య శీత తస్తం వికర్దమం

వరాసు చాధశిశిరే సుఖోష్ణం వాతవర్జితం॥ “బ్రహ్మపురాణము”

గ్రీష్మమునుపుణ్య పశుశాల వృక్షములనోగుడియునునట్లును, శీతాకాలములో
వెచ్చగను బాడిగను, వర్షాకాలములో సుఖోష్ణముగను గాలితరులమగునట్లు పశుశాల
సేర్పాటు చేయవలెను.

తానాం మూత్రపురీషేతు నోన్యైః క్రియతే క్వచిత్

శోధనీయశ్చ గోవాటః శుష్కతూరాద్వికై స్పదా॥

గోమయుము, గోమూలమునుచూచు పశుశాలపడరాదు. గోవులపిండ్లు చోటు
బాగుగా పరిశీలించవలయును. పశుశాలను పశువైద్యముగా ఎరిగించవలెను. సున్న
ముకొట్టవలెను.

ఉచ్చిష్టం మూత్రవిత్ శ్లేష్మములం జహ్వన్న తత్ర చ

రజస్వలా సప్రవేశ్యా నాంత్యజాలి ర్న పుంశ్వలీ॥

పశుకాలలో ఎంగిలి, మలమూత్రములు, క్లేష్ణము, ముష్నగు అశుద్ధపస్తవుల సుంచరాదు. రజస్వలకస్యను, కడజాతివారడను, రంకటాండ్రను రానియరాదు.

నలంఘయే ద్వత్సతరీం నక్రేడే ద్దోష్ఠసన్నిధౌ
న గంతవ్యం గవాం మధ్యే సోపానత్క్రైస్సపాదుకైః॥

కాలలో లేగలవీడగా దాలుకాదు. వ్యభిచరించరాదు. చెప్పులు పావుకొట్లు వగైరా తోడుకొని పోరాదు.

హస్త్యశ్వరథయానైశ్చ సవితానైః కదాచన
దక్షిణోత్తరగైః ప్రహ్వైర్గంతవ్యంచ పదాతిభిః॥

ఏనుగు మొదలగు వాహనముల శిక్కు గోవుల మధ్యనుండి పోరాను. వడివైపున గాని ఎడమవైపున గాని అతి విషయుముగా కాలిపడకతో పోవలయును.

శాలాం ద్విపానాం వృషగోహయానాం, తాం యామ్యద్విగ్ధ్వర
వతీం విదధ్యాత్

సౌమ్యా కకుబ్ద్వరవతీం సుఖోభాం తేహంశమిచ్ఛన్ హితమాత్మనశ్చ॥

ఏనుగుల యొక్కయు వృషభములయొక్కయు గోవుల యొక్కయు గుఱ్ఱముల యొక్కయు కాలలో దక్షిణద్వారము లుండునట్లు చేయవలయును. అట్లు చేసిన పశు వులను తనకును మేలుకలుగును.

గావోవృషోవా హయహస్తినోర్వా అన్యేఽపినర్వే పశవోద్విజేంత్రాః
యామ్యాముఖేనై నతః చోత్తరాదిజ్యుఖాదినా తే ఖలు బంధనీయాః॥

గోవులనుగాని వృషభములనుగాని గుఱ్ఱములనుగాని ఏనుగులనుగాని మరీతు యితరపశువులైనను దక్షిణముఖముగానైనను, ఉత్తరముఖముగానైనను కట్టవలయును.

ఆగచ్ఛంతో గోష్ఠేవృద్ధైశ్చ వేశ్మ బంభారవేణ సంసేవతో


గోష్ఠవృద్ధైగవాంగాః ఆర్ద్రాంగ్యోవా హృష్టరోమీః ప్రకృష్టా

ధన్యా గావః స్వర్గహిష్యోఽపిచై వం॥

గోవులు అంబాయనుచు నింటివచ్చిన గోశాలవృద్ధియును. గోవులను సేవిం చుచువచ్చినను గోశాల వృద్ధియును. అడసిన ఆహారవస్తువులతోగాని, నిక్కబొడిచిన వెండ్రుకలతోగాని సంఠిసేచుచు వచ్చిన గోవులునుంచుట. ఈతరగ నే గోదెలుకూడ నుండును.

పశువులకాల — ఇతర నిర్మాణములు

మనము నివసించు గృహము లెంత పరిశుభ్రముగ నుండునో పశువులనుంచు కాలలు గూడ అంత పరిశుభ్రముగా నుండవలెను. పశువుల కాలలు అనాశోగ్యముగా నున్న యెడల అందుండు జంతువులకేగాక ఇండ్లలో కాపురముండు మనుష్యులకుగూడ అంత అనాశోగ్యము కలుగుట మనకందరమే తెలిసిన విషయమేగదా? కావున అట్టికాలలు లేమలేనివిగ భక్తిగా గాలివచ్చుచువిగ పశువుల మలమాత్రాదులు కడిగినేయుటకు విలుగలవిగ నుండవలెను. పశుకాలకు కొట్టమనియు, పశువు చావడియనియు పశువుల దొడ్డియనియు, మన దేశములో పేరుపెట్టుదురు. పశువులు అడవిలో నుండునపుడు వాటికి ఎండతగలమండ పెద్దచెట్లును, పచ్చియైనటు రేడవమండ కొండగుహలును, వలసినపుడెల్ల తగినంత మేతయును నీరుత్రాగుటకు నెలమేరులును విచారించుటకు విశాలమగు సలములు భగవంతుడు నిర్మించియున్నాడు.



పశువుల కొట్టము

అనాది సిద్ధమగు వేరే కొలమునందు సంయతము ఋషిసతీరములందు బెంచుదు చుండెడివి. మన ఉపరేఖాగ మునకే వాటిని తెచ్చుటతోడకే వాటిస్వేచ్ఛ పోయినది. మన దేశములో పశుకాలము నీర్చించుట కచ్చమైనవికొదు. అతి స్వల్పభీరీదుతో తాటి

యాకుల కప్పులలోను దూలములలోను నిర్మింపవచ్చును. ఇంకను మనము పశువులకు వేయుపాకగాని పెండ్లిచావడినిగాని మిగుల ఎత్తుగా నిర్మించరాదు. రైతులలో కొందరు తమసిరికి మించి చాలధనము వ్యయము చేసి పశువులకు పెండ్లి చావడులు కట్టించారు. ఈ చావడులు చాలాపుకాదితో కట్టబడునుగాని అందచందములు లేక మోటుగా నిర్మింపబడుతున్నవి. రాయలసీమలో పశువులకువేయుకాలలు చాల మోటుగానుండును. ఇంకను పూర్వపద్ధతులలోనే యున్నారని ప్రస్తుతకాల పరిస్థితులనుబట్టి కాలలను నిర్మించుటలేదు.

పశుకాల నిర్మాణమునకై పలురకముల రాళ్ళు మన్నము వెదుళ్ళు కలప మున్నగునవి రైతుయొక్క అస్తినిబట్టి నిర్మించవలెను. ఏసామగ్గి తక్కువ ఖరీదుగలిగి గట్టితనముగానుండునో విచారించి పశుకాలను నిర్మించవలెను. కొన్నికాలలు అనేకకతాబ్దములక్రిందట నిర్మించినను చెక్క-చెదరక యుండును. కనుక సామగ్గిని పడీక్షించి త్వరలో శిథిలముగావట్టియు త్వలో మరివ్వుతు కొరవటువంటియు సామగ్గినే ఉపయోగించుటమంచిది.

పశుకాలనివేళనస్థల లక్షణములు

నేలగులగానుండరాదు. వర్షపునీరు నిలువకాకుండ త్వరగాజారిపోవునట్లు ఏట వాలుగానుండవలెను. పోతనుట్టిగలపలములలో కాలను నిర్మించరాదు. చెమ్మగా నుండుపలములు మాగానిపొలములు మురికిపిటిపొలములు శ్మశానములు, పశుకాలనివేళ నమునకు దూరముగానుండవలెను. సాధారణముగాపైనుత్తముల ననుసరించి నివేళనముల నెంచుకొనుట కవకాశము కలుగదు. ఎక్కడపలము లభించిన ఆచ్చటనే కట్టవలసి వచ్చును. అట్టి సమయమునందు నివేళనము నెత్తుచియు నేలక్రింద తూములనుంచియు చెమ్మతగులునట్లు యేర్పాటు చేయవలెను. సహిరానితుప్పలు నరికించి క్రుక్క ఏరునిలు వకుండ గోతులనుకూర్చిని నివేళనమునకు శుభ్రపరచవలెను.

కాల నిర్మాణము

కాలలో రోగినంత వెలుతురు గాలి రానియెడల చెమ్మగానుండి అనారోగ్యము కలుగును. మట్టిలోనికొమ్మలనను పైకప్పులు కాగుటవలనను కాలకు సమీపమున నెట్లుండుటవలనను చెక్కచేయను. ఒటికలుచెమ్మ పీల్చును. చిన్నసందులందును పశు సమానముగల ఏర్పల దును వికాలమగు పు గాని పొలిగాని లేక సంపదితమగు పలమున కట్టబడిన కాలలో వెలుతురు గాలిచొచ్చుటకు ఓటలేక పోవుటచే చెమ్మ పొచ్చుగానుండును.

ప్రవాదులు సరి నుండకపోవుట వలన గాలివానలకు కూలి చాలా పశువులు మరణించుచున్నవి. ఎందువలన ప్రవాదులు గట్టిగ బలముగనుండవలెను. నేల గట్టి

కానప్పుడు కంక్రీటుచేసి పునాదులు కట్టుటమంచిది. ఇందువలన దుర్గంధములు చెమ్మ భూగర్భమునుండి కాలలోనికి చొరబడజాలవు. భూమి మట్టమునకు గచ్చుమట్టమునకు మధ్యగా పునాదుల వెడల్పునను నీటిని చొరగియుని వస్తువులతో కట్టవలెను.

గోడలను సాధారణముగా ఇటుకతోగాని, రాతితోగాని కట్టుదురు. ఇటుక సరియైన ఆకారమును సరాసరిగ ఒకటేమాదిరి రంగుగలిగి మ్రోగించినచో లోహపుధ్వని నీచ్చుచుండవలెను. ఇటుకలు గాలిచొరనిచ్చుటకు చెమ్మవీల్చుటకు చాలినంత గుల్లగా నుండవలెను. మందముచాలని గోడలుగల కాలలలో శీతాకాలము చలియు, వేసవి యందు వేడిమియు అధికముగానుండును. పెద్దతుపాను గాలులందైనను గోడలు చెమ్మను వీల్చుటకునట్టితగా కట్టవలెను.

సామాను గదులవగాక పశువులుండు ప్రతిగదికి కనీసము ఒక కిటికీయుండవలెను. నాలుగువైపులద్వారము లుండవలెను. వేసవికాలమందు రాత్రిబళ్ళు కిటికీలు తెరచి యుంచవలెను. శీతాకాలమునందు పక్షాకాలమునందు ఉత్తపు కిటికీలు తెరవరాదు. కాలలో వేపచెట్టుండుట మంచిది. రాత్రులందు లేలువులు మూయవలెను. పగలు మూయరాదు. కాలలో ఎక్కువపశువులుగల రైతు పశుచికిత్సకొరకు ఒక గదిని నిర్మించుటమంచిది. ప్రాథమిక పశుచికిత్సకొరకు కొన్ని పశువైద్యగ్రంథాలు తెప్పించి చూచుట మంచిది. కొన్నిమందులు పరికరములు యుండుట మంచిది.

పశువుల కొట్టము భూమిమట్టమునుంచి 10 అడుగుల ఎత్తుకక్కునగా నుండరాదు. ద్వారముపైవు 8 అడుగుల ఎత్తుండవలెను. మధ్యభాగము 12 అడుగుల ఎత్తుండవలెను. వాయుప్రదేశమునకు, వాయుచిరమనమునకు నుపయోగించునట్లు కిటికీలు కాలయొక్క వాయుప్రదేశము ననుసరించి తగినవై కాల్యము కలవై యుండును.

పెంతు కలప తాటియాకు గడ్డి మొదలగు వానితో ఇంటికప్పుల నేటవాలుగ కట్టుదురు. ఇంటికప్పు వర్షమును ఎండను ఆపుటయేగాక కొంతగాలినికూడ చొరనిచ్చుటకు వీలుగా నుండవలెను. తాటియాకు కప్పులలో ఎలుకలు పురుగులు వీట్లు పాములు చేరుటకు వీలుగనుండును. ఇంటికప్పుపై పడిన వర్షపునీరు పైకిపోవుటకు చూరుప్రక్కలను కాలువల నేర్పరచవలెను. ఇంటికప్పు దట్టముగనుండి వేడిమిని చొరగియుని పదార్థములతో నిర్మింపబడవలెను. ఇంటికప్పు ఎంత ఎత్తుగ నున్నదానినుండి లోనికి ప్రవేశించు వేడిమి అంతతక్కువగ నుండును.

పశువులు సుఖముగా నుండుటకు యంత్రము

56	56	3	7
6	3	63	62
65	60	8	1
4	5	61	64

ఈ అంకెలను కాగితముమీద వ్రాసి పశువు అంటిని పశుకాల రేఖాపుటకు అంటించవలెను.

పశుకాల విస్తీర్ణము

పశుకాలము నుమారు ఏడెనిమిది రెట్ట విస్తీర్ణముగల వికాలముగు సలము ముందు భాగమున నుండవలెను. దానిచుట్టు ఎత్తరక్కవగానుండు గోడలుండవలెను. పశుకాల చౌకముగానైనను గుండ్రముగానైనను నుండవచ్చును. పశుకాలను మూడుభాగములుగా విభజింపవలెను.

1 ఆవులు గేదెలు ప్రసవించుట

2 దూడలను తల్లులు లేనపుడు ఉండుట

3 దుక్కి-పెద్దలను పశువుల నుంచుట

ఈ మూడు భాగములు దక్షిణపువైపు తేరచియుంచవలెను. ఈ తరపు గోడకట్ట వలెను. అందు చిన్నచిన్న కిటికీలుంచవలెను. ఆకిటికీలు ధూమికి అయిదారడుగుల ఎత్తుండవలెను. కాల 16 అడుగుల వెడల్పుండవలెను. ఈ తరపు గోడనుంచి పశువులు నిలుచుండుటకు 10 అడుగుల సలముండవలెను. ఒకనీటితోటి యుండవలెను. మంచినీరు త్రాగు తోపై ఇటుకతోగాని¹ సిమెంటుతోగాని చేసియుంచవలెను. తోపైయొక్క లోతు 18 లేక 21 అంగుళముల వెడల్పును 12 లేక 15 అంగుళములలోతును ధూమి నుంచి 12 అంగుళముల నీటి మట్టమును యుండవలెను.

పశుకాల యొక్క ఏటవాలు ఈతరదక్షిణములుగా నుండవలెను. పశువుల యొక్క తలమొదలు వెనుకటి భాగము వరకు ఏటవాలుగనుండవలెను. ఆ ఏటవాలు 30 అంగుళములు కాటియుండరాదు. అట్లున్నయెడల మాత్రమును అతిసులభముగా బైటపొగొట్టగలదు. ఈ తరపుగోడవైపు ఖాళీచేయవలెను. ఎందుచేతనన మేతవేయుటకుగాని సామానులు తీసికొని పోవుటకుగాని ఖాళీయుండవలెను. వెలుపలిభాగమున 8 అడుగుల పొడవు 4 అడుగుల వెడల్పు 2 అడుగులలోతు గొయ్యి యుండినయెడల మలమాత్రములన్నియు అందులోనికి వచ్చును. దక్షిణపువైపు పైకప్పు స్తంభములచేతగాని యిటుకచేతగాని కలపచేతగాని అమర్చబడియుండవలెను. ప్రతిస్తంభము యిటుకతోకట్టి యుండవలెను. ద్వారము 6 అడుగుల వెడల్పు 6 అడుగుల పొడవుగనుండవలెను. దూడలుగాని ఆవులుగాని గేదెలు ఈనుగడులు డ్రైటింగ్ చేయుండవలెను. దూడలనీరు త్రాగుటకు 6 లేక 9 అంగుళములవరకు లోతుగలిగినతోపైయుంచవలెను. మొత్తముమీద 17 అడుగుల కంటె తోపైఎత్తుండరాదు.

పశుకాల నేల స్వభావము

నేల గట్టిగను లేమవీల్చుకట్టిదిగనుయుండవలెను. నేల గట్టిగాలేనిచో పశు కాలకు అపాయము వచ్చును. నేలమట్టము ఎత్తుగానుండు చోట నే పశుకాల నిర్మింప

వలెను. కొట్టపునేలలేమను గ్రహింపనిచో కొట్టమెల్లప్పుడు లేమగానుండి వ్యాధిని జనింపజేయు నూత్నజీవుల కాస్పదమగును. మరియు కొట్టపు ప్రాంతములందు చెట్లతో నిండియుండునట్టి ఉపవనములుగల నేలయుండుట మంచిది. ఈ నేలకు సమీపమున యర్రకాలలు మురుగుకాలువలు దుర్గంధము వెదజల్లు శ్మశానవాటికలు అవినీతికరము లగు కసాయిదుకాణములు మొదలగునవి యుండరాదు. అట్టిపరిసరములుగలవి నివాస యోగ్యములు కావు. పశువుల మలమూత్రాదులు జారుటకును ఆవృణపృథు కడుగు టకు వీలగునట్లుగను కొట్టములోనుండు స్థలము ఏటవాలుగా నుండవలెను. ఆ నేల మిగులగట్టిగా నుండవలెను. లేనిచో, పశువుల త్రొక్కుడువలన గుంటలుపడెను. ఆ గుంటలలో మలమూత్రాదులుపడి సహింపరాని దుర్వాసన కలుగజేయును. ఇటుక ముక్కలు సున్నమువేసి నెమ్మదిగా దిమ్మెనకొట్టిక చాలును. పశువుల కాళ్లవైపున నుండు భూమి ఏటవాలుగనుండి మధ్య కాలువగ నేర్పరచవలెను. ఆ కాలువ రాకు మూడు అడుగుల పొడవు ఒక అడుగు వెడల్పుగలిగి ఇటుక సున్నముతో కట్టబడి యుండవలెను. పశువులు విడచి మలమూత్రాదులు ఆ కాలువలో జేరుటచే ఆస్థలము పొడిగను ఆరోగ్యముగను యుండును. ఇంకను నేలను శుభ్రపరచుటకు పగిలిపోయిన ఇటుక పెంతు సున్నము మున్నగువానిచే నిర్మించి వానిపైన మొదటికకపు ఇటుకలచే అండుకట్టి సమ్మెంటుచే చదునుపరచవలెను. అట్టివి చిరకాలముండును ఆ నేల 1½ లేక 2 అడుగులు మామూలు నేలకన్న ఎత్తుండవలెను. ప్రతిసంవత్సరము నేలమీద నున్న మట్టితీసి కొత్తమట్టి పోయవలెను. లేనిచో గ్లోమారుపట్టును.

కాలను శుభ్రముగా నుంచుట

పశువులమందను విస్తారముగా కాలలో నుంచరాను. వాటికి నిశ్చయమైన గడు లుండవలెను. అవి నిలుచుండుటకు పశుశాసనములను స్థలముండవలెను. కొన్ని పెద్ద పశువులైనచో 60 అంగుళములస్థల ముండవలెను. ఒక్క పశుచేయున్నయెడల 10 అంగుళముల పొడవు 8 అంగుళముల వెడల్పుండవలెను. అట్లుండిన కుడల గాని యివ్వమువచ్చినటుల తిరుగగలదు. పశుశాలను ప్రతిదినము ఉదయ సాయంకాలములందు శుభ్రము చేయుచుండవలెను. ప్రతిదినము మలమూత్రాదుల తీసివేయవలెను. పిక్నెలోనికాని సున్నపునీళ్లుగాని జల్లుచుండవలెను. భూమిమీద ఇసుక కంకి మున్నగునవి పోయుటవలన నేల బాగుగానుండును. పశుశాలను తుడుచుట కడుగుట ముచ్చగు పనులు పశువులను పాలములలోనికి తోలిగాని బయటకట్టినేసిగాని చుక్కదాడిలోనికి తోలిగాని దొడ్డిని శుభ్రముచేయవలెను.

కాలముల ననుసరించి పశుపోషణ

శీతకాలము

ఈ కాలము ఆక్టోబరు 15 వ తేదీ మొదలు మార్చి 1 వ తేదీవరకుండును. ఈ కాలమందు పశువులకు ఎక్కువ ఆహారము వేడిమిగలగాలి అత్యవసరము. రాత్రులందు వానికి కంబలులుగాని, వానికికప్పుటకు ప్రత్యేకముగా తయారుచేసినవిగాని ఉపయోగింపవలెను. వానిని పగలు 12 గంటలు మొదలు 2 గంటలవరకు బయటకుంట చాలా మంచిది. ఈ కాలములో పాడిపశువులకు పాలసేగ్గు నాలుకసేగ్గు అనువ్యాధి తరచుగా సోకుచుండును. మలబద్దకము లేకుండ చూచుచుండవలెను. దూడలకు పాలు ఎక్కువ తక్కువలు త్రాగుటవలనను తల్లిపాలు చిక్కగనుండుట వలనను రోగములు కలుగుచుండును. మిక్కిలి మలబద్దకముగానుండు దూడలకు ఎనినూచేయుట మంచిది. ఈ కాలములో చలిగాలి వర్షములకు బాధపడకుండ చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుచుండవలెను. పాడిపశువులు ఈ కాలములో చలిగాలివలన తక్కువపాలు యిచ్చుచుండును. పచ్చిగడ్డి ఎరుగగడ్డి బలముగలిగియున్న మొదలు వస్తువులు వలయునంత పెట్టుచుండవలెను. పెట్టెబరు నెలాఖరునుంచి మార్చి నెలాఖరు వరకు జనుముగడ్డి నిలువచేసియుంచవలెను. ఈరీతిగా చేసిన మొదల పశువులు ఆరోగ్యముగా నుండును. లేనియెడల రోగములచే వీడింపబడుచుండును. ఆక్టోబరు మొదలు మార్చివరకు ధాన్యము స్వల్ప ఖరీదునకు దొరకును. ఆ కాలమందు వానిని నిలువజేసి సంవత్సరమంతయు ఉపయోగించవచ్చును. ఫిబ్రవరి నెలలో గోధుమపొట్టు తల్లకు చిట్ట నులభముగా మనకు లభించును.

వేసవికాలము

మార్చి 1 వ తేదీనుండి జూన్ 15 వ తేదీవరకు వేసవి జూలై 1 వ తేదీవరకు యుండును. ఈ కాలమందు పశువులు విస్తారముగా ఆహారము కొరకు నీటికొరకు నిరీక్షించుచుండును. గరిగా మేవని యెడల చనిపోవును. శీతకాలముకంటె ఈ కాలములో జాగ్రత్తగా మేపుచుండవలెను. మధ్యాహ్న వేళలకు పశువులను బయటకు రానియరారు. ఎండ దెబ్బతగులును. రాత్రులందు బయటకు ఉంచవలెను. ఈ కాలములో పచ్చిగడ్డిదొరకదు. అందుచేత పాతగజేసిన పచ్చిజొన్నచొప్ప, దాణాదీనులు, జనుము, తదితర పొట్టుధాన్యములు మున్నగునవి రాత్రింబవళ్లు పెట్టవలెను. ఇంకను ఈ కాలములో పచ్చిఆకులు కాయలుకూడ మంచిఆహారముగ నుపయోగించవచ్చును.

వర్షాకాలము

జూన్ 15 వ తేదీనుంచిగాని జూలై 1 వ తేదీనుంచిగాని వర్షాకాలము ప్రారంభింపబడి ఆక్టోబరు 15 వ తేదీతో అంతిమగును. ఈ కాలముందు పచ్చిగడ్డి విస్తారముగా దొరకును. జంతువులను బయటకుంచరారు. వర్షములకు తక్కువయక జాగ్రత్తగా కాపాడవలెను. నాకర్ర పశువులదగ్గర నెలవేళలనుండి వానిని కాపాడవలెను. పశుకాలలను శుభ్రముగానుంచవలెను. లేనిచో పలువిధరోగములవలగును. పశువులను బురద చెమ్మ లేని స్థలములందు కట్టవలెను.

పశుగ్రాసము

నా లు గ వ భా గ ము

“వలియ వలియో వలియ రావేలు గలవాడా? రార పొలిగాడ!

రావేలు నీదయ్యా! రాశి మాదయ్యా!
నూజేలు నీవయ్యా! నూగు మాదయ్యా!
వేవేలు నీవయ్యా! వెన్ను మాదయ్యా!
కోటేలు నీవయ్యా! కొండ మాదయ్యా! ॥వ॥

ఎద్దులు నూర్వంగా మిద్దె రాసూలు
కోడెలు నూర్వంగా కొండ రాసూలు
ఆవులూ నూర్వంగా అడ్డ రాసూలు
దున్నలు నూర్వంగా దిన్నె రాసూలు. ॥వ॥

తూరుపూ ఒకవానా తుమ్మెదల మ్రోత
పడమటా ఒకవానా బెజుల మ్రోత
ఉత్తరా నొకవానా ఉటుమూల మ్రోత
దక్షిణా నొకవానా తాళాల మ్రోత. ॥వ॥

మంగళగిరి లాగూ పొంగెరా రా?
సింహాచలము లాగూ సిగదేలె రాశి
కోటయ్య కొండల్లా కొనదేలె రాశి
బొప్పుడి కొండల్లా పొడుగయ్యె రాశి. ॥వ॥

దాగెరా పొలిగాడూ తలకాడి క్రింద
తొంగెరా పొలిగాడూ తొలికట్ట క్రింద
వచ్చెరా పొలిగాడూ నరగాణి దాటి
పోయెరా పొలిగాడూ పొలిమేర టాది. ॥వ॥

గీ. అనుచు బాలినాగి బంతుల నవలద్రోలి
కంకులందుల్ని దంతెల గలయదున్ని
పొల్లు పొలకట్టు పొలికట్టె వల్లనుసిమి
రాశి కళ్ళములో బ్రోవుచేసి రంత. ||వ||

“రైతు హరికథ”



పూర్వము ప్రసిద్ధి జెందియుండిన గ్రామము లనేకములు ఇప్పుడు పాడు పడిన గ్రామములుగనే పరిణమించుచున్నవి. ఈ కారణముచేతనే వ్యవసాయము చేయువారల సంఖ్య తగ్గుచున్నది. గ్రామములో నన్న రైతులకా! ఐకమత్యము లేదు. పశుసంతతి నుద్ధరించుటయూ నున్న. పల్లెలు చేరు లేకుండ పాడుగుట దుష్ప్రక్రమించుటచే పశువులకు మేత చిక్కకపోవు కారణముచేత ననేకులు వానిని కసాయివారలకు విక్రయించు చున్నారు. ఈ కారణముచేత దినట కాహార పదార్థములు తక్కువగా నున్నవి. దొరికినను వాటివెలులు పూర్వముకంటె మితిమీరియున్నవి. పాలు, పెరుగు, వెన్న మున్నగు వానిని గురించి చెప్పు పనియే లేదు. చీడవారలు జీవించుటే కష్టముగానున్నది. మన దేశములో పశువులు ఇదివరకంటె చాల చిన్నవి గను దుర్బలముగను కృశించునవిగను నగుచున్నవి. ఈ పశువులు పూర్వపు పశువులంత పని చేయజాలవన్నవి.

పశుజాతుల అభివృద్ధికై పశువులు బలముగలిగి శక్తితో పనిచేయుటకు ముఖ్యముగ మేతవిషయమై శ్రద్ధవహించవలెను. బలకరముగు త్రొత్తత్రొత్త రకముల గడ్డిని పెంచవలెను. ఎండుగడ్డినే కాకుండ బలకరముగు పచ్చిగడ్డిని సయితము నిలువయుంచు పద్ధతులను కనిపెట్టి గడ్డి కఱువగు వేసవి దిశములందు ఉపయోగించవలెను. నేను

వట్టిగొడ్డును అరువులెక్కువ; వానలేని మబ్బును ఉరుములెక్కువ

ఇండియా గవర్నమెంటువారి ఇంపీరియల్ ఎగ్రికల్చరల్ రీసర్చ్ లైవ్ స్టాక్ కమిటీ మీటింగునకు ఢిల్లీ వెళ్ళినపుడు, కఱపు దినములలో మేత నిలువయుండు విషయమై చాలా పరిశోధనలు జరిగినటుల మీటింగులో తెలుపబడెను. మాలెండు దేశమున పశువుల విషయమై చాలా శ్రద్ధ వహించుచున్నారు. వంద ఎకరములుగల ఖండములను పశువుల మేతకై వదలిపెట్టుచున్నారు. ఈ రీతిగనే మన దేశములో గూడ నాచరణలో పెట్టినపుడే మన పశువులు బాగుపడజాలవు.

డిశంబరు నుంచి జూలై నెలవరకు మన దేశమునం దన్ని ప్రాంతములందును మేత బాగుగా దొరకును. పైరులను వచ్చిగడ్డిని నిలువజేయుటకు తగిన సదుపాయములు జేయవలెను. పైరులను పచ్చిగడ్డిని వృధాగా పోషియక వృష్టముగా వాడుకొనవలెను. పచ్చిగడ్డిని తీసివేయబడిన గుంటలయందు నిలువజేయు పద్ధతులను నేర్చుకొనవలెను. ప్రత్తిగింజలు మొదలగు ధాన్యములు తదితరములగు చిట్టు, తవుడు మొదలగు బలకర పదార్థములును తరచుగ తగినంత ఉప్పుతో చేర్చి పెట్టవలెను. గడ్డి కోయకులసిన కాలము మించకుండ కోసి నిలువజేయుటవలన లాభము రాగలదు. సాధారణముగ మన పల్లెగ్రామాదులలో పశువులమేపు పద్ధతియందు చాలగడ్డి పాడగుచున్నది. దంటుగల జొన్న మొదలగు పైరులను ముక్కలు ముక్కలుగ నరికి పశువులకు వేసినచో గడ్డి అంతగా నష్టము కాజాలదు. ఇట్లు పారుపోయిన గడ్డిని పేడతో కలిపి ఎరువుగ నుపయోగ పడుచున్నను గడ్డి చాలని పరిస్థితులయందు ఇట్లు గడ్డిని వృధాచేయుట పొూబాటు.

మద్రాసు రాజధానిలోని పశుగ్రాసము

సాధారణముగా ప్రతిజిల్లాలోను ఆచటపెరిగినపైరు సరిపోవుటయో లేక ప్రక్క జిల్లానుంచి తెచ్చుకొనుటయో జరుగును. గంజాంజిల్లానుంచి నెల్లూరుజిల్లావరకు సామాన్యముగా గడ్డివాములు నాలుగు లేక అయిదు సంవత్సరములవరకు నిలువయుండుటగలదు. నల్లరేగడి భూములయిన గుంటూరు కందుకూరు ప్రాంతములలో రెండు లేక మూడు సంవత్సరములవరకు నిలువయుండు జొన్న చొప్పు వాములుండుటయు గలదు. కాని మద్రాసు రాజధానిలో వసతులన్నియుగలవు. అనగా వర్షము తీతోపష్టితి, పశుగ్రాసము నీటివసతి గలవు. వ్యవసాయముచేయురైతులు తమ పశువులను తగినంతశ్రద్ధగా చూడరు. వారిపశువులు వేసనికాలములో పైరులుకోసివేరవార ఆ చేలలో మేపుదురు. తోటలు పొలములు గున్నగుక్కి పశువులకుమాత్రము మంచిమేతపెట్టుదురు. కొస్తానుమారముగానుండుజిల్లాలో వర్షము పంటలుపోవును. దత్తమండలములో పెట్టభూములు దున్నుటకు ఎక్కువశువు అవునరములేదు. ఒక జతపెద్దులున్న ఆసామి 30 లేక 40 ఎకరములవ్యవసాయము సాగుచేయగలడు. మొన్న మొన్నటివరకు నూతుల క్రింద వ్యవసాయమువలననే కొంతవరకు పరిపైరుగుచున్నది. అందుచేత ఎందుగడ్డికి

కరవులేదు. ఆమాదిరిగ నె కోయంబత్తూరు, నేలం, ఉత్తరార్కాడు తిరునవాల్లి జిల్లాలలో నూత్రికైంద్రవ్యవసాయమే ఎక్కువగానున్నది. కొన్నిచోట్ల జొన్నపైరుకూడ నేద్య మగుచున్నది.

సాంప్యన్ దొరగారు 1916 లో రామనాడు, మధుర, తిరునల్వేలు జిల్లాలలో పశువులకు మేతతక్కువయ్యే సరి తెలిపెను. ప్రత్తిధర పెరుగుటవలన వరినాటక ప్రత్తినే వేసి ఆమ్ముకొనిరి. అందుచేత ఆసంవత్సరము మేతలేకపోయెను. అందుచేత వరిగడ్డికొన వలసివచ్చెనట. ప్రత్తిపంట చాలాలాభకరమని దక్షిణజిల్లాలలోనిరైతులు అపంటను వేయమొనరిదిరి. వరిచేసేట ఖర్చుపెట్టవలసినంత మొత్తమును ప్రత్తిపంటప ఖర్చుపెట్ట వలెను. చడమటితరమయొక్కపైరు వేసవికాలము రాకమునుచే తనూరగును. మల బారులోగూడ పంటచాలాకెక్కువ. అప్పుడప్పుడు సగముగడ్డి పొలముమీదనే విడిచి పెట్టబడును. కొండలమీద మాన్యునువాయువులకు వచ్చున్నముచే గడ్డిపెరుగును. దానిని కొందరు పశువులకు మేపుదురు. కాని దీనిని చాలామందిమేపరు. మలబారు దక్షిణ కన్నడముకన్న చాలాకెక్కువ. ఎందుచేతనన కన్నడములో భూమి తడిగానున్న వుడే దున్నదురు. దేశములోవ్యవసాయము చాలాఅభివృద్ధిలో నున్నది. అందువలన ప్రతిరైతు తనపశువులకు తనసొంతమేతపైనే ఆధారపడి ముండవలెను. తోటమాలికి ఎరవుఅత్యవసరము. అందుచేత అతను చాలాపశువులను పెంచవలయును. ఇంతియే గాక బాగుగామేపబడిన పశువులు ఎక్కువ ఖరీదులోమండును. ఈపద్ధతి కోయంబత్తూరు సంతలలోచూడగలము.

పాటుపడుపశువులను మేతప్రాంతములకు తోలుకొనిపోయి ఆచ్చట ఖరీదునకు ఆమ్ముదురు. ఈపద్ధతిప్రస్తుతము విశాఖపట్నంజిల్లాలో నున్నది. మిగిలిన పశువులను వానిసొంతరైతులేమేపుకొనుపద్ధతి దత్తమండలములలో నున్నది. ఉత్తరస్కారలలోను విశాఖపట్నపుతీరప్రదేశములలోను గంజాంజిల్లాలోని చిక్కాకోల్ తాలూకాలోను పశువులకు క్రమశిక్షణపద్ధతి కొంతకాలముక్రిందట జరిగినది. పైనదహరించిన ప్రాంత మందంతయు పశువులమేత బాగుగానుండెడిది. ఉభయకోదావరి, కృష్ణ, గుంటూరు జిల్లాలనుంచి చిన్నకోడెలను ఈ ప్రాంతమునకు తీసికొనివచ్చి గ్రామాదులలోగాని పట్టణపు సంతలలోగాని విక్రయించెవారు. ఈకోడెలను బాగుగామేపు రైతులుకొనెడి వారు. ఆరంభములో ఈకోడెలతో తేలికగా భూములనుదున్నెడివారు. వచ్చిన సంవత్సరములోనే బలమగు ఆవరణములని బాగుగాబలిసి పుండెడివి. ఇట్టి బలముగల పశువులను డెల్టాలోనుండు ధనమగలరైతులు ఎక్కువమొ పైటి కొని తీసికొనివెళ్లుదురు. విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఈపద్ధతి ఎక్కువగానుండును.

దత్తమండలములోని నల్లకొండభూములు పచ్చికేతన ప్రసిద్ధికెక్కినవి. ఒకటి రెండు సంవత్సరములు వయస్సుగలకోడెలు నెల్లూరు దేరగాండ్రుకొని ప్రత్తిపంట

భూములలోనుండు రైతులకు అమ్ముదురు. కాని దత్తమండలములో పశుశిక్షణ చాలా తక్కువ. పడమట బల్లారిజిల్లాలో మైసూరుకోడెలను ఎక్కువగా కొందురు. పుంగ నూరు ఉత్తరనేలము ప్రాంతములందు పచ్చిమేత ఎక్కువగా నుండును.

కోయంబత్తూరు జిల్లాలో తోటెయిన్ జాతివారు పశువులకొపరులుగా నుందురు. ఆజాతివారు పశువులను కొంతకాలము పనిచేయించుకొని తరువాత అమ్ముదురు. వారు పశువులకు పచ్చిమేతమేసి పొలముదున్ని తరువాత ఎండుగడ్డిని మేపుదురు. ఇక రెండు మాసములకు ముందుగా అమ్ముదునగా నూనెపిండులనుగాని ప్రత్తిగింజలనుగాని బాగుగా మేపుదురు. దక్షిణ తిరుచనాపల్లిలోను, ఉత్తర మధ్యప్రాంతములోను పశువులను మేపుట చాలాతక్కువ. దక్షిణ కోయంబత్తూరు తిరుచనాపల్లి జిల్లా కారూరు తాలూకాలోను మంచిరకము కోడెలను తెప్పించిమేపుదురు. దక్షిణమలబారులో బీద పశువులుండును. కొందరు మలబారు వర్తకులు ధర్మపురిసంతలో చిన్నదూడలనుకొని మలబారుకొచ్చి తిరువాన్కూరు జిల్లాలలోనుండు తాలూకాలలోని రైతులకమ్మెదరు. అవి మాన్యునుగాలుల వలన పెరుగుగడ్డిని ఎర్నాకాలములో తినును. వేసవికాలములో ఎండుగడ్డితినును.

ఒంగోలు పశువుల మేత

నెల్లూరుజిల్లా దక్షిణ భాగములో మెట్టపంటలుపండును. అందుచేత పశువుల సంత జాగ్రత్తగా నుంచరు. ఈ జిల్లాలో పచ్చిమేతయొక్క విస్తీర్ణమునుబట్టి రైతులు పశువులను మేపుటయునుగలను. పల్లపుభూములనగా వరిపండించు భూములలో కొంత మెట్టభూమిలనగా అచ్చటచ్చట దిబ్బలుండు ప్రదేశములందుగూడ పశువులమేతకై ప్రత్యేకముగా విడిచిపెట్టబడును. జూలై నుంచి అక్టోబరు వరకు పశువులు గ్రామముల వెలుపల బాగుగా మేయవచ్చును. దక్షిణభాగమున వర్షాకాలమగుటవలన అచ్చటి పశువులను పడమటి అడవిప్రదేశములకు మేతకై తోలబడును. గ్రామాదులలో మేత చాల నక్కడు పనిచేయు పశువులు నవంబరునుంచి డిశంబరువరకు ఆపశువులు మేతకై వెంబడించును. రైతులందరు ఒకచోట గుమిగూడి వారిపశువుల సన్నిధిని కలిసి మందలుగా తోలుదురు. ఈకార్యమాన్యును వాయువులు బాగుగా వీచి వర్షములు కురిసిన పశువులు జనవరి మేతకై యుంచబడును. తరువాత వరికోత కాలములో మంచిపచ్చిమేత దొరకును.

గుంటూరుజిల్లాలోని నేలలలో నున్నము ఎక్కువగా నుండుటవలన మేత తియ్యగా నుండును. ఒంగోలు తాలూకాలో పట్టణములలో ఆరవ పంతుభాగము పశువుల మేతకై ప్రత్యేకింపబడును. ఆసారవంతపు భూమికి పచ్చికముగట్ట నివృత్తిలో చాలావృత్త్యాసముగలదు. ఒంగూరు భూములలో పెరు పచ్చిమేత మంచిదిగా నుండును. పచ్చిమేత పెరుగుటకు మేవిధమున కృషియు చేయ నగు పరములేదు. పొలము దున్నగనే

వర్షములుకురిసి చాల చిక్కనిమేత లభించును. ఈ గడ్డి మూడురకములుగా నుండును. చెంగలిగడ్డి, గొహగడ్డి, ననమలగడ్డి అని మూడురకములు. చెంగలిగడ్డి ఉత్తర సర్కారులంతయు వ్యాపించియున్నది. ఈ గడ్డి మంచిబలముగలదిగ నుండును. ననమలగడ్డి చెంగలిగడ్డి తినిన తరువాత నుపయోగపడును. రైతులు పచ్చికబయళ్లలోని మేతను అదనముగా కొనికొని పచ్చి యింటివద్దనుండు పాడిపశువులకు మేపుదురు. ఈ పద్ధతి ఉత్తరసర్కారులలోనేగాక ఒండు భూమిప్రదేశములందు గూడగలదు. ఒండు రేగడి భూములలో జొన్న ముఖ్యమైన ఆహారము. ఒండుభూముల గ్రామములలో కొడెలను ఇంటిదగ్గరనేయుంచి బాగుగామేపుదురు. అందువలన వాటికి తగిన వ్యాయామములేక కాళ్ళుగుడులుపట్టియుండును. ఎల్లప్పుడు తిరుగు పశువులు సకాలములో బలిసేయన్న రాకపోయినప్పటికి అవి యిండ్లలోనుండి మేపబడు పశువుల కంటే ఎక్కువ చాచవశ్యముగా నుండును.

పశువులకు కాయధాన్యములమీద వచ్చుపొట్టుగాక బియ్యపుకుడితికూడ పెట్టుదురు. పచ్చికబయళ్లకుట్టు కంపలేమియు నుండకపోవుటవలన పశువులను సాయంకాలమునకు యింటికి తోలుకొని రావలయును. పొలములుదున్న కాలములో వాటిని పొలములలో పందిళ్ళువేసి కట్టినేయుదురు. తదితర కాలములలో ప్రత్యేకపశుకాల లుండును. ఈ ప్రాంతములందు సల్లరేగడి భూములగుటవలన జొన్న బాగుగా పెరుగును. జొన్న తినుటవలననే ఒంగోలుజాతి మిగులబల్లిష్టముగానుండును. ఇంతియేగాక ఆధూములలో నున్నముండుటవలన జొన్నయెక్కువ బలముకలుగజేయును. కిత్తోవ్వనీతి వర పాతముమీదగూడ పశువుల బలుపు ఆధారపడియుండును. పల్నాడు సల్లముల కొండల ఎరుపు నేలలమీద పెరుగు పచ్చిగడ్డి తినిన పశువులు సల్లరేగడ భూములలోని పశువుల కంటే ఎక్కువగా మేపబడవు. ఈ రెండుజిల్లాలకు మాన్యును వాయువులు వీచును. సరాసరివర్షము 29.5 అంగుళము లుండును. వరిధాన్యము నూనెగింజలు ప్రత్తికాయ ధాన్యములు మొదలగునవి పెరుగును. అదియునుగాక పోరంబోక సలములమీద పచ్చిక బయళ్లమీద మంచిగడ్డి పెరుగును. పై నుదహరించిన ఆహారములన్నియు పశువులకు మేసిన బాగుగా బలియును. పూర్వము ఈపంటలన్నియు పండెడివి. ఆ పంటలను పశువులకు పెట్టుటవలన మంచిబలముగలిగి మంచిజాతి వృద్ధియగుచుండెడిది. కాని ప్రస్తుతకాలమున ఆ పంటలన్నియు తగ్గిపోయి ఆ సలములలో పసుపు, వేరుశనగ, మిరప, పొగాకు మొదలగు మెట్టపెరుల పండించుటవలన ప్రస్తుతపు పశువులకు ఆ బలమును మేత లేకపోవుటవలన బహు నీరసముగా నుండుచున్నవి.

రైతులు కాయధాన్యములకన్న వరిధాన్యములందే ఎక్కువశ్రద్ధ చూపి కాయల సిన ధాన్యమును ఎంతగడ్డిని పండించుకొనుచున్నారు. ఒంగోలు తాలూకాలో పచ్చిక బయళ్లు నడుల ఒడ్డులును పోరంబోకలునున్నై యున్నవి. పూర్వపు దినములలో 50 ఎకరములగుల రైతు భూమిని సాగుచేయుటకు ఈశ్రీంధి రీతిగా పైరు వేసెడివారు

- 12 ఎకరములున్న ఉలవ
 5 ఎకరములున్న కొర్రలు సజ్జలు ఉలవ
 15 ఎకరములున్న వరిగెలు పైరుజొన్న
 5 ఎకరములు పైరుజొన్న
 2 ఎకరములు గోధుమలు
 11 ఎకరములు పచ్చిమేత

మొత్తం 50 ఎకరములు. పై నుదహరించిన 50 ఎకరముల రైతునకు ఈక్రింది విధముగా పశువులుండును.

రెండు జతల ఎద్దులు
 రెండు లేక మూడు గేదెలు
 మూడు చూడలు

మంచి ధరలుగల రోజులలో సజ్జలు ఉలవలు ఖరీదుక కమ్ముబడును. వీటి యొక్క మేతయంతయు రైతు తనపశువులకు మేపుకొనును.

ప్రస్తుతకాలపు 50 ఎకరముల సాగు ఈతీగా నున్నది.

- 6 ఎకరములు జొన్న
 4 ఎకరములు కొర్రలు సజ్జలు
 4 ఎకరములు పిల్లిపెసర
 15 ఎకరములు వరిగెలు పైరుజొన్న
 5 ఎకరములు పైరుజొన్న
 2 ఎకరములు గోధుమలు
 10 ఎకరములు పుగాకు పచ్చిమిర్చి వేరుశనగ కొత్తిమిరి
 5 ఎకరములు పచ్చిమేత

వీటన్నిటిలోను 10 ఎకరముల పంట అమ్మిన 5 ఎకరముల పచ్చిమేత తగ్గి పోవును. 6 ఎకరములు అవారపంటలు. ఇద తయు చూడగా నూటికి 5 వంతుల భూమి పచ్చిమేతకై విదలివేయుదురు. ఆ ప్రదేశములోని పశువుకు చూచి మంచిదో చెడ్డదో రైతు చెప్పుగలడు. అందుచేతనే 20 సంవత్సరములకు యిప్పటికి ఎంత వ్యత్యాసమున్నదో గ్రహించండి.

ఏడు కురవలుచూచి ఎద్దుకు కొనవచ్చునాడు

అ ర ణ్య పు మే త

సాధారణముగా గ్రామములదగ్గరగానుండు అడవులను గ్రామరైతులలో నెవ రొకరుకొందురు. అగ్రామరైతులు కొంతభవనమును ఆరైతునకు పచ్చిమేతకొరవయిచ్చి తమపశువులను మేపుకొందురు. కరవువచ్చినపుడు మాత్రము అడవులు యేనిబంధనలలోను యుండవు. అప్పుడు గ్రామరైతులందరు తమ పశువులను ఉచితముగా మేపుకొనెదరు. అడవిమేత మూడుభాగములుగా విభజింపబడును.

- (1) పశువులు ఎల్లప్పుడు అడవులలోనుండి మేయును. ఈరీతిగా తూర్పుకొలిగిల్లు, పడమట ధర్మపురి, హోనూరు ప్రాంతములందు జరుగును.
- (2) అడవులకు చుట్టుప్రక్కల గ్రామాదులలోనుండు పశువులు ప్రతిదినము పగలుమేసి సాయంకాలమునకు యింటికివచ్చును. ఆయారైతులకు అడవులలో పాఠములున్న యెడల ఎరువునకై రాగ్రులందుంచుదురు.
- (3) గ్రామాదులకు అరణ్యములు చాలాదూరముగా నున్నపుటికి వ్యవసాయదినములలో మేతకొరకు అరణ్యములకు వచ్చుపశువులుండును.

ఎల్లప్పుడు అరణ్యములలోనుండు పశువులు

కోలిగల్, ఉత్తరభవాని, ధర్మపురి, హోనూరు మొదలగు అడవులలో పచ్చిమేత ఎక్కువగానుండును. అడవులలో మేయుపశువులు ముఖ్యముగా ఆవులు వానిదూడలు. ఆవులతో అబోతులుకూడయుండును. కోడెలనుమాత్రము పెద్దవికాగానే సంతలకు తీసికొనిపోయి అమ్ముదురు. అటువంటి పెద్దసంతలు మహాదేశ్వరమూలై, జెట్టిసముద్రము, మచిలీమట్నగు ప్రదేశములై యున్నవి. ఇంకను రైతులు ఉత్తరకొలయంబత్తూరు, ఉత్తర సేలం, పడమటి చిత్తూరు, మైసూరు రాజ్యమునానుకొనియుండు అడవులలోను కోడెలను మేపుదురు. కోడెలను జాగుగామేపి మలబారు పడమట మరియు ఉత్తరకొలయం బత్తూరు, చిత్తూరు ఉత్తరము మరియు తూర్పుఆర్కాటు ప్రదేశములలో అమ్ముదురు. ఇంకను వానిని తంకావూరు తిరుచనాపల్లి మధుర తిరువల్వేలి మొదలగు ప్రదేశములకు తీసికొనిపోవుదురు. ఇచ్చట ఆవులు ఆసౌఖ్యముగనుండును. ఎల్లప్పుడు ఎండలలోను వానలలోను నిలబడి మేయుచుండును.

అడవులకు చుట్టుప్రక్కల గ్రామాదులలో నుండుపశువులు

అడవులు ఎంతదగ్గరలోనున్న పశువు లంతహింసాస్థితిలో నుండును. అడవులలో కూడ సంవత్సరముపొడవున మేత యుండదు. సాధారణమేతను అనేకవందల పశువులు మేయును. అటువంటిపశువులు ఎంతఎండకాయుచున్నపుటికి మేతలేవండ నుండ గలవు. చాలాప్రదేశములలో ఇట్టిపశువులు ఎరువుకట్టుకొనుట దుపయోగపడును. ఇట్టిపశువులు చాలాదీరసముగా నుండును. ఇట్టిపశువులు రైతుల కన్నియుండునో

అంతభాగ్యవంతుడందురు. మధురజిల్లాలోని కంభంలొయ్య ఇట్టి పశువులుగల భాగ్యవంతులుందురు. ఈకంభంలొయ్య ధూములలో నున్న మెక్కవగా నుండుటవలన పచ్చిమేత ఎక్కువగానుండును.

చాలాదూరమునుండి పశువులు

మాగాని ప్రదేశములనుండి ఆరణ్యములమేతల చాలాదూరమునుంచి పశువులు వచ్చును. అట్టివి గోదావరి, కృష్ణ, గుంటూరు తంజావూరు జిల్లాలనుంచి ఎక్కువగా వచ్చును. నుగాలీలు అనుజాతివారు తోళ్లవ్యాపారము చేయుదురు. వారెక్కువగా ఆప్రాంతములనుపోయి తోలుకొని వచ్చుదురు. ఆ పశువులు ఏకారణము వలననైన చనిపోయిన వీరికి లాభము. సేలము వాయవ్య భాగపు టడవులలోను, కోయంబత్తూరు ఈశాన్యపు టడవులలోను, పశువులకు మేత మెక్కువగా దొరకును. సేలము ఉత్తరజిల్లాలలోనున్న హోనూరు, ధర్మపురం తాలూకాలలో తక్కువ ఖర్చుతో మేతదొరకును. అటవికాఖిల ప్రతిపశువునకు సంవత్సరమునకు ఒక ఆర్థరూపాయి యిచ్చుదురు. ఆపశువు ఆరువందల చదరపు మైళ్ళ వైశాల్యముగల స్థలములోని కచ్చిగడ్డి అడ్డులేవడ మేయును. ఈ పచ్చిక బయళ్లలో విరు త్రాగుటకు చెరువులుకూడ గలవు.

పశువుల బీళ్ళు

“పసరుకల నునులేత పచ్చికబీళ్ల
గమ్మని మేతలం గడువార మేసి
మునిమాపు వేళల మోరల నెత్తి
తోకల నెగబట్టి తొడరి కుప్పించి
గంతులిడుచును అంకె ఖంగునవేసి
యింటి దారిబెట్టి యేగుచునుండ
వరుగిడి కొట్టంపు బ్రాంతంబులందు
వలనొప్పగా నంది వాటుగా బండి
నిశ్చింతతో నెడ్లు నెమలువేయంగ
గాంచి, యానందించు కాలంబు మాటి
కడకు మే మీరీతి గడవగావలసె.”

“కష్ట జీవి”

మేతలన్నిటిలో బీటిమేత (Fodder) యే శ్రేష్ఠమైనది. పూర్వము భూమి చాలి శంత యుండెడిది. ఇప్పుడు వ్యవసాయదారులు (Farmers) పశువుల యభివృద్ధిని గణింపక పాలమునంతయు వ్యవసాయము చేయుచు బీడును విడిచిపెట్టుటలేదు. కొన్ని ప్రదేశములలో కొంతకాలము ముప్పుది యకరముల కొక యకరమువంటివ బీడుభూమి



పశువుల బీళ్లు

యుండవలెనని కాసననియములు (Laws) ఉండుచూ వచ్చినవి. కాని యిప్పు డవి లేవు. ఇప్పుడెన్నో ధనాభావముచే భూమినంతయు సాగుచేయుచున్నారు. అందు వలననే పశువులు క్షీణించుచున్నవి. ఇంగ్లండు, స్విట్జర్లండు, కాలిఫోర్నియా జపాను, డెన్మార్క్ మున్నగు దేశములలో పశువులకై వ్యవసాయదారులు ప్రత్యేక ముగా పచ్చికబీళ్లను నెలకొల్పి తదితరమేతలను బీటిమేతలను తారతమ్యమును గ్రహించిరి. అన్నిజాతుల పశువులకు బీటిమేతయనిన మిగులప్రీతి. ఈమేత అన్నికాలముల యందు తగినంత దొరకునెడల పశువులకు సాధారణముగా మరొకమేత అవసరముండదు. ఇట్లు లభింపనపుడును, విరాములేక పగలంతయు పనిచేయు పశువులకు దినమంతయు మేసి పొట్టనిండించుకొనుటకు దగిన యవకాశము లేకపోవుటచేతను గడి మొదలగునవి తెచ్చివేయుటయేగాక కొద్దిపరిమాణమునందే యెక్కువ సాముగల తెలికపిండి మొదలగు పదార్థములు దాణావేయ వలసియుండును.

బీళ్లలోని గడ్డిజాతులు

పచ్చికయనగా నేలపై స్వాభావికముగా మొలచు గడ్డిగాదములు. వీని మంచి చెడ్డలు అందు మెండుగనుండు జాతుల ననుసరించి యుండును. ఈదేశపు పచ్చిక బయళ్లయందు గాననగు జాతు లనేకములు. వానినింకను బాగుగా బరీక్షించినవా రెవరునులేరు. 1907వ సం॥న దొరతనమువారి యుద్ధిజ్ఞకాస్త్రజ్ఞులు (Botanists) గుంటూరు, కృష్ణ, గోదావరిజిల్లాలలోని గడ్డిజాతులను కొంతవంతు పరీక్షించినటుల దెలియుచున్నది. కృష్ణా గోదావరి జిల్లాలలో తరచుగా గాననగు గడ్డిజాతులలో గరిక, గునుకు, చెంగలి, మొలప, తుంగ, ఊద, కాపురు, ఆమడ, కాండ్ర, చికిలింత, ఊతిక, చిప్ప, ఊసడిము, ఎనుగ మోకాలు, తొండంగి, పిలిపెనర, జనిపె, దర్భ, ఆవురు, రెల్లు, గెలగడ్డి మున్నగునవి ముఖ్యములు. ఇవిగాక గడ్డివటుంబములో జేరని గలేరు, ఎలకచీడి, అన్యరకాడ, పాలిల మొదలగు ననేకజాతుల మొక్కలుగూడ బీళ్లలో గాననగును.

ప్రకృతమైన జాతులు

పై గడ్డిజాతులలో గరిక, గునుకు, మొలప, చెంగలి మున్నగునవి మిగుల బలమైనజాతులును, పశువులు బాగుగాదిననవియునై యున్నవి. ఊతిక, చిప్ప, తుంగ మొదలగునవి యిసుక కొడి నేలలో బయలుదేరు జాతులు. చవిటి నేల లో ఉప్పి, గలేరు మున్నగునవి మాత్రమే పెరుగును. కాబట్టి పశువుల మేతక్రింద వదలునీల మంచిదైన నేగాని యందలి పచ్చిక యందు మేయు పశువులకు బలమును ఆరోగ్యమును (Strength and Health) గలుగవు. కాని మంచి నేలలు విలువగలవగుటచే పశువుల బీటిక్రిందనుంచక రైతులు వ్యవసాయమును బెట్టి యందుకు పనికిమాలిన నేలలనే బీళ్ల క్రిందనుంచుదురు. కొంద రింతమాత్రమును జేయక నేలసంతరిని నేవ్యముచేయుదురు.

బీటిమేతయే బలమెక్కువ

బీటిమేత దినపశువులు మిగుల బలముగానుండును. పాడిపశువులపాలు చాల రుచిగానుండును. కాని యిప్పటి వ్యవసాయదారులు ఊడ్చుచేలగట్టు మాత్రమే మాగాణి రైతులు పశువుల మేతకై శుభయోగించుచున్నారు. అందున్న పచ్చిగడ్డి తగినంత సారము లేక పశువులమేతకై చాలకపోవుటచే ఉలవలు, తవుకు, రెలికపిండి మొదలగు కృత్రిమాహారములను కల్పించుచుండిరి. ప్రకృతి సిద్ధముగ పెరిగిన పచ్చికబయళ్ల యందు పశువులుమేత మేయుట శ్రేష్ఠమైన పద్ధతి. బీళ్లను పెండుట యన్ని ప్రాంతములందు సాధ్యముకాదు. అంతమాత్రముచే రైతులు నిరుత్సాహపడి పశువుల మేతవిష యమై లోటు కలిగింప నక్కరలేదు. సామాన్యముగా వర్షాకాలమునందు బీటిమేత కొరకు తదితర తాలూకాలవారు ఉత్తరాది తోలుదురు. పశువులు మిక్కిలముగా బలిసి ఆనందదాయకములుగా నుండును. బీటిమేత దినటవలన పశువులకు సాధారణముగా వ్యాధులు రాజాలవు.

మాగాని మెట్టభూములలోని వ్యత్యాసములు

మెట్టభూములలోని మేతను, మాగాణి భూములలోని మేతను చాల వ్యత్యాసము (Difference) యున్నది. మెట్ట భూమిమేత దినన పశువులు బిగుతరముగానుండును. మాగాణి భూమిమేత తినన పశువులు బిగుతరము తప్పియుండును. మెట్ట భూములలో నున్న పశువులకు ఎల్లప్పుడు పనియుండుటవలన ఆరోగ్యము బాగుగానుండి అంటు వ్యాధులు (Contagious diseases) ఎక్కువ అంతగానోకవు. బీటిమేత తినన పశువుల పాలనుంచి వచ్చు వెన్న గట్టిగానుండును. మాగాని భూములలోని మేత నిస్సారముగ నుండును. బీటిమేత స్వాభావికమగుట చేత పశువులకు మిగుల సారోగ్యకరము. మనము తదితర మేతలెంత బెట్టినను పశువులకు బీటిమేతయిత సంతోషనాయకముగను, బలము గను నుండదు. బీళ్లలో ససేకబాతి గడ్డి గింజలుండుటచే పశువులకు గావలసిన వివిధ వస్తువులన్నియు నందుండును. మన మేదేని ఒకరకపుగడ్డి కొనిమేసినను యితరాహార మును బెట్టినను అందు పశువులకు గావలసిన ద్రవ్యములలో గొన్ని యెక్కువగను, మరి కొన్ని తక్కువగను యుండుట తటస్థమిది. మరియు పశువులు ఎండుమేతకంటె పచ్చికను మిగుల నిష్ఠముతో దినును. కావున ఏ దేశమున పశువుల యభివృద్ధి కొరవారు సాధ్యమైనంతవరకు వానికి బీళ్లు అమరునట్లునేను ప్రయత్నించవలెను.

ఎరువునేలలయందు విత్తనముల నుపయోగించుట

పశువుల బీటిక్రింద వదలునేల మంచిదైన నేగాని యందలి పచ్చిక నుండు మేయు పశువులకు బలము ఆరోగ్యము కలుగదు. మెట్టతాలూకాలలో ఎరువునేలలు (Red lands) విశేషముగా బీళ్లు వదలబడుచున్నవి. కాని యందు వరము మరియు చున్నంత వరకేగాని అటుపిమ్మట తర్వాత పదు సారిపోవుటచే గడ్డియంతగా బట్టదు. పశుబాతులైనను ప్రకృతముగా నుండవు. కొయింబత్తూరు జిల్లాలో బాగుగా పట్టని ఎలసేలలోను కంకరసేలలోను కొలకగడ్డియను ఒకజాతిగడ్డి విత్తులనుజల్లి ప్రత్యేకముగా బీళ్లను తయారుచేయుదురు. ఒక పర్యాయము జల్లి ఏడేనిమిది సంవత్సరముల వరకు బీడుగా వదలి తరువాత మరల సాగులోనికి తీసికొనివచ్చుదురు. ఎకరమునకు రమారమి ఎనిమిదిపానుల విత్తులుపట్టును. ఈగడ్డిని ప్రత్యేకముగా అప్పుడప్పుడు గంటి బొన్న నూత్న మొదలగు నవ్యములతో గలిపి జల్లి యాహారము తీసివేసిన తరువాత నేలను బీడుగావదలుదురు. ఇట్టి విత్తులను జల్లి బీళ్లనుకాదు పద్ధతి తెలుగు జిల్లాలలోగూడ నవకౌళము గలవారవలెఁ చెదరు గాక.

బీళ్లలో మన్న మెక్కువఁ కావలయును

బీళ్లలో పెరుగుగడ్డికాకులు నున్నను (Lime) పెక్కువ దీసికొనును. కాబట్టి లోతుగనుండు నల్లసేలలో నపుడపుడు నున్నను పట్టవచ్చుచుంది. గరికగడ్డికి నున్నము

మరింతయివ్వము. కోయంబతూరు జిల్లాయందలి నేలలలో నప్పుడప్పుడు నున్న మొక్కవగ నుండుటచేత నచ్చట బీళ్ళలో గడ్డి బాగుగా పెరుగుచున్నది. మధ్యపరగణాల (Central Provinces) లో నున్న కొన్ని జిల్లాలలో ఆవుల, ఎద్దుల పోషణనిమిత్తము ప్రత్యేక అధికారుల నియమించియున్నారు. అడవులను (Jungles) వ్యవసాయమునకు చేరిక తలచుదురు, తగినగడ్డినిపెంచి నిలుపుదలచేసి అడవులలో మేపుటకంటెను గడ్డి కోయించి అమ్ముట మంచిది.

బీళ్లలోని పశువులను కాపాడుట

పశువులమేతకై భూమి సాగుచేయక బీడుగా విడిచిపెట్టుట ప్రాముఖ్యమైన విషయము. బీళ్ళలో సర్వకాలములయందును చక్కని పచ్చికయందు టవసరము. నిడయును శుద్ధోదకమును ముఖ్యములు. పశువుల నూరివెలుపల సంచారము లేనిచోట మేవునెడల నవి మనుష్యుల చూడని బెదరిచూచుచుండును. అందువలన నిర్లసప్రదేశములలో మేతమేయుటను పశువుల కలవగచరాదు. పశువులకాపరులు (Cattle Attendants) తమకు తీరికగా నున్నప్పుడెప్పుడో పశువులకు నీరు బెట్టజూతురు గాని శరియైన వేళకు మాత్రము పెట్టరు. మాన యిండ్లమందున్న పశువులకన్న బీళ్ళలోనుండు పశువులు స్వేచ్ఛగానుండును. బీళ్ళలోనుండు పశువులు మనుష్యులను చూడని బెదరుగా చూచుచుండును. అందువలన పశువులు మచ్చికను సరిగారాజాలవు. అందుచేతనే ఆరణ్యములలోనుండు పశువులను మచ్చిక చేసి పట్టుకొనుటకెంతో ప్రయత్నించెదరు. అట్లు ప్రయత్నించి తీసికొనివచ్చి యింట్లో వదలుచి మేపినను వాటి పాదములు మాత్రము చావదు. బీటిలోమేయుపశువులను అప్పుడప్పుడు గ్రామములలోనికి తోలుకొనివచ్చి అబీటి మేత కోసికొనివచ్చిమేపుట మంచిపద్ధతయియున్నది.

పశువుల కాపరులను బట్టిమాడ అపశువులు తగినచేట్టలు చేయుచుండును. బీటి పశువులకు క్రూరము, తామసము, అహంకారము ఎక్కువగానుండును. పెద్దపులులు మొదలగు ఘాతుకజంతువులు బీళ్ళలోనున్నవని అనుమానమున్నప్పుడు కాపరులు జాగ్రత్తగా చూచుచుండవలెను. పశువులకు నియమిత వేళల నేర్పరచి నీరు పెట్టుచుండవలెను. అక్కడనున్న పశువులలో నేడైన జబ్బుగానున్నదో, పోట్లాడుకొనుచున్నదో, ఏదైన బెబ్బతగిలి రక్తము కారుచున్నదో, ఈదుకొని పోయినదో మొదలగునవి బాగుగా పరీక్షించి తగిన శ్రద్ధ తీసికొనవలెను.

బీళ్ళలోచర్మముకొరకు మాదిగవాండ్రు సామానాడిని, దొంగు గురకచే చని పోయినవాటివేడను జల్లుదురు. అట్టిమేతలని పశువులు నినిపోవుటయుగలదు. కావున రైతులు అప్పుడప్పుడు బీళ్ళను పరీక్షించుచుండవలెను. ఇతను విషపురుగులుగాని దుష్ట సర్పములుగాని జంతువులుగాని బీళ్ళలో నివసించి పశువు ను చంపుచున్నది లేనిది చూచుచుండవలెను. పెద్దకోగనని, గురక దొంగు మొదలగు కంటుసంబంధమైన కోగములు (Contagious disease) వ్యాపించుచున్నవి లేనివి పరీక్షించుచుండవలెను.

గ్రామ కట్టుబాట్లవసరము

గత శతాబ్దములో దేశములో జనాభా వృద్ధియగుటచేత వ్యవసాయమునకు అనుకూలముగాని భూములన్నియు ఆక్రమించుకొనబడినవి. మైదానములన్నియు పల్లెలుగా మారినవి. అందుచేత క్రమముగ పశువులకు వలసిన పచ్చిక లేక పోయినది. వాని జనసత్వములు (Strength and energy) క్షీణించి పోవుచున్నవి. కాబట్టి మరల పచ్చిక భూములను పెంపొందించవలసిన యవసరం పెరిగియున్నది. మనహిందూ దేశములో విశేషముగ పచ్చిక బీళ్ళులేవు. విశేషముగ లేవన్నను ఉన్నవానిని అభివృద్ధి చేయుటకు మార్గము లుండకపోలేదు. అనేక గ్రామములకు పశువుల మేతనిమిత్తము కొంత బంజరుభూమి యుండును. అట్టి బంజరుభూములలో తంకెడు, జలేడు, తంబెళ్ళు చెట్లు మున్నగు పనికిరాని చెట్లు పెరిగి ఆసలమును ఆక్రమించుకొనుచుండుట మనమందర మెరిగిన విషయమే. ఇట్టిభూములలోనుండు పనికిరాని చెట్లను నరికివేసి బీటి సంబంధమగు మేతలు వేసి పెంచి గ్రామపశువులను మేపుచుండుట మంచిది. ఇటువంటి పనులు చేయుటకు గ్రామములో సంఘీభావము (Unity) కావలెను. ఇప్పటి పరిస్థితులలో ప్రతి గ్రామమునందు పార్టీలుండుట తటస్థించు చున్నది. ఈ పార్టీలుండుటవలన పశుగ్రాసము (Fodder) నశించినది. కాలవ గట్టమీదనుండు గడ్డివాడ రెట్టింపు ధరపెట్టి కొనవలసివచ్చుచున్నది. గ్రామ పోరంబోకలలో నిదివరకు ఐకమత్యముగానున్నవ్రుడు తమయిష్ట ప్రకారము అవసరస్వములువేసి పెంచెడివారు. తగాదాలున్న గ్రామములలో ప్రభుత్వము వారికి పితూరీలుచెప్పి ఉభయములకలసి పశువులనోటిలో గడ్డికొట్టుచున్నారు. ఈరీతిగా మన దేశములో రైతులకైకమత్యము లేక పశుసంతతిని నాశనము చేయుచున్నారు. గడ్డిజాతుల పేరేమరచిపోవుచున్నారు. కాలమునకు తగినట్లుగ పెరులు వేయక సరిగా పంటలు పండించక ఎరువులను తోలక పశువుల మేతవిషయమై పశువుల బీళ్ళవిషయమై తగిన కట్టుబాటుచేయక పశుసంతతిని పాడుచేయుచున్నారు.

జీర్ణము వృద్ధి జేయుట

పచ్చికబయళ్లసంఖ్య పెంచుటకు శీఘ్రముగ ప్రజాభివృద్ధియగుచున్న దేశముల యందు వీటులేదుగాన పూర్వమునుండి వచ్చుచున్న పచ్చికబయళ్లయందే ఎక్కువ పచ్చికనుపెంచు విధానముల నవలంబించవలెను. గ్రామములనుసంబంధించిన బయళ్ళయందు పశువులమందలను విచ్చలవిడిగా వదలివేయక అట్టిబయళ్ళను కొన్ని భాగములుగా విభజించి ఒక్కొక్కభాగము కొన్ని దినములు మేయునట్లు చేయవలెను. ఈరీతిగా చేయుట వలన మిగిలిన భాగములయందు పచ్చికపూర్తిగా పెరుగుటకు వీలగుచున్నది.

బీళ్ళకు వర్షమువరిసినవెంటనేగాని, బీళ్ళలో నీరునిలిచినప్పుడుగాని పశువులను తోలి మేపరాదు. అట్లు మేసినయెడల గడ్డిసంతయు త్రొక్కిపాడుచేయుటయే గాక మంచి రుచి గడ్డిఅంతయు నాశనమగును. గడ్డి పెరుగు ఋతువుల (Seasons)

యందు పశువులను తోలరాదు. మేతబాగుగాపట్టి కొంచెము ముదిరిన తరువాత మేపవలెను. జిల్లేడు, రెల్లునుబ్బలు, నల్లఉప్పెల్లొత్తుచెట్లు, మున్నగు పనికిరాని మొక్కలను తీసివేసి మంచిగకముల గడిజాతులను పెంచవలయును. వంచి చిత్తనమునువేసి పెంచి కాయలుకొయించి ఎండించిన తరువాతగొట్టెలను మేకలను బీదీనాలుగువైపుల త్రిప్పినయెడల ఎండినకాయలు బద్దలై బీడంతయు న్యాపించును. వేసవి కాలములోబీళ్ళలో మేపరాదు. గడ్డిపెరుగుకాలములో ఆపునలచేసి మంచిగడి బాణలు చిత్తనములు నుదిరిన తరువాత పూర్తిగా మేపవలెను. మంచిరకపు గడ్డిని ముఖ్యమైనపశువులకు మేసి తక్కినవాటికి రెండవరకము మేపుట రైతునకు మనాయాసముగా నుండును. బీళ్ళలో నీరుత్రాగు గుంటలుగాని, చెరువులుగాని ఎక్కువగా నుండరాదు. అట్లుంటువలన బీళ్లు తేమగలిగి పాడుగును. ఇంతియేగానూడి పశువులు మాటిమాటికి నీరుత్రాగుటకు వెళ్ళి మంచినీటిగడ్డిని పాడ చేయుచుండును. విషపురుగులు, గుప్టజాతువులు, గుప్ట సర్పములుండు పుట్టలను నిర్మూలించవలెను.

విదేశములలోని పచ్చికబయళ్లు

ఉష్ణమండలములోను సమశీతోష్ణ మండలములోను పచ్చిక బయళ్లుగలవు, ఈబయళ్లలో వాన ఎక్కువగావరదగు. కనుక చెట్లు మొలవవు. సరీసృపమున మాత్రము చెట్లు మొలచును. ఎడకొలమున పచ్చిక ఎండిపోవును. ఉష్ణమండలపు పచ్చిక బయళ్లు సావన్నాస్ (Savannas) అనుగు. సమశీతోష్ణమండలపు పచ్చిక బయళ్లు సంవత్సరము పొడుగునను పచ్చిక పెరుగుచుండును. ఇచ్చట ఎడకొలమున ఎడ ఎక్కువ. వర్ష పొక్కువగా వేసపోయినను పచ్చికకు కావలసినంత కరియును. ఈపచ్చిక బయళ్లకు పాంపాస్, టైప్స్, ఫ్రయిన్ అనివేరు. ఇట్టిప్రదేశముల సావనముగా సముద్రమునకు దూరమున నుండుటచే ఎడకొలము ఎగు ఎడయు, వాడకొలముల వాసయు ఎక్కువగానుండును. ఇటువంటి పచ్చికబయళ్లు అన్ని భూభాగములలోనుగలవు. నేలకొలది పశువులను గొట్టెలను మేపుకొని ఇచ్చట జనులు నివసి న్నుచుండును. ఉష్ణ మండలములలోను, గాఢజీ సమీపముననుండు సమశీతోష్ణప్రదేశములలోను అట్టి, మామిడి, ఈత, వేలేత, పెంకాయమున్నగు వివిధముల చక్కగా పండించును. ఇట్టికాయలు మన దేశములోను, సింగాప్ (Ceylon) లోను, ముద్రా దానా మున్నగు ఉష్ణ ప్రదేశములలోను చక్కగా పండించును.

ఆయాప్రదేశములలో చెట్లచేమలలో భేదమున్నట్లు ఆయా ప్రదేశములలో జంతుజాలములలోను భేదమున్నది. చెట్లమేన అడవులలో జంతువులు విశేషించియుండును. ఇచ్చట నీటి వలయు ఆహారములు మోడుగనుగటయే ఇందులకు కారణములు. ఎడారి ప్రదేశములలో నృకములు ఉండవు. శీతలమండలములలో జంతువులకొన్నియే యుండును. శీతోష్ణస్థితులలోని భేదముల వలన గించియే జంతువులుండును. ఆఫ్రికా

ఉష్ణమండలము (Tropical Region) లోనికట్టమైన అడవులలో పులి, సింహము, జిరాఫీ, బీరూ మొదలగు నానావిధ పృగములను చెట్లపై నివసించు కోతులు మున్నగునవియు, పాములు పక్షులు మున్నగునవియు విశేషించియుండును. ఈ ప్రదేశములలోని సదులలో మొగళ్ళు; ఖడ్గమృగములు, ఏటిగజములు, మున్నగునవి నివసించును. ఆఫ్రికాలోని పక్షిజాతులలో నీళ్ళకోడి (Ostrich) పెద్దది. ఆస్ట్రేలియాలోని జంతువులు ఇతరదేశములలోని జంతువులకన్న వింతయైనవి. శీతలదేశములకు సమీపముననుండు ప్రదేశములలో జంతువులు తక్కువ. వీనికి వానిబాధలేవంగుటకై వీనిచర్మము పైసకాన్ని (బొచ్చు) ఎక్కువగానుండును. బొచ్చుకై ఈజంతువులను వేటాడుదురు. రెయిన్ డియర్ అనుజంతువు మంచుగడ్డలమీదను నిల్చుట పైసను సులభముగా త్వరగా నడువగలదు. అక్కడ దొరనుపాచియే దీనికిఆహారము. ఎడారులలో పెంతుతప్ప మిగిలినవిజంతువున తిరుగజాలదు. ఆహారము సంపాదించుకొనుటకై దాని కడుపులోనుండు తిత్తి విచిత్రమైనది. దాని పాదములు వెడల్పుయి మెత్తగానుండుటచే ఇసుకలోనికి దివ్వు. ఈకారణములనుబట్టి దీనికి ఎడారిపక్షి అనిపేరు. ఎడారిని అనుకొనియుండు పచ్చిక బయళ్ళలో సాధారణముగా పచ్చికమేయు జంతువులు విశేషించియుండును. గొట్టెలు, మేకలు, పందులు, గుఱ్ఱములు మున్నగునవి యుండును. అచ్చటిజనులు ఇవి చాలా ఉపయోగకరమైన జంతువులు. ఇవి తినుటకుఆహారమును, కట్టుకొనుటకు బట్టలును-కోలును యిచ్చును. పచ్చికబయళ్ళు ఎక్కడనుండునో అచ్చట ఆంధ్రయు ఓటీరిజనులు కోట్లలను పెంచుదురు. పశువులు ఉష్ణప్రదేశములందును వానిని అనుకొని యుండు సమశీతోష్ణ ప్రదేశములలోను ఎక్కువగా నుండును. మన దేశములో సుమారు 60 కోట్లును, యునైటెడ్ స్టేట్సు (United States) లో 50 కోట్లును ఉన్నవి. మిసిసిపి (Mississippi) నదికి పడమట రాకీపర్వతమును అనుకొని యుండు బయళ్ళలో వీనిని విశేషించి పెంచుచుండురు. దక్షిణమెరికాలోని అర్జెంటైనాలోను పశువుల సంఖ్య ఎక్కువ. ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండు బయళ్ళలో గొట్టెల నెక్కువగా పెంచుదురు. యునైటెడ్ స్టేట్సులో మాత్రము 50 కోట్ల పంసు లున్నవి. వీనికి బొప్పలుపెట్టి బలిపెంతురు.

శీతోష్ణ స్థితిగతుల ననుసరించి ప్రదేశముగా వైరుపచ్ఛలుండును. మిక్కిలి వేడియు, వర్షపాతమును గల ప్రదేశములలో గొప్ప అడవులు పెరుగును. వేడియు స్వల్పవర్షపాతముగల ప్రదేశమున పచ్చిక విస్తారముగా పెరుగును. ఇట్లే సమశీతోష్ణ ప్రదేశములలో, పచ్చికయు, అగువర్షపాత మెక్కువగల ప్రదేశముల పెద్దవృక్షములు పెరుగును. ధ్రువప్రాంతము లందుగట్టి ప్రదేశము. ఇచ్చటనుంచు గడ్డ కట్టియుండును. పంటలుపండవు. ఇచ్చట నెల, సీత, ఎలుగులు క్లు, రెయిండీరు మున్నగు జంతువులుండును. అచ్చట జనులను ఎస్కిమో (Eskimo) అందురు. అచ్చట వాని జంతువులను వేటాడి చంపితిరి బ్రతుకుదురు. రెయిండీరుయొక్క పాలనుగూడా త్రాగుదురు.

పరువును పెరుపులు పెండు; పట్టిగొడ్డును ఆరువులు పెండు

వేటాడుట చేపలను బట్టుట వీరిముఖ్యవృత్తి. వీరుసెడ్జస్ (Sedjas) అనుబండ్లమీద మంచుగడ్డలపై ప్రయాణము చేయుదురు. ఈ బండ్లను తుక్కలచే లాగించుదురు.

భారతదేశము ముఖ్యముగా వ్యవసాయముపై నాధారపడియున్నది. పాశ్చాత్య దేశములలోవలె మనదేశములో వ్యవసాయము యంత్ర సహాయము వలన జరుగుటలేదు. వ్యవసాయమున వెన్నెముక పశువులు. వ్యవసాయపెట్టుడిలో పశువులు ముందుకు వచ్చును. తిండికి అన్నము ప్రధానమెట్టులనో వ్యవసాయమునకు పశువులు అనువంతివి. ఇట్టి పశువులకు సరియైనతిండిలేక అవి, దొడ్లకులు ముగరిపెట్టుకొని, లోతునకు పోయిన కన్నులతో బిరసముగానుండి పనిచేయులేక పోవడమేగాక వాటి సంతతికూడ “నానాటికి తీసికట్టు నాగంభట్టా” అను లోకోక్తిప్రకారము అగుచున్నది. పశువుల మేతనుగూర్చి మన దేశాన్ని యితరదేశాలతో పోల్చి చూచిన డెస్సాబుక్ దేశములో నూరు ఎకరముల సాగుబడిభూమి విస్తీర్ణమునకు 45 పశువులును, హాలెండులో 38 న్ని, జర్మనీలో 32 న్ని, ఆస్ట్రేలియాలో 37 న్ని, అమెరికాలో 17 న్ని, కన్నడాలో 14 న్ని బ్రిటిష్ ఇండియాలో 67 గలవు. కనుక నూరు ఎకరములభూమిపై మనదేశములో 67 పశువులు మేతకొరకు అధారపడియున్నవి. ఇట్టి పరిస్థితులలో పశువులకు వీరితిగామేత దొరుకునో తెలిసికొనవలెను. భూమి విస్తీర్ణముకన్న పశువులసంఖ్య ఎక్కువగుచున్న కొంది పశువులకు మేతకొరకక పోవడమేగాకుండ వ్యవసాయ ఖర్చులు కూడ ఎక్కువగుచున్నవి. కాబట్టి మనదేశములో పశువులకు సరియైనమేత లేకపోవుట వలననే వృద్ధిలోనికి వచ్చుటలేదు.

విదేశములలో బలమైనపశువులకు బలమగు పశువులను కలిపి, వాటి సంతానము నకు తగినమేతపెట్టి పోషించి మంచిజాతిని తయారుచేయుదురు. కాబట్టి కొత్తరీతిగా పెంచుపద్ధతి మనదేశములకు పాశ్చాత్యపడుటలేదు. సామాన్యముగా ఒక జత పశువులను పోషించుటకు రైతునకు సంవత్సరమునకు సుమారు రు. 50 నుంచి 60 ల వరకు అగును. ఇది కేవలము పశువుల ఉపవలక్రింద, తెలికపిండిక్రింద ఖర్చుపెట్టిన సామ్యు. గడ్డి, చొప్ప, జనుముకూడ మున్నగునవి లెక్కచేసికొనుట లేదు. ఇవికూడ కలుపుకొని, వాటికితోడు అప్పుచేసికొనిన పశువులకు వడ్డికూడకట్టుకొనిన ఒకజత ఎద్దులను మేపుటకు రైతునకు సంవత్సరమునకు రు. 120 నుంచి 150 ల వరకు అగుచున్నవి. గవర్నమెంటు వారు వ్యవసాయ ఖరచులలో ఒకకాడిఎడ్లను మేపుటకు సంవత్సరమునకు రు. 125 నుంచి 250 ల వరకు అగుచున్నవి. కనుక పశువులను తయారుచేయుటకు సరియైనమేత పెట్టలేకున్నాడు.

పశువులకు ముఖ్యముగా బలముకలిగించు తవుగు, తెలికపిండి ధరలు పెరుగుట వలన పశువులను మేపలేకున్నాడు. ఈ కారణము వలన పశువులు చూడిగా మున్నపుడు సరియగుమేతపెట్టక పాలుయిచ్చినన్నట్లు రైతులువాటిని మేపుచున్నారు. ఈపద్ధతే చాలాతప్పు. చూడిగానున్న ఆవునుగాని, గేదెనుగాని బాగుగా మేపినపుడే మంచి

సంతానము కలుగును. పట్టణములలో కొంతమంది పాలవాండ్రు పొడిపశువులను పగలంతా వీధులలోనుండు ఎంగిలిన స్త్రీలను తినుటకు వదలిపెట్టి రాత్రితమకు సేరుపాలు వచ్చుటకు ఆశపడినవారున్నారు. ఇటువంటి అభ్యాసముల మానుకొనవలెను. మన దేశమునుంచి నూనెగింజలు నువ్వులు వేరుకనగ అముదాలు మున్నగునవి విదేశములకు ఎగుమతియై వాటితోనే క్రూడాయిల్, మెబిలాయిల్, అనుషేర్తో డబ్బాలలోని కెక్కించి ఎక్కువధరలకు స్వయం అగుచున్నవి. ఇట్టిగింజలను విదేశములకు వెళ్లినచో కుండనున్నపుడే పశువులకు దాణావస్తువులు దొరకును.

పిండులను తయారు చేయుట

చమురుగింజలనుండి నూనెను తయారుచేయగా మిగిలిన పిప్పినే పిండి (Cake) యందురు. ఈపిండి పశువులకు మేతగను, పాలములకు ఎరువుగను నుపయోగించెదరు. కొంత నూనె ఈ పిండులలో కలసియుండును. గానుగ ననుసరించి ఎంత నూనె యుండునది తెలియును. ఇనుపయంత్రముల గానుగలలో మాత్రముండు పిండులలో నూనె ఎంత మాత్రముయుండదు. కొన్నిరకముల పిండులను మాత్రమే పశువులుతినను. నువ్వులు, ప్రత్తివీళ్లు, ఎట్టిగింజ, ఆప, పసుపు, వేరుసెంగ, కొబ్బరి, మొదలగువాటి పిండులు పశువులు మిగుల ప్రీతితో తినును. ఆముదము, బొప్పాయి, మహువా పిండినిమాత్రము తినజాలవు. ఏయే పిండిని ఎరువుగా నుపయోగించునది వాటివేలల ననుసరించి యుండును. కొన్నిటిని పశువులు తిననందువలన వెల (Cost) సరసుగునని తలంచరాదు. కొన్నిదేశములలో పశువుల ఆహారమున కుపయోగపడునని చాలస్వల్ప ధరలకు లభించును. అట్టి సందర్భములలో వాటినే ఎరువులుగా నుపయోగించ వలెను.

పశువుల కుపయోగించని ఆముదపుపిండి తినుట కుపయోగించు వానికంటె వెల ఎక్కువ. ప్రతిరైతును ఏదిచాకగా లభించునో ఆలోచించుకొనవలెను. పశువులకు దగిన పిండిని మేపి వాటి నులమూత్రములు (Urine and dung) భూములకు వినియోగించిన యెడల రెండువిధముల లాభములందును. పశువులకు మేపినందువలన వాటిలోని వృక్షాహారపదార్థములు నశింపవు. ఆవన్నియు నులమూత్రములలోనే యుండును. కాని నుల మూత్రములు పదిలము చేయుటయగు జాగ్రత్త లేనియెడల నష్టమగును. చెరువు మొదలగు విలువగల సస్యములను పైరు చేయకొనునారు పశువులకు తెలికపిండి (Oil Cake) మేపి వాటిని పాలములోనే రాత్రియందు కట్టివేసిన యెడల నష్టముండదు. మేతకుండువలసిన ధర్మములకును ఎరువున కుండవలసిన గుణములకును చాలవ్యత్యాసము గలను. లేను, నార, మాంసకృత్తులు, ద్రావణీయమైన సేంద్రియపదార్థము మొదలగు వస్తువులన్నియు మేతకుపయోగపడెడు పిండులలో నుండవలెను. ఈకొణములవలన మేతకుపయోగపడని పిండి ఎరువుల కుపయోగపడుపదార్థము లెక్కువగా నుండును.

ప్రత్తిగింజలు

ఈ గింజలు పాడిపశువుల కాహారముగ వాడబడు చున్నవి. ఈ గింజలపై న కొంచెము ప్రత్తియంటియుండును. ఈ ప్రత్తియు, గింజలపై పొట్టును జీర్ణముగావు. ప్రత్తిగింజలయందు తగినంతచమురున్న నే గాని పశువులకు బెట్టినపుడు జీర్ణముకాదు. ప్రత్తిపండు జిల్లాలలో గింజలు చౌకగదొరపను. ఈ గింజలను చిత్తుకగొట్టి ఎరువుగ వేసిన తగినంత ఫలితము బొందవచ్చును. ఎక్కువ కాలము నిలువయున్న యెడల ప్రత్తిగింజలు పశ్చాహారమునకు పనికిరావు. అప్పుడు గింజలు చౌకయగును. గనుక వీటిని ఎరువునకు బనికిరావని తలంపరాదు. ఎరువునకు చమురు అరిపోయిన గింజలే శ్రేష్ఠము. చమురున్న గింజల నెరువుగా నుపయోగించినప్పుడు త్వరితఫలితము గాన్పించదు. ప్రత్తిగింజలయందు చమురు తక్కువగా నుండుటచేత చమురును దీయుట కేదేశమున ప్రయత్నింప బడుట లేదు.

ప్రత్తిగింజల నూనె

అమెరికాదేశపు ప్రత్తినిత్తులనుండియు, ఈజిప్టు (Egypt) దేశపు ప్రత్తినిత్తుల నుండియు గానుగల మూలమున చమురు తీయబడుచున్నది. ఈ చమురు కూరలలో తాళింపులు వేసికొనుటకును, వెన్న చేయుటకును, చేపలు మున్నగు ఆహారపదార్థములు నిలువచేసికొనుటకును ఉపయోగింపబడుచున్నది. మనదేశపు ప్రత్తినిత్తుల చమురు వగరు రుచిగలిగి గోధుమరంగుతో నుండుటచే దీనినెగుమతి సంతగా నుపయోగించుటలేదు. ప్రత్తి నూనె కొంచెము పసుపురంగు (Yellow Colour) గలిగి రుచిగానుండును. ఈ నూనె పశువుల చర్మవ్యాధుల (Skin diseases) కు వాడవచ్చును.

ప్రత్తిపిండి

ఈపిండిలో 10 వేలపాళ్ళలో

950	వాల్లనీరు
1575	మాంసకృత్తులు
3274	ఉష్ణకరపదార్థములు
2035	నార
376	లవణపదార్థములు
1790	నికరవస్తువులు

ఉండును. గింజలపై పొట్టునువీసి శుభ్రము చేయబండ నీదము చేయబడిన పిండిలో నూటికి 3.4 భాగములు నత్రజని (Nitrogen) యు 1.26 భాగముల భాస్వరము

బుధవారం త్తుట్టినందున్న భూమిని దున్నిన, త్రొక్కిన తోడైపండును

(Phosphorus) యుండును. ఈపిండి పెట్టబడిన పాలలో క్రొవ్యుపదార్థములు (Fats) ఎక్కువగాయుండును. దానివలన వెన్నయెక్కువై పూర్వముకంటె నెక్కువ జీడ్డుగను గట్టిగను యుండును. నేయిగుడ గట్టిగ ముద్దగనుండును. ప్రత్తిగింజల పదార్థము పశువులకు పెట్టుచున్నంతకాలము యిరీతిగా నుండును. పిండినిగాని గింజలనుగాని అధికముగా పెట్టరాదు. గింజలలో చమురు ఎక్కువగా నుండుటవలన పిండినే పెట్టుటమంచిది. ప్రతిదినము ఇతరాహార వదార్థములతో పిండిని జేర్చిపెట్టుటవలన పశువులకు బలము నిక్కుటయేగాక వెన్నయు పాలును వృద్ధియై చాలమంది గుణములు కలుగును. ప్రత్తిపిండివలన వెన్నవలె పాలంతగా వృద్ధియైనటుల కానరావు.

వేరుశనగపిండి

బొంబాయి, మదరాసు రాజధానులలో పశ్చిమోరకును నూజెవోలకును విశేషముగా పైరు చేయుచున్నారు. వేరుశనగ పరదేశములనుండి ఎన్నియో శతాబ్దము (Century) ల క్రిందట మన దేశమునకు లేబడినది. చీనా, మనిల్లా, ఆరేబియా దేశములనుండి, లేబడినట్లు తెలియుచున్నది. బ్రీజిల్ దేశము (Brezil) దేశము. ఇది అయిదారు శతాబ్దములు. పంట తీరగనే పై పచ్చితిగనుకొని ఎండవేసినచో పశువుల మేతకు పనికి వచ్చును.

నూరుపాళ్ళ వేరుశనగపిండిలో 13. 41 చమురు

49. 48 మాంసకృత్తులు

22. 5 ఉష్ణకరపదార్థములు

గలవు. మాంసకర పదార్థములలో 80 పాళ్ళ మాత్రమే జీర్ణమగును. కాబట్టి జీర్ణకర పదార్థములు 39.58, జీర్ణకరమగు ఉష్ణకరపదార్థములు 16.9, జీర్ణమగుచమురు 12.06. జీర్ణమగుచమురును 23 చేగుచించి జీర్ణమగు ఉష్ణకరపదార్థములతో గలిపివేయవలెను. అందువలన జీర్ణమగు చమురు విలువ 44.63 యుండును. కాబట్టివేరుశనగపిండిలో నూరుపాళ్ళలో 39.58 మాంసకృత్తులు, 44.63 ఉష్ణకరపదార్థములును జీర్ణమగును. అనగా సుమాత 1.25 అగును. కాబట్టి ఇది మిక్కిలి బలకరమైనది. దీనిలో ఉష్ణకర పదార్థములున్నవి. పాడిపశువులకు దినమునకు చిన్న పాడెత్తు ఒక అరపానున్న పాడి పశువులకు 4 లేక 5 పానులు పెట్టిన బాగుగా వునిచ్చును, వెన్నయగును. పెట్టిన తరువాత ఒక పొన్ను ఉప్పు (Salt) పెట్టవలెను. ఉప్పుడిప్పుడే రైతులలో చాలమంది దీనిని వాడుచున్నారు. వ్యవసాయ దిపార్టుమెంటు (Agricultural Department) వారు ఈ విషయమై బాగుగా ప్రచారము చేయుచున్నారు.

ఎక్కువ వెలపెట్ట గుడ్డును; తక్కువ వెలపెట్టి గొడ్డును కొనరాదు

తెలిపిండి

దీనిపంట మనదేశమునందంతటను యున్నది. కాని బొంబాయి చెన్నరాజధానుల యందు, బర్మా మధ్యపరగణాలయందు విస్తారముగా కైరగుచున్నది. సువ్వులవలన దీయు చమురు మాంపులకు పశువులకు ఆహారమునకే గాక మృదులబోనికి గూడ పనికి వచ్చును. తెలిపిండి (Oil Cake) పొడిపశువులకును, తదితర పశువులకును మంచి ఆహారమైయున్నది. వాతముగల పశువులకు దీని మనకు ఒక అరప సెకు పశువు ఈయవలెను. నిక్కొకపశువులకు అంతగా వాడరాదు. పశువు శిశువుగానున్నప్పుడు తెలిపిండి పెట్టుటమంచిది. వాతసంబంధముగ రోగములు కలుగజేసవును ఈరీతిని ఆవృడప్పుడు పెట్టుటనుచిది. నిండుచూలుతో నున్నప్పుడు దీని నొక్కపగ వాడినమెడల పిండము (Foetus) కొగిపోవును. పశువు ఈ పిండమువారి బాగుగా పెట్టవచ్చును. దుక్కిపెట్టులకు సాయంకాలము పూట పెట్టవలెను. గానుగ అప్పుడెట్టవలె పిండి తెచ్చిపెట్టిన మిగులబలముగలిగించును. వినుపమున్న పిండి అల శ్రేష్ఠమైదికొను.

ఈపిండిలో 10 వేల పాళ్ళలో

1080 పాళ్లనీరు	3175 ,, మాంసకృత్తులు
2900 ,, ఉష్ణకరపదార్థములు	365 ,, నారపదార్థములు
1140 ,, లవణపదార్థములు	1340 ,, తదితర వస్తువులు

యుండును. పిండములన్నిటిలో తెలిపిండి గుర్తింపగా నున్నది. ఈ పిండినిగురించి ఆయుర్వేదపత్రమునైర్యవస్తువున దీనికిగా తేట తెల్లముగా తెలుపుచున్నది.

కొబ్బరి పిండి

కొబ్బరి పండు (Coconut fruits) పండులలోని పండుకై చమురు దీయును. చమురుదీయగా మిగిలి పిండి పాడిపంపులకు ఆహారముగా ముపయోగపడుచున్నది.

ఈపిండిలో నూటికి

9.00 పాళ్ల నీరు	19.35 పాళ్లపిప్పి
4.00 ,, పిండిపదార్థములు	9.12 ,, కొవ్వు
8.64 ,, నారపదార్థములు	5.89 ,, బొగ్గుపదార్థములు

యుండునని దెలియుచున్నది. ఆంధ్రములో ఈ పిండిని పశువులంతగాతీసవు. అలవాటు చేసికొలది దినమునకు 7½ పాసుల కొబ్బరిపిండి (Coconut cake) ని తినునట్లు చేయవచ్చును.

దొరలు యిచ్చిన పాలుకన్న; ధంజీయిచ్చిన పాలు మేలు.

గడ్డి రకములు స్వభావము

కొన్నిజాతుల గడ్డి మరికొన్నిటికంటె మృదువుగ నుండును. పెట్టపెరులగడ్డి దంపవరులగడ్డికంటె మృదువుగ నుండును. కొశామణి మొదలగు రకములగడ్డి మిక్కిలి మృదువుగ నుండును. కేసరిగడ్డిని పశువులు బాగుగాతినును. మిగుల ఆరోగ్యకరముగా కూడ నుండును. భూమినుండలి ఖనిజములను బట్టి గడ్డియొక్క స్వభావము మార్పుగలదు. విశాఖపట్టణము జిల్లాలోని గరపనేలలలో పెరుగుగడ్డికంటె గోదావరిజిల్లాలో పెరుగు గడ్డి మృదువుగ నుండును. మృదువుగనుండు రకములలో గడ్డితక్కువగును. మోటుగ నుండువానిలో గడ్డియెక్కువగును. దుబ్బు బాగుగా జేయురకములో నట్లుగాక నెక్కువ గడ్డియగును. ఎక్కువకాలములో పండురకములు తక్కువకాలములో పండురకముల కంటె నెక్కువ గడ్డినిచ్చును.

వరిగడ్డిలో 8.72పాళ్ళనీరు, 7.31పాళ్ళ మాంసకరపదార్థములు, 45.89పాళ్ళ ఉష్ణకర పదార్థములు, 42.96 పాళ్ళ వారబూడిదపదార్థములు ఉన్నవి. మొత్తముమీద ఈ వరి గడ్డిలో శుష్ణకరపదార్థములు హెచ్చుగానున్నవి. అందువలననే వరిగడ్డితో విశేషముగా మాంసమిచ్చు మరియొక పదార్థము కలుపనియెడల సరియైన యాహారముకాదు.

పైనచెప్పిన అన్నిజాతుల వరిగడ్డి పశువులకు మంచి ఆహారమైయున్నది. (పరి పెట్టభూమిని మాగాణిగా చేయుచున్నారు. అందుచే పశువుల బీళ్ళకు, పెట్టపెరులకు, పశువుల ఆహారములకు మిగులనష్టము గలుగుచున్నది. కాబట్టి రైతులు సగభాగము మాగాని, సగభాగముపెట్ట నుంచిన అన్ని సౌకర్యములకు వీలగును.

తదితర గడ్డిజాతులు

రెల్లగడ్డి:— ఇది నదియొడ్డులను, లంకలలోను, పెద్ద పోరంబోక గట్లమీదను, చెరువులకుట్టును పెరుగును. ఇంకను కాలువగట్టువగైరా వరదలకుతెగటంప ఈ మొక్కలను నాటుదురు. ఇది మంచిభూమియైనయెడల 20 అడుగులవరకు కూడ పెరుగును. వేరు లోతుగాపోవును. ఆకులు పొడుగుగా నన్నముగానుండును. ఈ గడ్డిని ఇండ్లకప్పులకు ఉపయోగించుదురు. మరికొందరు రెల్లరడికలు అల్లుదురు. దీనిని పశువులు తినవుగాని మిక్కిలి తేర మొక్కలను చున్నలు, గోదెలు తినును. కొనిమొత్తముమీద ఈ గడ్డి పశువులకు అంతమంచికాదు.

ఆరిక గడ్డి:— లేనునేలలయందు అయిదు అడుగుల యెత్తుపెరుగును. దీనిని పశువులు తినవు.

లేవ గడ్డి:— సారవంతముగు భూములయందు నాలుగైదడుగుల ఎత్తు పెరుగును.

కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం; జవతో నాస్తిపాతకం.

ప్రశ్నంగతి:— చెట్లక్రింద దొంకలమీద బెరుగును. అది నేలమీద బ్రాహ్మకుండును. అవలు గరమగానుండును. మేకలు, గొట్టెలు ఎక్కువగాదినను.

తున్నగరిక:— నేలమీద ప్రాహ్మకునేయుండును. అవలు చిన్నవిగానుండి ననువుగానుండును. పశువులప నిది మంచిఆహారమైయున్నది.

గండ్ర గడ్డి:—వరిచేలగట్లమీదను, లేమనేలమీదను పెరుగును. అది కొంత భూమిమీదబడి కొంతభాగము పైకి లేచియుండును. కాడ బల్లపరువుగానుండును. పశువులుతినను.

చిక్లింత:—ఈగడ్డి సగభాగము పైకి లేచియుండును. అవలమీద నూగుగలదు. పశువులు తినవు.

ఒండు గడ్డి:— కాడపఅవలు రెండుప్రక్కలనే యుండును. రుచిగానుండును. పశువులు బాగుగాదినను. పాడిపశువులప మేసిన వెన్నును కలుగజేయును.

పెద్దఒండు గడ్డి:—వరిచేలలో మొలచును. అవలు గరమగానుండును. పశువులు దినవు.

దూసగడ్డి:— చేలగట్లమీదను, కాలువగట్లమీదను పెరుగును. కాడలు గుండ్రముగానుండును. అంత మంచిదికాదు.

ఉడుగడ్డి:—లోతునీటిలోనైనను బెరుగగలదు. వర్షములు లేనిచోట నేలసంట్లు కొనియుండును. కాడ బల్లపరువుగా నుండును. అంతమంచిదిగాదు.

చిప్పర:—దీనిని పశువులు బాగుగాతినను. ఎక్కువగా మొరకనేలలందును, బీళ్లలోను పెరుగుచుండును. ఈ మేర దివ్యమైన ఆహారము. పాడిపశువులు తినిన నెక్కువగా పాలిచ్చును.

చిప్పబూర గడ్డి:—నాలుగైదు అడుగుల ఎత్తువరకు నీటిలో పెరుగును. ఇది నీటిమీద లేలచుండును. గింజలు తెలుపుగానుండును. అంత మంచి మేరగాదు.

తొండంగి:—అవలు ననువుగానుండును. కాడలు ఎరువుగానుండును. గట్లమీదను, దొంకలమీదను పెరుగును. చాల రుచిగానుండును. పశువులు చక్కగా దినను. ఎక్కువగా తినచుండినయెడల వాతముకలుగును.

చెంగలిగడ్డి:—నేలమీద బ్రాహ్మను. అవలు చిన్నవిగానుండును. అంచులవద్ద మెత్తనినూగుండును. ఈ గడ్డి పశువులప మిగులయిష్టము. జబ్బుచేయును.

దున్నేవాడు లెక్కచూస్తే; నాగలిహడా మిగలదు.

దర్శకడి:— అడగు మొదలు మాడగుల యెత్తువరకు బెరుగును. ఇదియును పశువులకు మంచిగడ్డియైయున్నది. దీని నన్న కాడలను బ్రాహ్మణకార్యములందు నుపయోగింతురు.

చీపురుగడి:— రాత్రి ప్రదేశములందు బెరుగును కాడ రేగు మాడగుల యెత్తు బెరుగును. దీని ముండ్ల దీనికి నిర్మలములు. కాని ఈ గడ్డి ముగ్గురములు శుభ్రము చేయుటకు చీపురుకట్టలుగా కట్టి యుపయోగించుదురు.

ఉడుతలోకగడి:— ఈ గడ్డి బీళ్లలోను, కొండప్రదేశములలోను బెరుగును. ఆకులు మెండుగానుండును. పశువులు బాగుగా తినును.

గునుగుగడి:— ఇదియును మంచిమేసయే బీళ్లలో నెక్కువగా పెరుగును.

గలగడి:— ఈ గడ్డికూడ చిట్టడవులలోను, బీళ్లలోను వృద్ధిపొందును. ఇదికూడ పశువులకు మంచి ఆహారము.

కుంకగడి:— నీటిలో పెరుగుదు గడ్డికి పెట్టవీరగ లేదుగడ్డిని పశువులు బాగుగా తినును. రుచిగానుండును.

కొండకెట్టిగడి:— కొండల మీదను, చిన్న గుట్టలమీదను పెరుగును. మేకలు గొట్టెలు విస్తాముగ దినును.

కంఘణీగడి:— రేడగుల యెత్తుబెరుగును. ఆకులు బిరుసుగా నుండును. ఈగడ్డి అంత శ్రేష్ఠమైనది గాదు.

కూతికగడి:— పెద్దపెద్ద కాలువల గట్లమీదను, బీళ్లలోను పెరుగును. పశువులకు శ్రేష్ఠమైనది.

కావురుగడి:— నూగాని పొలములలోను, తదితర స్థలములందును ఈగడ్డి పెరుగును. పశువులు బాగుగా దినును.

ఎడ్డిగడి:— దీనికొనలు పలకలుగానుండును. అంత శ్రేష్ఠమైనది గాదు.

గొడ్డుకుంక:— ఈగడ్డి వగరుగా నుండును. గేదెలు దున్నలు మాత్రము కొంచెముగ దినును.

తెగడకుంక:— నీడ తడియున్న ప్రదేశములందు బెరుగును. అన్ని పశువులు మిగుల ప్రీతితో దినును.

వరిగ, చోడిగడి:— మృగపుర నుండును. మిగుల బలముకలిగిండును. వరిగడ్డి కంటె మిగుల సారవంతమైనది.

గరికిగడ్డి :—సారవంతములగు భూములలో ఈగడ్డి మొలచును. ఈగడ్డి మంచి బలము కలుగజేయును. పాడి పశువులకు మేసిన వెన్న యెక్కువగును. రోగపశువులకు పథ్యముగా పెట్టవచ్చును.

గంజెచొప్ప :—ఇదియును పెట్టకలే. ఈచొప్పను అంతగా పశువులు తివవు గాని ఈగంజెల జావపెట్టిన పాలెక్కువ పొచ్చును.

తున్నక్కాయలు :—ఈకాయలు జీగ గువ తిగి సదాగ్రముండును. ఈపదార్థము చాల బలవంతమైనది. వేసవోకాయలలో ఈకాయలను మేసిన మంచి సత్తువనిచ్చి కండ బట్టును.

కాడజాతులు

తోటకూర :—తోటకూర కొన్నిటి ఎరువులగుగల కాడలుండును. ఇదియే ఎట్టతోటకూర. కొన్నిటి కాడలు పొడవు గలవైతను. ఇవి గుత్తునూడ బెరుగును. ఈకాయలు పశువులకు మిగుల బలవంతమగును.

చింకతోటకూర :—తోటకూరవలెనే యుండును. చిన్న గుబురుమొక్కలుగా నుండును. మనుష్యులు అరుగుగా కూను వండ కొందురు. ఈ కూరకూడ పశువులకు మంచి ఆహారమైయున్నది.

ముళ్ళతోటకూర :—వర్షాకాలములో విశేషముగా బెరుగును. దీనికి ఆకులువడ ముడ్డుగలవు. పాడిపశువులకు పెట్టి పాలెక్కువచేయును. పశువులకు కలుగు కాలి నొప్పులకు యెటులైనా దీనిని తిన్నచేత తిరిగి వేరే చి రెండుకూడ కట్టు కట్టిన తగును.

కొయ్యతోటకూర :—కొంచె మిండు మిండుగ గలచింతోటకూరవలె నుండును. ఈమొక్కలు దానికంటె కొంచెము చిన్నవి. దీనిని కూరవండకొందురు. పశువులకు పెట్టిన బాగుగా బలియును.

పొన్నగంటికూర :—ఆకు లొక్కొక్క చోట రెండు రెండన్నవి. దీనినికూడ కూరవండకొందురు. శతవులు ఈకూలు బాగుగా తినును.

బచ్చలికాడ :—ఈకాడ ఆహార కండగలిగి యుండును. పశువులకు పెట్టిన మిగుల సత్తువ గలుగును.

బొబ్బరికాడ :—దీనికి రెండుకాయలు గలవు. ఈ కాడను వర్షాకాలములో బాగుగా మేరుదురు. వర్షాకాలముకంటె శీతాకాలము మేసిన కాడబలముగలదిగా నుండును వెన్నుమొరిగిన తరువాత మేసిన మంచిది. లేతది మేసినయెడల బలముగలుగ జేయక మూత్ర మధికిముగా పోయును. కాకిగొయ్యలు తిందును.


సెసరకాడ :—వరిచేల గట్లమీదను మాగానిచేలు కొత్తకొనిన తరువాతను సెసర విత్తనము వేయుదురు.

అనపకాడ :—ఈ కాడయందు ఒక విధమైన నువాసన గలదు. పశువులకు పెట్టిన బలము గలిగించును.

మినపకాడ :—ఈకాడ పశువులకు శీతకాలములో పెట్టిన మంచిబలము గలుగ జేయును. వాతముగల పశువులకు పెట్టరాదు. అట్లు పెట్టినయెడల పక్షవాతమును గలుగ జేయును.

ఉలవకాడ :—ఈ మొక్కలువేసిన రెండు నెలలలోనే పెంపొందును. వరి కొత్తలైన తరువాత మాగానిచేలలోను మెట్టచేలలోను వేయుదురు. ముదరపండ మేసిన యెడల వగరుగానుండి పశువులుతినవు. పైన చెప్పిన కాడలన్నియు కాయలుకొవి ముదరనిచ్చిన తరువాత మేసిన మంచిబలము గలుగ జేయును. దీనిని ఎండబెట్టి వరిగడ్డి, జొన్నచొప్పవలె మేసినను మేపవచ్చును.

వీలి సెసర :—ఇది పశువులకు మంచి యాహారమేగాని పశువులు అంత విస్తార ముగాతినన అంత విషముగ పనిచేయును. వరాకాలములో తినిన పశువులకు వేసవి కాలములోను, వేసవికాలములో మేసిన పశువులకు వరాకాలములోను వారికోగములు శీత్రకోగములు తప్పుకలుగును. కాబట్టి ఈ పై ఆహారపదార్థములు తినినంత కాలము ఉప్పుగాని తెలికపిండిగాని అప్పుడప్పుడు పెట్టుట మంచిది. ఈ మేతను అప్పు డప్పుడు పెట్టుట మంచిదిగాని వరుసగా మేపుట అంత మంచిదిగాదని నాయభిప్రాయము.



బండి ఎద్దు అమ్మినవాని బ్రతుకు బండ్లయిన నమ్మండి.

ప శు జా తు లు

అ యి ద వ భా గ ము

ఆ ణో తు ,

ఆలయంబు ముందరా వృషభేంద్రుండు
నలసి పండుకొనియు హాయిగాను
నెమరు వేయుచుండి నిడువాల మాడించు
వాలకంబు నందివలెనుదోచు.

వీధినడుమ నెమరువేయుచు నిలుచున్న
యాములెద్దు నెంతో యాదరమున
ముట్టెబట్టియాపు మూపురంబు గదల్చు
బిరుదులెల్ల దువ్వు బిల్గుంపు.

భీతి జనియింపజేసెడి భాతిబరుగు
వరుగునంబోయి యారచ్చబడ్డ చెంత
గరక కుమారులందఱం గలియరాచు
కొనుచు బనవన్న గోకించుకొనుచు నుండె.

పనర మడ్డమువచ్చియుండిన బైబల్ దమకింపకే
బునలగొట్టక కాలుదువ్వక పూన్నితో దలగల్పకే
మనలుచుండెను బోటుగి త్రలమధ్య మేతలమేయుచుగా
బనవ డెల్లరి కూర్చి పేర్మికి బాత్తుడై తనరారుచుగా.

బునకొట్టక తలయావక
పసివారలు దువ్వ మోరపైకెక్కుచు దా
మనలెను బసిబిడ్డని గతి
బనవడుకాలంబు చుట్టుపక్కల మెలయగా.

అచ్చుగ్రుద్దినట్టు లాములెద్దునుబోలి
 కోడెమాడలెన్నో కోర్కెలురల
 దొడ్డిదొడ్డియందు దులదూగుచుండంగ
 గడు ముదంబుసెందె కరకాళి.

“పల్లెటూరు”

ప్రాచీనకాలమున గృహమేధుఁడుగల చుపట పశువులపదయేగాని భవసంపద గాదని చెలువుటలో నతిశయోక్తిలేదు. ఇట్టిదీనిని గూడ ఆ భవశయిలో గూడ నిట్టి పేరుగలదు. ఎంత సామాన్య సంసారియైనను పశువుల పాడి మామకైన పశుయింట నుంచి పోషించుమాడ నుండెను. కాబట్టియు పశువైద్యము పాడిశువును గృహలంకారము అను లోకోక్తి ఏర్పడినది. పసిపిల్లయు పోషించు లేనియులు యిల్లుకొదనియే పలువురు తలంచుచుందురు. ఈ కీతిగా మామపు పశువులమీను అని నాభావ సంబంధ మేర్పడియున్నది. పశువులు పృథ్వీపంబున జన్మించి సకాలిమాసాహారముల నపేక్షింపవు. అతిసులభముగ మచ్చిమురుచు. చక్కని పెంచుడిన గోవుపథిముల నుండరాకృతు లత్థంతిహాసములై యలరారుచు నును.

గోభక్తి అత్యంతము ప్రబలిత కణముననే ఆబోతులను దివ్యాంగ మొనరించి స్వేచ్ఛగా వదలుపదతి యేర్పడినది. వృషభములు బాగుగాపె చి చక్రాంగీక మొనర్చి పదతివేసెదరు. అట్టి వృషభము లొందసాములు గావు. గ్రామసులందరును వానిని పరమభక్తితో చూచుచు వానికి గ్రాసమిడుచు చురు. అవి స్వేచ్ఛగా గ్రామవీధులలోను పొలములలోను సంచరించుచు మేయుచుండును. ఇష్టమువచ్చిన యింటిగుప్పుముకడ నిలిచినంతనే గృహలక్ష్మి అతిధి సేవ యొనరి చుండుటలే యీ ఆబోతుల గూడ నావార పాసియాదులను భక్తిపూర్వకముగా నొసంగి పంపుచుండును. వాని నారగించి ఆ వృషభ రాజము మందగ మనముతో వెదికిపోవుచుండును. ఆ కాలమంతయు మారి అట్టి ఆబోతులను యములనుకొని ఈ గ్రామములొని కీవీడ ఎగురువచ్చినదిరా ! యని వినుగు విరామములతోనే ద్వేషపూర్వకములు అచ్చటచ్చటను న్నారని చెప్పుటకు నాకున్గరుడున్నది. పూర్వము గ్రామసులందరుగాని నాలుగైదు గ్రామములు కలసిగాని సంప్రదించి వృషభ రాజమున పేరులెట్టి ఎట్టిప్రదేశములందు మేసినను, ఎంతినవృషభునిను సహించి చక్కగా తర్ఫీదుచేసి చక్కని సాంప్రదాయముగల కోడెలను ఆవులదారా సంపాదించుకొనెడి వారు. ఇప్పుడాపదతియంతయుపోయి, ఏ ముసలమ్మయో, పిల్లికిచ్చిముచ్చటని ఏ మామ కాలో, ఎన్నో మాటలుచేయించి గ్రామపెద్దనని పేరుపొందిన ఏ దుష్టరైతునకో, సరి యగు సాంప్రదాయ లక్షణాలు తెలిసికొనవలెండ దొరికిన కితలెల్లతెచ్చి వారి పేర్లతో ఆబోతులను అచ్చవేయుట మొదలుపెట్టివారు. ఇట్లుచేయుటవలన సరియయిన శ్రద్ధభక్తిలేక వాటిని సరిగా పోషించక జాతియంత నిర్వీర్యమై చొక్కలుదించుకొని కృత్రిమ గోవుపథములెన్నియున్నచో పరిశీలించిన మన హృదయము నిరవ్యకతపుడు.

అంతమేరకు గోదావరితీతము సరిపోతుంది.

అమృతమహాజాతి (Amrutamahala Breed)

మైసూరులోనున్న జాతులన్నిటిలోను ఈ జాతియే ప్రసిద్ధికెక్కినది. ఈ జాతిని మూడుభాగములుగా విభజించ వచ్చును. హళికర్, హగల్వాపీ, చిత్రాలదుర్గఅనునవి. ఆయాజిల్లాలనుండి వచ్చినవిగాన ఆయాపేర్లువచ్చినవి. మనదేశములో ఏ జాతియెచ్చట నున్నను వెంటనే గుర్తించవచ్చును. ప్రస్తుతిముఠాన్న అమృతమహాజాతి కలగలవుగా నున్నది.

పూర్వము హల్బీకాగృహము గొల్లజాతి ఉత్తరదిక్కుననుండి దక్షిణభాగమునకు వచ్చి చిత్రాలదుర్గలోను, తూంకూరులోను, తిరుజాతి పశువులతో నివాసమేర్పరచుకొనిరి. ఈ పశుజాతినే అమృతమహాజాతియందురు.

ఓద్యయదుప్రభువు - మైదరాల్

పూర్వము తత్ప్రక్కేక ప్రభువులలో నొకడగు శేవరాజు ఒడయాల్ అను ప్రభువు పశువులయందుడు అసక్తిచే, ప్రత్యేకముగా వాటినికొక పశువులకొట్టము నిర్మించెను. ఇంకను వాని యభివృద్ధినిగూర్చి మిగుల జాగ్రత్తతోను డెడినాడు. వానిపాలు మున్నగు నవి గృహనిర్వాహకులు నుపయోగించుకొను చుండెడివారు. ఈ పశువులను పెంచుట కూడ రాజకీయములలో నొక ముఖ్య సమస్యయైయున్నది. మొట్టమొదట పశువులకు ముద్రవేయుట ప్రారంభించినది ఈ ప్రభువే - ఈ రాజుపేరే ప్రత్యేకముగా బ్రాహ్మలు చెక్కించి ముద్రించెడివాడట.

మైసూరు రాజ్యము బలవంతముగ మైదరాల్ వశపరచుకొనినపుడు ఆప్రభుత్వము యొక్క శ్రేష్ఠమైన పశుసంతతినిగూడ గైకొనెను. అట్లుగైకొన్న పశువులలో ముఖ్యమైనవి చిత్రాలదుర్గలోని పాలెగారననవి. మైదరాల్ రాజ్యసంబంధ విషయములలో యుద్ధసమయములందు తమపశువులనుగూడ నుపయోగించెను. తనరాజ్యములో 60 వేల ఎద్దులను తయారుచేయించెను. కాని ఈ ప్రభువు ఆపశువులయందంత శ్రద్ధసహింపలేదు. తుమారుడు టిప్పునుల్తాను మాత్రము ఈజాతిని తనకున్న పశువులతో చేర్చి తనతండ్రికిన్న మిగుల జాగ్రత్తతోకాపాడెను.

టిప్పునుల్తాను (Tippu Sultan)

చిక్కడేవర ఓద్యయదు ప్రభువు అమృతమహాజాతి పశువులకు పెట్టిన “భిన్ని చావది” అని పేరున బదులుగా టిప్పునుల్తాను “అమృత” అను పేరుగామార్చెను. టిప్పునుల్తాను, ఈ పశుసంతతినిగూర్చి మిగుల జాగ్రత్త తీసికొని ఒకప్రత్యేకసంస్థగా నేర్పరచెను. బ్రిటిషువారు మైసూరునకు ముఖ్యపట్నముగు శ్రీరంగపట్టణమున వశపరచుకొనిన తరువాతకూడ తద్విధమున అతిజాగ్రత్తతో రక్షించిరి. అమిల్దారులు, ఉద్యోగ

పశువుల కాచేవాడు పాటుకు ఆక్రమకరాడు.

గనులు, చిన్నికోడెలనభివృద్ధికి దెచ్చుటయు, బాగ్రత్తగా పెంచుటయు వారియొక్క విధిగానుండెడిది. ఆకోడెమాడలు ప్రభుత్వ కాసప్రకారము ఎట్టిపంటలోనైనను స్వేచ్ఛగా విహరించుటకు స్వతంత్రమియ్యబడెను.

వ్యవభములు మూడుభాగములుగ విభజింపబడెను

1. దుక్కిపెద్దులు
2. యుద్దసమయములందు తుపాకులు, మరఫిరంగులు మొయుఎద్దులు
3. విలాసార్థమైయుంచబడినయెద్దులు

ప్రతిసంవత్సరము పశుసంతతిగూర్చి సంవత్సరపు లెక్కలు రాజకీయముగ ప్రకటింపబడుచుండెడివి. టిప్పసుల్తాను ప్రభువైయున్న కాలమున తాను స్వయముగ పశువులను ఆయాల్లెక్కలను పరీక్షించి పశుసంతానము నభివృద్ధి పరచెను. ఈరీతిగా చిక్కదేవరాజు ఓడ్డయిర్ ప్రభువుతో 'ఉన్నతదశకువచ్చిన పశువులే ఈ అమృత మహల్ జాతియైయున్నవి. ఇట్టి సుప్రసిద్ధజాతి పశువుల సహాయము వలననే హైదరాల్ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వముమీదికి యుద్ధమునకు పోవుసమయమున నూరుమైళ్ళ దూరమున రెండుదినములలో తన యుద్ధసామగ్రినంతను గొనిపోజాలెను. హైదరాల్ పశువుల సహాయముచేతనే తాను ఓడిపోయినపుడెల్ల శత్రుముఖమునుండి తన యుద్ధసామగ్రిని ఆతిత్సరితముగా శత్రువులకందవండ లొలగించెడివాడు. ఇట్టిపశుసంతతిని బ్రిటిష్ ప్రభువులు హైదరాల్ తనయుడగు టిప్పసుల్తాను నోడించి తాము వశపరచుకొనినపుడు వారి యొక్క ప్రసిద్ధిని గొప్పతనమునుగూర్చి ఆశ్చర్యమొందిరి.

కెప్టెన్ డేవిడ్సన్ (Captain Davidson)

బ్రిటిష్ సేనానియగు కెప్టెన్ డేవిడ్సన్ ఈ జాతిపశువులను గూర్చి ఈవిధముగా పోగడెను:—

బొంబాయిసేనల ననుసరించి అఫ్ గన్ సాసమునకు బోయినపుడు మైసూరు సేనలో బోయిన 230 మైసూరెద్దులతో సమాసముగ యుద్ధసామగ్రిని ఈడ్చుకొని పోగలిగిన ఎద్దులు మరి యే సేనవెంటగూడలేవు. అట్లున్నను సాటిరావు. ఈసేనలు అఫ్ గన్ సాసమునుండి, మరల తిరిగి వచ్చుచు బొంబాయి పార్కులో విడిచినపుడు ఆప్రదేశము ఆసరిసరప్రాంతములుగూడ ప్రఖ్యాతివహించిన ఎద్దులను చూచుటకువచ్చిన జనులతో క్రిక్కిరిసిపోయెను. ఈ ఎద్దులు విశ్రాంతిలేక 16 గంటలు వరుసగా మెడమీద కాడితీయవండ బరువులాగెను. బెంగాలుసేనలో ఉన్నటువంటియు, ప్రభుత్వ సాత్తయి నటువంటియు ఎద్దులుచాలనున్నను మైసూరెద్దులంత అందమైనవి బలమైనవి ఓర్పుగలిగినవిగా నుండవు.

బావిత్రిందరున్ని బ్రతికినవాడు; చేనిత్రిందరున్ని చడినవాడు లేడు.

విల్లింగ్డన్ ప్రభువు, మైసూరుకమిషనర్ (Lord Willingdon)

కొన్నికొన్ని యితర దిగ్విజయములు ప్రత్యేకముగా అమృతమహల్ జాతి సహాయము వలననే కలిగినవి. ఆయిప్పుములో జరిగిన ద్వీపకల్ప యుద్ధసమయమునందు ఇంగ్లీషుసేనానియగు విల్లింగ్డన్ ప్రభువు యీక్రింది విధముగాచెప్పెను:—

ఈసమయమునందు నాకు అమృతమహల్ వశవులసహాయమున్న యెడల శత్రు బాగుండునోయని పశ్చాత్తాపపడెను.

మైసూరుకమిషనర్ 1808 వ సం॥ లో ఈరీతిగాచెప్పెను:—

అమృతమహల్ జాతి పశువులు మిక్కిలి చురుకుదనము బలముకలిగి సేవలకన్న అతి త్వరితముగా నడువ శక్తిగలిగియుండెడివి. అశేచియా గుఱ్ఱములు తదితరజాతి గుఱ్ఱముల కంటె ఎంతయునతవహించినవో, అట్లే అమృతమహల్ పశువులు అన్ని జాతులకంటె అగ్రస్థానము వహించినవి. మైసూరు ముఖ్యపట్టణమగు శ్రీరంగపట్టణము బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ వశమైనపుడు వారాసంతతిని వశపరచుకొనిరనియు, వీన్సుట రమకుకావలసినపుడు కొన్ని ఎద్దులను సహాయము చేయుచుగతుమీద ఆపశువులను మైసూరుమహారాజునకు వశపరచిరి. టిప్పునుల్తాను బ్రిటిష్ ప్రభువుల వశమైనప్పటికంటె ఆ పశుసంతతిని ప్రత్యేక జాగ్రత్తతో చూచి యుద్ధసమయమునందు వానిసహాయముమీద కొంతఆధారపడియుండిరి. తరువాత బ్రిటిష్ అధికారమందున్నపుడు పశువులయభివృద్ధికై నియమింపబడిన యుద్యోగులు వాని శత్రు జాగ్రత్తగా చూడనందున ప్రాముఖ్యత తగ్గిపోయినది. తత్కారణమున అంగ్లేయు ప్రభుత్వపుఆశలన్నియు నిరాశలాయెను. ఆకారణమువలన ఈ జాతిపశువులు రానురాను క్షీణింపబడుచు పడమూడుసంవత్సరములకు వాటియొక్క ప్రాముఖ్యతతూర్తిగానకించెను.

మైసూరుప్రభుత్వము (Mysore Government)

ఈజాతి పశువులు 1818 వ సం॥లో మైసూరుప్రభుత్వమువారు బీళ్లతోసహా మదరాసు సేనయొక్క భోజన సామగ్రిని జాగ్రత్తపెట్టెడు డిటోగన్లుడగు కెప్టెన్ హార్వేగారి వశము నొనర్చిరి. అప్పుడా సముదాయము పదిసంవత్సరములలోనే మిగుల జాగ్రత్తనీకొనుటవలన రెట్టింపుపశువులాయెను. 1840 వ సంవత్సరములో మైసూరు మహారాజుపశువుల గుంపులను వానికేరెండిన బీళ్లను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమునకు కేరెండిన అజేజాతి పశుసముదాయమును కలిపి మైసూరు కమిషనర్ వారి స్వాధీనమాయెను. 1860 వ సంవత్సరములో మైసూరుప్రభుత్వప్రతినిధి యజ్ఞవలన ఆపశువు యందజాగ్రత్త ప్రబలుటయు మీదుమిక్కిలి వానిని అమ్మికేయుటయు గూడగలిగెను. తరువాత వారికే అపనిచేయుట తప్పుగాకనబడెను. వానినమ్ముటవలన ఫలితము ప్రజాసామాన్యమునకు ప్రభుత్వమునకుగూడ మిక్కిలి నష్టముగలిగెను. తరువాత మైసూరుమహారాజు సహాయము చేత పశుసంతానాభివృద్ధినిగూర్చి మిక్కిలి జాగ్రత్తపడెను. మరల కొంతభవము మెచ్చించి

పల్లం దున్నినవాడు పల్లకెక్కినవాడు ఒకటే.

అమృత మహల్ జాతి ఎద్దులను ఆవులను మైసూరు దేశమంతయు వినుగు విరామములేక వెదకి వానిలో శ్రేష్టమైనవి మాత్రము తీసికొని ఆజాతిన పెంపొందింప మొదలిడెను.

మద్రాసు ప్రభుత్వము

అదేసమయమునందు మద్రాసు ప్రభుత్వముకూడ కన్ను తెరిచి కొంత భనము హెచ్చించి మంచి సాంప్రదాయములగు 4000, ఆవులను 100 శ్రేష్టమైన కొడెలను 1870 వ సం॥లో కొనిరి. 1833 వ సం॥లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము ఈ పశువుల నన్నిటిని మైసూరు మహారాజునకు 2 లక్షల 25 వేల రూపాయలకమ్మిరి. మైసూరు మహారాజు వానియందుండు ప్రీతిచే అదేసమయముగ నెంచి, వానివలయుధనము హెచ్చించి, తగిన శ్రద్ధనుజూపి వానియభివృద్ధికి మిక్కిలి పాటుపడెను. తుదకీజాతిన పూర్వజాతి పశువుల సీతకిగూడ లేకలిగెను. పశుశాలలను గూర్చి కొన్ని ప్రస్తకములను పెట్టి వానిలో పశువుల నన్నిటిని గూర్చి విపులముగా వ్రాయబడెను. వానికిగూడ జననమరణములు అరిజాగ్ర త్తగా వ్రాయబడినప్రతి నెలరిపోర్టును ప్రకటింపబడివారు. పశువుల మేపువారి ఆజాగ్రత్త, వారి దొంగలెక్కులు జాగ్రత్తగా పరీశీలించుచుండెడివారు. మద్రాసు ప్రభుత్వమునకు ప్రతిసంవత్సరము ఈజాతినండి మైసూరు ప్రభుత్వమువారు 200 ఎద్దులను మాత్రమిచ్చెడి వారు. ఇతరులెవరైన ఆజాతి పశువులు కావలెనని కొరినయెడల మైసూరు, బెంగళూరు ప్రభుత్వ సేనాధికారుల ఆమెమతితో బడి సేడివారు. ఒక్కొక్క పశువు ఖరీదు నూరు రూపాయలుండెడివి. మైసూరు ప్రభుత్వమువారే దేశములో అరికకి వ్యవసాయము సంధించి నపుడు తమ పశువులను స్వీకరింప సంవత్సరముల తరువాత మైసూరు మహారాజు మరల వానియభివృద్ధికి గడంగెను. కొంతమంది ప్రత్యేక కొద్దోగ్గులు మైసూరు దేశమంతయు తిరిగి ప్రత్యేకముగ అమృత మహల్ జాతికి చెందిన ఆవులను, ఎద్దులను కొనుటకు నియమింపబడిరి. కాని వారు అట్లుగాక ఆజాతిలోనే కొన్నిరకములగు హార్బీకర్, చిత్రాల దుర్గు, హగల్ వడి, మొదలగు అన్నిరకపు పశువులనుకలిపి కొనుటవలస మంచిజాతి పశువులు దొరకుట కష్టమయ్యెను.

1) అమృత మహల్ జాతి (Amritamahar)

ఈజాతి పశువులు కొత్త మనుష్యులను చూచినపుడు కొపించి మీదకు దూకును. వానిని సాధుత్వములోనికి దెచ్చుటకు కొన్ని మాసములు పట్టును. వానిని మచ్చికజేసి కొనుటకు కొన్నిదినములవరకు ఆహారము పెట్టక పోయినయెడల అతిబలహీన సీతకివచ్చి చెప్పినట్లునును. వానిచే యెప్పుడును మంచిబరువులను లాగించుచు బాగుగాపనిచేయుచు చుండినట్లేగాని అవి అంకటరావు. ఆవులకూడ ఎద్దులంత ప్రశస్తమైనవికావు. కారణ మేమన అవి అంతగా పాలిచ్చునవికావు. అయిదు పాలువానిదూడలకే చాలును. కానిగృహ కృత్యములకంతమాత్రముపనికిరాజాలవు. మంచిఆవు పూటకు నేరుపాలుయిచ్చును. పాలు మాత్రము అతిశ్రేష్టముగను, తీవ్రగ నుండును. మైసూరుజిల్లాలోనున్న ఈ జాతి పశువులు

గ్రుడ్డియెద్దు చేనిలోబడి తన నోటికందిన చెల్లె తినును.

తొలికాన్ను ఆరుసంవత్సరముల వయస్సున యినును. చూడలను పగటివేళ స్వేచ్ఛగా వానికలులదగ్గరనే వదలిపెట్టి రాత్రిపూట మాత్రము ప్రత్యేకముగనుంచి కాపాడుదురు. వానికి చూడుమాసములు వచ్చినతరువాత మిద్దిలి జాగ్రత్తగా పెంచుచు మంచినుంచి బీళ్ళలోనికి వదలిపెట్టుదురు.

అమృతమహర్జాతి లక్షణములు

తల: —పొడవుగానుండి శరీరమున కందమునిచ్చుచుండును. రోషవంతములై, పొరుషముగ, నలుపుగ, చిన్నవిగ, ఉబికియుండుకన్నులుగలిగి, చెవులు నిక్కబొడుచు కొనియుండును.

కొమ్ములు:—పలుచగ, అందముగ, పొడవుగనుండును.

మూపురము:—బలముగ, అందముగ, పొడవుగ, మంచితకారముగనుండును.

గంగడోలు:—పలుచగ పొట్టిగనుండి వెడల్పుకొమ్ము, బలముగల భుజములు, బలముగ గుండ్రముగనుండు ప్రక్కటెముకలుకలిగియుండును.

తోక:—మందములేక, పొట్టిగా నన్నముగ నుండవలెను.

కాళ్ళు:—చక్కగా నమరి బలిష్ఠములై యినుపముక్కలా యనునట్లుండును. కాళ్ళలోని ఎముకలు మందముగానుండును. చీలమండవ వెనుకభాగమున వెంట్రుకలుండెడు ఉబ్బెత్తుభాగము పొట్టిగానుండును. చిన్నవిగ, మందముగ, నుండు డెక్కలుండును. కొమ్ములు, డెక్కలు మాతిభాగముల చర్మమునలుపుగానుండును.

చర్మము:—పలుచగా, ఒకవిధమగుపట్టువలె, పొట్టిగ, మృదువుగ, నుండు బొచ్చుకలిగియుండును. పశువుఅన్నివిధముల ఆరోగ్యకరముగ, మంచిగుణములు కలదిగా నుండును.

మైసూరుజాతి (Mysore Breed)

ఈజాతికి, ఒంగోలుజాతికిని దగ్గరపాలిక యుండును. మైసూరుజాతిని ప్రతి పల్లెటూరు రైతులును సర్దాకొరకు వసులకొరకు తెప్పించుచుండురు. ఈ పశువులను చూచుటకు అన్ని దేశములనుండి ప్రతిసంవత్సరము జరుగు మైసూరు మహారాజావారి దసరాయుత్సవములకు బోవుచుండురు. ఈ పశువులు చిన్నవిగను పలువిధ రంగుల తోడను యుండును. వ్యవసాయదారులు ఈ పశువులవివాదనే ఆధారపడియుండురు.

మైసూరుజాతిని “నాతుదాన” యని ఆయా ప్రాంతములవారు పిలుచుదురు. రెండవజాతిని “దద్దోదాన” యని యందురు. అనగా పెద్ద పశువనియర్థము. కాని ఇవి అంత యెక్కువగా దొరకవు. అట్లు దొరికినను యెక్కువఖరీదుండును. “దద్దోదాన”

గ్రుడ్డివాడు అవుతోకబట్టుకొని నడచినట్లు.

“నాతుదాన” యనునవి మైసూరుపదములు. దద్దోదనా పశువు అమృతమహల్, హట్టి కర్, చిత్రాలదుర్గ, అనుకాండి, మహారాజేంద్రవరైత్త అను యితర పశుజాతులవలె నుండును.

ఈ పశువులు భనికులవదను, పెద్ద రైతులవద్దను కనబడును. కొంతమంది రైతులు ఈ పశువర్తకము మీదనే జీవింతురు. చాలామంది రైతులు ఆవులమందలను పశుసంతతి కొరకు కొండలమీదకు, తదితర ప్రాంతములకు తోలుకొనిపోయి మేపుచుందురు. ఒక సంవత్సర ప్రాంతపు చూడలను రైతులు ఆహారముగా విడిచి అతిజాగ్రత్తతో రెండు మూడు సంవత్సరముల వరకు మేపి మంచి భిక్షుల కిస్తురు. దద్దోదనా అను జాతి ఎద్దులలో శ్రేష్ఠమైనవానిని కొన్నిటిని పిడికొని తమ యింటివద్దనే యుంచి బాగుగ మేపుదురు ఇంకను పంటలమీదకు, బీడు గ్రామములలోనికి, గోవుల మందలలోనికి తోలి జాగ్రత్తగా మేపి ఆబోతులుగా తమూరుచేసి వానిని మిక్కిలి పవిత్రవంతములుగా జూచుచుందురు.


౩. దద్దోదనా జాతి (Daddodana Breed)

ఈజాతి చూడలను బాల్యము నుండే రైతులు తదితర పశువులనుండి విడిచిసి అమ్ముదురు. ఇవి సామాన్యముగా ఎక్కువబలముగలిగి మంచి బుద్ధిగలవిగ నుండును. ఈజాతి ఆబోతుల సంత బలియునట్లుగా మేపరు. గ్రామములలోనే అన్ని పశువులను ఆబోతులను కలిపి మేతవతోలుటచేతి కల్గిసంతతి పుట్టును. ఒక్కొక్కప్పుడు రెండు మూడు గ్రామాలవారు చందాలు పన్నాలుచేసి చిన్నదిగను, మంచి లక్షణములుకలదిగ నుండు కొడెచూడను కొనెదరు. అది గ్రామధనమై గ్రామములందరకు చేరినదై యుండును. దీనిని పంటపొలము లన్నిటికి వదలిపెట్టుదురు. ఆపశువు స్వేచ్ఛగా మేసి బాగుగా బలి సినతరువాత ఆవులమీదకు వదలిపెట్టుదురు. దద్దోదనా సంతతి ఆవుల నింటివద్దనే యుంచి మేపుదురుగాన వానికి మంచి ఆబోతులను సమకూర్చి మంచి సంతతులు కలుగునట్లు చేయుదురు. ఆబోతులకు పృథ్వాప్యమురాగానే దాని స్థానమున మరియొక మంచిచూడను ఆబోతుగాజేసి విడచుదురు.

మైసూరుజాతి ఎద్దులు

అమృతమహల్ జాతి మైసూరుదేశములోనే యగుటవలన మనదేశమునందంతట ప్రసిద్ధికెక్కినవి. అన్ని జిల్లాలవారు నిప్పుడిప్పుడే ధనవంతులలో కొందరు స్వారి చేయుచుటకు, సర్దాకొరకు తీసికొని వచ్చుచున్నారు. ఇవి దూరప్రయాణములకు పనికి వచ్చును. దుక్కికి అంత మంచివిగావు. విశేషముగ ట్రపులు లాగలేవు. గాలిపంటు తగిలినపుడు జాగ్రత్తగా కాపాడవలెను.

మెసూరుజాతి లక్షణములు



మెసూరుజాతి ఎరు

కన్నులు :—సాధుత్వముగా, స్పష్టముగా కనపడును. రెప్పవెండ్రుకలు నలుపు రంగుగా నుండును.

చెవులు :—పొట్టిగా, వెడల్పుగ నుండి నిక్క బొడుచుకొని యుండును.

మాతి :—పొట్టిగా, అందముగా నుండును.

గంగడోలు :—విజృంభించియుండును.

మాపురము :—పెద్దదిగానుండును.

కొమ్ములు :—పెద్దవిగా, నునుపుగా నుండును.


కాళ్ళు :—సమచతురములొ నుండును. కాళ్ళెముకలు బల్లపరువుగా బలిష్ఠముగా నుండును.

శరీరము :—వెనుకభాగము పంగియుండి వికాలముగా నుండును. చర్మము అంతగా కదలదు.

రంగు :—తెలుపు లేక గోధుమరంగుగ నుండును. తల కాళ్ళు మెడభాగములు ఎక్కువరంగు గలిగియుండును.

గేదె పాలైసను ఆవుపాలు కొంచెము కలిపిసచో పవిత్రముగును.

౪. ఒంగోలుజాతి (Ongole Breed)



ఒంగోలుజాతి ఆబోతు


ఈజాతి పశువులుకూడ ఇండియాలోనే గాక పరదేశములలో గూడ ప్రఖ్యాతి జెందినవి. మొదట నెలూరుజిల్లాలోని ఉత్తరభాగపు తాలూకాలోనే ఈ పశువు లెక్కవగానుండెడివి. ప్రస్తుతము ఆ తాలూకాలు గుంటూరు జిల్లాలో చేరిపోయినవి. వ్యవసాయమే ప్రధానవృత్తిగా లేని దేశములలో గూడ పశువులను బాగ్రత్తగా పెంచుదురు. అందువలన రైతు లెక్కువగా నీ పశుసంతానాభివృద్ధికి తమకాలమును వ్యయపరచుచుండెడివారు. ప్రజలను బాగుగా కాపాడుచున్న ప్రభుత్వమున్నచోటికి పోయినారు కావుననుండెడివారు.

ఆ పశువులను పెంచువారు ప్రభుత్వోద్యోగుల వలన కష్టపట్టములను నెఱచి వారి బారినండి తప్పించుకొనుటకు తమ పశుసంతతిని ఒక ప్రదేశమునుండి మరియొక ప్రదేశమునకు మార్చుచుండెడివారు. వారత్యంత భాగ్యవంతులగుటచేత మిక్కిలి అందమైనటువంటి, ముసనీదమైనటువంటి పశువులను తమవద్ద నుంచుకొనుచుండెడివారు. తత్కారణముగ ఒంగోలు ప్రాంతములందు ఆ సంతతియొక్క నుంచిపశువులు ఇప్పటికి దొరుకును.

ఆశపడి నెల్లూరి తినినా రోగముపోలేదట.

కారుమంచి, నిడమానూరు, పొందూరు, జయవరం, టంగుటూరు, కరవడి మున్నగు గ్రామాలలో మిక్కిలి మంచిపశువులు దొరకును. మరియు వెలుపలపడను, నెన్నూరుపాడు, మానీతీరమునందున్న పల్లెటూళ్ళలోను కందుకూరు తాలూకాలోను గూడ నీజాతిలోని ప్రసిద్ధమైన పశువులు దొరుకును. దగ్గరమాగాని ప్రదేశములలో నుండు నెలూరు దక్షిణభాగములో పశువులు బహు తక్కువజాతివి. అంతియేగాక ఆయా ప్రదేశములవారు ప్రైవేట్ ప్రదేశములవారివలె గాక పశువులయందంత జాగ్రత్త పహించక వానికి సరియగు పశుపోషణకూడ చేయరు.

ఆవులు



ఒంగోలుజాతి ఆవు

ఒంగోలుజాతి ఆవులయొక్క పాలను దూడలకే వదలిపెట్టుదురు. మూడు నాలుగు మాసముల ప్రాయమువచ్చిన తరువాత ఆ దూడలకు పచ్చిగడ్డిగాని, శులవ గుగ్గిళ్ళనుగాని చిట్టు వస్త్రాలనుగాని మేపుదురు. అవి ఇంటిలోని పిల్లలవలె గారాబముగా పెరుగుచుండును. ఆయా ప్రదేశములకు పోయి చూడవలెననిన అవి బయటకు రావు. ఆయా చైతులు తమ యిండ్లలోనే యుంచి మేపుదురు. ఈ రీతిగా పెంచి ఎక్కువ ఖరీదుల కమ్మెదరు. పాడివిలువనుబట్టి ఆవును అమ్ముదురు. ఆయావునుండి

మేక ఎంతబలసినా నోక బెల్లెడె.

చాలానేతిని తయారుచేసి వర్తకులకు అమ్ముదురు. రైతులు మాత్రము తక్కువగ వాడుకొనుచు నేతిని అమ్ముకొనుచుందురు. మంచిలపు 11 నుంచి 14 పానులవరకు పాల నిచ్చును. చూచుట కందముగానుండి కొనుగోనునా యన్నట్లు కనపడుచుండును.

ఎద్దులు బరువులులాగుట

ఒంగోలుజాతి ఎద్దులు మైసూరుజాతి యంత అందముగ నుండకపోయినను, అంతవేగముగ నడువకపోయినను ఎక్కువ బరువులు లాగుటలో నెప్పునిగా లాగినప్పు టికి అన్నిజాతుల పశువులను మించి అగ్ర సానము వహించును. వానిని ప్రత్యేకముగా బరవులలాగుటకే ఉపయోగించుచుందురు. చెన్నపట్టణములో అయిదుటన్నుల వరకు బరువుగల సామానులను ఇవిలాగుట గాననగును. ప్రశస్తమైన పశుసంతతి ఇచ్చుట గలుగుటకు కారణము అచటనుండు బీళ్ళేయైయున్నవి.

1857 వ సంవత్సరమునకు ముందుకూడ వీనిమీద పన్ను వేసిరి. నెల్లూరులో మాత్రము వేయలేదు. సాగుచేయుటకు భూములలో నూటికి 30 వ ఎంతు యింతరభూమిని ప్రత్యేకముగా బీళ్ళకు వగలిపెట్లు చుండెడినారు. ఆ బీళ్ళుగో ప్రతి గామమునకు పెంచుటకు హక్కుండెడిది. 1858 వ సంవత్సరము వగను పశుసంతానాభివృద్ధికి ఉత్సాహ మొనంగుటకు సాంవత్సరిక పశుప్రదర్శనములు జరుగుచుండెడివి. అవి 1871 వరకుకూడ జరుగుచునే వచ్చినవి. ఈ 12 సంవత్సరములలోను 18 వేల రూపాయలు పశుప్రదర్శనములలో బహుమానములుగా పంచిపెట్టబడెను.

గుంటూరు జిల్లాలో 1915 వ సం॥ నుంచి గుంటూరు సీమరైతుసంఘం (గోవాడ) సాపకులు శ్రీ ఆలపాటి నూర్యనారాయణగారు పశుప్రదర్శనా దర్శకత్వం వహించి నేటివరకు ప్రదర్శనముల నేటేట జరుపుచుండుటవలన మంచి సాంప్రదాయముగల పశుపోషణ నభివృద్ధికి వచ్చుచున్నదనుటకు సందియములేదు. ఇంకను లెనాలిలో జరుపు దేశోద్ధారక పశుప్రదర్శనము, చుండూరులో జరుపు ఆంధ్రరాష్ట్ర పశుప్రదర్శనముల వలనకూడ పశు సంతతి మున్నగు వృద్ధిలోనికి రాగలదు.

ఒంగోలుజాతి లక్షణములు

రతి :—అంత పెద్దదిగను, ఎక్కువ బరువుగను, యుండక దాదాపు శరీరమునకు రగినపరిమితిగా నుండవలెను.

ముఖము :—ఒకమాదిరి పొడవుగా నుండవలెను.

మాతి :—బాగుగాబలిసి మంచి వెడల్పుగల ముక్కురంధ్రములు కలిగియుండవలెను.

నొసలు :—బాగుగా, వెడల్పుగా నుండవలెను.

పొట్టెలు పొట్టెలు చెబ్బలాడగా మధ్య నక్కపడివచ్చినట్లు.

కన్నులు :—కోడిగ్రుడ్డు ఆకారముగలిగిన వికాలమగు కన్నులలో నలుపుగ్రుడ్డు కలిగియుండవలెను. కంటిచుట్టు అరంగుళము వెడల్పున నలుపురంగుల చర్మముండవలెను.

చెవులు :—సామాన్య పొడవుగానుండి వాలిపోవును.

కొమ్ములు :—పొట్టిగానుండి వెనుకకుగాని ముందునకుగాని తిరిగియుండవలెను. అవులలో కొమ్ములు పలువగానుండి పొడవుగానుండును. కొమ్ముల మొదటిలో పగులవు.

మొడ :—చిన్నదిగ, లావుగ, మందముగ నుండును.

మూపురము :—మంచి కండరముగలిగిన నలుపుగానుండును. అది ఒకవేళ ఒక ప్రక్కకు ఒరిగినను వడివైపునకేగాని ఎడమవైపునకు ఒరగదు. మూపురభాగమంత కండరములతో నిండియుండును.

శరీరము :—పెద్దదిగ, లావుగ, పొడవుగ నుండవలెను. మిక్కిలి శ్రేష్టమగు పశువుల టంగువారు మూపురమునకు వెనుకభాగమునకు 84 అంగుళము లుండవలెను. త్రిండినుండి ఎత్తు మూపురమునకు వెనుకభాగమున 36 అంగుళము లుండవలెను.

గంగడోలు :—కండరములతో నుండి, ముడుతలుపడి బొడ్డువరకు వ్యాపించి యుండును.

ఎదురొమ్ము :—లోతుగ, వెడల్పుగ నుండవలెను. రెండు ముంగాళ్ళమధ్య లోతుగా నుండవలెను. ప్రక్కపైముకలు పొడుగుగ, లోతుగనుండి రెండువైపుల సమానమైన ఎముకలు గలిగియుండవలెను.

వెన్ను :—సామాన్యమైన పొడవుగలిగి అందముగా నుండవలెను. వెన్నుభాగము పంగియుండవలెను.

తోక :—అడుగుభాగమున నన్నముగా నుండక మందముగా నుండవలెను. పొడవుగ అందముగ జూరుతో అలంకరింపబడి చివర తుచ్చవలె నుండవలెను. తోక యొక్క చివర మడిమితట తగులుచుండును.

గుదము :—తోకయొక్క వెనుకభాగము వెడల్పుగా నుండవలెను. పిట్టల మధ్యకు నుండవలెను. గుదము బాగుగా వెలుపలికుండినగాని పేడ శరీరమునకు అంటుకుండా సరిగాపడదు.

తోడలు :—కండరములుగలిగి బాగుగా వృద్ధిజేసి లోతుగా నుండవలెను.

కాళ్లు :—కొద్ది వంకరగానుండి బలముగా నుండవలెను. అంత పొడవుగా నుండరాదు. బలమైన పొడుగాటి భుజములుకలిగి యుండవలెను. మృదువుగ నుండక బలముగలిగి మొదలుగ నుండవలెను.

పశువులు తినవేయు నేనామును భయముతో పాలములో పైరువేయుట హానికట్లు.

పాదములు :— పాదపుగానుండి ఒకమాదిరి వృశువుగానుండును. చీలియుండవలెను.

ఎత్తు :— చాలా ఎత్తుగానుండును. మంచినయస్సు వచ్చినపుడు రీరి మొదలు 62 అంగుళముల ఎత్తువరకుండును. ఈ ఎత్తుభూమినుంచి మూపురమువరకు తెలిసికొనవలెను.

రంగు :— తెలుపు లేక బూడిదరంగుగాని లేక నలుపు తెలుపుగాని యుండును. మూపురము తెలుపుగానుండి మెడమీద అచ్చటచ్చట నలుపు లేక బూడిదవర్ణపు మచ్చలుండును. మూతి నలుపుగానుండును. మోకాళ్ళమీద, కీలమండలపు కొద్దిగా ప్రభాగమున వెనుక కాళ్ళమీద అచ్చటచ్చట నల్లని మచ్చలుండును.

కపిలియన్ జాతి (Capiliyan Breed)

కంభంలోని కపిలియన్ జాతి మనుష్యులు ఒకజాతి పశువులను పెంచుదురు. కపిలియన్ పెంచుటచేతనే ఈజాతి కీ పేరువచ్చినది. ఈజాతి కన్నడజాతివారి సంతతి యగుటచేత ఇప్పటికి కన్నడభాషలోనే మాట్లాడుచుండురు. అవి చిన్నవిగను, చురుకైనవి గను ఉండును. మిక్కిలి ఓర్పుతో బండ్లులాగును. ఆజాతి మనుష్యులు ఆయా ప్రాంతములను వచ్చినపుడు తమవెంట నా పశువులను తీసికొనివచ్చితిమని చెప్పుదురు. ఆజాతి పశువులను వారు పవిత్రపంక్తి మైనవని అర్థమువచ్చు ఒకపదముచే పిలుచుదురు.

ఆవులనుండి పాలతీయరు. వాని సంతానాభివృద్ధికై పెంచుదురు. ఈజాతి పశు వేదైన చచ్చినయెడల దానిని పాతినేయుదురేగాని మాదిగవాని చర్మమునొలుచుకత్తి గురికానీయరు. ఆ పశుసమాహముతో నున్న పెద్దపశువును పశురాజము లేక పల్లెడుపశువు అని పిలుచుచుండురు. అది చనిపోయినపుడు దానిసానే మరియొకదానిని గొప్ప ఉత్సవముతో నాపదవికి నెలకొల్పుదురు. ఆ యుత్సవసమయమునందు ఆ పశుజాతి సమాహమంతయు ఒకచోట కల్పించబడియుండును. చెరకుగడ్డ మోపులను వాని ముందుంచి వాటిచుట్టును మూగియుండిన ఆజాతి మనుష్యులు ఆ పశుసమాహమములో నేది ముందుగా మట్టునోయని చూచుచుండురు. అట్లు మొదట సాహసించి ఆ చెరకుగడ్డలను తినుదూడను ఆ పశుసమాహమనను రాజుగాజేసి దానికి కంఠమపెట్టి పూలదండలతో నలంకరించుదురు. దీనినే నంద గోపాలస్వామి యందురు.

నంద గోపాలస్వామి

ఈ నందగోపాలస్వామి యను రాజునకు ఒక నౌకరుని ప్రత్యేకముగా నుండుచును. ఆ నౌకరునకు కొంతపాలము ఈనాముగా నిచ్చుదురు. అతనికి ఆ పశువు రాజుగా చేయకముందు జరుగు ఉత్సవములో అచ్చటివారందరను మిక్కిలి భక్తితో వేయు నగలు, రాగిడబ్బులు మున్నగు కానుకలన్నియు అతడే గ్రహించును. ఈ పశు

వేరలో పురుగుపట్టిన చెట్లంతయు చచ్చినట్లు.

రాజులు అనేకమైన అత్యాశ్చర్యమైన పనులుచేయును. అవిచేయు పనులనుగూర్చి ఇప్పటికిని అనేకమం దనేకరకముల కథలు చెప్పుకొనుచుండురు.

నేడిగాలిని వీల్చుటకై తాను రాజుగా చేయబడిన పశుసమానమును తోలుకొని పోవుటకు ముందు పంచదారను పాలను ఆ పశువుముందు పెట్టుదురు. ఆ పశువు లది త్రాగి తలయూపినయెడల వారుచేయుపనికి నొప్పుకొనినట్లు భావించి వారు దానిని తోలుకొనిపోవుదురు. దానిపోవుటకై వినియోగింపబడిన నౌకరు ఒక ప్రత్యేకపలము నకు జెందినవాడై యుండును. అతడు చనిపోయినయెడల మరల నాటలమువారినే యెన్నుకొనుచుండురు. ఆ నౌకరు తానొక పశురాజువలె సంచరించును. ఈ పశు రాజును ఎన్నుకొనిన తరువాత దాని చుట్టునున్నవారు చేయబోవు పూజకు ముందు ఒక బాలకునకు దైవసంబంధముగు శక్తిప్రాని యెవడు దానికి నౌకరుగా నుండవలెనో వానిని చూపించును.

ఈ కపిలయను జాతివారు ఆజాతి సభ్యుల అందరివద్దను వన్ను వేసి పదునొకండు వేల రూపాయలను ప్రోగుజేసి రాతితో గదులుగదులుగ నుండు ఒక పెద్దభవనమును కంభంలో నిర్మించి ఆ పవిత్రపంథముగు పశుజాతి నివసించుట కుపయోగించిరి. పశువుల వీళ్ళలో మేసినందులకు యితర పశువులకు పశువిధించునట్లు వానికిగూడ విధించిన యెడల సాక్షాద్భగవంతునే మానవునితో సమానముగా వారు తలంచుచుండురు.

౬ తంజావూరుజాతి (Tanjore Breed)

ఈజాతి పశువులు చెన్నరాజధానిలోనున్న అన్నిపశువుల కంటెను మిక్కిలి వ్యత్యాసముగ నుండును. కొర్రామేనున వాని కొమ్ములను కోసివేసినందున బ్రిటిష్ జాతి పశువులవలనే యుండును. తంజావూరు గృహములలో ప్రత్యేకముగా మేపబడిన ఆవులసంతతి యగు దూడలను వాని యజమానులై వానికి ఆరుమాసముల ప్రాయము వచ్చినపుడే కొమ్ములు కోసివేయుదురు. ఆ కోసివేయుటకు ఈక్రింది పద్ధతి ననుసరించుదురు.

కొన్నిటికి తోకవెండ్రుకలను తీసి వాటిని చెరుకురసముతోగాని లేక పంచ దారతోగాని కలిపి కొమ్ములపైన పూతపెట్టుదురు. అంతట యినుపకడ్డిని కాల్చి కొమ్ము పూర్తిగా కాలిపోవువరకు ఆకడ్డితో చుట్టును గీయుచుండురు. అటుల కొమ్ము పూర్తిగా నశించువరకు రెండు మూడు వారములు పట్టును. అటుల నొకసారి కాల్చిన తరువాత మరల వానిజన్మలో కొమ్ము లెంతమాత్రము పెరుగవు. తరువాత వాని చెవులను రెండంగుళములు కత్తిరించుదురు. అట్లు కొమ్ములను కాల్చినయెడల అవి మిక్కిలి పొగురుబోతులై మనుష్యులమీదకు వచ్చునని అపని చేయుదురు. అట్టిపని చేయుటవలన వాని సహజాకారమునందు పెద్దమార్పుగలిగి అవియొక క్రొత్తరకపు పశువులో యన్నట్లు

ఈగ ఎంతచక్కని శరీరముమీద వ్రాలినా రుచిచూచునది వుండులోని బాడమాత్రమే.

తోడును. ఆకొమ్మల విషయములో తిప్ప తక్కిన అన్నివిషయములలోను ఈ రంజా పూరు పశువులు కంగాయంజాతిని పోలియుండును.

రంజాపూరుజాతి లక్షణములు

తల :—పొట్టిగ నొసలు వుగియుండును.

కన్నులు :—చిత్రముగానుండి వుగియుండును.

చెవులు :—కత్తిరించయుండును, కొమ్ములుగడవు.

పాద :—పొట్టిగ, మందముగ నుండును.

వీపు :—ఎత్తుపల్లములులేక సరిసమానముగా నుండును. వీపువైపునకు పోనుపోను ఎత్తు పెరుగును.

తోక :—పొడవుగానుండి కొన్ని సమములందు నేలను తాకుచుండును.

కాళ్ళు :—పొట్టిగ, బలముగ నుండును. పాదములు చిన్నవిగ అందముగ గట్టిగ నుండును.

శరీరము :—దట్టముగ, రొమ్మెముకలు కట్టముగ నుండును.

మూపురము :—ఒకమాదిరి యభివృద్ధి జెనెయుండును.

గంగడోలు :—పలుచగానుండి రొమ్మెముకవలె వ్యాపించియుండును.


ఎత్తు :—మూపురము వెనుక 41 నుంచి 48 అంగుళములుండును.

౧ కంగాయంజాతి (Kangayam Breed)

ఈ జాతినే కోయంబత్తూరు జాతియందురు. ఈజాతి కంగనాడు, కాంగు, మరియు కంగాయం అని పిలువబడును. ఈపేరు కంగాయం తాలూకానుండి వచ్చినది. ఈ పశుసంతతి కోయంబత్తూరు దక్షిణభాగములో నెక్కవగా నుండును. ఇందులో పెద్ద చిన్నయని రెండురకములు గలవు. చిన్నజాతి కంగాయ లోను, ధరిపురంలోను, ఉదమల్ పేట, పొల్లాకిపల్లెడం, మరియు ఎకోడా తాలూకాలలో నెక్కవగా దొరుకును.

కంగాయంజాతి పశువులు శ్రేష్ఠమైనవి. ఆయా ప్రదేశవాసులు వానిని తమ భాగ్యములుగ జాతురు ఆ ప్రదేశమునం దచ్చటన్నట్ల ఒక్కొక్కరు 500 నుంచి 1000 పశువుల వరకు కలిగియుండురు. సామాన్యముగ ప్రతిరైతుడు 10 నుంచి 20 వరకు పశువులను ఆమ్మకమునకై తనయొద్ద నుంచుకొనును. ఈ పశువులు సంతలలో నేగాక తదితర జిల్లాలనుండి బేరగాండ్రువచ్చి వానిని ఖరీదునకు తీసికొని పోవుచు దురు. ఇవి దక్షిణ హిందూదేశమునకును సిలోనునకును ఎక్కవగా ఎగుమతి చేయబడుచున్నవి.

పుధినియందే ఓషధులిమిడియున్నట్లు.



కంగాయంజాతి ఆవు

ఇవి బలిష్ఠములై చురుకగు పశువులు. వీనిని పెంచుట చాలతక్కువ వ్యయమగును. ఆవులు మాత్రము పాలు నొసంగును.

పశువుల సంతలు

అవనాసి, మహాదేశ్వరకొండ, మధుర మున్నగు ప్రాంతములలో ప్రతిసంవత్సరము పెట్టబడు పెద్ద పెద్ద సంతలలో ఈ పశువుల నమ్ముచుందురు. దక్షిణ జిల్లాలలో నమ్ముబడు పశువులసంత లంత మంచివిగావు. కంగాయం తాలూకాలవారు మంచి మంచి పశువులను పరదేశముల కెంతమాత్రము ఎగువతికేయరు. ఆ ప్రాంతములలో కొనువారు పెద్దపశువులను కొనక చిన్నదూడలనే కొని బాగుగా పెరిగియున్న బీళ్లలోనికి తోలుదురు. ఆట్రు మేపబడిన మంచిమంచి ఎద్దులజతలు మధుర, తిరునల్వేలి జిల్లాలలో కంగాయం ప్రాంతములకన్న ఎక్కువగా కనబడును. గ్రామాలలోనున్న యితర పశువులతో సమానముగా ఈ ఎద్దులను మేపుదురు. గాని వారికొరకు ప్రత్యేక జాగ్రత్తవహింపదు. ప్రతిరైతుయొక్క పొలముచుట్టును (కోయంబత్తూరు జిల్లాలో మాత్రము) అలవలు అనగా దట్టమైన ఎత్తుగాకట్టుదురు. ఈ సరిహద్దులలోపలనే రైతు తన పశుసముదాయమునంతను నుంచుకొనును.

హోటాడేశోళ్లు బాదినా వెనుదీయవు.

కంగాయంతాతి లక్షణములు

తల :—పొట్టిగ నొసలు వికాలముగనుండును.

కన్నులు :—ప్రకాశవంతముగ, నలుపుగ నుండును.

చెవులు :—పొట్టిగ నిక్కబొడుచుకొని యుండును.

కొమ్మలు :—పొట్టిగ, గట్టిగ, వెడల్పుగ నుండి మొసలు చివర్లు లేలియుండును.
ఇంకను పెద్దజాతిలో కొమ్మలు బాగుగా పొడవుగా నుండును.

మెడ :—పొట్టిగ, లావుగ, మందముగ నుండును.

మూపురము :—బాగుగా కండగలిగి పెరుగునదిగా నుండవలెను.

గంగడోలు :—మందముగానుండి రొమ్మెముకవరకు వ్యాపించి యుండును.
సన్నముగ పొట్టనంటువరకు ప్రలాడుచుండును.

శరీరము :—దట్టముగానుండి, మంచి ఎముకలు గలిగియుండును.

వీపు :—పొట్టిగ, వెడల్పుగ, ఎత్తుపల్లములులేక సరిగానుండును.

తోక :—పొడవుగ కుచ్చు వెండ్రుకలుగల్గి పెద్దదిగనుండును. అప్పుడప్పుడు నేలకు తాకుచుండును.

కాళ్ళు :—పొట్టిగ బలముగలిగి, మంచి ఎముకలుగలిగి యుండును. పాదములు చిన్నవిగ, పొట్టివిగ, గట్టిగనుండును.

రంగు :—ఎద్దులు బూడిదరంగుగానుండును. దట్టమైన బూడిదరంగు తలమీద, మెడమీద, మూపురముమీద నుండును. అవులలో చాలభాగము తెలుపుగానుండును. నాలుగు మోకాళ్ళమీద బూడిదరంగు మచ్చలుండును.

ఎత్తు :—మూపురము వెనుకభాగమునుండి కొలిచినయెడల 44 శేక 48 అంగుళములవరకు నుండవలెను.

౯ మధురజాతి (Madhura Breed)

ఈ జాతినే పులికోలం లేక జెల్లికోట్, కిల్కోడ్, కిల్కోట్ యని యుండురు. ఈజాతి పశువులు చాలా చిన్నవి. మధురజిల్లాలో ఎక్కువగా నున్నవి. కంభం ప్రాంతములందు గూడ నివి చాలగాననగును. మధురదగ్గర అయ్యంగొట్టాయమం జక్కతారు అను పెద్ద ఒకడుగలడు. ఆతనికి వేయిపశువులు గలవు. వానిలో కొన్నిటిని 1907 వ సం॥ లో మధురయొద్ద జరిగిన పశుప్రదర్శనములో ప్రదర్శించెను. వానికున్న కోడెమాడలు చిన్నవి. అందు మిక్కిలి బలముగలవిగను, లావుగల కాళ్ళతోను, కఠినమైన పాదములతోను ఒప్పుచుండెను. భుజములు మెడ మొదలగు భాగములు మిక్కిలి శక్తివంతములైయుండి ఎటువంటి పనులకైనను బలముగలిగియుండెడివి.

తేలు మాడిమోనీ పిల్లలుపుట్టిన వెంటనే చచ్చును.

ఆకాడె నొక్కొక్కదానిని నూరురూపాయలు చెప్పెను. కాని ఆరకపు పశువులు 95 లేక 50 రూపాయలకంటె నెక్కువ చేయనేలేదు. ఈజాతి పశువులు తదితర పశువులకంటె పరిమాణములో చిన్నవిగాని పనియందు మాత్రము చురుకుదనము గలిగి ఓర్పుతో నుండును.

పందెములు (Races)

మధుర పరిసరప్రాంతపు గ్రామములలో ఈ చిన్న కొడెలను పందెములకొరకై ప్రత్యేకముగా కొంతమంది రైతులు మేపుదురు. పందెములు జరుగునపుడు మిక్కిలి ముదురురంగుగల గుడ్డు కొమ్ములనుండి క్రిందివరకు కప్పదురు. పోట్లాటలు ఈ క్రింది విధముగా నుండును.

ఒక రంగుగుడ్డును కొడె కొమ్ములచుట్టును గట్టిగచుట్టి స్వేచ్ఛగా వదలిపెట్టుదురు. దానినటు వదలిపెట్టినతరువాత పలువురు మనుష్యులు పట్టుకొని పడవేసి దాని వెనుక కాళ్ళ రెంటిని ఆగుడ్డుతో కట్టుదురు. ఇట్టిని జరిగినపుడు పశువు ఒక్కొక్కపుడు విజృంభించుటచేత మనుష్యులకు గాయములు తగులుటయేగాక మరణములుకూడ సంభవించును. అంత ఆపాయమైనఆట నందరూ ప్రేమించుదురు. ఇట్టి పశువులను యజమాని ఇతర పశువులతో మేపక తానే స్వయముగా మేపుచుండును. తత్కారణమున ఇతరులను ఆ పశువు చూచినయెడల మీదటదూకి పొడచును.

మధురజాతి లక్షణములు

తల :—ముఖము సామాన్యపాడవుగా నుండి అందముగ నునువుగ నుండవలెను.

నొసలు :—వికాలముగ నుండవలెను.

కొమ్ములు :—వంగింతుకొని వెనుకభాగమునకు వంగరలుతిరిగి నన్నని యొసలు చేరి యుండవలెను.

చెవులు :—నిక్కబొడుచుకొని పొట్టిగ నిడువుగ నుండవలెను.

మెడ :—లావుగ పొట్టిగ నుండవలెను.

మూపురము :—పెరుగునదిగా నుండవలెను.

శరీరము :—బలముగలిగి మంచి ప్రక్కటెముకలతో కూడియుండవలెను.

వీపు :—వికాలముగ పొట్టిగ నుండి నడుము భాగమునకు రొమ్ముభాగమునకు మధ్య ఎత్తుగా నుండవలెను. తోకపాడవుగ, వెండ్రుకలకుచ్చుగలవిగ నుండవలెను.

గంగడోలు :—నన్నముగ పఱచగనుండి రొమ్ముభాగమువరకే వ్రేలాడుచుండవలెను.

ఒక ఆవునకు నాలుగు, ఆరు దూడలు పుట్టుటకలదు.

కొమ్మ :—బలముగ పట్టివిగ ఒకదానితో నొకటి కొట్టుకొనకుండ విడిగ నుండవలెను.

రంగు :—సామాన్యముగా బూడిద రంగుగ లేక తెలుపుగ నుండవలెనుగాని తదితర రంగులతో కలసియుండరాదు.

౧ గుంసూరుజాతి (Gunsoor Breed)

గంజాంజిల్లాప ఉత్తరభాగమునందు చూత్రము ఈజాతి పశువులు కనపడును. ఇవి మిక్కిలి చురుకుదనముగలిగి పనిచేయును. బాడ్లొంగుట కెక్కువగా నుపయోగింతురు. గుంసూరు తాలూకాలోను ఆ యా ప్రాంతములందును పచ్చికబయళ్ళెక్కువగానుండును. కాని అవి యెంత మేనినను తదితర పశువులతో సమానములుగావు.

లక్షణములు

తల :—చిన్నదిగ, చదునుగల ముఖముగలిగి యుండవలెను.

నోసలు :—వెడల్పుగ, నేత్రములు విశాలముగ నుండవలెను.

కొమ్మలు :—లోపలికి గాని, ముందునకు గాని వంగియుండవలెను.

మూపురము :—బాగుగా పెరిగియుండవలెను.

శరీరము :—చతురముగా, చిట్టముగా, మంచి రొమ్మొకటిగలిగి, మంచి బలమైన నడుముగలిగి యుండవలెను.

గంగడోలు :—పలుచగా రొమ్మొకవరుస వ్యాపించియుండవలెను.

తోక :—శీలమండలను దాసుచు ఆ గదుగా కొరదావలెనుగది చివరవెండ్రుకల వచ్చుండవలెను.

పాదములు :—అందముగా గట్టిగా నుండవలెను.

రంగు :—పలుచగానుండు బూడిదరంగు. కలిగి యుండునుగాని అన్నిరంగుల పశువులకూడ నుండును.

ఎత్తు :—మూపురము వెనుక భాగమున 42 నుంచి 46 అంగుళముల ఎత్తువరకుండును.


౨ బ్రాహ్మణజాతి (Brahmana Breed)

బ్రాహ్మణ పశువుయొక్క సాంప్రదాయము ఈవిధముగ నుండునని చెప్పవచ్చును. పూర్వముక హిందూరాజా ప్రయాణముచేయుచు మార్గమధ్యమున అపారత్రతో చూడ బడుచున్న కోడెదూడల గుంపునుజూచి సాక్షాత్తు భగవంతుడగు శివునియొక్క వాచన

ఆవుకడుపులో దూడతప్పదారిలోనున్న సూత్రమునుపయోగించి తీయును.

ఈజాతి పశువులు సింధుదేశమునందలి కరాచి, హైదరాబాదు పట్టణములందును సింధునది లోయలోను విస్తారముగా గాననగును. ఇండియాలోని పశుజాతులలో నిది మిక్కిలి స్వచ్ఛమైనట్టియు ప్రత్యేక ఉత్పాదములు గలిగినట్టియు జాతులలో నొకటి.

ఈ దేశమునగల పాడిపశువుల జాతులలోనిది విస్తారముగా లభించుచున్నది. సింధుదేశమున ఈజాతి పశువులు పాడికేగాక పొలుపకుకూడ ననుకూలించును. ఎద్దులు తదితరజాతులంత చురుకైనవి గాకపోయినను నిలుకడగా పనిచేయును. కరాచీకి వెలుపల నిది పాడిజాతిగనే పరిగణింపబడుచున్నది. అపనికే దీనిని యభివృద్ధి చేయదగియున్నది. అనేక శతాబ్దములనుండి ఈ పశువులు పెరుగుచుండిన ప్రదేశమున కితర ప్రదేశములతో సంబంధము లేకుండుటచేతనే ఈ పశుజాతి యంత స్వచ్ఛముగనున్నదని చెప్పవచ్చును. వాని నివాసస్థానమునుండి తదితరచోట్లకు దీసికొనిపోయి వివిధపరిస్థితుల యందుంచినను అలవాటుపడుట ఈజాతి మంచితక్షణము.



సింధుజాతి ఆవు

ఎ గు మ తి

ఇనుకవిదారిలో పుట్టి పెరిగినను ఈవారి పశువులు లేకునుండు రంగూనువంటి ప్రదేశములందుగాడ బాగుగా పెరుగుచున్నవి. స్వదేశమున నవి మేలకొరకు వెడడు

తెలిసి తెలియని పనులవేద్యంతో వైద్యము చేయించకు.

కొనవలసి యుండును. ఇప్పుడు సింధుజాతి పశువులు మెసపొటేమియా, బర్నా, ఫార్మోజా, బెలూచిస్థానము, పశ్చిమోత్తర సరిహద్దురాష్ట్రము, మోరీసు, బోర్నియా, సింహళము మొదలగు ప్రదేశముల కన్నిటికి ఎగుమతి యగుచున్నవి. మరియు నీదేశము నందలి మరి రోజులకి పశువులును ఇట్లు వివిధపరిస్థితుల కలవాటు పడగలవని చెప్పవలసికాదు.

అవి స్వతస్సిద్ధముగ కష్టమున కోర్పుట కలవాటుపడియున్నవి. అంటువ్యాధులు వాని కంతగాసోకవు. సింధుపశువులలో నితరలక్షణము లేనియు బలుపడకపోవుటచే నిది స్వచ్ఛమైనజాతిగ నెంచబడుచున్నది.

సింధుజాతి లక్షణములు

తల :—మరిచగను, నోసలు వెడల్పుగను, ఉన్నతముగను నుండును.

చెవులు :—పెద్దవిగనుండి కొంచెము చ్రాలియుండును.

కన్నులు :—పరిశుభ్రముగ, ఎడముగనుండును.

కొమ్మలు :—పరిమాణమునందును, వైఖరియందును పలువిధములుగ నుండును. కాని సామాన్యముగ మరచగ లావుగ నుండును.

శరీరము :—వెడల్పుగ మందముగ మరుచకాళ్ళపై నమర్చబడి యుండును.

గంగడోలు :—బొడ్డును వ్రేలాడుచుండును. రొమ్ము వెడల్పుగనుండును.

మాపురము :—మధ్య పరిమాణముగలిగి యుండును.

తోక :—పొడవుగ నల్లని పుచ్చుగలిగి అందముగ నుండును.

పొడుగు :—కొంచెము కండగలిగి వ్రేలాడుచుండును.

చన్నులు :—పెద్దవిగనుండి సమముగ నమర్చబడియుండును.

ఎముకలు :—బలముగనుండును. చర్మము పలుచగనుండి. రోమములు మృదువుగ నుండును.

తూకము :—అవులు ఎద్దులుకూడ మధ్యపరిమాణము, తానికయుగలిగియుండును.

ఆకారము :—వదిమట్టమైన ఆకారమును అందముగ గలిగియుండును.

12 నాగపూరుజాతి (Nagapur Breed)

ఈజాతి ఢిల్లీప్రాంతము నుంచి లేబడెను. నాగపూరు ఉత్తర హిందూస్థానములయందక్కడక్కడగూడ గలదు. చూపులకు బలహీనముగా నుండును. గుట్ట మంతవడిగా పరుగెత్తగలవు. ఈజాతి ఆవులు చాల మచ్చికగలవిగా నుండును. ధన

అన్నివ్యాధులకు వాళ్ళువేసే పశువైద్యుని దూరముగాకొట్టు.

వంతులు ఈజాతి ఎడను బండ్లుకట్టి సర్దాగా పిక్కార్లు చేయుచుందురు. వీని రెండు కొమ్మలమధ్య ఉచ్చెత్తుగానుండును. తోక పొడుగుగానుండి వచ్చు నలుపురంగుల వెండ్రుకలతో గుబురుగానుండును. మూపురము ఎత్తుగానుండి అందముగా నుండును. ఇవి 66 అంగుళముల యెత్తువరకు పెరుగును.

13 పంజాబుజాతి (Punjab Breed)

వీనినే షహివల్ జాతి లేక మాంటాగోమెరిజాతి యందురు. ఇవి పంజాబులో వుట్టి అమృతసర్, లైలాపూర్, లాహోర్, కానెవల్, మధ్యలోను పెంచబడుచున్నవి. ఈజాతి పశువులు హిందూదేశములో నున్న జాతులకంటె చాల వన్నెకెక్కినవి. ఇచ్చటనుండు జాతి 1911 వ సం॥లో కర్నల్ మెంటస్ వలన సాపింపబడి పోషింప బడుచున్నవి. ఈతను మిలిటరీ ఫారములన్నిటిలోను పరీక్షించి తెప్పించెడివాడు. 1912 వ సంవత్సరములో ఈ పశువులుమేయు ప్రాంతములందు కాలవలు కొలతలు త్రవ్వబడి పశువుల కనుకూలములేకుండజేసి గోధుమలు, ప్రత్తివిత్తులు, మొదలగునవి పండించుట మొదలిడిరి. ఈ జాతిని పోషించుటవగాను కొంతమంది రైతులకు పంజాబు గవర్నమెంటువారు కొన్నిభూముల నిచ్చిరి.

ఈజాతి ఆవులు బాగుగా పాలిచ్చును. ఒక్కొక్క ఈతకు 7, 10, 16 వేల పానుల పాలిచ్చెడివి. ఒక్కొక్క ఈతకు 270 దినములవరకు సరాసరితెక్క చూడగా పాలిచ్చెడి మంచిఆవు 4500 పానుల పాలిచ్చెడివి. గిత్తలను రెండున్నర లేక మూడు సంవత్సరములమధ్య పనులు చేయించెడివారు. ఆవు నాలుగు సంవత్సరములలో నిచ్చెడి పాలు మంచివని చెప్పుదురు.

ల డ్డ జ ము లు

తల :—కురుచగ, నొసలు వెడల్పుగ ఉన్నతమగునుండి కొంచెము ముందుకు వచ్చియుండును.

కన్నులు :—శుభ్రముగ, ఎడముగ నుండును.

మాతి :—వెడల్పుగ చెవులు పెద్దవిగ నుండి కొంచెము వ్రాలియుండును.

మొడ :—పొట్టిగ నుండును.

కొమ్మలు :—పరిమాణమునందును, వైఖరియందును పరివిధములుగ నుండును. కాని సామాన్య కురచగ, మందముగ నుండును.

శరీరము :—చిన్నదిగ, వెడల్పుగ, మందముగ, కురచకాళ్లపై నమర్చబడి యుండును. వికాళముగల ఎదురొమ్ము గలిగియుండును.

బూటకపు పశుపైద్యుల మాటల నమ్మకు.

గంగడోలు :—కండరములుగలిగి మడతలు మడతలుగా నుండి బొడ్డును ప్రేలాడుచుండును.

మూత్రరము :—మధ్య పరిమాణముగలిగి యుండును.

లోక :—పొడవుగనుండి వెండ్రుకలకువచ్చు నేలకుతాకునట్లు అందముగనుండును.

పొడుగు :—కొంచెము కండగలిగి ప్రేలాడుచుండును. ఎముకలు బలముగ నుండును. చన్నులు పెద్దవిగ సమానముగ నుండవలెను.

కాళ్ళు :—పొట్టిగ, బలముగనుండును. పాదములు చిన్నవిగ నుండును.

అకారము :—పొదిమట్టపై ఆకారము, అందము కలిగియుండును.

రంగు :—ఎరుపు లేక నలుపు ఎరుపు కలసినిగా నుండవలెను. అందముగ న్నరువును వెండ్రుకలుకలవిగా నుండును.

ఆవులపొడుగు, చనుమొంతులు పెద్దవిగానుండును. ఆవుల వయస్సులో పెద్దవైన కొలది పొడుగు ఊగులాడుచుండును.

౧౪ తార్పార్కర్ జాతి (Tarparkar Breed)

ఇవి సింధుప్రాంతములందున్నవి. షహివల్ జాతితో కొంచెము పోలియున్నను సింధుజాతికన్నను కొంచెము పెద్దవిగ నుండును. ఈజాతి మిగుల సాధువైనది. బూడిద, తెలుపురంగు కలిగియుండును. 750 నుంచి 950 పౌనుల తూకముగలిగి యుండును. ఎద్దులు బరువులులాగును. రెండున్నర సంవత్సరముల వయస్సువచ్చినది తగాయతు పని చేయించుదురు. ఈనిక తరువాత పాలనిచ్చుకొఱము 270 దినములవరకుండును. ఒక్క ఈతకు 260 నుంచి 350 పౌనులపాలవరకు నిచ్చును. ఈతకు మధ్య 100 దినములు వట్టిపోవును.

లక్షణములు

తల :—పొట్టిగ ముఖమునిడువుగ నుండి కండ బాగుగానుండును.

చెవులు :—నిడువుగనుండును.

కొమ్మలు :—పొట్టిగ దృఢముగనుండును.

వీపు :—తిన్నగా వెడల్పుగా నుండును.

పిరుదులు :—ఏటవాలుగ లోక నేలనుఅనుకొని అందముగ వుచ్చుగలిగి యుండును.

పొడుగు :—ఈభాగము చక్కని పాలనరములుగలిగి చన్నులు సరియగుసానములలో నమరియుండి అందముగానుండును.

, గిరిజాతి (Bombay Breed)

ఈజాతి నే గిరిజాతిలేక కలియవార్జాతి అనియందురు. ఈజాతి పశువులు రాజాపుటానాలో పశ్చిమభాగముందును, బొంబాయి రాజధానిలో ఉత్తరప్రాంతము లందును, పంజాబునకు దక్షిణభాగములోను కూడ యున్నవి. ఈ ప్రాంతములందు వచ్చికబయ్యలు ఎక్కువగా నున్నవి. ఈజాతి మిగుల పొడవుముగలది. క్రూరవృగముల చేష్టలు గలిగియుండుటచేత రైతులు వీనిని తమ యుండవగ్గరనుంచి చాలా జాగ్రత్తగా మేవుదురు. మంచి ఆబోతుతో సంపర్కము చేయించినచో ఆవులు మంచి సంతతిగలిగి పాలెక్కువనిచ్చును. ఈజాతిలో నాలుగైదు ఆబోతులుచేరి భయంకరము లగు సింహములనుకూడ చంపును. పూర్వము ఈజాతి ఆబోతులు యుద్ధములయందు పయోగింపబడెడివి. దినమునకు 30 పానులు పాలుంబుచ్చెడి ఆవు అంబాలిడెరీ ఘారంలో గలదు. కలియవార్జాతిలో ఈజాతిని ముఖ్యముగా పోషించుదురు. కాంక్రిజాతి గుజరాతీలోను, ఆహమ్మదాబాదునకు మధ్యగా 50 మైళ్ళ పట్టుప్రక్కలలోనున్న ప్రదేశములలోను గలవు. ఈజాతి హుబ్బజాతిని పోలియుండును. ఇవి బరువులులాగుటకు పయోగించును. తెలుపు, బూడిదరంగు గలిగియుండును. ఈజాతి పరిశ్రమకు, వ్యవసాయమునకు ప్రఖ్యాతిజెందినవి.

గిరిజాతి లక్షణములు

చెవులు:—ఈజాతి పశువులకు చెవులు మిగుల పొడవుగానుండి వంగియుండును. స్వచ్ఛమైనజాతి పశువుల చెవులు ముడుదుకొనిన ఆవసరెతుండునని చెప్పదురు. ఈ పశువుల చెవుల లోపలిభాగము ఎల్లప్పుడు పైకి కనపడుచుండును.

ముఖము:—ఈజాతి పశువులలో ముఖ్యముగా ఎద్దులకు నిర్దుష్టమైన ఎముకతో గూడిన నొసలుచే కన్నులు కప్పబడియుండుటవలన ముఖము నిద్రనుత్తువోనున్నట్లగపడును. ఈపశువు నోటిభాగము సామాన్యముగ వెడల్పు గలిగియుండును. కన్నుల దిగువభాగము నుంచి ముఖము ఉండవలసిన దానికన్న సన్నముగ శుభ్రముగ నుండును. తల ముడుతిలుపడి చివర ఆవసరె వ్రేబాడురు లోపలిభాగము పైకి కనపడుచుండును.

వెన్ను:—బలిష్ఠముగను, నూటిగను నుండును. కాని వృద్ధాప్యము వచ్చిన పశువులవీవు వంగియుండును. ఈజాతి పశువులయందు లొంటిఎముక ఇతరజాతి పశువులకన్న నిర్దుష్టముగా నుండును.

తోక:—పొడవుగానుండి కుచ్చతో దాదాపు నేలనుతాకును కొరడావలె నుండును.

చర్మము:—అందముగా మృదువుగా నుండును. జాగ్రత్తగా పెంచని పశువు చర్మము మృదువుగా నుండదు.

ఇంగ్లీషు మందులైనా ఆయుర్వేద మందులైనా గుణము కనిపెట్టి వాడుము.

రంగు :—దాదాపు ఎకపుంగుగా నుండును. స్వచ్ఛమగుజాతి పశువులకు శరీర మంతయు రంగుగలిగి యుండును. ఇంకను రంగులలో మచ్చలుకూడ యుండును.

మెడ :—సామాన్యమగు పొడవుగలిగి నన్నముగానుండును. ఈజాతి పశువులు తలను పైకెత్తి యుంచును.

మూపుగము :—పెద్దదిగానుండి ఎరుగను భును.

గొండోలు :—ఎక్కువగా నున్నవి. వక సామాన్య పొడవుగలిగియుండును.

శోమ్యులు :—మూలమై. నొసలుగలిగి వెనుకకు, బయటకు పొడుచుకొనివచ్చి తదుపరి పైకిపోయి లోపలికి వంకరితిగి చివరకొన ప్రశశములు వెనుకకు తిరిగి యుండును.

16 భగ్నారిజాతి (Bhagnari Breed)

ఈజాతి పుట్టుకొనను తెలుపుకొననులోని జకోబాబాద్ కు ఉత్తరముగా నున్న “భాగ్” రాజ్యమున్ను, సింధు గాఢ్య పరిసరములలోనున్న ప్రదేశములును నయ యున్నవి. ఈప్రాంతము వృక్షహీనమైన ప్రదేశముగానుండి శీతోష్ణసింధుయందు విప రీతమగు మార్పులు కలిగి యుండును. ఇచ్చట వ్యవసాయము “వారీ” నది పడలమూల ముగా జరుగుచుండును. ఇచ్చట వ్యవసాయకాలము చాల తక్కువగుటచే నీటిని నద్దిన యొగ పరచుకొనుటకై పాలములకు ఎత్తుగానుండు గట్టులను నేయుదురు. ఈ గట్టుపైన పశువులకు పుష్టినిష్కల గడ్డిని పెంచుదురు. లేదా ధాన్యపుపైరు కంఠతోగాని, పశువు లకు ప్రత్యేకముగానేయు పైరుతోగాని పెంచెదరు. ఈజాతిలో రాండురకములు గలవు. (1) జకోబాబాద్ చుట్టును, వాగ్లోయలోను చిన్నజాతి భగ్నారిగలదు. (2) ఉత్తర ముగా వ్యాపించియున్న ఎరువవాగ్లో పెంచబడుచున్న పెద్దజాతి భగ్నారిపశువులు గలవు. ఈజాతి ఆవులు పాడికి పెట్టినదిపేరు.

లక్షణములు

తల :—ముఖము సామాన్యవెడల్పుగలిగి యుండును. ఈ పశువులు పొడవుగా నుండి బాగుగావంగిన క్రక్కెమకలతోను, బలమగు యెముకలతోను, కండరముల తోను యుండును.

మెడ :—పొడవుగానుండును. మరుచగా మొసలుచేరిన చెవులుండును. బలి వ్రుముగా ఏటవాలుగానుండు పుష్టములు, నిశాపుగానుండు వీపు కలిగియుండును.


శరీరము :—పొడవుగ, దట్టముగ నుండును; శరీరపురంగం తెలుపుగ లేక బూడిదగలగా నుండి మెడ, మూపుము, భుజములయందు ముదిరినరంగు దాదాపు తెలుపురంగుగా నుండును.

కాళ్లు :—ముగా పొడవుగా నుండును.

తోక :—పొడుగ్గాటి వచ్చుతో గురికాలునవను, భూమికిని సగమెత్తువరకు పెరిగియుండును.

17 హల్లికర్ జాతి (Hallikar Breed)

ఈజాతిపశువులు ముఖ్యముగా మైసూరువిస్థితులోని తుంకూరు, హస్సాన్ మరియు మైసూరుజిల్లాలోను పెంచబడుచున్నవి. ఈజాతిలో అనేకరకములుగలవు.



హల్లికర్ జాతి ఆవృతు

వీనిలో కొంచెము మార్పులరకపు పశువులు మైసూరు రాజ్యమునకటిలోను, ప్రక్కనన్న రాష్ట్రములోను, ఇంక కొన్ని ప్రదేశములందును దొరకును. ఇతరజాతులవలె వీనికి కొమ్ములే పూర్తిగుర్తు. ఉన్నతమగు నొసలే ఎక్కువ ఉన్నతమగు లక్షణము.

ల డ్ ణ ము లు

రల :—మంచి ఆకారముగానుండి నల్లని ముట్టెతో అంతయిందును. పొడవుగా నుండును.

నొసలు :—చుక్కలమున నాగటిచాలుమాదిరిగ నుండి దాని కిరుప్రక్కల ఉబికియుండును.

గురువుప పంక నామాలు పెట్టే పరమానంద శిష్యులు చాలానంది యున్నారు.

కొమ్ములు :—కీళ్ళనుంచి వెనుకకు తిరిగియుండును. అట్లు కొంతదూరముపోయి చివరకు సన్ననినూడులవలె అంత మొందును. ఆ చివరభాగము నలుపురంగుగా నుండును. అవి చివరనుంచి తలదగ్గరవరకు వచ్చునపుడు మంద మెక్కువగును. పశువు మేయు నప్పుడు దానికొమ్ములు మూపురముదగ్గర వరకు మెడను లాకును.

చెవులు :—పొట్టిగా నున్నితముగా నుండును.

గంగడోలు :—పలుచగానుండును. వెన్న పొడవుగానుండును.

దెక్కలు :—పలుచగా, చిన్నవిగా నుండును.

తోక :—నల్లనిపచ్చతో గుడికొల్లవరకు వ్రేలాడుచుండవలెను.

రంగు :—ముఖమునందును, గంగడోలు పైను, శరీరముయొక్క శ్రీదిభాగము నను లేతబూడిదరంగు నుచ్చలుండును.

౪౮ దేవరకోటజాతి (Devarakota Breed)

ఇండియా గవర్న మెంటువారు ఈమధ్యనే కృష్ణజిల్లాలో దేవరకోటపరగణా ప్రాంతములందుండు పశువులను పరిశోధించి దేవరకోట పశుజాతి గాని పేరుపెట్టిరి. చల్లపల్లి రాజాగారి ఎస్టేటులో ఇట్టి సాంప్రదాయముగలజాతి గలను. ఇటీవల బెజవాడలోజరిగిన ఆఖరిభారత పశుప్రదర్శనమువారు ఈజాతి పశువులను మంచి బహుమానములొసగిరి.

ఈజాతి పశువులకు ఎరుపురంగుమీద తెలుపునుచ్చలుగాని, నలుపురంగుమీద తెలుపునుచ్చలుగాని యుండి అన్నిలక్షణములు సరిగానుండవలెను.

౪౯ అలంబాడిజాతి (Alambadi Breed)

ఈజాతి కొండజాతి పశువులవలె నుండును. మైసూరుసేటునకు దగ్గరగానున్న మదరాసురాష్ట్రములోని ఉత్తర కోయంబత్తూరు జిల్లాలోను, ఉత్తర నేలంజిల్లాలోను కనపించును. మైసూరుజాతిని పోలియుండును. అరిణ్యములలో మేయును. ఈజాతి కోడెలను ఒక సంవత్సరము వయస్సులో పెద్ద ప్రదర్శనములలోపెట్టి కష్టపడి పనిచేయు ఎద్దులుగా తయారుచేసి రైతులకు అమ్ముదురు. కోడెలు చురుకుగాను, బలముగాను సాహసముగాను ఉండును. ఇవి బండిఁగుటకు మోటుపని చేయుటకు ప్రసిద్ధికెక్కినవి. ఇవి లాగుడునకుపయోగించుజాతి. ఈజాతి ఆవులుమాత్రము పాలసంతగా ఈయవు.

లక్షణములు

తల:—సామాన్యముగా నుండును. నొసలు అందముననుండును.

కొమ్ములు:—వెనుకకు తిరిగియుండును.

సారాశము లేలిసికోలేరుగాని విమర్శించటానికి మొనగాళ్లు.

చెవులు:—పొడవుగానుండి నిక్కబొడుచుకొని యుండును.

కన్నులు:—విశాలముగ, మృదువుగ నుండును.

మెడ:—పొట్టిగ, మందముగ నుండును.

శరీరము:—లోతుగ, ప్రక్కటెముకలు దట్టముగ, బలమైన భుజములు గలిగి యుండును.

వీపు:—అందముగ నుండును.

తోక:—పొడవుగ చివరవచ్చుగ నుండును.

కాలు:—పొట్టిగ మంచి బలముగలిగి యుండును.

పాదములు:—గట్టిగ పెద్దవిగ నుండును.

చర్మము:—నలుపుగ లేక గోధుమరంగుగా నుండును.

౭౦ బర్గర్ జాతి (Bargur Breed)

ఈజాతి పశువులు మద్రాసురాష్ట్రములోని కోయూర్తూరు జిల్లాలోని బర్గూరు కొండలలో విస్తారముగా నున్నవి. మైసూరుజాతిని పోలియుండును. కాని వానికన్న చిన్నవిగాను, ఎక్కువ సాంద్రముగాను యుండును. ఉబ్బిన నొసలు మైసూరుజాతి వలె స్పష్టముగా కనిపించవు. ఇవి చాలా అదముగా నుండును. ఇవి మూరజాతి యగుటవలన తగ్గీరుచేయుట చాలా కష్టము. ధైర్యములోను, శక్తిలోను, సాహసించుటలోను, కదలు త్రొక్కుటలోను, వెగములోను, ఉత్క్రిష్టమైనజాతి యందురు. ఈజాతి పశువులు ఎరువుగను, ఎరువులో తెలుపుగను, తెలుపులో ఎరువురంగుగను, తెలుపులో బూడిదరంగుగను యుండును. ఆవులు పాలసంతతిగా నిలువు.

లక్షణములు

తల:—అందముగా పొడవుగా ముట్టెవరకు వ్యాపించియుండును.

నొసలు:—ఉబ్బికియుండును.

కన్నులు:—చూచుటకు భయంకరముగా నుండును.

చెవులు:—ఒకమాదిరి పొడవుగానుండి నిక్కబొడుచుకొనియుండును.

మెడ:—పలుచగా మృదువుగానుండును.

గంగడోలు:—పలుచగా చిన్నదిగా నుండును.

శరీరము:—వంగి రొమ్మెముకలు దట్టముగా నుండును.

పాదములు:—దట్టముగ చిన్నవిగా నుండును.

రంగు:—తెలుపు, బూడిదరంగుగాని, ఎరుపు తెలుపు మచ్చలుగా గాని యుండును.


విద్యుత్ లేని వ్యవస్థను పశువైద్యానికి తీసికొనుటకు తగిన పాఠశాలలు మరొకటిలేదు.

౨. దోనిజాతి Deoni Breed)

నైజాం రాజ్యపు పశ్చిమమునను, పశ్చిమోత్తరమునను ఈజాతి పశువులు విరివిగా నున్నవి. బొంబాయిరాష్ట్రములోని ధన్విజాతిని పోలియుండును. ఎద్దులకు వ్యవసాయములో ఎక్కువ నేర్పరితనము గలదు. సాధారణముగా ఈజాతి కఠిమ వార్లో నున్న గిరిజాతిని కొంతనరకు పోలియుండును. నైజాం దేశపు ఆవులవలె ఈ జాతి ఆవులు పాలకు పేరు గాంచియున్నవి.

ధన్విజాతి (Dhanni Breed)

ఈజాతి పశ్చిమోత్తర రాష్ట్రములో ఆట్టక్, పంజాబులో జహిలమ్, రావల్ పిండి ప్రదేశములలో పెంచబడుచున్నది. పశువులు అంత పెద్దవికాక సామాన్యముగా నుండును. చురుకులోను, దున్నుటలోను, ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత వహించినవి ఈ పశు



ధన్విజాతి ఆబోతు

వులు వర్షములు విస్తారముగాలేని ప్రదేశములందు పెంచబడుటవలన ధాన్యపుపైరు కంపతోగాని, వీటికి ప్రత్యేకముగా వేయబడిన పైరుతోగాని మేపెదరు. ఆవులు మాత్రము పాడికి పనికిరావు.

చదువులేదు : పశువైద్యమంతా నాకే తెలుసు నంటాడు మా మూర్ఖ శిష్యుడు.

ల క్ష ణ ము లు

తల :—సామాన్యపాడవుగా నుండును. కొమ్ములు చిన్నవిగానుండి ఎత్తైన తలభాగమునుంచి ప్రక్కపైకి వంగియుండును.

చెవులు :—చిన్నవిగ, చురుకుగ నుండును.

మూపురము :—ఎద్దువలె తగినంత పెద్దదిగాలేని మూపురము ఎదురుగానుండును.


చర్మము :—వదులుగానుండక బిగువుగానుండును.

కొళ్ళు :—చక్కగానుండును.

శరీరము :—పశువునకు మించినపాడవు శరీరముగలిగి, పాడవుగల వెన్నుగలిగి యుండును. బాగుగా వంగిన ప్రక్కటెముకలుండును.

రంగు :—తెలుపు శరీరముపై నల్లని మచ్చలుగాని, ఎరుపు మచ్చలుగాని యుండును. ఈమచ్చలు కొన్ని పశువులయందు శరీరమంత సమానముగా నుండును. మరియు కొన్నిపశువుల శరీరమంతయు నల్లటి మచ్చలుండుటయే ముఖ్యలక్షణములు.

23 కిల్లారిజాతి (Killari Breed)



కిల్లారిజాతి ఆబోతు

నోరులేని పశువైద్యమంతా నాకే తెలుసని రైతులను మోసపుచ్చుట.

బొంబాయి రాష్ట్రపు దక్షిణభాగములోనున్న షోలాపూర్, సతారా జిల్లాలలో పెంచబడు కిల్లారిజాతి పశువులు ప్రసిద్ధిజెందియున్నవి. ఆవుత మహల్ జాతినుండి వుద్భవించినవ వాని యంత దట్టముగాగాని, చురుకుగాగాని, గుణములోగాని, మంచి ఎద్దులతో తులతూగ గలవిగాని వుండవు. ఉత్తర దేశమందలి బూడిద, తెలుపు పశువుల నెత్తురుకూడ వీరియందున్నది.

ఇవి కష్టపడి పరిచేయును. మేత కరవుగానున్నను ఓర్పుకొను స్వభావముగలవి. అవి నాగలిపనులకు, బండ్లుబాగుటకు, ప్రసిద్ధి జెందియున్నవి.

లక్షణములు

తల:—మైనూరు ఎద్దులవలె దట్టముగు తలయుండునుగాని అంత ప్రాముఖ్యముగ నుండదు. నోసలు సన్నముగానుండును.

కొమ్ములు:—తలపైభాగమునుండి పైకిపోవును.

గంగడోలు:—విస్తించి యుండును.

తోక:—గుడికాలునకు కొంచెము త్రిందవరకువచ్చి నల్లనివచ్చుతో వ్రలాడుచుండును.

౨౪ కృష్ణవెల్లిజాతి (Krishnavelly Breed)

కృష్ణానదీ తీరప్రదేశమునను, బొంబాయి రాష్ట్ర దక్షిణప్రాంతములందును, మైద రాబాదు స్ట్రీటునందును నల్లరేగడ భూములలోను ఈజాతి పశువులుండును. వీనిని రైతులు ధాన్యపు పైరుకంపలతోను, ప్రత్యేకముగా వేసిన పైరులతోను, మేపుదురు. ఎద్దులు మిగుల బలిష్ఠములుగ నుండి నెప్పునిగ లాగుడుపనులకును, నల్లరేగడభూములలో బరువైన నాగలిపనులకు నుపయోగపడుచున్నవి. ఆవులు బాగుగా పాలిచ్చును. ఇవి ఒక్కజాతినుండి ఉద్భవించినవి కాకపోవుటవలన వీనిలో అనేక మార్పులు కనుపడుచుండును.

రంగునుబట్టియు, సామాన్యలక్షణములనుబట్టియు, ఈజాతి ఉత్తరపు బూడిద తెలుపు పశుసంతతియని తెలుపునుగాని జాగ్రత్తతో పరిశీలించిన మైనూరు పూర్వపు జాతి నెత్తురుకూడ వీరిలోనున్నట్లు తేలును.

లక్షణములు

శరీరము:—పొడుగగా, లావుగానుండి నెడల్పుబలముగల కొమ్మును కలిగి యుండును.

మెడ:—తరుచుగా, బలముగా నుండును.

కాళ్ళు:—పొడవుగా నుండును.

రోగనిదానము తెలియక నుండులుగుప్పే వైద్యులవలన ప్రయోజనములేదు.

తల:—ఉండవలసినదానికంటే చిన్నదిగానుండును. నొసలు సామాన్యముగా నుండును.

కొమ్ములు:—బయట వైపునకు వంకరతిరిగి చిన్నవిగా నుండును. కాని సామాన్యముగా సైజులోను, ఆకారములోను ఇవి మారుచుండును.

మూపురము:—బాగుగా విస్తరించి ఎదురుగా నుండవలెను.

చెవులు:—మొసలుదేరిన చిన్నచెవులుగానుండి ఎక్కువగా వంగియుండరాదు.

తోక:—గుది కాలునకు, నేలకు సగముదూరమువచ్చు నలుపురంగుగల తుచ్చు పెండుకలతో సామాన్యపాడవుగ నుండవలెను.

25 మెహవతి (కోసి) జాతి (Mehavati Breed)

ఈజాతి ఆల్బార్ పశ్చిమప్రదేశములలోను, భరతపురపు ఎస్టేటులోను, పెంచుడు చున్నవి. హరియానాజాతికి వీనికి చాలా సంబంధమున్నది. కాని వీనియందు గిరిజాతి పశువుల రక్తమెక్కువగా నున్నది. ఇవి బండిపనులకు, దుక్కికి ప్రసిద్ధిజేందినవి.

సామాన్యముగా వీనిరింగు తెలుపుగానుండి తల, మెడ, భుజప్రదేశము, పువ్వు భాగము ఒకమాదిరి నలుపుగా నుండును. అచ్చటచ్చట గిరిజాతి పశువుల రంగుకూడ కన్పట్టుచుండును. హరియానా జాతికివలెనే ఈజాతి పశువుల కాళ్లుకూడ పాడవుగా నుండును. గాని వీరి శరీరము వానియంత దట్టముగా నుండదు.

లక్షణములు

తల:—నొసలు ఎక్కుగానుండును. ముఖము సన్నగా, పాడవుగా నుండును.

కొమ్ములు:—తల వెలుపలి భాగమునుండి వచ్చు కొమ్ముల చివరభాగములు వెనుకకు వంగుటకు ప్రయత్నించునట్లుగా నుండును.

శరీరము:—తేలిక కాళ్లతోనున్న పాడవుగల శరీరముండును.

గంగడోలు:—విస్తరించియుండును. మూపురము బాగుగా పెరుగును.

తోక:—గుదికాలునకు, నేలను సగభాగమువరకుండి నల్లని తుచ్చుతో వ్రేలాడుచుండును.

26 నిమారిజాతి (Nimari Breed)

ఈజాతి నర్మదానదీతీరమున పెంచుడుచున్నది. నర్మదకు దక్షిణమునకున్న కిల్లారిజాతికిని, రాజాపుటానాలోనున్న గిరిజాతి పశువులకును ఈజాతి ఉద్భవించినది. ఇవి చురుకుగా పనిచేయుగల జాతియని పేరుగలదు.

పశువైద్యము చేసేవారందరిని రైతులొకకంటితో చూడాలి.

లక్షణములు

తల :—ఎత్తైన నొసలుగలిగి ఒకమాదిరి పొడవుగానుండును.

చెవులు :—సామాన్యముగ పొడవు వెడల్పు గలిగియుండును.

కొమ్మలు :—తల బయటభాగములో వుట్టి వెలుపలికి పైకి వంకరతిరిగి చివర మొనలు లోపలప తిరుగును.

శరీరము, పీపు :—పొడవుగానుండును. సామాన్యముగా వంగిన ప్రక్కలముకలతో, వంగుచున్న పుష్పభాగములు కలవిగానుండును.

గంగడోలు :—సామాన్యముగా నుండును.

కాళ్ళు :—నిడువుగా, శుభ్రముగా నుండును.

తోక :—నల్లనిపచ్చతో నేలను తాపచుండును.

దజ్జల్ జాతి (Dajjal Breed)

ఈజాతి పంజాబు రాష్ట్రములోనున్న డోరహాజీఖాక్ జిల్లాలో విస్తారముగా పెంచబడుచున్నది. ఈజాతి భగ్నాల్ జాతినుండి ఉద్భవించినదే. నూరు సంవత్సరములకు పూర్వము ఈజిల్లాలోనికి ఉత్పత్తియై ఈజాతిపశువులు పెంచబడెను. క్రమేపి ఈజాతి ప్రసిద్ధి కైగ్గినది.

ఈజాతి పశువు చాలావరకు డ్యూన్ గారిజాతి లక్షణములుగా నుండును. ఇవి పంజాబులోని ఇతర ప్రదేశములందు లాగుడుపములకు విస్తారముగా ఉపయోగపడుచున్నవి.

గులావ్ జాతి (Goolao Breed)

ఈజాతి మధ్య పరగణాలలో ఎక్కువగానున్నది. సింధువారా జిల్లాలోను, వార్ధాలోను వీటిని ఎక్కువగా పెంచుదురు. కొడెలు చిన్నవయస్సున మేపు చాలనందున బలహీనముగా కనపించును. బాగుగా మేసిన ఉపయోగ మైనపనిచేయు ఎద్దులుగా తయారగును. ఆవులు మంచిపాలనిచ్చును.

పోన్వార్ జాతి (Ponwar Breed)

ఈజాతి పశువులు సాధారణముగా పిలిఖిట్ జిల్లాలోని టెహానీల్లోను, ఫేరి జిల్లా పశ్చిమోత్తర భాగములలోను దొరుకును. ఈజాతి పశువులు చురుకుగాను, పాతుకముగాను యుండును. వాటంతటవే మేయుట కిచ్చగించును. అయిదు సంవత్సరములకు వయస్సు వచ్చును. లాగుటలో ఎద్దులు ప్రసిద్ధి. ఆవులు పాలకు శ్రేష్టమైనవి.

గ లిటుంటులే ; ౬ ర మంటాడు మరొక పశువైద్యుడు.

౩౦ లోహనిజాతి (Lohani Breed)

ఈజాతి సరిహద్దు రాష్ట్రములలో పశ్చిమోత్తరమున ఉత్తరజిల్లాలలోను, బెలూచిస్తానములలోని రోలాయి ఏజెన్సీలోను యుండును. పంజాబులోని డేరాయ్ మాయిన్ ఖాన్ జిల్లాలోకూడ కొద్దిగా కనుపించును. కొండ ప్రదేశములలో లాగుటకు ఈజాతి మంచిది. ఈజాతి పశువులు పాలు బాగుగా నిచ్చును.

కొండజాతి పశువులను పోలిచిన్నవిగానుండును. ఎరువులలో తెలుపునుచ్చలుగల రంగులోనుండును. ఆవులు రోజుకు పదిపావుల పాలవరకు యిచ్చును.

౩౧ హరియానాజాతి (Hariana Breed)

ధిల్లరాష్ట్రములోను, పంజాబురాష్ట్రములోని గోవాత్క్, హెస్సార్, గుర్గావ్ జిల్లాలోను ఈ జాతి పశువు లెక్కువగా ఉన్నది. కలకత్తా తొత్తర పట్టణములకు హరియానా జాతి పశువులను పాడికొనుట ఎగుమతికై యుచున్నారు. ఆగ్వాత్, భక్తపూరు ప్రదేశములలో ఈజాతిని ఎక్కువగా క్రేమించుదురు. త్వరితగా గుడ్డియగుటకు, రోడ్లమీద బండ్లులాగుటకు ఈజాతి ఎదులు చాలా సులభివి. పాడికిమాత్రము చాలా మంచివి.

౩౨ కెన్ వారియాజాతి (Kenwariya Breed)

ఈజాతి బండోల్ ఖండే, మిందాజిల్లాలోని కెన్ వారి పాడుగునను ప్రసిద్ధిగా నున్నది. పన్నా రాజ్యములోను, బీకానర్, ఛిత్తూర్, అజమీర్ స్టేటులలోను, ఈజాతిని పెంచుచున్నారు. ఇవి బలిష్ఠముగ, తీవ్రముగ నుండు చిన్నజాతి పశువులు. ఆప్రాంతపు పశులకు ఈజాతి పనికివచ్చును. రోడ్లమీద బండ్లులాగుటకు, వ్యవసాయమునకు కెన్ వారియాజాతి పశువులు ప్రసిద్ధిగాంచిరి.

షహీవాల్ జాతి

ఈజాతి పంజాబురాష్ట్రము సాగులోకి తీసువ రాజధాన్యము దక్షిణమున, మధ్య భాగములోనున్న హెట్టిధూములలోను అడవులలోను నడిగట్టమీదను తిరుగుతూ మేస్తూ వుండెను. ఈజాతి పశువులకు, ఉత్తర పడమర ప్రదేశములలో వుండే భగ్నాడీప్, హరియానా, నాగోడీప్, ధన్నిను జాతులకు, రకములలో కొద్దితేడా కన్పించుతూ వుంటుంది.

ఈజాతి సామాన్యముగా కొంచెము ఎరువులోకూడిన కశిలపర్ణముగలదిగాను, కొద్ది తెలుపుగాను వుండును. కొన్ని పశువులకు గోధుమవర్ణముగాను, కొన్నింటికి చాల భాగాలలో తెలుపువుండును. అవి మామూలుగా పాడుగుగా నుండును. కాలు పంచ

రెండవ పశువైద్యుడుంటే మాత్రము పశువైద్యునికి గిట్టును.

బడెను. ఈ కారణములవలన అనేక శతాబ్దములనుండి ఈ చిన్నదీవుల పశువులు అన్య జాతి సంపర్కములేక కేవలము స్వజాతిపశువులై జ్ఞాతిసంబంధముగలవి కావలసి వచ్చినవి. కాని మొదట నవి అంతగా పాలిచ్చెడివిగావు.

18వ శతాబ్దములో పెద్దకోగమనువ్యాధి యూరపుండినులో పశ్చిమభాగము లో వ్యాపించినది. కాని ఒక శతాబ్దమునకు ఏజాతిలో కల్తీ యేమియులేదు. 1850 వ సంవత్సరమువరకు చిన్నచిన్న సంఖ్యలలో ఉత్తరమెరికావ దిగుమతి చేయుట నారంభించిరి గాని 1870 వ సంవత్సరమువరకు అంత ఎక్కువ దిగుమతి లేదు. అప్పటినుంచి ఈజాతి ప్రతి సంవత్సరము చాలా అభివృద్ధిగాంచుచుండెడిది.

జెర్సీజాతి ఆవులు

ఈ జాతి ఆవులు తెలుపురంగుగానుండును. వీరినే జింకపిల్లరంగు ఆవులందురు. కాని మొత్తముమీద ఒక జేరంగుగల ఆవులను కొనువారు చాలామంది యుండెడివారు. రంగుభేదములేకయే కొనుటగూడ జరుగుచున్నది. ఈ జాతి ఆవులు చాలా సుమారు మైనవి. ఇవి చిన్న జంతువులగుటవలనను, సాధుత్వము గలగుటవలనను, పెంతుటకు వీలుగా నుండుటవలనను, ప్రతిరేకు కావలెనని కోరుచుండును. కాని వీరిని సరిగా పోషించకపోయినయెడల వీటికి కొపము, తామసము, ఎక్కువై అలిగి మేత, నీరు మానునట. యజమానుని పొడుచునట. పాలుసరిగా నీయక తిప్పులు పెట్టునట. అందుచేత నీజాతిని కొనినరైతు చాలా జాగ్రత్తగా పోషించును. ఇవి అంత ఎక్కువగాను, తక్కువగాను పాలనీయక సమానముగా నిచ్చుచుండును. ప్రపంచములోనున్న ఆవులలో జెర్సీఆవులతో సమానముగా నుంచిపాలిచ్చు ఆవులెక్కడనోతప్ప అంతలను కన్పట్టవు. ఈజాతికి లెనురులేదు. చేపలు, ద్రాక్షపాడ్లు, తేవును, కడ్డి మొదలగు నవి సాధారణముగా పెట్టబడుచుండును. చేపలు తిని పశువుల పాలు దుర్వాసనగా నుండును.

లక్షణములు

తల:—చిన్నదిగా, అందముగానుండును.

కన్నులు:—కాంతిగలిగి సాధుత్వమును జూపుచుండును.

చెవులు:—పొట్టిగనుండి కదలుచుండును.

కాళ్లు:—లేడికాళ్లువలె అందముగానుండును.

మాపురము:—ఏటవాలుగానుండును.

శరీరము:—తోకవైపు శరీరమంత విస్తరించి యుండును.

పొడుగు:—పాలతిత్తులు మిక్కిలి విస్తరించి కాస్త్రీతిగా వృద్ధిచెందుననిగా నుండును.

కేరగి వాతిపెట్టాలిగాని ఇష్టమువచ్చినట్లు పెట్టిత ఆ వైద్యునే కాల్పాలి "గాతముడు"

గెర్నీజాతి (Guernsy Breed)

జెర్నీజాతికన్న ఈజాతి ఆకారములో పెద్దవై దృఢత్వముగల ఎముకలుగలిగి బలిష్ఠములుగా నుండును. వీనివలన తయారైన గోమాంసము చాల ప్రశస్తమైనది. ఈజాతిలో జెర్నీ, ఆల్బర్నీ, ఛార్క్, హీరం, దీవులలోని పశువులుకూడ చేరియున్నవి. ఈ జాతికూడ ఇంగ్లీషు ఛానలులోనున్న జెర్నీ ద్వీపములోనన్నవి. ఇవికూడ ఫ్రాన్సు నుంచి వచ్చినటులే తెలియుచున్నది.

19 వ శతాబ్దములో జెర్నీ, జెర్నీ ఆవులను ఇంగ్లండు దేశమునకు ఎగుమతి చేసి నపుడు రెండుజాతుల కంతభేదములేపండ నుండెను. ఈ రెండుజాతులను కలిపి ఆల్బర్నీ నుంచి ఎగుమతి చేయుటవలన ఈపేరు వచ్చినదని తెలియుచున్నది. అక్కడ గొప్పరేవు పట్టణముండుటవలన ఎగుమతి యయ్యెడివట. ఈరెండుజాతులు ఉత్తరమెరికాలో ఎగుమతి చేయబడినపుడు మొదట యేజాతియైనది కనుగొనుట కష్టమైనదట. కాని కొంతకాలము నకు ఈరెండుజాతుల భేదములను తెలిసికొనుటచేత కల్పితమండ జేసిరి. దిగుమతి చేయ బడిన జెర్నీ ఆవులలో పొల్చియూడినచో జెర్నీ ఆవులు తక్కువగానుండును. ఈజాతి ఆవులు యునైటెడ్ స్టేట్సులోని కెంటాకీయులలో నెక్కువగానున్నవి. వీనిపైజా జెర్నీ ఆవులకంటె పెద్దవి. యుక్తవయస్సువచ్చిన ఆవులు 1200 పౌనులు తూగును.

ఈ జాతి రంగు

శరీరమంతయు నొకజేరుగంగా నుండక తెలుపునుచ్చలుండును. గోధుమ, ఎరుపు, బూడిద, నలుపురంగులమీద తెలుపునుచ్చలు గలవియును, కొన్ని దేహమంతయు మచ్చలు గలవియును, చారలు గలవియును మంచివిని యొందుదురు. జెర్నీ జాతివెన్న, రంగుగలిగి చిక్కగా నుండును. వారమునకు 10 లేక 12 పౌనుల వెన్నవరకు వచ్చును. ఒక్కొక్కఆవు సంవత్సరములో 700 నుంచి 750 గ్యాలనుల పాలవరకు యిచ్చు చుండును. జెర్నీద్వీపములోనే 8 వేల పశువులుగలవు.

షార్ట్ హోర్న్ జాతి (Shorthorn Breed)

ఈజాతి పశువులు 1800 వ సంవత్సరములో నార్తెంబరులెండులోను, డర్ హామ్ యార్కులోను, లింకొల్న్ లోను మొక్కవగా నుండెడివి. డర్ హామ్, న్యూయార్కు లలో ఈజాతి వృద్ధిజెందినది. ఈజాతినే ఆరంభమున డర్ హామ్ జాతియని పిలచెడివారు. గ్రేటుబ్రిటనులో షార్ట్ హోర్న్ జాతికి పేరువచ్చిన తరువాత ఉత్తరమెరికాలోను, యితర దేశములోను, డర్ హామ్ జాతియని పిలుచుచుండెడివారు. హాలెండు దేశమునుంచి దిగు మతి చేయబడిన ఎద్దులవలన యిక్కడజాతి ఆవులను దాటిచుచు పశుమంతరిని వృద్ధి చేసెడివారు.

వస్తుగుణాలు తెలియపుగాని బీరువానిండా మందులే.

ఈజాతి రంగులు

ఈజాతికి ఎరుపు, తెలుపు, ధూమ్రము మున్నగు రంగులు స్వభావసిద్ధముగా నుండెడివి. పాడిపశువులు ఎరుపురంగు కలిగియుండెడివి. తెలుపురంగుగల గిత్తలజాతి కూడ యెక్కువగా నుండెడిది. తెలుపురంగుగల గిత్తలను వెయ్యిగిన్నెలప కొనుచుండెడి వారు. చారలు, మచ్చలుగలవి ఈషార్తారన్ జాతిలోలేవు. పశువుల పెదవులు, అంగిలి, నోరు, కనురెప్పలు, మున్నగునవి కండబట్టి ఎరుపురంగు కలిగియుండవలెను. వెండ్రుకలు లేని శరీరభాగమున నలుపురంగుగాని, ముల్లురంగుగానియుండినచో నాణ్యముచేయరు. శర్మము తెలుపుగా నుండవచ్చును. ఈజాతి కొమ్ములు పొట్టివిగను, కొద్ది వంకరగను, ముందునకు విటనాలుగను నుండును. ఎద్దుల కొమ్ములకంటె అవుల కొమ్ములు నిడుపు గను అండముగను యుండును. నలుపురంగుగల కొమ్ములుగలిగిన అవులను నాణ్యము చేయరు.

ఈజాతి వంగనము

1800 వ సంవత్సరములో ఏజాతి నానాటికి వృద్ధిచెందుచుండెడిది. మంచిఎద్దుల చరిత్రలుగలిగిన పుస్తకములను అప్పుడప్పుడు ఈజాతిని పోషించు మహనీయులుదగ్గర నుంచుకొనుచుండెడివారు. ఈజాతిలో వన్నెకక్కిన దూడలు వానికల్లులను పోలినవై యుండవలెను.

1737 లో దూడగానుండి స్టెబుల్ వంశవృద్ధికి కారణమైయున్నది. 1777లో వుట్టిన ముబ్బాక్ ఈ షార్తారన్ జాతికి మూలాధారమై వంశవృద్ధిజేసినది. ఛార్లెస్, రాబర్టులొలింగు 1780 లోనే ఈజాతిని మంచి ఉన్నతదశలోనికి తెచ్చిరి. మంచి వంగ సమునేరి బాగుగా పోషించెడివారు. దేశమంతయు ఏజాతినిగూర్చి విమర్శించి పోషించుటకు తగిన ప్రోత్సాహమిచ్చుటచేత వారిరువురిపేర్లు బయటపవచ్చినవి. ఇందువలన ఈషార్తారన్ జాతి యున్నటెడ్ కింగ్డంలోనికల్లును మంచి పేరుగాంచినది.

బూతుషార్ట్ హోరన్ జాతి (Batu Shorthorn Breed)

1900 సం॥లో ఇద్దరు మహనీయులు ఈజాతిని వృద్ధిలోనికి తీసికొనివచ్చిరి. ఈజాతి పాలకంటె మాంసమున కెక్కువగా ప్రసిద్ధికెక్కినది. వేసవిలో పచ్చికయు, చలికాలములో ఎండుమేతయు, ఏజాతికిమేపి బాగుగాబలిపించి అచ్చటకూడ అప్పుడప్పుడు వీనిచే పోటీపంఁచులు వేయించి గెలుపొందించి మంచిపేరులోనికి రాగలుగు నట్లుచేసిరి. పొట్టికాళ్లుగలవి, నలుపురంగుగలవి, మంచికండగలవి, అగు ఈజాతిపశువులు మంచిపేరుతో నుండెడివి.

పాలిచ్చు షార్తార్నజాతి (Shorthorn dairy Breed)

కొయ్లస్ షార్తార్నజాతి ఆవులు పాలిచ్చుటలో మిగుల ప్రసిద్ధిగాంచినవి. ఈజాతినండి తీయబడిన పాలను సమీపముననున్న బస్తీలలో అమ్ముచుండెడివారు. దూడలకు పాలుతక్కువగానుంచి ఎక్కువగా పితువటవలన ఫశుజాతి కొంతవరకు క్షీణించినది.

గ్రేట్ బ్రిటన్ లోను తదితర దూరదేశములలోను ఈ పాడిపరిశ్రమ అభివృద్ధిలో నుండెను. రిచర్డు స్ట్రాట్ ఫోర్డ్, జోన్ టీల్, జాన్ తోరంటన్ మొదలగు మహనీయులు ఈ షార్తార్నజాతిని బాగుగా పోషించుచు 1900 సంవత్సరము మొదటిదశలో బాగుగా పాలిచ్చు ఈజాతి పశువులను బహుకూన మిమ్ముచుండెడివారు. 1905 వ సంవత్సరములో కొంతమంది కలిసి సంఘముగా నేపడి ఈజాతిని వృద్ధిలోనికి తెప్పించుటకు ప్రచారము చేసిరి. ఒక పెద్దమనిషిదగ్గర పాలుతీయించి పాలయొక్క శుభ్రతనుబట్టియు, తూకమునుబట్టియు వానికి బహుమానము లిచ్చెడివారు.

నాలుగు సంవత్సరముల ఆవు యీనిన మూడుశెలలలోపుగా కనీసము 25 పానుల పాలనిచ్చిన నేగాని బహుమానము లేక సర్టిఫికెట్టు పొందజాలరు. నాలుగు సంవత్సరములు అంతకు పైయనున్ననున్న ఆవు కనీసము 8 వేల పానుల పాలీయవలెను. నాలుగు సంవత్సరముల పయస్సగల ఆవు ఆరువేలపానుల పాలీయవలెను. ఈ పాలయొక్క పరిమాణములను తేలికగా తెలిసికొనుటకుగాను రికార్డు తయారు చేయుదురు. కొన్ని కేసులలో పాలు నిత్యము కొలుకుట కష్టము. కొన్నిటిలో వాచమున కొకసారి రెండు సార్లు కొలుచుదురు. ఈపైచెప్పిన పశువులు వంశపరంపరగా వచ్చినవి.

నాన్ పెడిగ్రీ షార్తార్నజాతి

(Non Pedigree Shorthorn dairy Breed)

ఇంగ్లండు ఉత్తరభాగములోను, క్షేమైరులోను ఈజాతి పెంచబడుచున్నది. ఇంగ్లండున కీశాన్యదిగ్గజనున్న ఈజాతి పశువులను పోషించు మహనీయులు పాడి పరిశ్రమలో అజాగ్రత్త చేయుచుండెడివారు. ఎద్దులను ఎండిపోయిన ఆవులను మాంస పరిశ్రమకనియు, బాగుగా పాలిచ్చు ఆవులను పాడి పరిశ్రమకనియు రెండు భాగములుగ విడదీసిరి.

విర్రండులో నిప్పటికూడ ఈజాతి పశువులున్నవి. నూరు సంవత్సరములక్రిందట లాంక్ షైరునుండి ఇంగ్లండుదేశములో నితరభాగములనుండి లేబడిన లాంక్ హారన్సుజాతి పశువులు చాలావరకు వృద్ధిలోనుండెడివి. కాని క్రమేణ షార్తార్నజాతి ఎద్దులయొక్క వృద్ధి ఎక్కువగానుండెను. వ్యవసాయ దీపార్థమెటువారును, రాయల్ డూబ్లిస్ సాయితీ వారును షార్తార్నజాతి ఎద్దులయొక్క వృద్ధిని బాగుగా వ్యాపింపజేసిరి. విరిష్ షార్తార్నజాతులు ప్రతి సంవత్సరము ఇంగ్లండునకు స్కాట్లాండునకు విరివిగా పంపబడు చుండెడివి.

మా ఎద్దు చచ్చినా బ్రతికినా, డబ్బుముందుమాత్రము కట్టుకొనాలట.

హియర్ ఫోర్డ్ బ్రీడ్ (Hereford Breed)

ఈజాతి ఇంగ్లండులోనేగాక ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణ ఆమెరికాలలో నుండెడిది. మాంస మెక్కువ తయారు చేయుటలోను, దూర దేశములకు ప్రయాణములు నునాయానముగా చేయుటలోను, పచ్చిక యెచ్చట బాగుండునో ఆచ్చటనే నివాస మేర్పరచుకొని బాగుగా బలియుట చేతను, ఈజాతి కేర గాంచినది. ముఖము, కడుపు, గొంతుక, కాళ్ళలోపలి భాగము, తోక చివర, తెలుపుగను కొమ్ములు తెలుపు లేక బూడిదరంగుగను యుండును. ఈజాతి క్షయరోగమును బాధజాలవు. తీక్ష్ణమైన నూర్గురళ్ళి కంటికి తగిలినపుడు వేడిమికి బెదరునంత నుపయోగత గలిగియుండును. అందుచేత గోధుమ రంగుల కనుగ్రుడ్డున్న శువును నాణ్యమును చేయుదురు. డెవన్ సాసెస్కస్ జాతుల వలె దక్షిణ ఇంగ్లండులోనున్న రెడ్ జాతినుండి ఈజాతి వచ్చుచున్నది.

19 వ శతాబ్దమువరకు లాగుట వపయోగించెడి ఎద్దులను బాగుగా పోషించెడి వారు. ఈ ఎద్దుల భుజములపద్ద ఎత్తుగలిగి ఆకారములో పెద్దవిగా నుండును. 18 వ శతాబ్దములో ఇంగ్లండుయొక్క మధ్యభాగమునను తూర్పుభాగమునను ఈజాతి ఎద్దులను కొని అమ్ముటలో ప్రసిద్ధిగాంచినవి. ఒక పోటీపం దెములో ఈజాతికి, 185 బహు మానములును తదితరజాతుల నన్నిటికి 190 బహుమానములును ఈయబడెను.

ఎబర్డీ షింగన్స్ (Aberdeen Angns)

షోర్ హెన్ షిర్, యబ్డీన్ షిర్ లోను ఈజాతి యుండెడిది. షోర్ హెన్ షిర్ కాపు రనుడు హ్యావ్ కన్స్ ఆను పెద్ద వ్యవసాయవతు ఈజాతిని గురించి విషయముండెను. ఆతని తండ్రి ఆతనికి ఈ ఎల్లువుజాతిలోను చి నాని ఆరు పశువులనిచ్చెను. దగ్గరనున్న మార్కెట్టులో నిటువంటివానిని ఖరీదుచేసెను. ఎబ్డీన్ షిర్ కాపురనుడు విలియు మెక్కోంబా ఇతరులకంటె శ్రద్ధవహించి బాగుగా పనిచేసెను. ఈయన పోషించిన జాతులద్వారా రెండు బహుమానములు పొందెను.

1873 వరకు ఈ త్రగమెరికాలో ఏజాతి కనుపించెడిదికాదు. కాని దరిమిలా హియర్ ఫోర్డ్ జాతివలె ఇప్పటివరకు ఈ త్రగమెరికాలో ఏజాతి పశువులుండుచున్నవి. స్కాట్లండుదేశములో పెరుగు ఈజాతి పశువులు పరిశ్రమలో నుంచి. మాంస పరిశ్రమకుకూడ ఈజాతి ఉన్నతిమైనది. షార్లెన్ హియర్ ఫోర్డ్ జాతులంత పెద్దవికావు.

ఇవి పోటీయగు కాల్గిగలిగి చూచుట కందముగానుండును. వాని యాకారము నకు తగినంత తూకముగలవై యుండును. ఇవి గుండ్రని యాకారముగలిగి యెత్తునకు మించిన నిడుపుగలిగి ఎముకల నిర్మాణము అందమునిచ్చుచు తగినంత కండగలిగి నలుపు తగగుగానుండును. షార్లెన్ జాతి ఈజాతి పశువులను దాటుచుండెడివి. ఈజాతికి కొమ్ములుండవు. మాంసపరిశ్రమకు మాత్రము ప్రసిద్ధిగాంచినవి.

పాలు వెన్న పట్టు బొచ్చు చర్మములు జంతువులవలన కలుగుచున్నవి.

డెవోన్ జాతి (Devon Breed)

ఈజాతి సాసెక్స్ జాతిని పోలియుండును. ఎబర్డ్స్, యంగ్ జాతిమాదిరి నిర్మాణము గలిగియుండి మాంసపరిశ్రమకు మంచిగా నుండును. శరీరము ఎరుపురంగుగానుండి ఆచ్చలుచ్చలు మచ్చలుండును. ఆవుల కొమ్ములు పొట్టిగానుండి కొంచెము వంకరగా నుండును. ఎద్దుకొమ్ములు తిన్నగానుండి కొంచెము ఏటవాలుగా నుండును.

బ్రిటిష్ హోల్స్టీన్ జాతి (British Holstene Breed)

ఈజాతి ఆకారములోనిందుమీద చుగ్గ పార్తాన్ జాతియంత పెద్దవై పాడిపరిశ్రమకు అనుకూలమైయున్నది. కవీల, నలుపు తెలుపు కలసివరంగు, తెలుపురంగు, నలుపురంగు, ఈజాతికి చెందియుండును. కొని వీసర గులు చూచుటకు ముచ్చటగా నుండును. తల నిడుపుగ పొడుగుగ నుండును. కొమ్ములు పార్తాన్ జాతికివలె ముందునకు వంగి చూచుటకు అందముగానుండును. మెడ సన్నముగనుండి పొడవుగానుండును.

ఇతరజాతులతో పోల్చిచూచిన యెడల వీనికొమ్ము లోతుగా వెడల్పుగానుండి బాహుశ్రోభముగలిగి ఇతరజాతుల కొమ్మునకు మించియుండును. కడుపు లోతుగలిగి వికాలమైచిగా నుండును. హారాడులోను ఆమెరికాలోను ఈజాతి యెక్కువగా నుండును. ఇతర ఇంగ్లీషుజాతులన్నిటికంటె ఈజాతి పాలెక్కువయ్యును. పాలు అంత రుచికరమైనవిగావు. ఈజాతి ప్రతిచోట యుంచినచో పాడిపరిశ్రమ కనుకూలముగా నుండును. ఈదేశములో నీజాతిని పాడిపరిశ్రమకును మాంసపరిశ్రమకును వాడుదురు.

కెర్రీ జాతి (Kerry Breed)

ఈజాతి తేలికగా చురుకుగా శుభ్రముగా అందముగా నుండును. చిన్నతల, అందమైన నిడువైన శరీరము, చిన్నపీరలు, జీవశక్తిగల కన్నులు గలిగియుండును. శరీరము నలుపురంగుగలిగి పొడుగువూడ తెలుపుమచ్చలుండును. ఎరుపురంగుగలవానిని ఈజాతిలో జేర్చుకొనెదరు.

ఈజాతి ఆవులు పాడికి శ్రేష్ఠమైనవి. వీనిపొడుగు చక్కగా నమర్చబడి వికాలముగా నుండును. సామాన్య మేకటిని పాలనిచ్చును. పాలిచ్చుటలో నితరజాతులకంటె వన్నెకెక్కినవి. ఈకెర్రీజాతి ఆవులు 36 పౌనుల పాలను అందునంది 3 $\frac{1}{2}$ % వెన్నయు, 8 $\frac{1}{2}$ % పౌనుల పాలలో 4 $\frac{1}{2}$ % వెన్నయు కలిగియున్నది. ఈజాతి ఆవులు 900 పౌనులు, ఎద్దులు 1000 పౌనులు బరువుకలిగియుండును.

సేద్యపువృత్తి చాలా పురాతనమైనది.

డెక్స్టర్ జాతి (Dexter Breed)

ఈజాతి కేవలము నలుపురంగునగాని, ఎరుపురంగునగాని కలిగియుండును. క్రేటి జాతికన్న ఈజాతి గుండ్రని యాకారము గలిగి యుండును. కాళ్ళు పొట్టిగానుండి నుంచి బలముగనుండును. మెడ పొట్టిగ అందముగ నుండును. కొమ్ములు నిడువుగ నుండముగ నుండును. దీని పుట్టుకచక్రత సరిగా తెలియదు. ఇది బహుశా డెక్స్టర్ అను నాతివలన పుట్టించబడిగాని లేక లిమ్ కుటిక్, కార్లు, సమీప్రదేశములలో బిరిష్ ఆవులవలన క్రేటివద్దలతో చాటబడి పుట్టి వృద్ధిగాంచబడిగాని యుండవచ్చును. డెవన్, క్రేజాతుల మిశ్రమమువలన ఈజాతి కలిగినదని ప్రాఫెసర్ విలసనుగారు తెలిసిరి.

ఫ్రెంచి కెనడియన్ జాతి (French Canadian Breed)

ఫ్రాన్సువారు కెనడాకు వలసవచ్చినపుడు తమతోపాటు ఫ్రెంచివారు కొన్ని ఆవులను తీసికొనివచ్చిరి. వీరినే ఫ్రెంచి కెనడియన్ ఆవులందురు. మొప్పటివరకు వీరికొకటి చాలా తక్కువ. కాని ఈమధ్య జెర్సీ ఆవులవలన వీరికి కల్పింపబడినది. ఆకారములో జెర్సీ ఆవులవలె నుండును. ఇవి బూడిదరంగు, నలుపురంగు నుండును. వీరికి తగిన త మేతలేకపుటికీ తృప్తిపడునట. మిగుల చురుకుగానుండి ఎటువంటి శీతోష్ణనిరీతి నైనను నష్టించగలదు.

దార్జిలింగు జాతి (Darjeeling Breed)

ఇవి ఇంగ్లీషుజాతివలెను, అడవిజాతివలెను కన్పిందును. కొమ్ములు పొడవుగా నుండును. నలుపు ఎరుపు బటావరంగుగా నుండును. దినమునకు నాలుగుశేర్ల పాల నిచ్చును.

సౌత్ డెవన్ జాతి (South Devon Breed)

ఈజాతి కొన్ని పశువులు ఆకారములో పెద్దదిగ లేలికగ ఎరుపురంగులవై డెవన్ జాతికి భేదించుచు డును. ఛానల్ దీవులలోనున్న తెలుపు ఆవులను, ఆల్ఫీస్ ఎద్దులతో చాటించెడివారు. అంతవపుర్యము ఈజాతిని హేమ్స్పూరి వీలిచెడివారు. 30 సంవత్సరముల క్రిందటి వరకు ఈజాతులయెడ నుంచి గౌరవముంచెడివారు. ఈజాతిని దగ్గరదేశములకు అనగా దక్షిణకాఫ్రికా, దక్షిణమెరికా, యునైటెడ్ స్టేట్సులకు పంపెడి వారు. సంవత్సరములో 900 నుంచి 1000 గాలనుల పాలిచ్చును. ఇతరజాతులకంటె నిది పాలనెక్కువనిచ్చును.

ఈజాతి పశువులు శరీర పరిశ్రమలో పేరుగాంచెను. గ్రేట్ బాంగర్ యొక్క ప్రాన్స్ సెన్స్ క్లాబ్ అనునతడు ఈజాతిని ఆరంభములో పైకిదీసెను. తాను చూచినంతలో

ప్రొ. నామము చేసుకొనెడివారిని కృషియు, కేంద్రముగలవారు.

మంచివిగానున్న ఈజాతి పశువులను కొని పోషించెడివాడు. హాల్ భామునుండి ఈజాతి పశువులు విరివిగా యునైటెడ్ స్టేట్సుకు ఎగుమతిచేయబడు చుండెడివి. షార్టరన్ జాతులంత యెక్కువగా ఆమెరికాలో ఈజాతిని పోషించెడివారకారు. ఉత్తర దక్షిణమెరికాలోను, ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికాలోను ఈజాతి యుండెడిది. ఈజాతి మధ్యరకముగా పాలనిచ్చును. మాంస పరిశ్రమకు ఎక్కువగను, పాడిపరిశ్రమకు తక్కువగను, ఈజాతులు పెంచబడెడివి. సన్నని తేలిక ఎముకలుగలిగి శరీరము చాల మృదువుగా నుండును. ఇవి మిగుల తెలివిగల జంతువులు. ఈజాతి ఎద్దులు బండ్లు బరువులు లాగును.

సుస్సెన్ జాతి (Sussen Breed)

ఈజాతి క్వంటులోను, సర్రేలోను, సస్సెక్సులోను మాంసపరిశ్రమకు పెంచబడుచుండెడివి. బ్రిటీషు పశుజాతులన్నిటిలోను ఆకారములో పెద్దవిగానుండెడివి. ఎరువు తంగు గలిగియుండును. అవి తిను ఆహారమునుబట్టి కండగలిగినంత మాంసమును యిచ్చుచుండెడివి. ఇవి బరువులు లాగుటలో ప్రసిద్ధి కెక్కినవి. ఆమెరికాను, దక్షిణాఫ్రికాను ఈజాతులు పంపబడుచుండెడివి. స్వదేశపు ఆవులను ఈజాతిఎద్దులు దాటుటచే ఈజాతి దూడలు పుట్టుటయు గలదు. సవిశిష్టతలలో ఈజాతి ఎద్దులవలన ఎక్కువగా పనుల చేయించుచుండెడివారు. ఇవి త్వరలో నశించుచుండెడివి.

గేలోజాతి (Gallow Breed)

ఈజాతి 17 వ శతాబ్దమునుంచి పెరుగుచున్నది. స్కాట్లండు నైఋతిదిక్కువీనికి పుట్టినిల్లయ్యున్నది. కర్కడ్రెట్టు, విగ్టవున్, బ్రిటిష్ వీధిపులు, ఇంగ్లండు మొదలగు ఉత్తరభాగములలో నివసించుచుండెడివి. వీనికి చలిగాలి చక్కకా సరిపడును. వీనికి తక్కువమేత మేపినను బాగుగా కండబట్టి బాగుగా వృద్ధిపొందుచుండెడివి.

ఈజాతికి కొమ్ములులేవు. నలుపురంగుగానుండును. ఈజాతిపశువు లిప్పుడుగూడ ఆక్కడక్కడ కనించుచుండును. తల తురచగను వెడల్పుగను కన్నులు పెద్దవిగను, శరీరము గుండ్రముగను మంచి నిర్మాణము కలదిగను కాళ్లు పొట్టిగను చర్మము బిరుసుగను వెండ్రుకలు మెత్తగను యుండును. ఈజాతి ముఖ్యముగా శ్రేష్టమైన మాంస మిచ్చుటచే పేరుగాంచినవి. ఈజాతిఆవులు దాటుటకు ముఖ్యముగా గణించబడినవి. వీనివంటి కొమ్ములులేని దూడలే పుట్టుచుండును. ఈజాతి కెవడా, ఉత్తరమెరికాలో వృద్ధిగాంచబడినవి.

వెస్టు హైలాండుజాతి (West Highland Breed)

ఈజాతి స్కాట్లండుయొక్క ఎత్తు ప్రదేశములలోను, వాని దీవులలోను నివసి చుండెడివి. అన్ని ఇంగ్లీషు జాతులలోనికెల్ల నీజాతి శరీరమునిండు బొచ్చుగలదై, గట్టి

కంచెలేని చేను విరామములేక దున్నెడుగడ్డు సమానము.

తనముగానుండును. ఇది సంకరజాతి, వీపుతిన్నగను, కాళ్లు వరచగను, ఎదురొమ్మ వేడల్పుగను, శరీరము గుండ్రముగను, గొమ్ములు అందముగను, కండ్లు పెద్దవిగను, ముఖము చిన్నదిగను, నలుపురంగుగానుండి తెలుపునుచ్చులగను, అక్కడక్కడ పసుపు రంగుగను యుండును. కొమ్ములు బలముగలవై కొద్దిగా ముందుకు వంగియుండును.

ఎద్దులకన్న ఆవులకొమ్ములు త్వరగా పైకివచ్చును. కొమ్ములు నిడుపుగలవై యుండును. ఇవి గట్టి వరుసజంతువులగుటచే ఎటువంటి తప్పువమేత మేసినను బాగుగా పెరిగి త్వరలో వృద్ధిగాంచుచుండును. వీనికి శీతోష్ణనితి సరిపోనందువలనను, తక్కువ మేత తినుటవలనను, ఈజాతి ఆకారములో తదితరజాతులతో సరిపోక చిన్నవిగా నుండును. వీరి మాంసము చాల ఉత్తమమైనది. త్వరలో వృద్ధిగాంచు షార్టాన్ మొదలగు జాతులతో వీరి ఆవులను దాటించిన కొంతవరకు మంచి జాతిదూపలను కను చుండును. ఇవి పాలు కొద్దిగా యిచ్చుచుండునుగాని ఒక చూడపమాత్రము సరిపోవును.

రెడ్ పోల్ జాతి (Redpoll Breed)

ఈజాతి నార్ ఫోక్, సఫోక్ అను రెండు ప్రదేశములలోయున్నవి. పురాతన మైన ఎరుపురంగు కొమ్ములుగల నార్ ఫోక్ జాతియొక్కటి, కపిలవర్ణమైన సఫోక్ జాతి యొక్కటి ఈజాతిలోని భాగములు. కపిలవర్ణపుజాతి పాలు యిచ్చుటలో ప్రసిద్ధిగాంచినవి. నార్ ఫోక్ జాతి ఆకారములో చిన్నదిగనుండి మంచి అందము గలిగియుండును. త్వరగా పెరిగి యున్నత మైన మాంసము కలుగజేయును. ఈజాతి ఎరుపు రంగుగలిగి తోకవర భాగము, పొడుగుభాగము తెలుపుగా నుండును. ముక్కు రంధ్రములు తెలుపుగానుండిన ప్రశస్తమని యెంచుదురు. నలుపురంగుగను, మబ్బురంగుగను, ముక్కురంధ్రములున్నచో మంచి దానినిగా పరిగణించరు. కొమ్ములు చూచుటకు అంత నాణ్యమైనవిగావు. రెడ్ పోలో సంఘములు గ్రేట్ బ్రిటనులోను, ఐర్లండులోను 1888 లో నేర్పడెను. ఈజాతి గిత్తలను బాగుగా పెరుగనిచ్చి కసాయివానికి మాంసముకొరకు నొప్పగించుదురు. వీరి మాంసము లండన్ మార్కెటులో ఎక్కువఖరీదునకు అమ్ముదురు. ఇవి పాడిపరిశ్రమకు పనికివచ్చుటచే దూరదేశములనుండి అన్నికంపెరిలకు ఎరుపతి కేయుదురు. యునైటెడ్ క్లబ్బులో గూడ ఈజాతి కనుపడును.

ఎయిర్ షైర్ జాతి (Ayrshire Breed)

ఈజాతి 18 వ శతాబ్దములో నుండెడిది. డచ్చిజాతులనుండి ఈజాతి వృద్ధిగాంచ బడినది. ఈజాతి యితరజాతులతో పోలియుండదు. 300 సంవత్సరముల క్రిందట స్కాచ్ జాతులకు ఈజాతికి పోలికయుండెడిదికాదు. స్కాట్లండు వైరుతిడిక్కున అది వరకున్న గాల్లోనేజాతిని ఈజాతి తరిమివేసి ప్రపంచమంతటిలో వ్యాపించినది.

ఈజాతి పాడికి ప్రసిద్ధికెక్కినది. చమ్ములు చిన్నవిగానుండును. 1906 లో

దుక్కికాని చేను తాలింపులేనికూర వ్యర్థము.

చన్నులకొలత చూడగా $2\frac{1}{2}$ నుంచి $3\frac{1}{2}$ అంగుళములవరకు యుండెడివి. అంతకు పూర్వము 2 నుంచి $2\frac{1}{2}$ అంగుళములవరకుండెడివి. అన్నిరంగులలోను తెలుపురంగున్న ఆచ్చులచ్చుట తలవడగ్గరగా ఎరుపు గోధుమవర్ణపు మచ్చలున్న గలదానిని నాణ్యముగా నెంచుచుండురు. కపిలవర్ణముగల జాతికూడ నుంచిదికాదు. 900 నుంచి 1000 పౌనల పాలిచ్చెడివి.

షార్తార్న్ గ్యాల్లోనే జాతులను, ఈ ఎయిర్ మేర్ జాతిని, జెన్సీజాతితో పోల్చి చూచినచో ఎయిర్ మేర్ జాతి తల, దవుడలదగ్గర లోతుగను, కండ్లదగ్గర వెడల్పుగను యుండును. కొమ్ములు వెడల్పుగా నమర్చబడి పైకిపెరుగును. పొడుగుభాగము శరీరములో చక్కగా నమర్చబడి చూచుట కందముగా నుండును. డెన్నార్కునకు, యునైటెడ్ స్టేట్సునకు, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండు, దక్షిణాఫ్రికాకు ఈజాతులు విరివిగా పంపబడుచుండెడివి. ప్రపంచములో పాలుయిచ్చుటలో ప్రఖ్యాతిగాంచిన జాతులలో నిదియొకటి. ఈజాతికి యెటువంటి తక్కువనిలువగల మేకమేసినను పాలు మాత్రము ఎక్కువగా యిచ్చుచుండును. పాలుకూడా మంచిరకములో చేరినవి. వీని పాలలో వెన్నకూడ తదితరజాతుల పాలలోకంటె నెక్కువగా నుండును.

వెల్షుబ్లౌకుజాతి (Welsh Black Breed)

ఈజాతి ఇతరజాతులను పోలియుండును. ఇది పురాతనమైనది. వేల్సులో నూరు సంవత్సరముల క్రిందటివరకు ఈజాతికి సంబంధించిన అనేకరకములగు పశువులుయుండెడివి. కాని యాంపుటిలో రెండు రకములుమాత్రముండి తదితర రకములు నశించెను. సోకువేల్సులో ఈజాతి తిమ్మనగానుండి పొడిపగిలమును నృద్ధిలోనికి తెచ్చినవి. ఈ నిర్మాణము చాల గట్టితనము నుంచినడక గలిగియుండును. సామాన్యముగా అన్ని పనుల వపయోగపడును. వీని కొని అమ్మి లాభము పొందెడివారు. వీరి శవమును విలువగా నెంచెడివారు. వీని మాంసమును మొదటిరకముగా నెంచెడివారు.

ఆవులు పాలు బాగుగా యిచ్చెడివి. ఇవి బరువులు అగుటకు నెక్కువగా నుపయోగించెడివి. సోకు ఆఫ్రికాకు పంపబడుచుండెడివి. శరీరము నలుపురంగుగనుండును. పొడుగుకూడ నలుపుగ నుండను. తెలుపురంగు గలవాటిని నాణ్యము చేసెడివారుకారు. వీనికొమ్ములు బలముగలవై బాగుగా పెరిగి ఎద్దుల కొమ్ములకంటె దృఢములనిగా నుండును.

లాంగ్ హోర్న్ జాతి (Longhorn Breed)

ఇంగ్లాండునకు పడమరభాగమునను, లీసెస్ట్ షైరు ప్రాంతములందును ఈ లాంగ్ హోర్న్ జాతి యుండెడిది. రెండువందల సంవత్సరముల క్రిందట ఈజాతి విర్రండు నుండి, షార్తార్న్ జాతివలన తరుచుచేయబడెను. లాంగ్ షైర్ లోను యార్క్


మొత్తగా దుక్కియైన నేల వ్యర్థముకాదు.

షేర్ లోను, క్రావెన్ జిల్లాలోను ఈజాతి విశేషము గా నుండెడిది. డిమలే కాపురస్తుడు రాబర్టు బెక్విల్ వీనిని పోషించువారిలో ముఖ్యుడు. ఈజాతిలోని పశువులన్నియు ఆకారములో మార్పు గలిగియుండును. వ్యవసాయము చేయుటలో ఈజాతియెద్దలు ప్రసిద్ధిగాంచినవి. బెక్విల్ 45 సంవత్సరములవరకు వీనిని క్రద్దగాబెంచి తగు ఎర్పాట్లు చేసి ఆత డవలంబించిన పద్ధతులను ఇతరులకు చెప్పినందున అతని రహస్యపు యేర్పాట్లు అతనితోనే అంతమొందెను.

19 వ శతాబ్దములో ఈజాతి చాల నశించెను. వార్విక్ షేర్ సెంటరులో నిప్పటికిని ఈజాతి పశువులు 500 వరకున్నవి. వీనికి కండ బాగుగానుండి ఇతర జంతువుల మించియుండును. వీరిరంగు ద్రాక్షపండురంగువలె నుండును. పిపునిద తెలుపు చారయుండును. నిడుపులోను, కొమ్ముల ఆకారములోను, లాంగువోరన్ జాతికిని నలుపు వెండ్రుకలుగల షార్తాన్ జాతికిని భేదము స్పష్టముగా గాన్పించును.

దున్నలు — గేదెల జాతులు (Buffaloes and she Buffaloes)

ఈజాతులు మనదేశమున వర్తరభాగమున యున్నవి. హిమాలయ పర్వత ప్రాంతములందును, ఆయోధ్య నుంచి బూటాను వరకును, పంజాబ్ దేశమునుంచి పశ్చిమ



ముద్రాజాతి దున్న

తీరముననుండు తిరుహోట్ వరకున్న దేశములోను, బ్రహ్మపుత్రానది వ్యాపించినంత వరకుండు దేశములోను, బర్మాలోను మిక్కుటముగా నున్నవి. గేదెలు ఎక్కువగా

చాలువై చాలుగా దున్ని లే చచ్చునలకూడా పండును.

పాలిచ్చుటవలన ప్రతి పల్లెటూరులోను యున్నవి. దున్నలు బరువులుగల బండ్లులాగుటకును, భూములు దున్నటకును వినియోగపడుచున్నవి. తెలుపు పశువులవలె నివి ఎండ తీక్షణమును భరింపజాలవు. గేదెలు శరదృతువునందు పొలి వేసవికాలము సమీపించు సమయములో ఈనును. మచ్చికపడిన గేదెలు మూడు సంవత్సరములు వచ్చినతరువాత దూడలను బెట్టుచుండును. గేదె సాధారణముగా ఎనిమిదేసి దూడలవరకు పెట్టుచుండును. సాంప్రదాయమునుబట్టి కొన్ని గేదెలు ప్రతిసంవత్సరము ఈనును. తవుడు చిట్ట మున్నగు బలకరమగు వాతపదార్థములు ఎక్కువగా పెట్టుటవలన ఈ శిశువులో ఎటిపోవును. ఎదులతోపాటు దున్నలున్న పాలునకు పరిశీలించును. మదరాసు రాష్ట్రమునందంతటను ఇవి పాలుపడుచున్నవి. వీనికి లావుగ పొడవుగనుండు కొమ్ములుకలిగి వంకరతిగిరి అయిదా రడుగుల పొడవు గలిగియుండును. రంగు సామాన్యములుపుగను లేక లేతనలుపురంగున యుండును. వెండ్రుకలు తక్కువగానుండునుగాని ఒక్కొక్కభాగమందు మాత్రము వెండ్రుకల సమూహముండును. పల్లపుభూములు సాగున్నచోట వీనియొక్క యుపయోగ మెక్కువగానుండును. ఇవి నెచ్చుదిగా నడచినను పొలము దున్నుటలోను, చెరువులోటలు దున్నుటలోను, తదితరపనులు చేయుటలోను మిక్కిలి ప్రసిద్ధిజెందినవి.

తోడాదున్నలు (Toda Buffaloes)


నీలగిరి కొండల పోవువారి కందరికి ఈదున్నలను గురించి తెలిసియేయుండును. అచ్చటనుండు ప్రతి తోడావాడు ఒకమగ్గు కలిగియుండును. సామాన్యముగా నితర చోట నుండువానికిని వీనికిని చాలా వ్యత్యాసముగలదు. ఈదున్నలు తలవంతుకొని నడచును. అవి అట్లునడచునపుడు చూచినయెడల భయంకరమైన దుక్కవలె కనపడును. మెడటిభాగమందును, మెడభాగమందును, మాపురము వెన్నుభాగములందును వెండ్రుకలు దట్టముగానుండును. వానిని మనము అబ్బగ్రత్తగా సమీపించినయెడల అపాయము కలుగును.

అవి కొత్తమనుష్యులను చూడగానే తలపైకెత్తి కొంతదూరము వెనుకకు పరుగిడి మరల నిలబడి తానుచూచిన మనుష్యులవంక భయంకరముగ జూచుచు తలను పైకెత్తుచు వెళ్ళిపోయి ఇంకకొన్ని దున్నలను ప్రోగుచేసికొని ఆమనిపిని పొడచుటకై దండెత్తి వచ్చును. కొన్ని సమయములందు ఆ సమూహమంతయును ఒక్కసారి మహాగ్రత జెంది తలలు క్రిందికివంచి అవి దేనినిచూచి కోపముగనుండునో దానిమీదకు దుమికి చంపివేయును. ఈరీతిగానే పెడవులి మున్నగు భయంకరమృగములు సముద్రతీరములందున్నపుడు ఈ దున్నలగుంపులు వానిమీదబడి చీల్చివేయును.


ఉ ద క మ్మా ం డు

తోడాలు నీలగిరి పీఠభూమిమీద 800 సంవత్సరములనుండి నివసించుచున్నట్లు తెలియుచున్నది. దున్నలను గేదెలకు పెంచి జీవించుటయే వారి వృత్తియైయున్నది.


తేనెదులలోకుగా దుక్కిదున్నుటయు మూరెడెత్తు ఎరువుపెట్టుటయు సమానము.




శ్రీ రావి అంకిడుగారి 20గ్లబారి అవు — తవారి.



శ్రీ బొడపూడి భద్రయ్యగారి పందెత్తుక్త — చేబ్రాలు గుం. జిల్లా



చేబ్రావో నేదె



శ్రీ సూరికి- నెంకటనారాయణగారి మందిరబాటి ఆబోతు. (చిలువూరు గుం. జ.)

బ్రిటిషు ప్రభుత్వము రాకపూర్వము ఈజిప్తీవారే ఆ మీకభూమికి ప్రభువులైయుండిరి. కాని వారు పచ్చి బయళ్లను మార్చివేసి “ఉదకమాండు” అనుపట్టణమును నిర్మించుటకు ప్రారంభింపగానే వీరిప్రభుత్వము నాశనమైనది. క్రొత్తగాజరిగిన స్వర్ణరేలకల్లలనుబట్టి ఒక్కొక్కతోడా మిషికి 50 నుంచి 70 ఎకరములవరకున్నదని తెలియుచున్నది. ఈ భూమిమీద ఎకరమునకు రెండణాలశిస్తు కట్టెడివారు. ఈశిస్తుకప్పు వేరొండుశిస్తు లేదు.

తోడాలుచేయు విచిత్రములు

తోడాలు వివాహములు నిశ్చయించుకొనినపుడు దున్నలను ఒకరికొకరు మార్చుకొందురు. అదియే వారిప్రమాణము. మరల వివాహము జరుగునపుడు మరొకసారి యట్లే మార్చుకొందురు. చచ్చినమనిషిని శ్మశానమునకు తీసికొనిపోవుచువుడు కొన్ని దున్నలను కూడ తీసికొని వెళ్లుదురు. చచ్చినవానియందు ఆ పరిసర గ్రామములవారు గౌరవము జూపుదురు. దాని మెడలో నొక బొలుగు కట్టియుండును. శ్మశానమునకు వెళ్లిన తరువాత “మీరు వెళ్తుడు, వెళ్తుడు” అను పదముతో దున్నలను గోతిదగ్గరకు తోలినపుడు ఆచట శేడ్చువారందరును క్రిందనుండు దుమ్మును కొంచెము కొంచెము తీసికొని దున్నలమీద జల్లుదురు. తరువాతి దున్నల నన్నింటిని చంపుటకేమైన అభ్యంతర మున్నదాయని ఆశపము నడుగుదురు.


చనిపోయిన వారందరికి సంవత్సరము చేయుదురు. సంవత్సరము మొదటిదినమున బలియొసంగుటకు నిర్ణయింపబడిన దున్నలను అవియుండు పశువుల కొట్టములనుండి ఒక సంవత్సరమునకు రెంటి మూడింటిని బలియిత్తురు. రెండవ దినమున పెట్టెలో కప్పబడిన శవవాహనమును బయటపఱియుదురు. పశుశాలయొక్క ద్వారముబయట నొక పెద్దగొయ్యి త్రవ్విన తరువాత అచ్చటనున్న పొరొహితుడు పూజావిధులు గావించును. తరువాత పూజారి పూలదండలతో అచ్చటను లేబడిన దున్నలకగ్గరనువచ్చి వానిమీద విసరును. అప్పటికే యువకులచేత నానావిధకన్యములు పెట్టబడియున్న దున్నలు మార్గము కనపడక గల్గుటకు చేయును. కాని వెంటనే తరుగెత్తుమనివచ్చి బలియిచ్చిన పశువుల మొండెములను శవవాహనమునదేవు ఈడ్చుకొనివచ్చి దాని ప్రక్కనుంచి అందరు శేడ్చుదురు. తరువాత జరుగువని అతి భయంకరముగను క్రూరముగ నుండును. ప్రభుత్వమువారి పద్ధతిని నిషేధింతుని తోడాలు భయపడుచుందురు.

గేదెజాతి

ఈజిప్తి గేదెలు బాగుగా పాలిచ్చును. పాలు దుచిగానుండును. ఇవి పాలకే గాని తవితర పనులకు పనికిరావు. ఉదయమున సూర్యోదయమునకు ముందే పాలు పితురుదురు. రాత్రినేళ పశువులను కాపాడుటకు రాత్రితోగుండ్రముగ పెద్దగోడ కట్టియుం

దుక్కిలో వెడల్పుమాచుకొనక లోతుమాచుకొనును.

దును. అది చాలా బలముగను పశువుల సంఖ్యనుబట్టియు పెద్దదిగ కట్టబడియుండును. ఈగోడ మూడు నాలుగడుగులు ఎత్తుండును. ఏరాకాలమునందు పశుకాలవచ్చు చలిగాలిని రానియ్యక పిన్నచిన్న పొదలతో నాద్యారములు కప్పివేయుదురు. ఈ



చిత్రము
చిత్రించినది

ముద్రాణాతి గేదె

పశుకాలమిద గేవిధమగుకప్పుయుండదు. వానిని అన్ని కాలములందు వర్షములకు ఎండలకు విడిచిపెట్టుదురు. చిన్న దూడలను మాత్రము అతి జాగ్రత్తతో అన్ని కాలములందు కప్పువేసిన చావడియుండు కాపాడుదురు.

దక్షిణకన్నడపు దున్నల పందెములు

ఈ ప్రదేశమునందు జేయిన్ బాంటు అనునొక హిందూజాతి తెగవారున్నారు. వారు చక్కనిదున్నలను పెంచుదురు. వానిలోకెల్ల అందముగలవి కొన్ని మంగళూరు ప్రాంతమునందున్నవి. ఆ ప్రదేశములందుండు ఇతరపశువులు కొన్ని చిన్నవియగుటచేత అవి వ్యవసాయమునకు పనికివచ్చును. దున్నలను పోట్లాడించుటకునిన వీరికి మిగులప్రీతి. ప్రతి ధనవంతుడును కంబ్లలను పవిత్రవంతుడైన పాలమున ఈ దున్నల పోట్లాటలకై ప్రత్యేకస్థలమును ఏర్పరిపెట్టుదురు. ఈ పందెముల వపయోగించు దున్నలజత అయిదు వందల రూపాయల ఖరీదుండును. వాని నెప్పుడైన అరుదుగ దుక్కికి నుపయోగించుదురు. అవి పరుగెత్తించబడినప్పుడు వానిదుట్టు మూగియున్నవారు ఆపరుగెత్తు రెండిం

గొట్టెలమంద కట్టుటకంటె లోతుగా దున్నుటమేలు.

టిలో నేది ఎత్తులనుమానుచు పరుగిడునో దానినికనిపెట్టి గుర్తించుదురు. ఒక్కొక్కప్పుడు సుమారు ఇరవదిఆడుగుల ఎత్తుగల కటకటాలను నిర్మించుదురు. సామాన్యముగా నీ పంచెములు 150 గజముల పొడవుగల తడియు బుర్రము వీరును యుండు ప్రదేశమునందు వేయుదురు. వానిని తోలువాడు పలయునండములను చేత బుచ్చుకొని 18 అంగుళముల ఎత్తును, 12 అంగుళముల వెడల్పుయగల బల్లనెక్కును. దానిమీద మరియొక బల్లయుండును. అంతట తోలువాడు ఒకకాలును చిన్నబల్ల మీదను, రెండవకాలును దున్నుటవేయబడిన కాడికి తగిలించబడిన ఒక చిన్నబండి మీదనువేసి ఒకచేతితో కొరచాను, మరియొకచేతితో దున్నులోకను పట్టుకొనును. ఎట్టిపగములను వ్రుచ్చుకొనడు.

ఈరీతిగా ఆటాడబడుచున్నపుడు తోలువాడు తాను మొదట కాలువేసిన బల్లను ధ్వనిఅగునట్లుగ బలమంతయుజూపి ఆబల్లను గ్రద్దుడు కొంచెము నీటిని బురదను తీసికొని తనచుట్టును ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ గౌను ఆకారముగా జలుపు. ఆప్పుడప్పుడు వాడు పడుచుండుటగలదాని భూమియంత బురదతో నీటితో కూరుకొని యుండుటచే దెబ్బమాత్రము తగులదు. ఆ చుట్టునున్నవారు ఒక్కొక్కప్పుడు కేకలువేసి అరచి నపుడు తోలువాడు కొన్ని చిత్రమైనపనులు చేయును. ఇటువంటి పెద్దపెద్ద ఆటలను చుట్టుప్రక్కలనున్న గ్రామములనుండి సుమారు నూరుజతల దున్నులువచ్చును. ఆ చుట్టు ప్రక్కల షాహుకార్లు రాకపోయినను తమదగ్గరనున్న దున్నులను మాత్రము తోలి పెట్టుదురు.

పర్లాకిమిడి దున్నులు, గేదెలు

గంజాంజిల్లాలో దేశలేక మందజాతి, పెద్ద కిమిడిజాతి, జిరంగిజాతి దున్నులు గలవు. ఈ జిల్లాలోని యితరభాగములలోనున్న దున్నుల, గేదెలకంటె నీ పశువులు పొడవుగ బలముగ నుండును. అవి ముదురు బూడిదరంగు కలిగియుండును. జిరంగిజాతి బట్టెలకంటె కొంచెము నలుపుగ నుండును. వేడిమినంతగా భరించజాలవు. ఎంత బరువు వేసినను శాంతముగ ఆయాసము లేక లాగును.

జిరంగి గేదెలు, పెద్ద కిమిడిజాతి గేదెలు, పర్లాకిమిడిజాతి గేదెలంత పాల నీయవు. సామాన్యముగ ఈజాతి పర్లాకిమిడిలోనేతప్ప తడితరచోట దొరకవు. దున్నులు వ్యవసాయమునకు ముఖ్యమైనవి. ఆ ప్రాంతములోని ఎద్దులు దున్నులు లాగినంత బరువు లాగలేవు. పర్లాకిమిడి ఎట్టిటైతులు ఎద్దులకన్న దున్నులనే ఎక్కువగా నుపయోగించుదురు.

ఆటవభాగము పశుపరీక్ష

పశువుల కాపరి

“ముదమారగా దున్న మూపునగూర్చుండు
దొడ్లవారల యింటి బిడ్డవోలె
పచ్చికబీళ్లలో బశువుల బాలించు
ధరణినేలెడు క్షమాధవునిబోలి
బుట్టకు బంకంబుపూసి యీతలగొట్టు
బ్రకృతి శాస్త్రజ్ఞునిభాతి దేలి
కోకిల కెదురు ‘కూ కూ’ యని కూయుచు
నటపించు మేటిగాయకునిమాడ్కి

కోతికొమ్మచ్చులును బిల్గోళ్లులాడు
సాటిలేనట్టి పిల్లవస్తాదురీతి
మురువుగొల్పగ గోచిని మూడిపెట్ట
కాలగతులెంచి పశువుల గాయు నతడు”

అడ్డులేనట్టి యానంద మనుభవించి
చింతలన నెట్టివో మది జేరనీక
హాయిగా గాలమునుబుచ్చు చనుదినంబు
ప్రభుతపచరించు బశువుల పాలకుండు॥

“పల్లెటూరు”

భారతదేశములో 8 లక్షల గ్రామములున్నవి. తెల్లవారుసప్పటికి ప్రతిగ్రామము నుండి కనీసము 25 మందికి తక్కువగానుండ పిల్లలు పశువులను కట్టువిప్పి మందలను బీడుభూములను, కాలువగట్టను, పాలములను తోలుకొనిపోయి స్వార్థాస్తమయము వరకు మేపుటో, కాపలాకాయుటో, కోతికొమ్మచ్చులాడుటో, కేదెలమికనెక్కి స్వారిచేయుటో, మొండిమొలలతో కాలువలలో దూకి స్నానము చేయుటో కాల

యాపనము చేయుచుందురు. కనీసము 8 లేక 9 గంటలవరకు కాలక్షేపము చేయుచుండురు. ప్రతి కాపరికి ఒక తక్కిలీ యిచ్చి వడుగుట నేర్పిన ఆరగంటలో వచ్చును. పశువులను మేపుకొనుచు సరాగా ఆరగంటసేపు వడికిన గ్రామములలోని మంద బయళ్ళు, బీసీ తక్కిలీమయమైపోవును. ఈరీతిగా మన దేశములో ప్రతిశాజు పశువులను కాచే కాపరులు ఒకకోటి ఆరువది లక్షలు లేరుచున్నారు. వీరంతా వడికిన నూలు ఖరీదు వేసిన దినమునకు పదిలక్షల రూపాయలు విలువగల నూలు లభించును. దీని నాలుగరి విలువ వీరి కోట్ల రూపాయలుండను. ఈ మొత్తములో సగముధర వేసికొనినప్పటికి 18 కోట్ల రూపాయల విలువగల నూలు సంవత్సరమునకు దేశ మొత్తముమీదగల కాపరులచేత గొడ్లకాపున భంగములేకుండ తయారుచేయి చువచ్చును. ఇందువలన వారి సరదావకుడ ఎట్టిభంగములేదు. ఎంత తక్కువ వడికినా నెలకు ఒక పాను సులభముగా వడుగుకొనవచ్చును. తన వుటుంగములోనివారికి యింక కొంత అందులోనుంచి ఈయ వచ్చును. ఈ గొడ్లకాపరులంత బీదరైతులు, వ్యవసాయకూలీలు, హరిజనలయొక్క వుటుంబములైయున్నారు కాన తక్కిలీపద్ధతిని ఆచార్యులలో పెట్టుదురుగాక.

కాపరి ఆవలంబింపవలసిన పద్ధతులు

పశువులను మేపు కాపరి తెలివి, చురుకైనతనము, పశువులయందు భూతదయ కలిగియుండవలెను. ఇకను దొంగతనము, దుభ్యాసములుగలవాడుగా నుండరాదు. గ్రామాలలోనుండు పశువులకాపరులు వాటిని విడిచిపెట్టి హాయిగా పరుండుటయో లేక యేపనిమీదనో షికారులుచేయుటయో గలుగుచుండును. అప్పుడా పశువులు యిరుగుపొరుగు రైతుల పాలములలోనికి ఆచ్చటనున్న మేతను తినుచుండగా, ఆరైతు ఆ పశువును చాపగొట్టుటయో లేక ఎవరికి తెలియకుండ ఏ బం చెలదొడ్డిలోనో పెట్టుటయో, ఏ మార్గప్రదేశములకో తగులుటయో జరుగుచుండును. కొందరు నాకరులు పాలములకు తోలుకొని వెళ్ళి పాడిపశువులను దప్పులలో బాతులుకట్టి నూర్చుటయో లేక దరాకాలములో పాలములలో దమ్ముచేయుటయో లేక మేతకేరీ యే పొరం బోకలలోనో ఆటవిటు ప్రిప్పి సాయంకాలమునకు యింటికితొలుకొని పోవుటయో కలుగుచుండును. కాబట్టి రైతులంతా తమ పశువులను కాయువారికి గరియగు క్రమ క్షణ నిచ్చుదురుగాక.

పశువుల వయస్సు కనుగొనుట

పశువుల వయస్సును పశువుల శరీరపరిమాణమునుబట్టియు, వాటి పండ్లనుబట్టియు కొమ్మలనుబట్టియు కనుగొనవచ్చును. ఒక సంవత్సరము లేక ఒకటిన్నర సంవత్సరము లేక రెండు సంవత్సరములు కలిగిన దూడలను వాటి పరిమాణమునుబట్టియే వయస్సును కనుగొనవచ్చును. కొన్నికొన్ని పశువులు చిన్న వయస్సులోనే యుండవలసిన పరిమాణమునకున్న హెచ్చి పెద్దవయస్సుగలవానివలె కన్పట్టుచుండును. ఇట్టి విషయములు చాల

అరుదుగ నుండును. కాని అనుభవకారుల మాడలకు చూడగ నే వానియొక్క పరిమాణమునుబట్టి వాటి వయస్సు కనుగొందురు.

కొమ్ములనుబట్టి పరీక్షించు సూత్రములు

పాడిశశువులయొక్క వయస్సు కనుగొనుటయందు మాత్రము వానియొక్క కొమ్ములే మనకు ముఖ్యాధారములు. కాని చాలాపశువులకు కొమ్ములను నగుట వలన వానియొక్క వయస్సును సులభముగా కనుగొనుట కష్టము.

పశువు పుట్టిన 1¹/₂ సంవత్సరము లేక 2 సంవత్సరములవరకు కొమ్ములు త్వరగా పెరుగును. తరువాత నెప్పటిగా పెరుగుచుండును.

మాడుసంవత్సరములు వయస్సువచ్చునపుడు కొమ్ముయొక్క మొదలునందు ఒక గుండ్రని చారవంటి వలయ పేర్చుడును. అప్పటినుండి ప్రతిసంవత్సరము ఒక వలయ పేర్చుడును. ఆ వలయములు ఎద్దు కొమ్ములమీదకంటె ఆవుకొమ్ములమీద స్పష్టముగా కనపడును.

అయినను ఎదుయొక్క కొమ్ములూదమున్న వలయములసంఖ్య రెండు కలిపిన యెడల దాని వయస్సును తెలిసికొనవచ్చును. పశువు కొమ్ములమీద నాలుగు వలయములుండిన దానికి రెండు కలిపినయెడల ఆరు అగును. కావున ఆ పశువుయొక్క వయస్సు 6 సంవత్సరము అగును. ఈ ధముగా లెక్కించవలెను. కాని కొందరు బేగాండ్రు తక్కువ సంవత్సరములున్నవని తెలుపుటకు పశువుల కొమ్ములను చిత్రీకపట్టించుదురు. కాట్టి బాగ్రత్తగా పరీక్షించి కొనవలెను.

పండ్లనుబట్టి పరీక్ష

పశువునకు సామాన్యముగ క్రింది దౌడలగుండు 20 పండ్లును, పై దవువయందు 12 పండ్లును యుండును. క్రిందదౌడకు నుండుభాగముననుండు పండ్లకు కత్తెరపండ్లందురు. పై దవుడయొక్కయు క్రింది దవుడయొక్కయు వెనుకపండ్లకు దంతములందురు. కత్తెరపండ్ల సహాయముచేత పశువుయొక్క వయస్సు కనుగొనవచ్చును. అపుల పైదౌడయందు కత్తెరపండ్లుండవు. దూడకు పుట్టినప్పుడే చిగళ్ళలోనుండి కొంచెము కొంచెముగా పాలపండ్లు కనపడును. క్రమముగా ఆ పండ్లుపోయి సిగనుగు పండ్లు వచ్చును. సిగనుగుపండ్లు పాలపండ్లకంటె పరిమాణమున పెద్దవిగ నుండును. పుట్టినపుడు దౌడయందు రెండుపాలపండ్లుండును. రెండవ వారమునకు 4ను, మూడవవారమునకు 6 ను వచ్చును. ఇట్లొక నెలలో 8 వచ్చును 6 నెలలవరకు ఈపండ్లు శుభ్రముగా సమావముగా నుండును. తరువాత రుగుమారి అరుగుట మొదలుపెట్టును. 8వ నెలలో మొదలునున్న రెండుపాలపండ్లు అరుగును. సంవత్సరమునకు 4 అరుగును. 15 నెలలకు 6 అరుగును. 2 సంవత్సరములకు 8 అరుగును. మళ్ళనున్న రెండు పాలపండ్లూడి క్రొత్తవి వచ్చును. 3 సంవత్సరములకు 4 ను, 4 సంవత్సరములకు 6 ను, అయిదు సం

శ్మరములకు రి పండ్లును వచ్చును. ఆచ్చటనుంచి మగల పండ్లూడును. ఈరీతిగా జరుగు పండ్లనుబట్టి వయస్సు కనుగొనవచ్చును.

ప్రాచీన ఋషుల బోధ

ఆప స్తంబమహాముని గోటాతులనుగూర్చి చెప్పుట.

ప్రథమా గౌరకపిలా ద్వితీయా గౌరపింగళా

తృతీయా ర క్తకపిలా చతుర్థా నీలపింగలా

మొదటిజాతి గౌరకపిల, రెండవజాతి గౌరపింగళ, మూడవది ర క్తపింగళ, నాల్గవది నీలపింగళజాతి.

పంచమీ శుక్లపింగాక్షీ షష్ఠీతు శుక్లపింగళా

సప్తమీ చిత్రపింగాక్షీ అష్టమీ బభ్రురోహిణీ

అయిదవది శుక్లపింగాక్షిజాతి, ఆరవది శుక్లపింగళజాతి, ఏడవది చిత్రపింగాక్షి, ఎనిమిదవది బభ్రురోహిణిజాతి.

శ్లో॥ నవమా శ్వేతపింగాక్షీ దశమీ శ్వేతపింగళా

తాదృశాస్తే పృథ్వీహః కపిలాస్తుప్రకీర్తితాః

తొమ్మిదవది శ్వేతపింగాక్షి, పదియవది శ్వేతపింగళజాతి. ఈరీతిగానే వృషభ ములకుగూడ కపిలాది జాతులుగా జెప్పబడినవి.

ఎటువంటి వృషభములతో పనిచేయింపరాదు.

పరాశరమహర్షి బృహత్పరాశరసంహితలో చెప్పుట.

నాగం వ్యాధినయం క్తం ప్రాణహీనంచ దుర్బలం

క్షుద్యుక్తం తృప్తం శ్రాంత మనన్ద్యాహం నవాహయేత్.

అవయవముల లోపములు గలిగినట్టిదియు, వ్యాధిగ్రస్తమైనట్టిదియు, హీన ప్రాణము గలిగినట్టిదియు, బలములేనిదియు, అలెగొనినట్టిదియు, అలసిపోయినట్టిదియు నగు ఎద్దును కొనరాదు. పని చేయింపరాదు.

దృమైథన అవయవములు, సుడులుగల ఎద్దే శుభము నిచ్చును.

వామావరై ర్యామే దక్షిణపార్శ్వే చ దక్షిణావరైః

శుభదా భవన్త్యనదుహో జంఘాభి వైప్రణక నిభాభిః.

ఎద అదను అయినప్పుడు వెలుగులోనయినా చల్లవచ్చును.

ఎడమవైపున ఎడమనుడి, వడివైపున వడినుడియు గలిగి లేడి పిక్కలవంటి పిక్కలుగల వృషభములు శుభము నిచ్చును.

వైడూర్యమల్లికాబుద్బుదేక్షణాః స్థూలశీత్రవర్మాణాః
పార్శ్వే భిరస్ఫుటితాభిః శస్తాః సర్వేపిభారవహాః.

వైడూర్యము, మల్లికము, నీటిబుగ్గవంటి కన్నులు గలవియు, స్థూలమగు కనురెప్పలును, బద్దలుకొని మడిమలు గల వృషభములు మంచివి. ఇవి^గ బరువులనుకూడ మోయును.

నాసికమీద ముడుతలుండుట మంచిది,

ఘ్రాణోద్దేశే సవళిః మార్జారముఖః సితదక్షిణతః
కమలోత్పలలాక్షాభః సువాంధి ర్వాజితృల్యజవః.

నాసికమీద ముడతలుండినను, పిల్లిముఖమువంటి ముడతలుగలదియు, ఆముఖము వడివైపు తెలుపుగ నుండినదియు, కలువతామరపువ్వు, లక్కరంగుగలదియు, మంచి తోకగలదియు, గుట్టమువంటి వేగము గలదియు నగు వృషభము శ్రేష్ఠమైనది.

గుట్టముతో సమానమైన వడిగల వృషభము శ్రేష్ఠమైనది.

లంబై రస్త్వవశై ర్గోషోదరశ్చ సంక్షిప్త వంక్షణక్రోడః

జ్ఞేయోభారాధ్వసహో జవేశ్వతుల్యశ్చ శస్తఫలః

తేలాడు వృషణములు గలది, మేఃయుదరమువంటి యుదరముగలది, సంక్షిప్తమైన తొడల సందులుగలది, రొమ్ముగలది, ఎక్కువ బరువులు మోయునది, చాల దూరము, నడచునది, గుట్టముతో సమానమైన వేగముగలదియు నగు వృషభము మంచి లాభము కలుగజేయును.

పెద్దముఖముగల వృషభమునకు హంసయని పేరు.

సితవర్ణః పింగాక్షః తామ్ర విషాణోక్షిణి మహావక్త్రః

హంసోనామ శుభఫలో యూధస్య వివర్ధనః ప్రోక్తః

తెలుపురంగును, పచ్చని కన్నులుగలది, ఎరుపురంగు కొమ్ములు, రక్తపురంగు శీత్రములు, పెద్ద ముఖముగల వృషభమునకు హంస యని పేరు. ఇటువంటి వృషభము తన యజమానిని వేగముగా లక్ష్మీసంపన్నునిగ జేయును. ఆ యజమాని మందగూడ వృద్ధియగును.

నీరులేని పైరు నూనెలేని తలకట్టు.

భూమిని తాకు తోకగల వృషభము మంచిది.

భూస్పృగ్వాలధి రాతామ్రవంక్షణో రక్త దృక్కకుదీచ
కల్మాషశ్చ స్వామిన మచిరా త్కురుతే పతిం లక్ష్యాః

భూమిని స్పృశించు వాలము, వృషభమునకు దిగువ మందర కాశ్యకుభ్యనుండు
సలమును, కిన్నులు, మూపురము, ఎరుపురంగుగ నుండు వృషభము యజమానునికి లక్షి
ప్రాప్తి జేయును.

దేహమంత నొకరంగును ఒకకాలు తెలుపుగల వృషభము శ్రేష్ఠమైనది.

యోనా సితైక చరణో యధేష్టవర్ణశ్చ సోఽపి శస్త్రఫలః
మిశ్రఫలోఽపి గ్రాహ్యో యది వైకాంత ప్రశస్తోఽస్తి.

ఏ వృషభము యొక్క కాలు తెలుపుగానుండి శరీరమంతయు మరియొక రంగు
కలదిగా నుండునో ఆ వృషభము మంచి ఫలము నిచ్చును. బాగుగా తెలుపుగా నుండక
మిశ్రమ రంగుగా నున్నను శ్రేష్ఠమైనదిగా నుండును.

వృషభముయొక్క శరీర కొలతలు

పరిణామో వృషముఖా దుదరేతు చతుర్గుణః
నకస్త్రిగుణోఽఛ్చంతు సార్థత్రిగుణాదీర్ణతా.

వృషభముయొక్క ముఖమానముకంటె చతుర్గుణము, ఉదరముయొక్క చుట్టు
కొలత, ముఖమానముకంటె త్రిగుణము, ముందరి డెక్కి మొదలు మూపురమువరకు
ఎత్తు సాపు మాడునర్నర గలిగియుండవలయును.

సప్తతాలో వృషః పూజ్యో గుణై రేభి ర్యుతోయది
తస్యాశినచత్వైర్మందస్సు వోఢా హ్యంగసుందరః.

ఏడడుగులు ఉన్నతమైనను పైన చెప్పిన లక్షణములే, కలిగియుండినను, బొడ్డు
యొక్క చలనముచేత మందగమనము గలదియు, బరువు బాగుగా మోయునదియు,
అందమైన అవయవములు గలదియు

జాతికూర సువువృష్టశ్చ వృషభ శ్రేష్ఠ ఉచ్యతే
త్రింశద్యో జనగంతావా ప్రత్యహం భారవాహకః.

ఇతర వృషభముల ధిక్కరించునదియు, బలిసినదియు నగు వృషభము శ్రేష్ఠము,
పూజనీయము నగును. ముప్పది యోజనములు ప్రతిదినము నడచునదియు

నూతిని నివు రక్షించితే నూయి నీపాట్లను రక్షించును.

నవతాల్పసుదృఢ స్సుముఖోష్ఠః ప్రశస్యతే
వృషస్యాష్టేసి తాదంతా చతుర్దేభిఃఖలాన్మృతా.

తొమ్మిది ఆకుగుల పొడవుగలదియు, మిక్కిలి దృఢమైనది, యోగ్యమైన
ముఖము పెదవులు గల పృషభము చాల మంచిది.

ఎట్టి వృషభములు మంచివికావు ?

వృషభోవ్యేవం సూలాతిలంబవృషణః సిరాతతక్రోడః
సూలసిరాచితగండః స్త్రిస్థానం మేహతే యశ్చ.

సూలమై మిక్కిలి వ్రేలాడుచుండు వృషణములుగలదియు, మందర జబ్బలమధ్య
సరము లగపడుటయు, గండస్థలమువద్ద సరములు బడుటపడుటయు, మాడుచోట్ల
మేహన మొనర్చునదియు,

ఎక్కువగా శ్వాసను పీల్చు వృషభము మందను మాపును.

మాఛారాక్షః కపిలః కరటోవా నశుభదో ద్విజస్యేష్ఠః
కృష్ణోష్ఠతాలుజిహ్వః శ్వసనో యూధస్య ఘాతకరః.

పిల్లిఃస్థులప టి కన్నులుగలవి, కపిలగంగులవి, సగు పృషభములు మంచి
కావు. నలుపుపెదవులు, దోడలు, నాలుకగలవియు, ఉచ్చాస్వసనిశ్వాసములు తర
చుగా విడచునవియు సగు పృషభములు మంచివికాక మందలనుకూడ మాపును.

పేడ ఎక్కువగావేయు వృషభమును విడిచిపెట్టవలయును.

సూలశక్రకృన్మణిశృంగః సితోదరః కృష్ణసారవర్ణశ్చ
గృహజాతోఽపి త్యాజ్యో యూధస్య ఘాతకరః

విశేషముగ పేడ వేయునవియు, కొమ్ములచివర ఉండవలె నుండునవియు,
తెలుపురంగుల కడుపుగలిగి మిగిలిప శరీరము నలుపు ఎటువుగంగులు కలిగియుండున
వియు సగు పృషభము లింటబుట్టినను విడిచిపెట్టవలయును. మందలనుకూడ పాడు
జేయును.

నలుపురంగు మచ్చల వృషభముల కొనరాదు.

శ్వానుక ఘృష్ణచితాంగో భస్మారుణనన్నిభో బిడాలాక్షః
విపాణా మపి నశుభం కరోతి వృషభః పరిగృహీతః.

లావులేని నెను లేగ లేని యావు నిష్పుయోజనము.

దేహమందంతట నలుపురంగు పువ్వులువంటి మచ్చలుగలవియు, భస్మమువలె ఎరుపురంగులవియు, పిల్లకన్నులవంటి కన్నులుగలవియు నగు పృవభములు మంచి కావు.

యే చోద్ధరంతి పాదాన్ పంకా దివ యోజితాః కృతగ్రీవాః
కాతరసయనా హీనా శ్చ పృష్ఠత స్తే నభారసహాః.

తోలునపుడు బుడలొనుండి లాగుకొనునట్లు కాశీకన్నునదియు, చిక్కినమెడ గలదియు, భయస్వభావ మగు కన్నులుగలదియు, తక్కువ ఆనందముగలదియు నగు యెద్దు బరువులు మోయజాలదు.

మంచి గోవు లక్షణములు.

మృదు సంహతతామ్రాస్తా స్తనుస్పిచః తామ్రతాలుజిహ్వశ్చ
తను హస్తోచ్చశ్చనణాః సుకుక్షయః సృష్టజంఘాక్షయః.

మృదువుగానుండి కలసిన ఎరుపురంగుగల పెదవులు, చిన్న పొత్తికడుపు, ఎరని దవ్వుడలు, నాలుక, సన్నమై మృదువుగానుండి వాలక నిలుపుగానుండు చెవులు, మంచి కడుపును, సుప్తమైన పిక్కలు.

ఆతామసంహతఖురా వ్యూఢోరస్కా బృహత్కరుద్యుక్తాః
స్నిగ్ధ శ్లేష్మ తనుత్వగ్రోమాణః తామ్రతనుశృంగాః.

కొంచె మెరుపురంగు, ఒండొంటితో కలిసియుండు డెక్కలు, విశాలమైన వక్షము, గొప్ప మూపురము, నురుపై మృదువై నూత్నమైయుండు చర్మము, వెండ్రు కలుగలవి, ఎరుపురంగుగల చిన్న కొమ్ములు,

తనుభూస్పృగ్వలధయో రక్తాంతవిలోచనా మహోచ్ఛ్వాసాః
సింహస్కంధా స్తన్వల్ప కంబళాః పూజితాః సుగీతాః

నవదశపురు భూమికి తగిలితగలని తో, కొంచె ఎరుపురంగు దీపగల కన్నులు, ఎక్కువగా ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసములు విడుదలవి, సింహమువంటి వెన్నెముకగలది, పెద్ద కుత్తుక గండడోలు గల గోవులు శ్రేష్ఠములైవి.

ఆక్షేపణగల గోవులు

సాస్రవిలరూక్షాక్ష్యో మూషకసయనాశ్చ సశుభదా గావః
ప్రచలచ్ఛిపిలవిషాణాః కరటాః ఖరసదృశవర్ణాశ్చ.

గొట్టెలపెంట యేదాది, ఆవుల పెంట ఆకేడ్లు.

బిరుగార్చును రక్తముగలిగిన నేత్రములుగలవియు, ఎలక కన్నులవంటి కన్నులు గలవియు, నగు గోవులు శుభముల నియ్యు. కదలుచున్న కొమ్ములు గలవి, చప్పి కొమ్ములుగలవి, కష్టముగ పాలు పితుకదగినవి, కాకి, గాడిదరంగుగలవి మంచివి కావు.

దశ నస్త చతుర్దంత్యః ప్రలంబ మండాననా వినతపృష్ఠాః

హ్రస్వస్థూల గ్రీవా యవమధ్యా దారితఖురాశ్చ.

పది, ఏడు, నాలుగు దంతములుగలవి, పొడుగుగానుండు నోరు, ముట్టెగలవి, పంగిన పృష్ఠభాగముగలవి, పొట్టిగాను స్థూముగానుండు గంగడోలుగలవి, నూత్ను మగు నడుముగలవి, బ్రద్దలైన డెక్కలుగలవి మంచివికావు.

శ్యామాత్మిరజిహ్వ గుల్ఫైరతితమభి రతిబృహద్భి ర్వా

లతికకుదః కృశదేహ నేష్టా హీనాధికాంగ్యశ్చ.

కపిలరంగుగలిగి మిక్కిలి పొడుగు నాలుకగలవి, పెద్దమూత్రముగలవి, పరి మా గముకంటె తక్కువ అంగముకలవియు నగు గోవులు మంచివికావు.

పశువునుకొని ఇంటికి తీసికొనివచ్చు చక్రము

లిధి	వారము	నక్షత్రములు
పాడ్యమి	—	—
విదియ	సోమ	స్వాతి
తదియ	బుధ	—
పంచమి	—	పునర్వసు
షష్ఠి	బుధ	—
సప్తమి	గురు	త్రావణము
దశమి	శుక్ర	ధనిష్ఠ
ఏకాదశి	—	—
ద్వాదశి	శని	—
చతుర్దశి	—	శతభిషము

ముక్కును కుట్టుట

తృతీయేఽహ్ని చతుర్థేవా యదైవోఽతా దృఢోభవేత్
తదా నసాతు భేత్తవ్యా నైవప్రాగ్ దుర్బలస్యచ.

దూడ దగ్గరనుంటేకాని వాలపశువు పనికిరాదు.

మూడవ దినమందుగాని, నాల్గవదినమందుగాని, వృషభము ఎప్పుడు బలముగా ఉత్సాహముగా నుండునో అప్పుడు ముక్కును వట్టవలయును. దుర్బలముగా నుండు నపుడు వట్టరాదు.

నానావేధనకాలంతు ఖాదిరం వాధశ్శై శపం

ద్వాదశాంగుళకం కార్యం తజ్జై స్త్రీణి సమేచవా.

మహ్న కట్టుటకు చంద్రకట్టనైనను, ఇరుగునుకట్టనైనను పండ్రెండో గుళముల పొడవుగలదానిని ఉపయోగించవలయును.

పశువులను యాత్రలకు తీసికొనిపోవునపుడు ముహూర్తచక్రము

తిథి	వారము	సత్కర్తములు
పాడ్యమి	సోమవారము	పూర్వాభాద్ర కేవ పాదం
విదియ	మంగళవారము	జ్యేష్ఠ, ధనిష్ఠ
తదియ	—	—
పంచమి	బుధవారము	మృగశిర, రే.తి
సప్తమి	గురువారము	ఆశ్విని, విశాఖ
దశమి	శుక్రవారము	ఆశ్లేష
ఏకాదశి	శనివారము	—

గోక్రయవిక్రయ ముహూర్తచక్రము

ఈ దిగువ చక్రములోనున్న తిథులు, సత్కర్తములప్రకారము క్రయ విక్రయములు జరుపుటమంచిది.

తిథి	వారము	సత్కర్తములు	
పాడ్యమి	సోమ	హస్త	ఆశ్విని
విదియ	మంగళ	పుష్యమి	పునర్వసు
తదియ	బుధ	రేవతి	కృత్తిక
చవితి	గురు	జ్యేష్ఠ	మృగశిర
పంచమి	శుక్ర	ఆశ్లేష	ధనిష్ఠ

పశువుల పెడకు పెడకలరూపముగా కొల్లుట మహానష్టము.

పశువులను సంతరికు, యాత్రలకు తీసికొనివెళ్ళునపుడు ముహూర్తచక్రము

తిథి	వారము	నక్షత్రములు
పాడ్యమి	—	అశ్వినీ, భరణి, కృత్తిక
విదియ	సోమవారము	మృగశిర, ఆశ్లాద, పుష్యము
తదియ	—	—
పంచమి	మంగళవారము	పుష్యమి, ఆశ్లేష, మఖ
షష్ఠి	బుధవారము	—
సప్తమి	గురువారము	పూర్వాశ్లాద, హస్త 3 వ పాదం
దశమి	శుక్రవారము	—
ఏకాదశి	—	జ్యేష్ఠ, ఆహారాధ
ద్వాదశి	శనివారము	—
త్రయోదశి	—	మృగశిర, శరభిరూ, రేవతి

మంచి గోవు లక్షణములు

రల:—ఆంత పెద్దదిగ, ఆంత చిన్నదిగ నుండరాదు.

నొసలు:—విశాలముగ నుండవలెను.

కన్నులు:—సోమగానుండి మిగుల చిన్నవిగాగాని, చాల పెద్దవిగాగాని యుండక సామాన్యముగా నుండవలెను. గుంటలుపడక చక్కగా కనపడుచు శాంతి నూచకములయిన కళ్ళలుగలిగియుండుట మంచిది.

మెడ:—పొట్టిగ లావుగ నుండవలెను.

ముక్కు రంధ్రములు:—కోసుగా పొడవుగా నుండవలెను.

కొమ్ములు:—వెనుకవలిదిగి యుండవలెను. ముందువ పొడుచుకొనివచ్చిన కొమ్ములుగల ఆవులతోగూడ కొన్ని మంచివియుండుటగూడ గలదు.

కాళ్ళు:—పొట్టిగ వంకరలేకుండ నుండవలెను. ముంగళ్ళు వెడల్పుగలిగి కండ బట్టి యుండవలెను.

తోక:—సన్నముగా పొడవుగానుండి నేలమతగులునట్లుండవలెను. తోకచివర చక్కని పెద్దకుంచవలె పుచ్చుండవలెను.

వీపు:—మూపురముప్రక్క కొంచెము పల్లముగా నున్నను వీపు చదునుగా నుండవలెను.

వెండ్రుకలు:—సన్నముగా మెత్తగా నిగనిగలాడుచు నుండవలెను.

ఒక జతపశువులప సుమారు 60 చ॥ అడుగుల వైశాల్యమువసరము.

శరీరము:—పాడవుగా నుండవలెను. తోకవైపు శరీరము మూపురమునకు సమానమైన ఎత్తుండవలెను.

తొంటి:—విశాలముగా నుండవలెను.

తొడలు:—ఒకదానికొకటి యొరనికొని పోయినట్లుండక విడిగా నుండవలెను. ఇట్లున్నచో మంచి పాదుగేర్పడును.

అవయవములు:—వదులుగా విశాలముగా నుండవలెను. దానిపై కండ వ్రేలాడుచుండవలెను.

పాదుగు:—పెద్దదియై ముందునుండి వెనుకవైపువఱకు చాలావరకు వ్యాపించి పెద్ద సంచివలె నుండవలెను. పాలుతీసినతరువాత పాదుగు పూర్తిగా మడతలు పడవలెను. మాంసపూరితములైన ఆనగా కండపాదుగులు అంత మంచివికావు. చూచుటకు అవి అందముగానుండును గాని పాల నంతగా ఈయజాలవు. కండపాదుగునుంచి పాలు తీసినతరువాత ముడుచుకొనినయెడల ఆ పశువు మంచిదికాదు.

స్తనములు:—నాలుగు సమానమగు దూరములో నుండవలెను. ముందువైపు స్తనములు వెనుకవారికంటె నిందుక పొట్టిగ నుండవలెను. మూడు, ఒకటి, చన్నులు గల భ్రశువులంత శ్రేష్ఠమైనవిగావు, కొరివి చన్నులుగలవానిని కొనరాదు.

ఈదిగువ స్వభావముగల అవులుకూడ మంచివి.

పాలిచ్చు అవు అందముగా శాంతముగా తగినంత ఓపికతో మచ్చికతో నుండును.

పాదుచునవి బునకొట్టునవి ఎగజేయుచుండును.

తొలుచూలు యీతయైన అవు చిరావగానుండును. లేత అవును కొనుటయే మంచిది. ఈయావు అయిదారు యీత లీనపుటికి ఆధర కమ్మవచ్చును. రెండవ ఈతప పాల పెక్కువ యిచ్చును. ఈతలీనక అవును కొనినచో సరిగా పాలీయక యీతలుడిగి పనికిమాలినదగును.

అవుల నేకరకములుగా పాలిచ్చును. కొన్ని నాలుగు మరికొన్ని ఎనిమిది సంవత్సరముల వరకు పాలనిచ్చును. నాలుగు యీతలుదాటినకొలది పాలుతగ్గును.

అవు వయస్సు వృద్ధియైనకొలది ఆహారమెక్కువగా తిని పాలు తక్కువగా నిచ్చును.

ముఖము, మెడ, భుజములు, తొంటి, కాళ్ళు వగైరా అవయవములమీద రక్షలు చేసిన అవులను కొనరాదు.

నెలలురాకమునుపే దూడలను పారకేయు పాడిపశువులను కొనరాదు.

వృషభముల కుండవలసిన విషయములు.

తల:—పెద్దిగా నుండవలెను.

చెవులు:—మృశువుగానుండి నిక్కబొడుచుకొని యుండవలెను.

కన్నులు:—అంత పెద్దవిగాగాక అంత చిన్నవిగాగాక మధ్యరకముగా నుండి లేడికన్నులవలె నుండుట మంచిది. రెండుకన్నుల మధ్యభాగము వికాలముగానుండి క్రమక్రమముగా ముక్కురంధ్రములవరకు కొనలేరియుండవలెను. కనుగ్రుడ్డు లోతుగా గాని మిడిగ్రుడ్లుగాగాని యుండిక సాధుత్వము చురుకుదనము గలిగి చకచకలాడుతుండవలెను.

ముక్కురంధ్రములు:—పెద్దవిగానుండి తెరుచుకొనియుండవలెను.

దాడలు:—ఎరువురంగుకలిగియుండి దృఢముగా నుండవలెను.

కొమ్ములు:—సన్నముగా దృఢముగా నుండవలెను.

మాపురము:—పెద్దదిగానుండి పురుషచిహ్నము కలిగించునదిగాను, మధ్య వీపావలె గుండ్రముగా నుండవలెను.

మెడ:—బలముగలిగి తలవంచినపుడు కాలువలె నుండవలెను. ఇంకను పొట్టిగలావుగ దృఢముగా నుండవలెను.

వక్షసలము:—వికాలముగా నుండవలెను.

నాలుక:—నన్నముగా కాంతిగా నుండవలెను.

చర్మము:—నుమ్రుగా నుండవలెను. మూపురము మొదలు తోకముడివరకు మిట్టపల్లములలేక సమానముగా నుండవలెను.

కాళ్ళు:—నాలుగు పరచగానుండి గట్టి ఎముకలు గలిగి యుండవలెను. తొడలు బలముగలిగి నరములతో కూడియుండవలెను. డెక్కలు కఠినముగను నలుపుగను గుండ్రముగ విడివిడిగ నుండవలెను.

తోక:—ధూమిపైకి వ్రేలాడునదిగ నుండవలెను.

గంగడోలు:—చిన్నదిగా నుండవలెను.

రంగు:—తెలుపుగానుండి మూపురము కొంచెము నలుపురంగుగా నుండవలెను. తెలుపురంగులవి శ్రేష్ఠమైనవి.

కోడె లక్షణములు

మెడ:—కురచగా బలముగా నుండవలెను.

ముక్కురంధ్రములు:—కాంతిగా నుండవలెను.

కన్నులు:—వికాలముగా నుండవలెను.

దూదితీయగా మిగిలిన ప్రతిగింజలను పశువులకు మేపును.

నొసలు:—వెడల్పుగా నుండవలెను.

చర్మము:—శుక్తుకక్రిందనుండి క్రింది పొట్టవరకు గంగడోలు వదులుగా నుండవలెను.

గేదెకుండవలసిన లక్షణములు.

తల:—చిన్నదిగా నునువుగా కండగలిగి యుండవలెను.

నొసలు:—విశాలముగా నుండవలెను.

కన్నులు:—చిన్నవిగా సొగసుగా నుండవలెను.

వెన్ను:—లోతుగా నుండవలెను.

కాళ్ళు:—వెనుకకాళ్ళకంటె ముందుకాళ్ళు పొట్టిగా నుండవలెను.

కడుపు:—లోతుగా విశాలముగా నుండవలెను.

తోక:—సన్నముగా నుండవలెను. వెండ్రుకలు నలుపుగా బిరుసుగా నిక్కబొడుచుకొని యుండవలెను.

స్తనములు:—సమానముగ దూరములో నుండవలెను. పాలనరములు స్పష్టముగా కనపడవలెను.

కొమ్ములు:—పశువు నిలుచున్నపుడు మనకు దానిమీద నీరుపోసినయెడల దాని ముందుకాళ్ళ డెక్కలమీద ఆ నీరు పడినట్లు అడ్డముపెచ్చునంతవరకు వంకరలిరిగి శరీరము నానుకొనియుండవలెను.

తోకక్రింద గుదసానముపైన గుండ్రని కణతులవలె కనిపించిన గేదెను కొనరాదు. వివిధరంగుతో కూడియుండు పొడుగుగల గేదెను కొనరాదు. భుజము పైభాగమున గుంటగానున్న గేదెను కొనుట మహాదోషము.

దున్నకుండవలసిన లక్షణములు.

తల:—పొడవుగ బరువుగ నుండవలెను.

మూత్రము:—చిన్నదిగానుండి పక్షస్థలము విశాలముగా నుండవలెను.

కాళ్ళు:—పొట్టిగ, బలముగలవిగ లావుగ నుండవలెను.

శరీరము:—పొడవుగ మిక్కిలి బలముకలిగి యుండవలెను.

కొమ్ములు:—నిలుచున్నపుడు మనము దానిమీద నీరుపోసినయెడల దాని ముందు కాళ్ళ డెక్కలమీద ఆనీరు పడినట్లు అడ్డము పెచ్చునంతవరకు వంకరలిరిగి శరీరము నానుకొనియుండవలెను. వంచిదున్నలను కొనవలెనని వాని కొమ్ములను చూచి కొనవలెను. వాని కొమ్ముల అడమే శుభలక్షణమని గ్రహించవలెను. కొమ్ములు

ఎద్దునకు దోషము కలిగియుండుట ముఖ్యలక్షణము.

రెండును సమానమైన పొడవుగలవై వెనుకవ వంగి వానియొక్క రెండు మొసలు ఒక దాని నొకటి ఎదురుగా నున్నయెడల మంచిలక్షణమందురు. నాలుక బయటపెట్టి త్రిప్పుదానిని పామునాలుక యందురు గాన కొనరాదు.

ఆక్షేపణగల లక్షణములు

1. ముఖమును నాగలివలె వంచుకొనియుండు పశువును కొనరాదు. పాటుపడక యజమానికి నష్టము కలిగించును.

2. పశువు నిలబడి కాళ్ళు ఎత్తిఎత్తి ముందువెనుకలకు ఊగుచుండునది యింట నున్న మహదోషము. పశుకాలకు కీడు.

3. పశువు నిలబడి ఎడమ, కుడిప్రక్కలకు తలను అడించుచు ఊగుచుండును. శ్వాతీగా ఏప్రక్కకు ఊగిచను యజమానికి నష్టమేగావండ పశువీడ యుండునని హితమహర్షి తెలుపుచున్నాడు. దీనినే ఆసుపోయుట యందురు.

4. తోకక్రింద గుడస్థానమునకు దగ్గరగా రెండువైపుల మాంసము అధికముగ కూడుకొనియుండు గ్రంధులవలె కనిపించుదానిని కొనరాదు. ఇట్టిది యజమాని నుఖి సంపదల నశింపజేయును.

5. పశువు అంగిలి నలుపుగానున్నయెడల మహదోషము. అట్టిదానిని యింట నుంచరాదు. అంగిలి ఎరువుగానుండి ప్రక్కల నలుపురంగుగానున్న ఆక్షేపణలేదు. అంగిటిమధ్యగా నలుపుగానున్నను మహదోషము.

6. పశువునోటినుండి ఎల్లప్పుడు నాలుక బైటికి పోనిదప్పుడు లాగుకొనుచు అడించు నది ఆశుభమును కలుగజేయుటయేగాక యజమాని ఎంత సిరిసంపదలతో తులతూగునో అంత దరిద్రుడగును. సమస్తముఖముల పోగొట్టును.

7. విషయిన ధ్వని విన్నను వాద్యములు విన్నను నీలిరంగు గొడుగు చూచినను బెదురునట్టి ఎదురు శత్రువులుకూడ కొనరాదు. ఇట్టిది యజమానికి నుఖము నీయకపోగా కష్టముల కలుగజేయును.

8. లేడికడుపువంటి కడుపుగలది ఎక్కువగా పాటుపడును. కొని బలమురాదు. శక్తిలేనిదిగా నుండును. గాన యిట్టిది మధ్యరకముగా నెంచవలెను.

9. కొంగకాళ్ళవలెయుండు పశువు వికృతాకారముగా నుండును. సత్తువ తక్కువగా నుండి సడక మ దముగా నెడరును. ఇదియును మధ్యమ రకమే.

10. కాళ్ళ పొడవు ప్రక్కలల ఎదు బారుగానుండి పనికయ్యబోయెదగాన కొన రాదు. ప్రేమించు వృక్షములుగలది సడదునపుడు వృక్షములు ప్రేలాడుచు కొట్టుకొను చుండుటచే బలము తక్కువగా నుండును గాన కొనరాదు.

11. కేదెలమిద ఎమ్మనప బలమురాదు. ఆత్మవశ మానసైవ చూడదు. మనస్సు స్థితిమితముండదు. పని సరిగా చేయదు. ఇట్టిదానిని దొడ్డిలో నుంచరాదు.

12. ఏ వ్యవధియు మాఖియు వెడల్పుగ నుండునో అట్టిది పొందుదునని గ్రహించవలెను.

13. గుఱ్ఱపు రొమ్ముగల వ్యవధియు ఆందహీనముగ కొంచెము బలహీనముగ నుండి తన్నును. పశువు వెన్నుపూసలు వంగినయెడల సర్వవశేరిదై పనిలో మందముగా పోవును.

14. కాళ్ళు ఈడ్చుచది నడకసాగక మిగుల మందముగా పోవును.

15. ఏ పశువు చెవులు మిక్కిలి పెద్దవిగా నుండునో అట్టిది సోమరిగ తక్కువ నడకగలదిగ నుండి పనిచేయజాలదు.

16. లోకవేండ్రుకల వచ్చు అధికముగనుండి చిన్నచెవులుగల పశువు నీరిసంపదలు కలుగజేయును.

17. ఏ ఎద్దునకు పిల్లగిట్టలు నడచునపుడు కాలికి కొట్టుకొనుచుండునో అట్టిది గిట్టలతానిడివలన రక్తము కారుచుండును. ఇట్టిదానిని ఎవరు కొనరాదు.

18. అన్ని ఆవయవములు శరీరము గట్టిగానుండి పొడవు తక్కువగానుండు పశువు మిక్కిలి బలముగలదై సమస్తమగు పనిపాటలయందు చేరొందును.

19. ఏవశువుయొక్క నొసలు వెడల్పు వుష్టిగానుండునో అట్టిపశువు రూపము బలముగలదిగా నుండి మార్గమున మహావేగమున పోవును.

20. లేడికన్నులుగల పశువు మంచదికాదు. గచ్చకాయ, గోశోచనము, పొగ గలనీనట్టి రంగులుగల కన్నులు అశుభమును కలుగజేయును.

21. ఒకకన్ను గచ్చకాయరంగు మరొకకన్ను శ్యామ లేక గోశోచనపు రంగు గల కన్ను రెండవకన్ను నలుపురంగునన్న యెడల ఆక్షేపణ. ధనధాన్యముల నశింపజేయును.

22. పువ్వులేనిద కాయకాచిన కన్ను గ్రుడ్డుకొరిప కన్నులుగలవి నయముగా నుండవు. పెల్లకన్నుగల దానిని విడిచివెట్టుము. కనుగొలువలు తెల్లపు నలుపు రంగుగా నున్న మహాదోషము. కనురెప్పలు నలుపు తెలుపురంగు కలసియున్న ఎద్దు అపకారియని తలంచుము. ఏనుగు కన్నులవంటి కన్నులు (నూక్కుమగు కన్నులు) గలది పొడచును. దీని నేత్రములు కొంచెము ఎరవుగానున్న మహాక్రోధము, చురువగలదిగా నుండును. ఈ లక్షణములుగలవి శుభము అశుభములగూడ కలుగజేయును.

23. గిట్టలు వ్యాపించినకొలది పంగిగిట్టలుగా నుండును. ఇట్టిది నడక మందముగానుండి వీలురుండును. ఆక్షేపణయే.

24. గిట్టలు వెడల్పుగనుండి వంకరలు తిరిగి యుండినయెడల శక్తిలేనిదిగ నుండును. పలుచని గిట్టలది బలములేనిదిగా నుండి ఎండలో ఇసుకమీద నడువజాలదు. అరిగిన గిట్టలది పుండ్లుపడును. తెలుపు ఎరుపు పింగళరంగులు కలసిన గిట్టలుగల పశువు పనిచేయజాలదు.

25. పశువు నడచునపుడు ముందు అడుగునకంటె వెనుకఅడుగు ముందునకు వేయుచు నడచుచుండినయెడల అప్పుడు చాలామంచిది. నీలిపోయిన గిట్టలుగలది పైకి లేచిన గిట్టలుగలది మంచిది. సగముగిట్టలుగల ఎదు సరిగా నడచువజాలదు. గిట్టలనుగచ్చి నడచునది అంత మంచిదికాదు. కలిసిపోయిన గిట్టలుగలది పనిచేయజాలదు.

కొమ్ముల శుభాశుభ లక్షణములు

1. కిరీటమువలె కొంచెము వెనుకకు వంగిన కొమ్ములు గల ఎద్దు అతివేగముగా నడచును.

2. నూదికొమ్ములుగలది శక్తిగలదిగా భాగుగా పోట్లాడునదిగ నుండును.

3. కత్తెకొమ్ములు, లావుకొమ్ములు, గిన్నెకొమ్ములు, భువచక్ర ప్రక్కకు వాలినకొమ్ములు, తెలుపురంగుకొమ్ములు, నలుపురంగుకొమ్ములు, చిలికంగు కొమ్ములు, రాగిరంగు కొమ్ములు, క్యామలరంగుకొమ్ములు, ఒంటెమచ్చకొమ్ములు, వెనుకకు వంగిన కొమ్ములు, గొట్టెకొమ్ములు, ముఖమువైపునకు వంగియుండుకొమ్ములు, లేడికొమ్ములు, ముందునకు వంగియుండుకొమ్ములు, లేడికొమ్ములు ముందునకు వంగినకొమ్ములు మొదటిలో 25 అంగుళముల పొడవుగల కొమ్ములుగల ఎద్దులు యజమానులకు శుభఫలముల నిచ్చును.

4. పెద్దవిగ పొడవుగ నిలువుగ నుండు కొమ్ములుగల వృషభమునకు త్వరలో పశ్యువు వచ్చును. చూడుటకు ఆందోహముగ నుండును.

5. ఒక కొమ్ము ఆకాశమువైపునకు రెండవకొమ్ము ముందుముఖమువైపునకు యుండుదానిని మెంటి కొమ్మునందురు. దీనిని కొనరాదు. యజమాని సుఖసంపదల సంకటజేయును.

6. ఒక కొమ్ము స్వర్ణమువైపునకు రెండవకొమ్ము పాతాళమువైపునకు అనగా పైకి క్రిందికి జూచుచున్న కొమ్ములుగల ఎద్దు అశుభము గలిగించును. ఎర్రెత్తు తన ఇంట నుండుకొనునో ఆ రెండుకడు దుఃఖము కలుగజేయుటయేగాక సకల ధనములు చోరులు అపహరించుదురు.

7. ముందుకువంగిన కొమ్ములుగలది పనికిమాలినదగును. త్వరలో ముసలిదగును. దీనిపండ్లు గిట్టలుకూడ త్వరగా అరిగిపోవును. ఇది అశుభమును కలిగించును.

8. ఒకకొమ్ము చిరిగినెదురు వాధ్యవము.

కొన్ని యావులు విస్తారముగా తిండితినె వాలు స్వల్పముగా నిచ్చును.

9. ఒకకొమ్ము పుట్టి రెండవకొమ్ము పుట్టకపోయిన ఎద్దు అశుభము కలుగ జేయును.

10. కొమ్ములుపుట్టక బోడిగానుండు ఎద్దు అంగహీనము గలదిగాన కొనరాదు.

11. కొమ్ములపైన పంగతలగానున్న ఎద్దును కొనరాదు. మహాదోషము.

12. పగిలినకొమ్ములుగలవి వ్యాధులు పుట్టునుగాన చికిత్స చేయవలెను.

13. ఎదుగాని బ్రద్రెగాని రాత్రింబవళ్ళు కొమ్ములను గుంజలకు మేపలకు కొట్టు నది అశుభము.

14. కొమ్ములుచివర తెలుపురంగుగలది మహాదోషము కలుగజేయును.

15. పెద్దకొమ్ములు గలది ఒకటి వెనుకకు మరొకటి ముందునకు పంగిన కొమ్ములు గలది, ఎడమచెవిమీదకు వ్రాలినకొమ్ములుగలది, పొట్టేలుకొమ్ములుగలది, ఒకటికొమ్ము గలది, ముఖముమీద మధ్యగానుండు కొమ్ములుగలది, మూపురముమీదకు వాలినకొమ్ములు గలది, పగిలినకొమ్ములుగలది, పంకరకొమ్ములుగలది, పక్షులు నిద్రించుటకు వీలుగానుండు కొమ్ములుగలది ఆ యా యజమానులకు పలువిధోగముగా నష్టకర్తలు కలుగునని ఒక సంస్కృత పశుశాస్త్రము తెలుపునున్నదిగాన తెలియవలెనని మైనది.

16. పశువులకొమ్ముల చివరభాగము తెలుపుగానుండి పొట్టురాలుటయు కొమ్ముల మొదటిభాగమునగాని చివరలనుగాని పేళ్ళుగా చీలికలుగా పగిలి రక్తమువచ్చిన వాటిని కొనరాదు.

17. ఒకకొమ్ము తోలుకొమ్ముగానున్నను కొమ్మునుంచి మూలిభాగమువరకు కాటుకరంగు చారలుండినను ఆక్షేపణయే.

వన్నెలనుబట్టి శుభాశుభ లక్షణములు

1. ఏవృషభమైనను ఒకకాలు తెలుపు శేహమందయు తదితర రంగులతో కలసి యున్న యజమానికి శుభము కలుగ జేయును. ఎవ్వగు తెలుపుగా నుండక మిశ్రమ వర్ణముగా నున్నను ప్రకృతమైనదిగా తలంచవలెను.

2. కలువరంగుగలది, తెలుపురంగుగలది, నువ్వులబియ్యము కలిసిన రంగువలె మిశ్రమముగా నుండునది తన యజమాని మందను వృద్ధిచేసి లక్ష్మీసంపన్నునిగా జేయును.

3. సగభాగము బిలిరంగు సగభాగము తెలుపురంగుగల ఎద్దు తనకుండు దోషము లన్నియు నశించి సకలశుభములను కలుగజేయును.

4. అన్ని ఆవయవములమీదను తెలుపురంగున్న పశువు శుభము కలిగించును. శరీరమంత తెలుపుగానుండి పసుపురంగుగల వెండ్రుకలు కొన్నియున్నయెడల అట్టి పశువు దున్నునపుడుమాత్రము మందమతిగ నుండును.

కొన్నియావులు తిన్నితిండిలో చాలాభాగము పాలుగామారును.

5. తోకక్రింద గుదసానము వరకు నీలిరంగువలె నున్నయెడల శుభమునిచ్చును. నేత్రములకు నాలుగుప్రక్కల కాటుకరంగు వెండ్రుకలున్న పశువు బలముగలదిగా నుండును.

6. కాటుకరంగు, నీలిరంగు కలిగి నూత్నరోమములుగల ఎద్దు బల పుష్టికముగలదిగా నగును.

7. ఏడువరచలు, ఏడుఅవయవములలో నలుపురంగున్న ఎద్దు జయము గలిగించును.

8. పనుపుపచ్చరంగు వెండ్రుకలుగల ఎద్దు చురుకుదనము కలిగి యుండును.

9. నొసలునుంచి ముక్కురంధ్రములవరకు ఒకవిధముగా ఆయుధమువలె గీతగా రంగున్నయెడల మంచిది.

10. శరీరమంతా తెలుపుగానుండి తోకమాత్రము నలుపురంగుగా నున్నయెడల అధికముగా పాలుపడును.

11. శరీరమంతా ఒకరంగుకలిగి తోకమాత్రము ఎరుపు రంగుగా నున్నను మంచిదియే.

12. సగము ఎరుపు సగము తెలుపు కలసిక రంగుగల ఎద్దు శుభమును కలుగ జేయును.

13. శరీరమంతా తెలుపున నలుపున మచ్చలున్న ఎద్దుకూడ మంచిదియే. వీపు మెడ, తోక నలుపురంగుగానున్న వృషభము శురుకుగా నడచును. అలసటయుండదు.

14. తెలుపు, నలుపు రంగుగల ఎద్దు మధ్యముగా నుండును. ఎక్కువ ఎరుపు, ఎక్కువ తెలుపు రంగుగలది సోమరితనముగా నుండును. చిలుక కంతమునందున్నచూడిరిగా తోక వెండ్రుకలు రెండువరుసలున్న ఎద్దు మహాదోషము.

15. వస్తురంగు పువ్వులుగలది, గజబట్టగలది చురుకుగనో మందముగనో యుండును. శరీరమంతా పంచరంగులున్న ఎద్దు మధ్యము. గొట్టెరంగుగలది అశుభము. కాకిరంగుగలది దోషము. పువ్వులవలె మచ్చలుగలది మంచిది. కంచురంగు గలది బంగారుఛాయగలది శుభముల నిచ్చును. శరీరమంత బంగారురంగు కలిగి పాలవలె తెలుపుమచ్చలున్న ఎద్దు చాలా మంచిది. తొటిపైలది మధ్యము. కట్టిబట్టి, పాలబట్టి, గజబట్టి, ఎరుపుబట్టి శుభముల కలుగ జేయునని వృషకల్పద్రుమును తెలుపుచున్నది.


షరా:—కాస్త్రాధారములేపండ వివిధరీతులుగా రంగులునడకలు స్వంతపేర్లు పెట్టి కొందరు వృద్ధుడొకరిక వైద్యులు పద్యకావ్యముగా వచనముగా వ్రాయుచున్నారు. ఇట్లు వ్రాయుట పొరబాటు. వైద్యపద్ధతులలో అనుభవముండవచ్చునుగాని కాస్త్రాధారము లత్రసరములని గ్రహించవలెను.

కాయజొన్న మేనే తోడెవ కైలాసము కావలెనా,

సు క్ష ప రీ క్ష

శుభమును కలుగజేయునవి

రానురాను సుశ్రమగూర్చి రైతులలో చాలామందికి సమృద్ధము తగినది. కాని ప్రాచీన పశువైద్య సిద్ధాంతముల ననుసరించి సుశ్రమ పరీక్షించి తీసికొనుటయే మంచిది. ఈదిగువ నూదించు సుశ్రమ శాస్త్రానుసారముగా తెలిపితినిగాన ఇప్టమున్నవారు ఆమలులో పెట్టుటమంచిది. ఆనవసరపు తర్కములుచేయక మికాంతవరకు సమృద్ధముగలదో అంతవరకే ఆచరణలో పెట్టమని నా అభిప్రాయము.



సుశ్రమ తెలుపుచిత్రము

1. సానపునుడి 2. ధాన్యపునుడి 3. ఆనపునుడి 4. కవ్వపునుడు 5. మూపునుడి 6. సగరానుడు 7. గొలుసుకట్టునుడి 8. లక్ష్మీనుడి 9. భాషికపునుడి 10. ఆనపునుడి.

1. సానపునుడి (బ్రహ్మనుడి)

దీనినే బ్రహ్మనుడి యందురు. పశువు కొమ్ములకు నాలుగైదు అంగుళముల దిగువగా ముఖమందు ఈనుడి యుండును. ఈనుడి నొసటియందుండుటవలన సానపు

తన బంతువుల గొప్పచెప్పుకొను వాడవ్వడును వానియెడల ప్రూరముగా నుండదు.

కుడి లేక తావునుడి యని పేరువచ్చినది. ఈకుడిలేకుండ ఇతరసుళ్లున్నను అంత మంచిది కాదు. ఈనుడి లేకుండునందు వృషభమును చూచినను వితంతువుముఖము చూచినను ఒక్కటియేయని తలంచవలెను. ఈనుడియున్న పశువు యజమానికి సర్వసంపదలు సమకూరును.

2. ధాన్యపునుడి (విష్ణునుడి)

పశువు మూపురము వెనుక భాగమున కొంచెము మారములో (అనగా 12, 14 అంగుళములలోపల) వెన్నెముక భాగము తొలగక ముందుచూపులో ఈనుడియుండును. గంతకట్టునకు వెలుపలభాగమునకు, వెన్నెముకకు ఒకప్రక్కను ఈనుడియున్న మధ్యరకమని గ్రహించవలెను. ఈనుడిగలవిడ్లు యజమానికి సస్యాభివృద్ధి, పుట్టుబప్పిది కలుగును.

3. ఆననపునుడి (మహేశ్వరనుడి)

వృషభముయొక్క ఆననపు అడ్డెముకనుంచి 4 లేక 5 అంగుళములకు దిగువగా ఈనుడి యుండును. ఈనుడి యుండుటవలన యజమానిపంశము నదివలెపొందును.

వృషభమునకుండు ఈ మూడునుళ్ళు భాగములలోను బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుల లెల్లవుడు నుండురనియు, అట్టివిదును కొనినరైతు కనకధన వస్త్రవాహనములతో తుల తూగుచుండుననియు అందుచేతనే శివుడుకూడ ఈనుళ్ళుగల వృషభమునే ప్రేమించె ననియు ప్రాచీన ఋషీశ్వరులు తెలిపిరి. ఈ మూడునుడులలో ఏఒకనుడి లేకపోయినను కొనరాదని ప్రాచీనశాస్త్రములు తెలుపుచున్నవిగాన నా యభిప్రాయముకూడ నంతియేయని తెలుపుచున్నాడను.

4. కవ్వపునుళ్ళు

వృషభము రొమ్మభాగమునకు దగ్గరగు, గంగడోలునకు ఇరువైపులను కవ్వపు ఆకారముగా ఈనుళ్ళుండును. రెండువైపుల నుండుటమంచిది. కుడివైపున ఒకనుడి యున్న (కుడినున్న కూర్చవచ్చును) కొనవచ్చును. ఎడమవైపున నుడియున్న (ఎడ్డునకు మోసమని) మంచిదికాదని తెలిసికొనవలెను. ఈనుళ్లు ఏప్రక్కనున్నను అక్షేపణలేదని కొన్ని శాస్త్రములు తెలుపుచున్నవి.

5. మూపునుడి

మూపురమునకు ముందుభాగమునగాని, వెనుకగాని, చివరగాని నుడియున్న మూపునుడియని పేరు. అచ్చట వర్షపునీరు అద్రుమినికి జారునట్లు నుడినిలిచియుండిన అట్టిపశువు త్రొక్కినధూమి చక్కగా ఫలించును.

ఏదో తెగులు రాబోవునని తలనుంచి తోకవరకు వాతలు పెట్టుట ప్రారము.

6. నగారాసుళ్లు

పశువు కడపటి బరిఎముకకు పైగా (గంఠలోపల) వెన్నుతూసకు రెండువైపుల రెండుసుళ్ళున్నయెడల నగారాసుళ్ళని పేరు. ఆక్షేపణలేదు. ఆసనము మధ్యభాగమునను కాళ్ళ, చంకలలోను నుడులున్న మంచిది.

7. తెంపులేని రోమములు.

తోకనుట్టునంచి మధ్యకుగాని చివర వరకుగాని తెంపులేకుండ రోమములు ఎదుర్కొనియున్న గొలుసుకట్టందురు. ఈ నుడిగల పశువు యజమానికి జయము గలుగును.

8. లక్ష్మీసుడి.

గంగదోలునకు కొంచెముపైన, మెడకొకప్రక్కను ఈ నుడి యుండును. ఇట్టి నుడిగల పశువు యజమాని సకల భోగముల ననుభవించును. లక్ష్మీయను దేవత మహిమ ఎల్లరకు తెలిసిన విషయమే. ఇట్టి పశువులు ఆరుగుగా లభించును.

9. భాషికపు చుక్క

పశువు నొసటిభాగమునందు స్థానపునుడి పైసగాని క్రిందగాని నెమలికన్నవలె ఒకదానిపై నొకటి దొంతరగా నిలువుగా నుండును. దీనినే భాషికపుచుక్క అందురు. ఈ చుక్కగలది సర్వసౌఖ్యముల ననుభవించుటయేగాక తన యజమానికి గూడ సర్వ సంపదల గూర్పును. వీటినే దొంతరినుళ్లందురు.

10. ఆసనపునుడి.

ఆసనమునంచి వృషణములవరకు నుండు భాగములో ఒకనుడియుండును. దీనినే ఆసనపునుడి యందురు. ఈనుడియున్న యజమానికి జయము గలుగును.

అశుభమును కలుగజేయునవి.


1. తొండపరీసుళ్ళు

తోకనుట్టపైభాగమునగాని క్రిందభాగమునగాని, రెండువైపులలో ఒక ప్రక్కగాని రెండుప్రక్కలనుగాని ఈ తొండపరీసుళ్ళుండును. పైభాగముననున్న తొండనుడి యనియు క్రిందిభాగముననున్న పరీకనుడియనియు అందురు. ఇవన్నియు ఆక్షేపణగలవి.

తోటకు వర్షము, దూడకు గడ్డి.

2. మూతపు సుడి

ఈనుడి పశువు పట్టమధ్యభాగమున నుండు గీత మధ్యగా మాత్రకోశమునకు దగ్గరగా ముందుభాగమున నుండును. ఈ నుడికి మరొక గుర్తు కలదు. మట్టిని తీసివని అనుడివీధి వేసి రుద్దినయెడల మాత్రము పొందును. ఇట్టి పశువును కొనిన కైతు సంసారము నాశనమగును.



1 తొండపరిమళ్ళు, 2 మాత్రపునుడి, 3 మధ్యమళ్ళు, 4 సంకల్పమళ్ళు, 5 ముక్కుంటినుడి, 6 బొడ్డునుడి, 7 భాషికపునుడి, 8 గాడిమళ్ళు, 9 కత్తెరమళ్ళు, 10 గూటత్త మళ్ళు.

3. మధ్యసుఖ్మ

ముందు రెండుకాళ్ళ లోపలిభాగమున సుళ్ళున్న మంచిది.

4. సంకల్ప సుశ్చు

ఈ సుర్కు పెండ్లుకలతో కలసి కార్మికులందుంచును. ముందు మోకార్మిద
గాని, కార్మిద పెనుక మోకారి మడతనుంచి పిల్గిటలు చాటకుండగాని, మోకార్మి
పెగుగమున 8 లేక 10 అంగుళములవరకుగాని ఈసుర్కుంచును. ఇట్టి సుర్కుగల ఎడ్డు
యజమానికి తప్పక కారాగృహవాసము కలుగును.

ఈ శ్రీ ఎడే శోన మోసేది.

5. ముక్కంటి సుడి

ఈ సుడి నొసటిభాగమున మూడు కోణములు గలిగియుండును. దీనినే కిచ్చని యొక్క మూడవనేత్రమందురు. ఈ కన్ను తెరచిన అన్ని వస్తువులు భస్మమైపోవునట. కాబట్టి ఇట్టి యెద్దను యెవరును కొనరాదు.

6. బొడ్డుసుడి

బొడ్డుభాగమున సుడియున్న ఆక్షేపణలేదు.

7. భాషికపుసుడి

నేత్రములకు పైభాగమున నొసటియగు భాషికపు ఆకారముగానుండును. స్థానపుసుడికి రెండంగుళముల దిగువగా అడముగా ఒకటి లేక రెండు సుళుగిడును. ఈసుడిగల ఎద్దునుకొనిన రైతుకు భార్య : యోగముగాని భార్యను తెచ్చుకొనుటగాని జరుగును. వివాహముకానివారు కొనవచ్చును.

8. గాడిసుళ్లు

మెడపక్కన సుడియున్న కందసుడియనియు, రెండువైపులనున్నదా వెనసుళ్ల నియు, గంగడోలునకు క్రిందిభాగమున సుళ్లున్న గాడి సుళ్లనియు, రొమ్మనకు ఒక వైపున వెండ్రుకలతోగూడిన ఒక సుడియున్న కవ్వపుసుళ్లగా ఒక రకమనియు చెప్పుదురు. ఇన్నియు ఆక్షేపణయేయని తలంచవలయును. ఎదరాలకు రెండువైపుల గాని ఒకవైపునగాని తుడిభాగమునందున్న సుడియున్నవనిచిది. ఎడకువైపున్న ఆక్షేపణ.

9. కత్తెరసుళ్లు

పశువు అసనమునంచి వృషణములవరకు పొడవగు ఈనవలెనుండును. ఈ యీనె అటునిటు తొలగకనుండిన వుండిది. ఈ యీనెకు రెండువైపుల రెండుసుళ్లుండి రెంటి యొక్కచూపు ఈనెకు అడ్డువచ్చినట్లు కన్నటిక కత్తెర సుళ్లందురు. ఇవికూడ ఆక్షేపణ యని గ్రహించవలెను.

10- గూటపుసుళ్లు

పశువు అసనమునకు రెండువైపులనుండు మొరడుల వెలుపల గూటపుసుళ్లుం డును. కొన్నిటికి ఒకవైపున మాత్రమే యుండును. ఇన్నియు ఆక్షేపణయే.

తదితరసుళ్లు

పశువు వెన్నుభాగమున రెండు వెండ్రుకలవరుసయున్న అశుభము. తలనుంచి మెడవరకు రెండు పాములవలె నలుపుగానున్న అశుభము.

ఎదుస్పిట్టయొక్క పైభాగమున పాము పడగవలె నుడియున్న ఆక్షేపణయే. దీనిని నానుడియందురు.

పశువులోకమట్టికింద కేడవచ్చు మార్గమున రెండువైపుల పాము పడగవలె నుడియుండిన దోషము.

ఒకేనుడి రెండుగా ఒకదానిపైనొకటి నొసటి భాగముననున్న జంటనుడి యందురు.

ఈనుడిగల పశువు తన యజమానికి కష్టములు కలిగించును.

ఆ రీతిమీద నుడియున్న దోషము

వెన్నుభాగమునకు రెండువైపుల డొక్కసానముపై నెవరచగానుండు ఎముకల మీద నుడులున్న ఆక్షేపణయే.

పశువు కడపటి బరిఎముకనుంచి మూడవ నడుముపూసఎముక చాటకుండ వెన్ను భాగమునకు ప్రక్కగాగాని, మీదుగాగాని చీపురుకట్ట ఆకారముగా నుడియున్న పొరక నుడియనిపేరు. ఇదికూడ ఆక్షేపణయే.

పశువు కడపటి బరిఎముకచాటి వెన్నుపూసకు రెండువైపులనుండు సుల్లప పాడె సుల్లందురు. ఈ పశువుగల యజమానికి త్వరలో పాడె గట్టునంత ప్రమాదము వచ్చును.

వెన్నుభాగమునకు రెండువైపుల డొక్కసానమునకు పైన వీరచగానుండు ఎము కలమీద నుడులున్న ఆక్షేపణయే.

వెండ్రుకలవరుస ఒకటి మెదటిభాగమునుంచి వెనుక వెన్నుమీదకు తిరుగక యుండును. దీనినే వరుస నుడియందురు. ధననష్టము కలిగించును.

కొమ్మల చివరభాగమున తెలుపుగా చింతపువ్వు రంగుగల నుడియున్న పూత యందురు. ఆక్షేపణయే.

దెహమంతయు ఒక రంగుగలిగి యితర రంగులుగల మచ్చ ఎచ్చటనైనను యుండిన యెడల దానిని అగ్నిమచ్చ లేక ఒంటిమచ్చ యందురు. ఇట్టిది ఆశుభము. ఆ రంగుగల మరియొక మచ్చయున్న యెడల ఆక్షేపణలేదు. మరియొక మచ్చ లేనప్పటికి ఆ రంగుగల ఒక వెండ్రుకల వరుసయున్నను ఆక్షేపణలేదు.

పశువు శరీరమునకు రెండువైపుల ఇరువదియారు ప్రక్కలెముకలుండును. వాటిలో మొండిఎముక కనిపించిన మహాదోషము.

కొన్ని పశువులకు కడపటి బరిఎముక, దానిముందర బరిఎముకతో కలియక ప్రత్యేకముగానుండును. దీనినే మోటుబరి యందురు. ఆక్షేపణయే.

పరా:—ఇంకను అనేక రీతులుగా సుల్లుగాని, గీతలుగాని అరుదుగా నుండ వచ్చును. మొత్తముమీద పశువులకు రీతి సుదులుండును. అనేకమంది అనేక రీతులుగా ఈ సుల్లప మారుపేర్లుపెట్టి విలక్షణులు. గాన ముఖ్యమైనవాటినే పేర్కొంటిమి. చదువరులు గ్రహించుదురుగాక.

ఏ డ వ భా గ ము

ద్రవ్యజ్ఞానము

ఓషధులయొక్క స్వరూపములు, గుణములు, ఉపయోగములు మోతాదులు తెలిసికొనవలసిన అగత్యత ప్రతిరైతునకు, పశువైద్యులకు చాలా అవసరమైయున్నది. ప్రస్తుత కాలములో గ్రామములలో మామూలుగా పశువులకు వైద్యము చేయువారలలో చాలామందికి ఓషధులయొక్క గుణములుగాని, మోతాదులుగాని చికిత్సలుగాని తెలియక ఎవరి యిష్టము వచ్చినటుల వారు వాడుచున్నారు. అందు వలన తాత్కాలిక ఫలితము కనుపడినప్పటికిని తరువాత మూలికా ప్రభావముచే తదితర రోగములలోనికి దింపవచ్చును. కాబట్టి పశు సేవచేయవలెనని కోరికయుండువారు ద్రవ్యజ్ఞానమును చదివి అనుభవము సంపాదించవలెనని నాయభిప్రాయము. ఈ యుద్ధపరిస్థితులలో కాగితపు కరువువలన ముఖ్యమగు మూలికలను కొన్నిటినే తెలిపితిని గాన చదువరులు గ్రహించుదురుగాక.

భూమిని పగల్చుకొని పుట్టునవి.

ఇవి నాలుగు విధములుగ నుండును.

1. ఓషధులు—ప్రతి సంవత్సరము పుట్టి ఫలించి నశించునవి.
2. వనస్పతులు—అనగా వృక్షరాజములు—పూవులు పూయకనే ఫలించు మట్టి, మేడి, జావ్వి, రావి మొదలగునవి.
3. వానస్పతులు అనగా పూవులు పూసి కాయలు కాదునవి—మామిడి, నేరేడు, దానిమ్మ మొదలగునవి.
4. వీడుధములు అనగా అల్లకొనునట్టి తీగలు- పొదలు మొదలగునవి.

రైతులు దున్ని తే స్వామలప అన్నము.

జాంగల దేశము

స్వల్పావధకము కలిగి పర్వతములు, యెడారులుగల దేశమునకు జాంగలదేశ ముండును. ఇది వాతభూయిష్టముగా నుండును. అందు జనించునవి వాతాధిక్యతగలవిగ నుండును.

అనూప దేశము

జలాధిక్యముకలిగి వనము లధికముగనుండి యెడ తక్కువై నిర్మలమైన గాలి లేని దేశము. అందు జనించునవి కఫాధిక్యత గలవిగ నుండును.

సాధారణ దేశము

వసంతాది ఋతులక్షణములు సక్రమముగ నడుచుచు నిర్మలమైన జలాశయములు నిర్మలమైన గాలి తగినన్ని పృథ్వుములు గలది. ఇందు త్రిదోషములు సమముగ నుండును. కావున ఔషధములను జేయుటకు సాధారణదేశమునుండియే ఔషధులను సంపాదించ వలెను.

ఔషధులను గ్రహించదగిన ఋతువులు

మార్గశిర పుష్యమాసములందు వచ్చు శరదృతువునందు ఔషధులు సరియైన రసములు కలిగియుండును గనుక సర్వరోగ నివారణార్థము ఈఋతువునందే ఔషధులను సంగ్రహించుట మంచిది. శ్రేష్ఠా మాధమాసములందు వచ్చు గ్రీష్మఋతువునందు రూక్ష స్వభావముచేత రసహీనములై యుండును. వర్షా కాలమునందు అధికరసము కలిగియుండును గాన అంత గుణవంతములు కావు. విశేషములకిచ్చు ఔషధులు తీక్షణములై యుండవలెను గనుక వానిని గ్రీష్మకాలమునందే సంపాదించవలెను.

ఔషధులను గ్రహించకూడని సలములు

పుట్టలు, చెడుసలములు, జలముతో నిండియుండు ప్రదేశములు, స్నానములు, చవిటిసేలలు, మార్గమధ్యము, దుష్టజగతువులుండు సలములు, కాలినచోటులు, అతి మంచుగల సలములు, ఇటువంటి సలములందుండు ఔషధులను గ్రహించరాదు. ఇవి మంచిగుణములు ఈయకపోవుటయుగాక చెడుగుణముల నిచ్చును.

సమూల సారములు

గుంటకలగర, కలబంద, చేదుపొట్ట, మోడి, నేలనేము, క్రంధికరము, చవ్వము, చిట్టిక, గజిక, గొంతెమగోరు, పులిచింత, పాదిరి.

పచ్చివిగనే యుపయోగించవలసినవి

అడ్డసరము, బూడిదగుమ్మడి, పిల్లిచీర, తిప్పతీగె, గోరింట, తామర కాడలు, మాంసము, అల్లము, తామరగడ్డ, కొడిశపాల, పెన్నేరు.

స్వరసము

పచ్చిద్రవ్యములను సమకూర్చి పురుగులు, మున్నవగేగాలు లేవండగ బాగుచేసి తెచ్చినవెంటనే నీరు కలుపవలెనని త్రొక్కి విస్త్రములో వడియగట్టిన రసము స్వరసము అని పిలువబడును. ఎండినయోషధుల చూర్ణమును గ్రహించి యందురెండింతలు నీరుపోసి రాత్రింబవళ్ళు మరునాడు ఆ ఉదకమును వడియగట్టుట మరియొకవిధమగు అంగరసమున బడును. పచ్చి వనమూలికలు దొరికనియెడల ఎండిన వానిని పచ్చి వానికి ఎనిమిదిరెట్లు నీరుపోసి చతుర్థాంశముగ కాచవలయును. ఇట్లు కాచబడిన యంగరసము శృతమన బడును.

కల్కము

(Paste)

పచ్చిద్రవ్యమైన యెడల నీరు కలుపకయు, లేక ఎండు ద్రవ్యమైన యెడల తగినన్ని నీళ్ళుపోసియు మెత్తగా ముద్దగ నూరబడినది కల్కము అనబడును.

క్వాథము

రోగముల ననుసరించి ద్రవ్యముల నన్నిటిని లెక్కప్రకారము వేసి నలగగట్టి వండలాచేసి యందు తగినంత నీరుపోసి అగ్నితోకాచి దానిని వడియగట్టి కొంచెము వడిగనున్నపుడే రోగ పశువున కిచ్చుదానికి క్వాథము లేక కషాయము (Decoction) అందురు. కషాయమును వండలాచే కాచవలయును. అటులకాచినయెడల పైన మూత వేయరాదు. మూయబడిన వండయొక్క క్రిందిభాగమునుండి అవిరినీరు పడుటవలన కషాయము చెడిపోవును. ఆయారోగములను బట్టి కషాయములలో తదితర ఓషధులు కలుపవలసి వచ్చినపుడు జాగ్రత్తగా త్రాసుతో తూచి వాడవలెను.

హిమము

రెండుభాగముల ఔషధద్రవ్యములను నలుగగట్టి చక్కగా ఒక వండలాచేసి ఎనిమిదిభాగములనీరుపోసి చక్కగా నీటికి ఒక రాత్రి నిలువయుంచి మరునాడు అనీటిని

చదువుతున్నవారికి సేద్యగాడే అన్నం పెట్టవలయును.

వడియగట్టుటయే హిమము లేక శీతకషాయము (Watery Extract) అని పిలువబడును.

పొంటము

ద్రవ్యమును వేడి నీటిలో వేసి పిసికి వడియగట్టగా వచ్చు కషాయమునకు పొంటము (Thin form of decoction) అందురు.

జంగమద్రవ్యములు

అనగా ప్రాణముకలిగి కదలునది :— మనుష్యులు, పశువులు, పక్షులు మున్నగునవి.

సారాంశములు

త్రిఫలములు :— కంకాయ, శాడికాయ, ఉసిరికాయ.

త్రికటుములు :— శొంఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియాలు.

పంచలవణములు :— సైంధవలవణము, సోపర్ణలవణము, బిడాలవణము, సముద్రలవణము, కౌచలవణము.

పంచకొలములు :— శొంఠి, సిప్పళ్ళు, మోడి, చవ్యము, చిత్రమూలము.

పంచాంగములు :— ఏ చెట్టుయొక్క చెక్క, ఆకు, వేగు, పండ్లు, పూలు యైనను.

పంచగవ్యములు :— గోమయము, గోమూత్రము, గోదగ్ధ, గోశ్లేఠము, గోఘృతము.

భాగపంచకము :— మేకపాలు, పెగుగు, మూత్రము, పురీషము, నెయ్యి.

పంచమూత్రములు :— ఆవు, గొట్టె, బట్టె, మేక, గాడిద మూత్రములు.

షడూషణములు :— సిప్పళ్ళు, మోడి, చవ్యము, చిత్రమూలము, శొంఠి, మిరియాలు.

సప్తాపవిషములు :— జల్లేశుపాలు, జెముడుపాలు, పొత్తినుంప, గన్నేర, గురిగింజ, నల్లమందు, ఉమ్మెర్ర.

పంచవర్కములు :— మట్టి, రావి, జువ్వి, అర్జి, మామిడి వీని పట్టలు.


పంచపల్లవములు :— మట్టి, రావి, జువ్వి, మేడి, నేరేడు వీని చిగుళ్ళు.

మహారసములు :— అభ్రకము, నైక్రాంతము, మాక్షికము, విమలము, శిలాజితు, మైలు తులము, చపలము, కఫరి.

మహావిషములు :— పర్శినాభి, హర్ద్రము, సప్తకము, ప్రదీపనము, సారాష్ట్రము, శృంగకము, కాలకూటము, హాలాహతము, బ్రహ్మశూత్రము.

శరీషపంచకము :— దిరిశన చెట్టుఆకులు, పట్ట, పువ్వులు, పండ్లు, వేరు.


కీరావృకములు :— మనిషి, ఆవు, మేక, ఎనుము, గొట్టె, ఒంటె, ఎనుగు, గుఱ్ఱము వీనిపాలు.




శ్రీ వేగేశన కనకదుర్గ వెంకట సత్యనారాయణరాజుగారి
కపిలకోట. (పాండున్వ, ప. గో.)




పైవారి ఎద్దులజత



సాంప్రదాయం కల కంగాయంబాటి ఆబోరు



పాడిపరిశ్రమాలయం



శ్రీ బోజుపాడి శ్రీద్రవ్యగారి పంజాగిర్త — చేబ్రోలు గుం. జి.

దుంపలందు సారముగలవి

మంజిష్ఠ, చెంగల్వకోస్తు, కచోరములు, నేలగుమ్మడు, పసుపు, చల్లగడ్డ, తుంగగడ్డలు, పిల్లివీచర, సన్నరావ్రిము, అశివన, ముగధపాల, అల్లము, నేలతాడిగడ్డలు, పస, భద్రముస్తలు, ఆడవికండ, తొగడ, చాగ, పుల్లలబ్బులి, ఆశ్వగంధ, చేమ, వేగిన.

వేరులందు సారముగలవి

ములక, వావడ, ముయ్యగపాపి, కోలపాపి, బల, అలిబల, మహాబల, నాగబల, రాజబల, నాయుంట, చిట్టి, పిరుగొట్టి, ఉప్పి, తెల్లగలిజేరు, ఎఱ్ఱగలిజేరు, పిరునేరు, పట్టిజేరు, దూలగొండి, ఆగుగొండ, ప్రాస్తునిగుడుచెట్టు, చిరుగొడ్డి, గోరింట, నల్లతెగడ.

వ్రేళ్ళమీది పొట్టునందు సారముగలవి

నల్లతెగడ, రాన్న, చిత్రమాలము, బల.

మానుమీది చెక్కయందు సారముగలవి

లాద్దు, తుమ్మ, పెద్దచాను, మానిముపు, వేలేడు, లవంగచెక్క, కానుగ, మోగుగ, ములుమోగుగ, చేల, మట్టి, జాబ్బి, రావి, మేడి మొదలగు పాలుగల చెట్లు, బూరుగ, కొడిశపాల.

మానులోపల చేవయందు సారముగలవి

ఇప్ప, చందనము, రక్తచందనము, శేవదారు, సుంద్ర, కాయఫలచెక్క, వేగిన, వేప.

ఆకులందు సారముగలవి

గుంటకలగర, జలేడు, యద్రజడ, మణుగుదాము, ఉమ్మెత్త, కాకర, పొట్ల, వావిలి, పొన్నగంటి, బోడతరము, ఉప్పి, అడ్డపగము, గుండిగము, ఊడుగ, తంగెడు, తెల్లజలేడు, మోడుగ, తక్కుల, కూరనెల్లి, పులిచింత, తెల్లగలిజేరు, ఎఱ్ఱగలిజేరు, సకస్వతియాకు, గోరింటాకు, ప్రేంకణము, సహదేవి, పప్పుకొంత, ఒడ్డి, బుద్ది, పాల, గరికె, బొవంచి, చెంచలికూర, సదాప, ఎలుకచెవియాకు, త్రుచ్చ, వేప.

పుష్పములందు సారముగలవి

సంపంగి, మొగలి, అశోకము, పాడిరి, పొన్న, భుజపత్రి, పొగడ, తురువింద, బాజి, మల్లె, వావిలి, మొల్ల, మునగ, చేల, సదాప, లవంగము, ఆరె, నందివరసము, కలువ, దాసాని.

యముడు వక్కణ్ణి చంపితే ఏలము ముగ్గురిని చంపుతుంది.

ఫలములందు సారముగలవి

ద్రాక్ష, ఖర్జూర, దానిమ్మ, అరటి, మారేడు, కొబ్బరి, పసస, మామిడి, నిమ్మ, బిరిగి, వెలగ, శారంజ, మాదీఫలము, చారపప్పు, దేవదారు, గురిగింజ, గంగరేగు, తీగలయందు పుట్టు గుమ్మడి, బూడిదగుమ్మడి.

విత్తులందు సారముగలవి

అన్నిరకముల పరిధాన్యములు, కందులు, పెసలు, మినుములు, కెసగులు, ఉలవలు, నువ్వులు, అముదములు, పొన్న, ప్రత్తిచెట్టు, తగిలె, చారపప్పు, వేప, పొగడ, అవికె, ముసగ, క్రానుగ, జ్యోతిస్సతి, గచ్చు, తెల్లగంటెన, మోడుగ, తక్కిలములు, మామిడి, జాజి, వాయింట, పిప్పర్లు, మిరియాలు, వాము, ధనియాలు, జీలకర్ర, చిల్ల గింజలు, జీడివిత్తులు, కరక్కాయ, ఉసిరికాయ, తానికాయ, బావంటి, ఊడుగ, వాయువిడంగములు.

క్షౌరమునందు సారముగలవి

తెగడ, చిత్రమాలము, జెముడు, క్రానుగ, ఎఱ్ఱగలిజేరు, తెల్లగలిజేరు, చవ్వము, అడ్డసరము, దుండిగము, పాదిరి, వేము, నేపాలము, జల్లేడు, వాగుడు, ములుమోడుగ, సిచ్చిపుచ్చు, గంటెన, అడవిపెసర, వావిలి, ఉప్పి, పసుపు, నిలి, మొగిలి, బోడతరము, ఉత్తరేణి, అడవివాయింట, తెల్లజల్లేడు, వాయింట, పుక్క-వాయింట, నువ్వులు, నీటి గొట్టి, నీటిప్రబ్బలి, శింశుప, మర్రి, దేవదారు, ముసగ, మొక్కపుచ్చెట్టు, కామంచి.

క్షీరసారములు

లొద్దుగ, తెల్లలొద్దుగ, జీడిచెట్టు, పెద్దజెముడు, అపజెముడు, పచ్చగన్నేరు, జల్లేడు.

చెట్లజగురునందు సారముగలవి


మాచిపత్రి, సరసము, మహిసాక్షి, తురుష్కము, మోడుగ, బూరుగబంక, గుల్లము, వేము, అతిపస, కేల, లంగేడు, వెలగ, చండ్ర, ఇప్పు, వెలుతురు, ఇంగువ, ముసగ, కాకిమారేడు, అహిఫేనము.

అడ్డసరము (Adhatoda Vasica)

శ్లో॥ ఆరూఢా వాసకో వాసా వృషా సింహముఖ భిషక్,
సింహపర్ణి వృషో వాసా సింహకోత్పాట రూషకః.

ప్రత్తిపంట పాడియాపు కలవారికి కొడువయుండదు.

దీనిరెమ్మలు ఒకదాని ప్రక్కకొకటి మొలచి పొదలవలె పెరుగును. దీనికొమ్మలు శేతగనున్నపుడు ఆకుపచ్చగను, ముదిరినపుడు తెలుపుగను ఉండును. దీని ఆకులు మామిడాకులవలె పొడవుగనుండును. గాని పెళుసుగ నుండవు. పండుటాకులు పసుపు పచ్చగనుండును. మాఘషాల్గుణమాసములలో నిది పూతపూయును. ఆప్పుడు కొమ్మల



చివర జాలువలె చిన్నచిన్న కోటియాపలు పుట్టి వానిలో తెల్లని చిన్నపువ్వులు పూయును. కాయలు కాయదు. దీనివేరు, ఆకులు, పువ్వులు ఔషధములలో వాడుదురు.

అయుక్తేద పశువైద్యులు దీని ఆకులను చెక్కను వాతరోగములకు వాడుదురు. ఆకు రసము విశేషముల కట్టిండును. వాతముల నన్నింటిని పోగొట్టును. పశువులకు కలుగు శ్వాససంబంధముగు రోగములకు చెక్కరసము, అమరసము బాగుగా పనిచేయును. ముద్ద వాతము వచ్చినపుడు రెండుగుప్పెళ్ళ ఆకులను గుండెచేసి దానిలో ఒకతులం ఇంగువ, రెండుతులములు ఉప్పు కలిపి పెట్టివ తగ్గును. అమరసము లేనెతోకలిపి దగ్గులకు, వగర్పు నకు అన్నపానము నాలుకకు నాకి చిన తగ్గును. దీని ఆపవనరు చలువచేయును. దీని ఆకులు చెక్కను కషాయముగా కాకి చిపశుత్రులకు వచ్చు కల్లవాపులు, వాతనొప్పులు, దెబ్బలకు వాడిన బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—ఆకులు_10 తులములవరకు.

అవిసె (Linseed plant)

శ్లో॥ అగస్త్యో వంగ సేనాహ్వో మధుస్విగు ర్మునింధ్రుమః

ఇది ప్రసిద్ధమైన పెద్దచెట్టు. దీనిపువ్వులు పెదవిగానుండి ఎగువురంగుగాని, తెలుపురంగుగాని ఉండును. కొందరు ఆకులను పువ్వులను వాడుదురు. దీనిచెక్క ఆకు రసము చేరుగ నుండును. వేడిజేయును. పైత్యపురస్థులకును ఆపవనరు, పసుపు శరీరమున కంతటికి రెండుమూడు పర్యాయములు పట్టించినయెడల బాగుగా పనిచేయును. ఇంకను వాతనొప్పులకు, ఉబ్బురోగమునకునూడ ఈపనరును శరీరమునకు పూయవచ్చును. నేత్ర రోగములకు ఆపవనరుతో మిరియాలగాని, కొంఠిగాని గంధముతీసి కలిపి వాడిన బాగుగా పనిచేయును. చర్మరోగములకు ఆపవనరులో తగినంత ముద్దకర్పూరము కలిపి వాడిన పనిచేయును. అవిసెనూనె, గింజలుకూడ పనిచేయును.

అల్లము (Ginger)

శ్లో॥ ఆర్ద్రకం శృంగిబేరం తస్మహౌషధ ముదాహృతం.

ఇది పసుపు మొదలైన మొక్కలజాతిలో చేరినది. అల్లమునుండియే కొంఠిని తయారుచేయుదురు. మనకు చీనా, జపాను దేశములనుండికూడ వచ్చుచున్నది. అల్లము కారముగా, పుల్లగానుండును. వేడిజేయును. కీర్ణ, శ్వాస సంబంధముగు రోగముల కన్నిటికి బాగుగా పనిచేయును. కడుపులోని వాయువును హరింపజేయును. అజీర్తి, దగ్గు, వగర్పుమున్నగు రోగములలో నుంచిబెల్లము అల్లము సమానభాగములు తీసికొని నారింజకాయంత ప్రతిపూట పెట్టుచుండిన యెడల బాగుగా పనిజేయును.

మోతాదు:—1 తు మొదలు నేరువరకు.

దుక్కికొద్దీ పంట బుద్ధికొద్దీ సుఖము.

అరటి (Plantain tree)

శ్లో॥ కదలీ గ్రంథినీ మోచా రంభా వీరా యతచ్ఛదా,
కదలీవారణబుసా రంభా మోచా మహాత్ఫలా.

వీరిలో ఆశా గకమలగులవు. వీరి గుంప, క్రేష్టి, పొత్తి, అపలు, మిన్నగు వాని రసము స్వాదు. వెంటుగ నుండును. చలువచేయును. గుంప సము ర్ధకసంబంధ మగు రోగములకు బాగుగాపనిచేయును. క్రేష్టోనము విషములను కలుపును. ఆపసము, దుంపరసము శేత్రస్యాధులకు పనిచేయును. ఆపలమాగ్గము వెచ్చతోకిలిసి ఆగ్రవాపు లకు, చర్మవ్యాధులకు ఉపయోగి చి బాగుగాపనిచేయును. అరటిపొడ్లను ముఱబడక ముగా నుండుమాడలకు, ఎండ రోగముగల పశువులకు బాగుగాపనిచేయును. దుంపరసము విరేచనముల కట్టియును. అరటిపువ్వులరసములో విరికిలిసి యిచ్చిన పాదకరోగము కట్టును. ఆపరసమును శేత్రోగములకు వాడవచ్చును.

మోతాదు :—గుంపరసము ఆర్ద్రశేరువౌతు.

అతిమధురము (Liquorice root)

శ్లో॥ మధుయస్త్వీ త్రినకం యస్త్వీ మధు మధూలికా,
యప్యోవ్యాం మధుకం యస్త్వీమధూకం జలజామధు.

ఈ మొక్కలు పైసావరు, అరేబియా, సింధుప్రాంతములందు వైరిగును. ఇది ఆరడుగులఎత్తు పెరుగును. ఆకు గుండ్రముగ, చిన్నదిగ, ములగ ఆకంత పరిమాణముగ నుండును. చెట్టుతెయు నారగానుండును. సన్నని గుత్తులుగా పూవులుపూడును. పువ్వులకు వాసనయుండును. ఆకును నలిపి వెంటువాసనగానుండును. సన్యాసులు దీని ఆకులని యోగ సిద్ధిపడయుదురు. వేరుగము చలువచేయును. శేత్రోగములకు, చర్మ వ్యాధులకు బాగుగాపనిచేయును. యస్త్వీమధుకమును దగ్గలకు, పగర్బముకు వాడవచ్చును. దీనిబెరడు ముంగు చేదుగ నుండి తుంపగ తీసిగ నుండును. బెరగు పాడితో తగినంత జలముకలిపి దగ్గలకు నాకించవచ్చును.

మోతాదు :—2 తులములవరకు.

అక్కలకట్ట (Pellitory root)

ఇది గుల్మముగ పెరుగును. చామంతి ఆకువంటి ఆకులను, బోడతరపు పువ్వువంటి కాయయును కలిగియుండును. కాయంతయు పసుపువచ్చునను, పై ఎరుఘండుగల బెరడును యుండును. దీని పూతలోనే గింజలుండును. దీనివేరునే అక్కలకట్టయందురు. ఆకుపూడ వేరువలెనే నమిలినయెడల చిమచిమ లాడును. ఇది పగరుగ కారముగ

దున్నెవాడు లెక్కచూస్తే నాగలి కూడి మిగులదు.

నండును. వేడిజేయును. సరసంబుగనుగు రోగములకు ఈరసము బాగుగాపనిచేయును. చాతరోగముల పోగొట్టును. గట్టికంతులకు గండ ఫెరోజులలో ఈ అక్కులకర్ర పొడి కలిపి పటివేసిన తర్వాత పక్వమునకువచ్చును. నేత్రరోగములకు దీనిని తడితర ఔషధములతో కలిపి వాడవచ్చును. బోర్గిలు, కందిగిలు పువ్వుకరీరమును కంచి వద్దకు త్రుట్టినయెడల నామునద్దతో ఈ అక్కులకట్ట గంధముతినీ కలిపి రాచిన తగును.

మోతాదు :—2 తులములవరకు.

అత్తి (Ficus Racemosa)

శ్లో॥ ఉదుంబరః క్షీరవృక్షో జంతువృక్ష స్సదాఫలః,
హేమదుగ్ధః కృమిఫలో యజ్ఞాంశ్శ్రీతవల్కులః.

ఇది పెద్దవృక్షము. ఆకులు గుండ్రముగ, కొంచెము కొలగ మందముగ గరగరలాడుచుండును. చెట్టునుండి పాలుగాగును. కొయ్యలు గుండ్రముగ తీయగ నుండును. వీటినే అత్తిపండ్లుగాదుగు. ఇవి పూవులు పూయకయు కొయ్యలుపుట్టును. చెక్కెరసము వెగటుగ తీపినుండును. వాతరోగములకు చెక్కెరసము బాగుగా పనిచేయును. చెక్కెరపొడి కంఠులకు, చర్మరోగములకు వేపనూనెతో కలిపి రాచిన పనిచేయును అత్తిపండ్లను పిసికి మొండికంతులపై వేసినయెడల పక్వమునకు వచ్చును.

మోతాదు:— చెక్కెరసము నేరువరకు.

అతివన (Root of Indian Atees)

శ్లో॥ అతివిషా శుక్లకందా విషా ప్రతివిషాపరా,
శ్యామకందా సితాశృంగీ భంగు రోపవిషాణికా.

ఈ అతివన రేబువు, నలుపు, ఎరువు అని మూడువిధములుగా నుండును. కాని గుణముమాత్రము సమముగా నుండును. అతివన కొంచెము చిరుచేరుగ, కొరముగ నుండును. దీని గంధము కళ్ళవాపులకు పనిచేయును. చూడలకు కలుగు పాలనొప్పులలో దీనిని వాడవచ్చును.

మోతాదు:— తులమువరకు.

ఆముదవుచెట్టు (Ricinus Communis)

ఈ చెట్టు చాల ప్రసిద్ధమెకది. ఇది చిట్టామదము, పెద్దాముదము అని రెండు జాతులు. చిట్టామదమునకు కొయ్యలు, ఆకులు చిన్నవిగాను, పెద్దాముదమునకు పెద్దవిగా నుండును. గుణము సమానమే, కాని చిట్టామదము హంచిన. వీరిలో పూవులలో

దుక్కు దున్నితే భూమికికాంతము.

ఎఱుపు, తెలుపు భేదములు గలవు. ఆకులు పగరుగ చేడుగ, రుచిగ నుండును. తల మాదకు శిరోవాతములకు ఆకులను వేసికట్టిక బాగుగా పనిచేయును. శిలామేహవాతమునకు ఆకురసము వాడవచ్చును. ఆముగవునేత వాతకోగములకు నుపయోగించవచ్చును. ఆముదపుగించిలు విశేషము గావించును. మామూలుగా పెట్టు దాచాదినునులు మొదలగు బలవర్తకాషధములలో ఆముగవుసప్సను వేసిపెట్టుచుండిన యెడల వాతకోగములు, నేత్రకోగములు సంభవింపవు. ఆముదము విశేషమును గలిగించును.

మోతాదు:— ఆముదము సేరుపా.పా.

ఆవాలు (Indian mustard)

శ్లో॥ సర్వహాకటుకన్నేహలో భూతఘ్నో రక్షితాఫలః,
తుర్తుభోగ్యస్య ఉదిప్తస్థిభాశ్శ్వేతసర్వపః,
రాజకాచాసురీరాజీ సుతీక్షః కృష్ణసర్వపః.

ఆవాలలో ఎరుపు తెలుపు నలుపుగులు గలవు. ఇంచుమించుగ మాడును సమానగుణములు గలిగియుండును. తెల్లవాలు ఔషధములలో నాడుగురు. వేడి చేయును. వాతకోగములలో విరివిగా వాడవచ్చును. వీరి తగుగా జబ్బుపడిన భాగమునకు పట్టువేయుదురు. వీరిని పట్టువేయుచున్న వేడివీటితో కలిపి పట్టువేయవచ్చును. వాచియుండు ప్రదేశముపైన ఈ పిండితో పట్టువేసిక తగును. పశువునకు న్యూమోనియా మున్నగు వ్యాధులు కలిగినపుడు ప్రతిరోమీదను, కడుపునొప్పికి పొట్టొందను, గుండె, పేగులు వాచినపుడు ఆ యా ప్రదేశములమీదను పట్టువేయవలెను. ఇంకను వీటిని బలవర్తకాషధములలో కలిపి వాడవచ్చును. చురుకుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—1 తులమునుంచి 2 తులముల వరకు.

ఆరుదొండ (Capparis zeilamica)

శ్లో॥ ఆర్జుటస్సాదా రగభోబహుకంటః ప్రఘ్నరణః.

ఇది తీగ. కాయ కోలగ నుండును. పండిన ఎరువుగ నుండును. కాయలు చేడుగ నుండును. ఈ ఆకుపసరు వేడిచేయును. దీర్ఘవాతములలో వాడవచ్చును. ఈ దొండ చిగుళ్లలో తగినన్ని మిరియాలు, జాజికాయ కలిపి పెట్టిన అతిమూత్రము తగును. వాపులకు దీని పసరును వాడవచ్చును.

మోతాదు:— ఆకుపసరు ఆర్ద్రసేరు

ఆకుజెముడు (Euphorba Nerufola)

శ్లో॥ దళస్సుహీశ్యానజిహ్వో వత్రస్సుక్కు విరేచనీ.

జెముడు చెట్లలో ఆకుజెముడు, పులకెముడు, పలకలజెముడు మున్నగు అనేక రకములుగలవు. అన్నిటికీ పాలు పూర్తిగానుండును. ఇంచుమించు సమానగుణములు

కలిగియుండును. ఆపశుముకుట సన్నని కావలయు అయ్యుగ చిన్ని ఆపలును యుండును. వేడిచేయును. కఫమును పోగొట్టును. విశేషము గలిగియును. పశువులకు శ్వాసకోగము అందుకు సంధి పుట్టింపును దాని కావలయు దో-గావలయు చి సముత్తిసి తగినంతగా త్రాగించి యెడల శ్వాసోగిట్టును. ఇంకను ఈ కావలయుములో వేపమానెకలిసి ఆరువాపు అను కల్పవాపులను ఉపయోగించవచ్చును.

మోతాదు:—పరద ఆగ్రసేరువకకు.

ఇంగువ (Assafoetida)

శ్లో॥ హింగుబాక్లికమత్యుగం రామరం భూతనాశనం,

అగూఢగంధాజరణం జంతుఘ్నం సూపభూషణం.

ఇది 3, 4 అశువుల ఎత్తుగల పెరుగు. ఈ మొక్కలలో చాల రకములు గలవు. చెట్టునోపును సామాన్యము నేర్చి వేడి బియ్యమును ముడుపులను నలుపుంగుగ నుండును. దీనినే ఇంగువయందు ఈ గురు లక్షణము దీనిపై గల గురూయును. ఇది కాదువాసనగ, వెగటుగ, కారముగ నుండును. ఎక్కిలి వేడిజేసి ఆర్చును. శ్వాస నణగను. విశేషముగానియును. పశువు లు కలుగు శీతాత శ్వాసకోగములను బాగుగా పనిచేయును. ఈనివలెఅనే 1 గుంపుల ఇంగువను పేగువాలో కలిపి వేడిజేసి త్రాగించి వానియను పొందును. ఇందువలె సామాన్యలోగాని, స్పిరిట్లోగాని కలిపి పుండలి రాచిన నెట్టుచుండును. దీని కక పుట్టును. కర్మబుత్తెలలోగాని, అవి న నూనెలోగాని ఇంగువనుకలిపి త్రాగించి తగును.

మోతాదు:—4 అశువుల వరకు.

ఇందువెగింజలు (Clearing nuts)

శ్లో॥ కతకోముప్రసాదశ్చ ద్రవస్తి క్షఫలస్తథాః.

ఈచెట్టు ముసిడిచెట్టుకంటె పెద్దది. ఇది కొండలమీద బాగుగాపెరుగును. పండనతిందురు. గింజలు జగటగ నుండును. గింజలు ఎరుగదీసి మడ్డినీటిలో కలిపిన యెడల స్వచ్ఛమైన నీరు పైకి తేలును. ఇంకను యీ గింజలను మనిచేసి పంచదారలో కలిపి పశువులకు కలుగు శీత్రకోగముల ఉపయోగించవచ్చును.

ఇప్ప (Bassia)

శ్లో॥ మధూకోమధుక స్తీక్ష్ణసాగశ్చగుడపుష్పకః,

గోలాఫలోలోధపుష్పౌమధుకోష్ఠోమధుద్రుమః.

ఇది పెద్దవృక్షము. దీని ఆపలు లోలు గావలసలెనుండును. దీని పూవులు పొగడ పూవులవలెనుండును. పువ్వులనుండి సారాయితీయుగును. ఇంకను చమరుగూడ తీయు

మనిషికి శస్త్రదిపుష్టి పసరానికి తిప్పదిపుష్టి

దురు. ఆముదముకంటె చిక్కగానుండును. పువ్వులను ఎండబెట్టి పిండిగా జేయుదురు. ఇప్పుడూనే వేడిజేసి ఆర్చును. ఈ చెట్టు బెరడుగనుము వాతరోగములకు, క్రిమిరోగములకు బాగుగా పనిచేయును. ఇప్పుడిండి మోకాళ్ళనాపులకు తగ్గించును. ఇప్పుడు పువ్వు పై రోగములకు పనిచేయును.

ఉత్తరేణి (Achycanthes Aspera)

శ్లో॥ అపామార్గస్తు శిఖరీ కిణిహీ భిరమంజరీ,
అధశ్శల్వశ్చైశ్శిఖరీకః ప్రత్యక్షుష్పీమయూరకః.

హిందూలో నలుపు తెలుపు ఎరుపు అను మూడురకములు గలవు. ఉత్తరేణి ఆకులు నూరి విరిగిన భాగాములకు కట్టుట వలనము కట్టుట వలనము. ఈ ఆకు పసుపు కారముగ చెరుగ నుండును. జీర్ణకలిలో ఆకుపసుపుకలిపి త్రాగించిన మాత్రరోగములు, వాతరోగములు తగ్గును. ఆకునూరి రసముతీసి విషపురుగుల కాటకు నుపయోగించవచ్చును. చర్మవ్యాధులకుకూడ పసుపు బాగుగా పనిజేయును. ఉత్తరేణి భిన్నము చేసి తడితర మందులలో కలిపి చర్మవ్యాధులకు, జీర్ణరోగములకు వాడిన తగ్గును.

మోతాదు: —పసుపు సేగువరకు.

ఉమ్మెత్త (Datura)

శ్లో॥ ధత్తూరః కితవోధూర్తోదేవతా మదనశ్శరః,
ఉన్మత్తోమాతులస్తూరీతరకః కనకాహ్వయః.

పువ్వులు అపలు పెద్దవిగ నే యుండును. కొయలమీద ముండుండును. కొన్ని జాతులను ముండు దవు. నల్లఉమ్మెత్త చాల శ్రేష్ఠమైనది. తెలుపు నలుపు పసుపు పూవులుగల చెట్లుగనును. పచ్చపువ్వులది దొంగుట కష్టము. తక్కినవి దొంగును. అమరసము వేడిజేయును. ఆద్రవాపులకు, బెనులకు ఈ ఆకుపసుపులో తగినంత వెన్న కలిపి మర్దనచేసి తగ్గును. పశువులకుకూడా వాతరోగములకు ఆకుపసుపు బాగుగా పనిచేయును. నల్లఉమ్మెత్త అమరసము విషపురుగుల కాటకు పనిచేయును. నుసిమిరికి ఈ ఆకుపసుపుతో తగిన త గంధకముకలిపి రాచిన మాడిపోవును. మంటివెట్టి అను వ్యాధికి నల్లఉమ్మెత్తాకుపసుపులో తగినంత ఉప్పు లిపి యిచ్చిన తగ్గును. ఈ ఆకుపసుపును ఎక్కువగా వాడరాదు. దీనిలో విషవస్తువు లెక్కువగానున్నది. పసుపు పువ్వుల ఉమ్మెత్తను భూతివైద్యు లెక్కువగా వాడుదురు.

మోతాదు: —పసుపు అర్ధశేరువరకు.

ఉసరిక (Myrabolan tree)

శ్లో॥ ధాత్రీఫలామృతఫలమలకం శ్రీఫలంశివం.

దీని ఆకులు, పువ్వులు కాయలు ఔషధములయందు యుపయోగపడుచున్నవి. దీని చెక్క కాయలరసము పొరుగు పురుగులనుండును. రసము చలువచేయును. పశువులకు కలుగు దీర్ఘ వాతరోగముల కన్నిటికి తదితర మందులతో కలిపివాడిన బాగుగా పని చేయును. పశువులకు కలుగు దొమ్మలకు శ్రీఫలములు అనగా కరక్కాయ, తాడికాయ ఉసరికపంపుతో కలిసిరుకలిసి రెండుమూడు మోతాదులిచ్చిన తగ్గును. ఇంకను ఉసరిక పంపు కమాయము ప్రత్యేకముగా విరచనములు కట్టించుటకు ఈయవచ్చును.

మోతాదు :—6 తులములవరకు.

ఊడుగ (Alangium Decapetalum)

శ్లో॥ అంకోలక స్తామ్రఫలః పీఠసారోనిరోచకః,
గుప్తస్నేహో విరేచీన్యాద్యాషితో దీర్ఘకాలకః.

ఇది సాధారణమైన చెట్టు. దీనియాకులు సన్నముగా రెండుమూడు అంగుళముల పొడవుగనుండును. తెలుపుంగుగల పూవులు పూయును. దీనికాయలు పచ్చిగానున్న పుడు నలుపుగనూ, పండినపుడు ఎరుపుగనూ ఈతకాయంత ఆకారముగ లిగియుండును. దీని చెక్కరసము చేరుగనుండును. వేడిచేయును. విషపుగుల కాటకు బాగుగా పని చేయును. పశువులకు కలుగు కడుపునొప్పి కామెర్లు చర్మరోగములకు ఈ చెక్కరసమును వాడవచ్చును.

మోతాదు :—చెక్కరసము ముప్పాతిక సేరువరకు.

ఏనుగ పల్లెరు (Pedalium Murex)

శ్లో॥ శ్వదంష్ట్రాన్మూలశృంగాట షడంగ ఘోరకస్త్రీకః

ఇది చిన్న చెట్టు. తెలుపుగనుండును. వర్షాకాలమునందు బాగుగా నొలచి వేసవియందు మాడిపోవును. దీనిపువ్వులు నూపుపువ్వుల ఆకారముగలిగి పసుపుపచ్చగ నుండును. కాయలు గచ్చకాయలంత పరిమాణముగలిగి ప్రక్కలయందు నాలుగు ముండుండును. దీనినే ఏనుగపల్లెరనియు, పెద్దపల్లెరనియు, వాడుదురు. ఇందు చిన్న పల్లెరొకటి కలదు. ఇది నేలప్రాకును. ఆకులు చింతాకులవలె నుండును. దీనిపువ్వులు చిన్నవిగ ఎరుపుగ నుండును. దీని కాయలకు నాలుగు జంటముండుండును. గొల్లలు వీని ఆకులను పెరుగులో నీరుపోసి వేయుదురు. వెంటనే పెరుగు గట్టిపడును. దీని ఆకు, కాయ, రసము చలువచేయును. దీని ఆకుపసురులో బియ్యపునీరు కలిపియిచ్చిన తురమ

తల్లిని నమ్మినవాడు ధరణిని నమ్మినవాడు చెడడు.

యనురోగము శాంతించును. పల్లెరుకాయలనుమాడ్చి పొడిజేసి తులం నూశకారంలో కలిపి నేనుకగిరుతో యిచ్చిన నీరుచురుట, శిలామేహవాతిము తగును. ఆరంభములోనే చేయవలెను. శుక్లశవ్వమునకు ఆపవసరు పనిచేయును. పల్లెరుకేళిరసము కూడ మూత్ర రోగములకు పనిచేయును. ఆప రసములో తగ్గింత మానే కలిపి వాతనొప్పులకు మర్దన చేసిన తగును.

మోతాదు:—ఆకురసము సేరు.

కరక్కాయ (Terminalia Chebula)

శ్లో॥ శివాహరీతకీ పథ్యాచేతకీ విజయాజయా,

ప్రపథ్యాప్రమథామోహూ కాయస్థాప్రాణదామృతా,

విచనీయాక్షైః పరీ పూచనా పృతనా ధయూ,

పయపా నందినీజ్యేయాశ్రేయసీరోహితీతథా.


ఈ పంట పెద్దపొంగును. ఆపలు ముదముగ పెరుముగ నుండును. విజయ, రోహిణి, హాతి, అమృత, అభయ, జీవశి, చిత్తి అని కరక్కాయలు ఏను విధము లగు నుండును విజయ కరక్కాయ సాకాయవలె సుగ్రహుగ నుండును. రోహిణి కరక్కాయ సుగ్రహుగ నుండును. హాతి కరక్కాయ చిన్నదిగ నుండును. అమృత కరక్కాయ బీజము చిన్నదిను కంప మిక్కిలి మందముగ ఉండును. అభయకు అయదుగేళుండును. జీవశి గురగాగుగ కలిగి యుండును. చేతకికి మూడుగేళులుం డును. విజయ సర్వరోగ ములంగును, రోహిణి ప్రహారీపలుకును, హాతి లేపవిధి యంగును, అమృత శోధనమునంగును, అభయ నేత్రిరోగములంగును, జీవశి స్వరోగ ములంగును, చేతకి చూర్ణయోగములంగును వాడదగి యుండును. చేతకియను కరక్కాయ తెలుపు నల్లపు భేదముచేత రెండురకములుగా నుండును. తెల్లచేతకి కరక్కాయ ఆరు అంగుళముల పొడవుగను, నల్లచేతకి కరక్కాయ ఒక అంగుళము పొడవుగ నుండును పై భేదములలో కొన్ని స్వర్ణమాత్ర నును, కొన్ని దృష్టిమాత్రమునను, కొన్ని వాసవమాచిత మాత్రమునను, కొన్ని తిన్దను విశేషముచేయు స్వభావము కలవిగ నుండును. అన్నిటిలో విజయ కరక్కాయ మిగుల శ్రేష్ఠమైనది.

కరక్కాయ కంఠయందు మధురరసము, స్నాయువులయందు ఆమలరసము, తాడిమయందు చేదు, చర్మమునందు కారము, గింజముందు వగు యిట్లు అయిదు రుచులు కరక్కాయ యందున్నవి. కరక్కాయ వగుగా నుండును. చలువచేయును. వాత, రక్త, జీర్ణ, శ్వాసరోగముల కన్నిటికి ఈ కరక్కాయపొడి బాగుగా పనిచేయును కరక్కాయపొడి కవిపొడి కొబ్బరినూనెలో కలిపి గాయములకు పుండ్ల వాడిన తగును.

మోతాదు:— పొడి రీ తులముల వరకు.

కలబంద (Aloe Barbadensis)

శ్లో॥ కుమారీ మండలామాతాగృహకన్యాతిఫిచ్చిలా,
రసాయనీ కంటకినీ బహుపుత్రావనోద్భవా.



కలబంద యనునది యొక గుల్మము. మందమైన మట్టలును మట్టలలో మదపు వాసనగల గుల్మము అందును. కాయ, ఆకు, వెన్ను మొదలగునవి రేవు. సర్వాంగసార

పాడిదాచవలెను : పంటపొగడవలెను.

మైన మూలిక. వైద్యమునందు మట్టలనే ఎక్కువగా వాడుదురు. మట్టల రసం జిగటగా తీగలు సాగుచుండును. చలువ చేయును. విరేచనము గావించును. బలవర్ధకాషణములలో మట్టలనుంచి తమూరగు ముసాంబరమును పొడిచి కలిపి వాడిన పనిచేయును. మట్టల రసములో పటిక గంధకము సమానభాగములు కలిపి చర్మరోగములకు, నలిగిన గాయములకు వేసిన తగును.

మోతాదు:— ముసాంబరము. రీతులములవరకు

కవిరి (Acacia Catechu)

ఇది క్రొత్తపట్టు కాయలనుండి వచ్చును. దీనినే కైవరము, కాదు అందురు. వెగటుగ, వగరుగ నుండును. చలువ చేయును. విరేచనముల కట్టించును. చర్మరోగములకు నోటిపూతకు దీనిని తడితరి మందులలో కలిపి ఇచ్చిన తగును.

మోతాదు:— 3 రీతులముల వరకు.

కటుకరోహిణి (Hellibrous Niger)

శ్లో॥ కటుకీ రోహిణీతిక్తా చక్రాంగా కటురోహిణీ ।
మత్స్యపితౌ పాండరుహా కృష్ణభేదీ ద్విజాంగికా ।
అశోకా రోహిణీ మత్స్యాసకులాశకులాదని॥

ఇది తెలుపు నలుపు రెండురకములు. ఆపలు చేరుగనుండును. ఎక్కువ మోతాదుల నీయరాదు. నల్లదానికంటె. తెల్లకటుకరోహిణి చురుకుగ పనిచేయును. వేపచెక్క పొడి, యష్టిమధుకము, కటుకరోహిణి నీయకలిపి కాచిన కషాయము బలవర్ధకాషణముగా రక్తసంబంధముగ రోగములయందు వాడవచ్చును. కటుకరోహిణిని బలవర్ధకాషణములలో కలిపి వాడవచ్చును.

మోతాదు:— $1\frac{1}{2}$ రీతులములవరకు

కరివేప (Bergera koenigh)

శ్లో॥ కైడర్యోధ మహానింబో రావణో గిరినిమ్బకః.

ఈచెట్టు చెక్క, వేరు, చేదు, కాయముగ నుండును. ఆకు సువాసనగా నుండును. ఆపరసము చలువచేయును. విరేచనముల కట్టించును. గొడ్డుబొరతనము గల పశువులకు ప్రతిదినము నాలుగు గుప్పెళ్ళవంతున ఉండిచేసి వారము దినములు పెట్టిన చూలు నిలుచును. ఇంకను క్రిమిరోగములకు వాతరోగములకు వాడవచ్చును.

న్యూగిర లిందిస్తే ముసలియెద్దు అంకవేయును.

కసివెండ (Cassia Occidentalis)

శ్లో॥ కాసమర్దః కర్మశస్యాద్వృంజనో గజరస్తథా.

ఇది చిన్న చెట్టు. భూమిపై ముప్పావుగజమువరకు పెరుగును. చెట్టంతయు వెగటు వాసనగా నుండును. దీని కాయలు పెసరకాయలవలెనుండును. పనుభవచ్చని పూవులు పూయును. ఆకులు కొంచెము కోలగా మొదలక గుండ్రముగ నుండును. ఆకురసము చేరుగ నుండును. నేడిజేయును. వెన్నతో ఆకురసము కలిపి అగ్రవాపులకు, పక్షవాతము లకు ఉపయోగించవచ్చును. ఇంకను పడగు నేత్రకోగములకు చిర్బకోగములకు బాగుగా పనిచేయును.

కురాసానివాము (Black hembane seeds)

ఇది జీర్ణ సంబంధముగ రోగములకు బాగుగా పనిచేయును. ఈ మొక్కలు గుమి దుగా పెరుగును. ఈ వాములలో చుట్టును కలిగి చగుణము కలదు. గర్భవాతమునకు, దగ్గు నకు, కడుపునొప్పికి, తదితర హలంతులతో పువాలలో కలిపి త్రాగించిన బాగుగా పని చేయును. ఈ గజలగసము తీసి కడ్లమున జలముచేసి రోగభాగము తగ్గును.

మోతాదు:—4 తులములవఱకు.

కుప్పింట (Acalypha Indica)

ఇది మార్కొండ్రాకు చెట్టు తిలలోది. దీని ఆకులు కొంచెము కోలగా నుండును. ప్రతిదొడ్డిలోను ఈ మొక్కలు మొలచును. ఆకురసము భూమిగా నుండును. చిన్నవ్యాధులకు బాగుగా పనిచేయును. మార్కొండ్రాకు గుణములే దీనికి గలవు. శ్వాసరోగము లలో ఈ పసురును ముక్కుగొండ్రములలో పోసి బాగుగా పనిచేయును. ఆకురసములో నున్న ముకలిపి గజ్జ, నునీమిరికి వాడవచ్చును.

కుంకుమ (Sanpindus)

శ్లో॥ అరిష్టకోగర్భపాతీ కుమ్భవీర్యశ్చ ఫేనిలః,
కృష్ణబీజో రక్తబీజః పీతజేనోర్ధనాధనః.

ఇది పెద్దపువ్వు. ఆకుకొంచెము కోలగా గుండ్రముగ నుండును. కాయలు చిన్న విగ పూవులు తెల్లగా గుత్తులుగ నుండును. కాయలను బిళ్లతో నూరిన నురుగువచ్చును. కాయలు చేరుగ నుండును. నేడిజేయును. చర్మరోగములలోను, కేను, మిన్నలులు పుట్టినవలెను ఈ కాయల నురుగుతో శుభ్రము చేయుటనుంచిది. పశువుల లోకలకులుగు నునీమిరి, గురుజ మున్నగు వ్యాధులకు ఈ నురుగును పట్టించవచ్చును. దొమ్మలకు ఈ నురుగును త్రాగించిన తగ్గును.

పడమటకట్టువేస్తే పాడియావు అంకనేయును.

కానుగ (Pongamia glabra)

ఈ చెట్టునెక్క, ఆమృతము వెంటుగా చేరుగనగును. ఈచెట్టుయొక్క సర్వాంగములు వెంటుగానూగు నుండును. నేటికొలనుగు చిగురుపట్టి పూడును. పూత తెలుపు నలుపుంగుగానుండును. కొయలు కొంచెము పొడిగి ఎల్లవరపుగనుండును. ఆమృతము చక్కలోగి ములప బొగుగాపనిచేయును. పురుగులు పడిన పుష్పము తదితర గాయములకు ఈ గింజలనుండి తయారుచేయబడిన నూనెనువాడిన చక్కగా మానును. దీని ఆకులునూరి పురుగులుపడిన పుష్పమునట్టి పురుగులు చచ్చును. చెక్కెరము వాత లోగి ములప యిచ్చిన తిగును. కానుగి గింజలను పెరుగుతోనూరి పురుగులుపడిన పుష్పము కట్టిన మానును.

మోతాదు:—చెక్కెరము అర్ధసేరువరకు.

కాకర (Momardica charantia)

శ్లో॥ కాకరవేల్లంకటిల్లంస్యా దుగ్రకాండం సుకాండకం.

ఇది తీగచాతిలోనిది. దీనిలో అనేకకాయలు గలవు. దీని ఆకులు చిలుగులిగి నుమారు మాడంగులముల వెచ్చుకొని లిగియుండును. పువ్వులు పసుపువచ్చుగనుండును. పెద్ద కాకరకాయలు గొంగులుకలిగి పాడవుగనుండును. పాటికాకరకాయలు గుండ్రముగ నుండును. పాటికాయలు మిగుల చేరుగానుండును. ఆమృతము చేరుగానుండును. నేడి జేయును. విషజంతువులకొట్టప, నేత్రలోగి ములప, చర్మవ్యాధులప పనిచేయును. వాత లోగి ములప పసరును తదితర మందులలోఁబడి వాడవచ్చును.

మోతాదు:—పసరు అర్ధసేరువరకు.

కందదుంప (Areen Campanulatum)

గ్రామములోను పొలములందును నేని పండించు ఊకందగుడ అడవికందయొక్క గూములను కలిగియుండును. అడవికంద వన్నెత దుగ్ధ దీని ముడుగు అంతయును పనిచేయును. మావివేరుని పశువులప ఈ దుంపను పులిచల్లతోగాని కలిపితితో గాని కలిపి నూరి త్రాగించిన వెంటనే పడును.

మోతాదు:—రీ తులములవరకు.

గంజాయి (Cannabis sativa)

దీనినే జ్ఞానప్రతియందురు. ఈ చెట్టు రెండుగజముల యెత్తులోపుగ పెరుగును. పూవులు గుత్తులుగ పూనును. లేత మొక్కలను ఎలుకలు తినును. ఈ మొక్కలనుండి ఒక విధమైన నారయు, గింజలనుండి నూనెయు తయారు చేయుదురు. ఇది మత్తును కలిగించును.

మన్నునెల్లప్పుడూ దున్నితే వెన్నునెల్లప్పుడూపండును.

చును. పెద్దరోగము, పొరుడు, రక్తవిరేచనములు మున్నగు రోగములలో దీనిని వాడిన బాగుగా పనిచేయును. చెవిమాదకు గంజాయిఆకును నూరి రసము తీసిపోవిన తగును. దీని విత్తులను రోగము తినిపించిన విస్తారము గ్రుడ్లను పెట్టును. కొన్ని పక్షులకు తినిపించిన వానిరంగు మారును.

మోతాదు:—2 తులమువరకు.

గచ్చ (Caesalpinia)

ఈచెట్టు పొదవలె పెరుగును. పొలము యొక్క ఆవరణలకొరకు చుట్టువేయుదురు. చెట్టుంతయు చిన్న చిన్న ముండ్లతో నిండియుండును. ఆకులు దిరిసెన ఆకులవలె నుండును. కాని ఆంధ్రము లిచ్చువి. కానుకలములను గురించి తెలియదు. గచ్చగింజలో విషయాపమైన పప్పుడును. గచ్చపప్పు చేగుగ, వగరుగ, కారముగ నుండును. శ్వాసరోగములలో ఈపప్పు బాగుగా పనిచేయును. దీనిఆకును శేరు వాపునకు, దూకుల జంటబొడ్డునకు తదితర కల్లవాపులకు ఆముదముతో వేయించి కట్టిన బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—గచ్చపప్పు 3 తులములవరకు.

గుంటకలగర (Eclipta prostrata)

శ్లో॥ భృంగరాజో భేకరాజో మార్కవః కేశరంజకః,
అంగారికో మహానీలో భృంగాహ్వస్సూర్యవల్లభః,

నీటిప్రదేశములందు విశేషముగా మొలచు చిన్న మొక్క. ఇది నలుపు పనుపు తెలుపు పూవుల ధేరము కలిగియుండును. ఇది సర్వాంగ సారమైన మూలిక. ఆవరసము చేదుగ నుండును. శరీరమునందలి చెడునీటిని లాగివేయును. నేత్రరోగములకు శ్వాస రోగములకు పనిచేయును. చర్మరోగములకు తదితర మందులలో కలిపి వాడవచ్చును. ఆకునూరి మలిమిడికి మిరియాల పొడితో కలిపికట్టిన తగును.

మోతాదు:—అర్ధ సేనువరకు.

గోగు (Cannabis Sativa country)

శ్లో॥ పీలుశ్శతసహస్రాంశీ తీక్ష్ణకఃకరభప్రియః,
సహస్రాంగీ గుడఫల స్తత్ఫలం పీలుపీలుజమ్.

దీనిలో శశనానిగోగు, పుల్లగోగు, ధవాసరిగోగు, యెర్రగోగు మున్నగు రకములు కలవు. మెట్టచేలలో పెరిగిన పుల్లగోంగూర శ్రేష్ఠమైది. సన్నని కాడవలె పొడవుగ

పాన్పుమంచిదిగామాచి ధనరమును కట్టినయవలెను.

మొలచును. ఆకులు పూవులు పుల్లగనుండును. పాలుబడుచు దూడలకు అప్పుడప్పుడు గోంగూర పెట్టుట మంచిది. విరేచనము గావించును. వాపులకు, పంపరకు, బొడ్డుపుండ్లకు గోంగూర ఉడికించిగాని, అమదముతో వేయించిగాని కట్టిన పనిచేయును.

గాడిదగడవ (Aristolochia Bracteata)

ఇదియొక తీగ. నలుపుగలసిన అవపచ్చరంగు గలదిగానుండును. దీనికాయలు లేత బుడమకాయంత యుండును. ఆకు గరువగ నుండును. అడవులయందును, కంచెలయందును విశేషముగా పెరుగును. దీనివేరు, కాడ, ఆకు చాల చేదుగనుండును. పంపర అతి వేడిజేయును. పశువులకు కలుగు వాతరోగములకు, సమస్తవాపులకు, బాగుగాపని చేయును. చర్మరోగములకు ఆకుపసరులో హఠతికర్పూరము కలిపి నాలుగైదు పూతలు పెట్టిన తగును. దూడలకు ఎలుకపాములు, నువ్వురుగులు పడినపుడు ఈ ఆకుపసరు పెట్టిన బాడించి విరేచనమగును. విషపురుగులకొట్టకు ఈ పసరు త్రాగించిన బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—కపర ఆర్ద్రశేరు వరకు.

గుగ్గిలము (Baellium)

గుగ్గిలపుచెట్టుయొక్క బంకకు గుగ్గిలమనిపేరు. గుగ్గిలము ముక్కలుముక్కలుగ పచ్చగ ఎరువురంగుగ నుండును. పరిమళముగలది. దీనిపొగ లేవతారాధనయందు ప్రశస్తముగ నుపయోగింతురు. రసవీర్యాగ్రముగ మహిసాక్షికి సమముగనుండును. గుగ్గిలము మెత్తగ నుండును. ఉంగును. శ్రేష్ఠమైన గుగ్గిలము నిప్పుగోవైచి నుండును. ఎండలో నుంచిన దగును. గోరువచ్చని నిప్పులోవైచిన ద్రవమగుటయేగాక వాలవలె తెల్లగా నగును. గుగ్గిలముయొక్క సారము మూడునెలలకు తగ్గిపోవును. గుగ్గిలము మలమూత్రముల వెడిల్పించును. గడలకు కంతులను కరగించును. నీటిలోనూ పట్టువేసిన వాతనొప్పులు తగును. దీనిని పొగవేసి ఘామపానము చేయించిన శిరోరోగములు తగును. చర్మవ్యాధులన్నిటికి తదితరమందులలో కలిపివాడిన పనిచేయును. బలవర్ధకాషధములలో కలిపి వాడవచ్చును. పండలపాడిలో దీనినివేసి వాడవచ్చును.

మోతాదు:—3 తులములవరకు.

చింత (Tamarind tree)

శ్లో॥ అమితా చుక్రితా చించా తింత్రితీ శక్తిచంద్రితా.

చింతచెట్టు పెద్దపుత్తము. ప్రసిద్ధమైనది. దీని లేతఆకులు కాయలు-పండ్లు పుల్లగా నుండును. వేడిజేయును. చింతాకుపసరులో ఉప్పు, అమదపు పప్పు కలిపి చర్మరోగములకు వాడవచ్చును. అపత్రోక్తి- అమదముతో వేయించి బెణుగులకు మలిమిడి వాడ

వట్టిగొడ్డుకు ఆరుపులెక్కువ; వానలేనిమబ్బుకు ఉరుములుఎక్కువ

కచ్చును. చింతగింజలను రుద్ది విరిగిన ఎముకలకు గుడ్డతో కట్టుకట్టవచ్చును. చింత చెక్కను మసిచేసి అముదముగాని నేపనూనెలోగాని కలిపి చెల్లి, గజ్జి, నునీమిడి కాడిన తగును. చింతపండు చలువచేయును. పశువులకు కలుగు జీర్ణ, వాత, రక్తశోగము లలో చక్కగా పనిచేయును. విషములకు విరుగుడు పెట్టవచ్చును. పైత్యపుద్దురునకు చేదుబీలకర్రతో ఈవులును కలిపి మర్దన చేయవచ్చును. మలబద్ధకముగా నున్నపుడు చింత పండువులునుతో ఉప్పుకలిపి పెట్టిన పారును. ఉంగిడికి వులును పనిచేయును.

మోతాదు:—చింతపండు ఆర్ధసేరు నవతామరకు.

చిత్రమూలము (Plumbago Zeylanicum)

శ్లో॥ చిత్రకో నూతనభుగ్వ్యాలో దారుణో హనోరుణః,
అగ్నిమాలీ హవిః పాచీ వహ్నినామా విశేషతః.

దీనికి గుండ్రని ఆకులుండును. దీనివేరు చిరుకగొట్టి మొదల పసుపుపచ్చగ నుండును. ఇది తెలుపు, ఎరుపు, నలుపు పువ్వుల భేదము చేయుండును. అల్పముగ దొరకును. ఎరుపు, నలుపు చిత్రమూలములు రెండు ఒకేగుణము కలిగియుండును. నలుపు చిత్రమూలమును అవులకు వాసువజ్జాసినను లేక పాలలో వేసిను పాలు నల్లబడును. మలిమిడికి, బెణుకులకు చిత్రమూలముతో అముదము కలిపివేసి, పుండుపడి తగును. దీనిరసము పాకుగ్గును. కాబట్టి తదితరమందులతో కలిపి లోపలికి ఈయవలెను. దీరజీర్ణ శోగములకు దీనిరసముతో తదితరనుండులు కలిపి యిచ్చిన తగును. బలవరకాషణములలో కలిపి ఈయవచ్చును.

మోతాదు:—చిత్రమూలము 1 తులమువరకు.

చేదుబీర (Pluckettiana)

శ్లో॥ కోశాతకీశతచ్చిద్రా జాలినీ కృతవేదనా ।
మృదంగఫలకాక్ష్యేళా ఘోంటకీ కర్కశచ్చదా ।

మంచిబీరవలెనుండును. రసము చేదుగ వెగటుగనుండును. నరములకు సత్తువ చేయును. తలతిరుగుడు, ధనుర్వాతము, దొమ్మ మొదలగు వ్యాధులకు యీపసరుపెట్టిన కాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—పసరు ఆర్ధసేరువరకు.

చేదుపొట్ల (Trichosanthes Cumecurina)

శ్లో॥ తిక్తమా బీజగర్భా పరా రాజపటోలికా,
జ్యోత్స్నాపటోలికాజాలీ నాదేయీ భూమిజంబుకా.

బండరుమూలమెరిస్తే బుక్కగొడ్డునుగూడ మేపలేక అమ్మకలెను.

తీగప్రాకును. ఆకులు పొట్లఆకులవలె నుండక చిక్కలువేయును. కాయలు గుండ్రముగ చిన్నవిగ నుండును. పండినవెనుక ఎరుత్తుగానుండును. కాయపైన తెలుపుచారలుండును. ఆకురసము వగరుగా చేదుగానుండును. రక్తసంబంధమగు రోగములకు ఆకు పసరు బాగుగా పనిచేయును. చర్మవ్యాధులకు పసరును వాడవచ్చును. క్రిమిరోగములకు దీని పసరుతో కలిపి కలిపి ఈయవచ్చును.

మోతాదు:—పసరు ఆర్ధసేరువరకు.

చేకొణిత (A Medicinal plant)

దీనినే సేగుర్రాట అందురు. ఇవి పొలములందును, దొడ్లలోను పెరుగులకలు. దీనిఆకు కందివెట్టు ఆకువలెనుండును. వాతరోగములకు బాగుగా పనిచేయును. జొన్న కలితో ఈ ఆకుపసరు కలిపి పక్షముదినములు పెట్టిన వాతము వారిండును.

మోతాదు:—ఆవి పీసెనుంచి ఆర్ధమణుగువరకు.

జీలకఱ్ఱ (Cuminum Cyminum)

శ్లో॥ జీలకం దీర్ఘకం శుక్లమజాజీకణ జీరకం.

ఇది చిన్న మొక్క - దీని కొంఠెయందు గుత్తులు గుత్తులుగా పూచి పువ్వుగల్గులలో గింజల తేర్చుడును. దీనినే తెల్లజీలకర్రఅందురు. మామూలుగా గృహములందు బాడు జీలకర్ర యిదియే. దీనిరసము పులగా స్వాదుగా నుండును. వేడిజేయును. జీరక దీప్తి కలిగించును. రక్త, జ్వర, వాతరోగముల కన్నిటికి ఆమోఘముగా పనిచేయును.

మోతాదు;—4 తులములవరకు.

జీడిగింజలు (Semecarpus)

శ్లో॥ భల్లాతకోనభో భల్లీ వీరవృక్షోగ్నివక్రకః,
ఆరుష్కర స్తథాయాక్ష స్తవనోగ్ని ముఖధనుః.

ఇది పెద్దవృక్షము. కొంచెము పొడవుగా వెడల్పుగా ఆకులుండును. నలుపు గింజలు, గుండ్రనిపండ్లు, తెలుపుగల మాను కలిగియుండును.

జీడిగింజలను నలుగగొట్టునపుడు బాగ్రత్తగా కొట్టవలెను. గింజలలో నుండు పొగ మనుష్యులకు సరిపడనిచో శరీరమంతయు వాచును. జీడిగింజలు వెగటుగ, చేదుగ, చుమరు గలిగియుండును. పశువులకు వాతరోగములకు ప్రతిదినము నాలుగైదు తీసికొని తిను ఆహారములో కలిపి పెట్టిన నెమ్మదిండును. పొడిపశువులకు పాలసేర్పు నాలుక నెయగునప్పుడు ఈ గింజలను పులిచల్లలో నానబెట్టి త్రాగించిన నెమ్మదియగును. కాలు గొట్టు, తదితర మొండిగాయములకు జీడిని కాల్చి అంటించిన తగును.

తూర్పుకొర్రువేస్తే దుక్కియెద్దు రంకవేయును.

జల్లేడు (Asclepias Gigantea)

శ్లో॥ అర్కస్సూర్యాహ్వయః క్షీరీ సదా పుష్పవికీరణః

దీనిలో తెలుపు నలుపురంగుల పువ్వులుగల చెట్టుండును. జల్లేడు చిన్నచెట్టు. దీనికాయలు వంకరగ ఆకుపచ్చనివి. ఎడిన గింజాల్ కాయలోనుండి స్వచ్ఛమైన ప్పసువైద్యునిది వెలుగుచున్నది. దీనిని గింజాల్ అనుకొనును. పావుల పువ్వుల వాసన యుండును. తెల్లజల్లేడు పూవుల పువ్వుకి కీచింజుక పూజలకు సమానముగా మందముగి కొంచెం లోపల నుండి చెట్టులను నున్న తెల్లని నూనెను. ఇది ప్రసిద్ధి చెందినట్లు. దీని జల్లేడును పూవుల ప్రభుత్వము విడిగా, తెల్లజల్లేడు మిగుల శ్రేష్ఠము.

ఆకులు, వ్రేళ్ళు, పూవులు, పాలులు గయితల చేయుగానుండును. చాలా వేడి గలిగియును. విరేచనముకూడ చేయును. జల్లేడుపల రసము వావులను శ్వాసరోగములను చెవిరోగములను పనిచేయును. జల్లేడుపాలు నేత్రరోగములను చిక్కరోగములను పనిచేయును. అవపసరు విషపురుగుల కాటకు పనిచేయును.

తుమ్మ (Acacia Arabica)

ఇదియొక పెద్దచెట్టు. కొమ్మలను సత్పరి ముండ్లుండును. పసుపుపచ్చగను గుండ్రముగనుండు చిన్నపువ్వులు పూయును. పూవునకు అరంగుళిము పొడవుగల నన్నని తొడిమయు, నలుపుగ, మందముగనుండు వ్రాసుపైపట్టయు, తెలుపు, నలుపు రంగులుగల జిగురును, నన్ననిపొడవుగ పలుచగనుండు కాయలును, జమ్మిఆకులవలె చిన్నవిగనుండును. ఇందు తెల్లతుమ్మ, నల్లతుమ్మ, కస్తూరితుమ్మ అని మూడురకములుగలవు. తెల్లతుమ్మనూ అంతయు తెలుపుగ బూడిదరంగుగ నుండును. పూవులకూడ తెలుపుగ నుండును. కస్తూరితుమ్మ సాధారణమైనచెట్టు. ఇంచుమించు తెల్లతుమ్మవలె నుండును. దీనికాయ మిక్కిలిపొట్టిది. నల్లతుమ్మచెక్క వగరుగ వెంటగనుండును. ఈ చెక్కరసము పొరుడు నోటిగాలిపుండ్లు మొదలగువానికి పనిచేయును. చిన్నదూడలకు కలుగు చర్మ వ్యాధులకు పనిచేయును. పాలనేర్లు, గడ్డివారమునకు, పశువుతొనిన తరువారము నేరుతుమ్మకు పసరులో అర్ధసేరుపాలు, రెండుతులముల ఇంగువలిపి వ్రాగించిన తగ్గును. తుమ్మచెక్క పొడిచేసి రసికాయపుండ్రు తదితరగాయములను బాగుగా పనిచేయును, తుమ్మచెక్క కషాయము నోటిపూతకు పనిచేయును. తుమ్మకాయలను పశువులకు పెట్టిన మిగుల బలము గలిగియును.

మోతాదు:—చెక్కరసము అర్ధసేరువరకు.

ఆశేషకురిస్తే ముసలిపిడురంకవేయును.

రసము కారముగ నుండును. విశేషము గావించును. వాతరోగములలోను, కడుపునొప్పి, రొంప, దగ్గ మున్నగు రోగములలోను అవపసరు బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—ఆకులు 100 వరకు.

తంకేడు (Cassia Auriculata)

గుబురుగా పెరుగును. పసుపుపచ్చని పూవులు పూచును. కాయ వంకరగ బద్దవలె నుండును. అప చింతాశకన్న రెట్టింపు పెద్దదిగనుండును. చెక్కరసము వగరుగ నుండును. ఆకురసము చెక్కరసము విశేషములు కట్టించుటకు పనిచేయును. దూడలు పా లెక్కవగాత్రాగి పారుకొనిన యెడల తంకేడుచిగుళ్ళను పెరుగులో కలిపిపెట్టిన తగును. పెద్దరోగములో పారుడెక్కవగా నున్నయెడల ఆకు చిగుళ్ళను నూరి కలిపిటిలో గాని పెరుగులోగాని. నాలుగైదుసార్లు పెట్టినయెడల తగును.

మోతాదు:—అవపసరు అర్ధసేరువరకు.

తిప్పతీగె (Tinospora Cordifolia)

శ్లో॥ గుడూచీ కుండలీ ఛిన్నావయస్థామృతవల్లరీ
ఛిన్నోద్భవా ఛిన్నరుహో మృతాజ్వరవినాశినీ
వత్సాదనీ చంద్రహాసా జీవంతీ చక్రలక్షణా.

ఇది యొకనిదమైన తీగ. దొంకలమీదను కంచెలమీదను ప్రాపను. దీనియాకులు యిండుమించుగ తమలపాకును పోలియుండును. ఈతీగ గణపథులలో రెండువైపుల చిగురుపట్టి పెద్దతీగగా పెరుగును. దీనికి చిన్న చిన్న తెల్లనిపూవులును, బచ్చలకాయల వంటి కాయలును ఉండును. పండు నలుపురంగుగా నుండును. రామరావణయుద్ధంలో మృతులైన కవీశ్వరులను బ్రతికించుటకై దేవతలు వారిశరీరమున చలిన అమృతబిందువులు పడినచోట నీతీగ మొలచినదని యుండురు. కేపచెట్లమీదప ప్రాకుతీగలు మంచివందురు. ఈ తీగనుండి సత్తు తయారుచేయుదురు. తీగరసము వేడిజేయును. కారముగ, వగరుగ చేరుగనుండును. ఈతీగను పలుపుగాదుట్టి వురమతగిలిన పశువుమెడలోవేసిన రోగము తగ్గును. ఇంకను వాతరోగములకు యీ రసరు పనిచేయును. ఇంకను ఆకురసము గాయములకు, చిగువ్యాధులకు, నరములు తెగినప్పుడు వాడిన పనిచేయును.

మోతాదు:—తీగరసము సేరువరకు.

తవాక్షరి (Bamboo manna)

శ్లో॥ వంశజా వైణకీ క్షీరీర్వక్షీరీ వంశరోచనా,
తుగాక్షీరీ తుగావంశీ వంశక్షీరీ శుభా సితా.

ఉత్తర ఉరిమిపరిసినా పాముతరిమి కరిచినా తిరుగడు.

వెదురుబొంగులను చీల్చినపుడు తెలుపురంగుల పలుకు కొన్నిటిలో బయలు
దేరును. దీనినే తవాక్షరియందును వెగటుగా వగరుగానుండును. మూత్రరోగములలో
దీనిని వాడవచ్చును. విరేచనముల కట్టించును. శుక్లశవ్వము కలిగినపుడు మంచిగంధముతో
దీనిని యిచ్చినచో తగును.

మోతాదు:—1 తులమువరకు.

త్రిఫలములు

(Cheboulie, Belleric and Emblic Myrabalam)

కరక్కాయ, తాడికాయ, ఉసిరకాయ అనునాటిని త్రిఫలములందురు. మూడు
పాళ్ళు కరక్కాయలు, ఎనిమిది పాళ్ళు తాడికాయలు, పన్నెండు పాళ్ళు ఉసిరకాయలు
కలిపినచూర్ణము నమస్తరిక్త జీర్ణవాత సేత్ర రోగములకు బాగుగా పనిచేయును. శిరో
రోగముల పోగొట్టును. దొమ్మలను రూపుమాపును.

త్రికటుకములు (Pepper, dryginger and long pepper)

ఐంటి పిప్పళ్ళు మిరియాలు అనునాటిని త్రికటుకములందురు. ఇవి క్యాస, వీరస
రోగములకును, రక్తజీర్ణ వాతరోగములకును బాగుగా పనిచేయును. త్రికటుకములను
మెత్తగానూరి వస్త్రఘాతమువట్టి వెన్నలోగాని, తేనెలోగాని, కలిపి సేత్రరోగములకు
పెట్టిన బాగుగా పనిచేయును. త్రికటుకములు జీర్ణకర్మిని గలిగించును. వేడిజేయును.

తేనె (Honey)

శ్లో॥ మధువుష్పాసవః పుష్పరసోమాక్షిక మిరితమ్.

తేనెలో నాలుగురకములు గలవు. భ్రామరము, పైత్తికము, త్షాద్రము, మాక్షి
కముఅని నాలుగువిధములు. భ్రామరము తెలుపుగ నెయ్యిరంగులదిగ నుండును.
త్షాద్రము కఠిలరంగునండును. మాక్షికము తెలవర్ణముగ నుండును. భ్రామరముతేనె
త్వప్తియిస్తు. తియ్యగ నుండును. పైత్తికముతేనె త్రిదోషముల ప్రకోపింపజేయును.
త్షాద్రము తేనె గురుత్వము కలదిగనుండి శేష్ణమునుపె చును. శ్రేష్ఠమైనది. మాక్షికమును
తేనె రూక్షగుణము స్వల్పముగు గురుత్వముగలది సుధురముగానుండును. వాతమును
పెంచును. ప్రణచికిత్సయందు ఉత్తమముగ నుండును. త్రాత్రతేనె అల్పగుణములను బహు
దోషములను గలిగియుండును. కాచి వడిముగట్టి తేనె త్రిదోష హరముగను. పచ్చితేనె
పులుపుగ త్రిదోషహారిగను నుండును. విషపుష్పములనుండిగూడ తేనెను తేనెటీగలు
చేర్చును. గాన తేనెను ఉష్ణముగ నుండునపుడుగాని, ఉష్ణముగనుండు పదార్థములలో
కలిపిగాని వాడరాదు. అట్లు చెసినచో విషసముగ నుండును. గాన తేన్యాములందును,
బలవర్ధకాషధములలోను వాడవలసి వచ్చినపుడు చల్లార్చి వాడవలెను.

వదిదుక్కులకుతర్వాత దున్నినవాడుపాపాత్ముడు.

ధనియాలు (Coriander Seeds)

ఆకు సలివానసగ నుండును. చిలులుచిలులుగల మృదువైన ఆకులును, గుత్తులు గుత్తులుగ తెల్లపుగ చిన్నవిగనుండు పువ్వులును ఉండును. గింజలు గుండ్రముగ పరిమళముగ పచ్చిగ నున్నపు దాహపచ్చరంగు, ఎండినపిదప గోధునువరము గలవిగ నుండును. ధనియపు మొక్కలకు కొలిమిరి మొక్కలనిపేరు. సోపుగింజలవలెనే ఇవియును పని చేయును. పశువులకు కలుగు అజీర్తి కడుపునొప్పి మొదలగు జీర్ణరోగములకును, బలవగ కాషధములలో, వాయువును పోగొట్టు జౌషధములలో కలిపివాడుదురు. ఇవి తీసిగ, వగరుగ నుండును. ధనియాలరసములో రేపల్చిన్నిరసము కలిపియిచ్చిన నరుచురుకు తగును.

మోతాదు:—ధనియాలు అర్ధ సేరువరకు.

దానిమ్మ (Punica Granatum)

శ్లో॥ దాడిమీ రక్తకుసుమా దంతబీజా శుకప్రియా,
మధురామ్లఫలో రక్తబీజకో రక్తపూరకః.

తియ్యదానిమ్మ, పులుపుతీపు కలసినదానిమ్మ, పులుపుదానిమ్మయని మూడు రకములుగలవు. దీని ప్రాసాదెక్క, వేరుచెక్క, ఆకు మొగ్గ పువ్వు లేతచిగుళ్ళు తొక్క పీరిసము వగరుగనుండును. పాగుడు రక్తవిరేచనములలో ఈచెక్క రసముగాని లేత ఆకులనుగాని పెరుగుతోడిపి మూడునాలుగు పర్యాయములు పెట్టవలెగ్గును. ఈనిన తరువాత మాసమువెంట గుర్రాసనగల మస్తుపము, డిసయెడల ఈచెక్క రసముతో కడిగిన వాసనతగ్గును. ఇంకను ఈ చెక్కపొడి పుట్టు గారపట్టుటకు ఉపయోగించ వచ్చును.

దిరిసెన (Mimosa Sirissa)

శ్లో॥ శిరీషః ప్లవగోవిప్రశ్మకవృక్షః కపీతనః,
మృదుపుష్పశ్శ్యామవర్ణో భండీరశ్శంభీనిఫలః.

ఇది పెద్దవృక్షము. దీనికొమ్మలు పెళుసైనవి. ఈచెట్టు శాఖోపశాఖలుగా పెరుగుటచే పందిరివలెఛాయాప్రధానముగాకూడ ఉపయోగపడును. కాయలుపలుచగా బద్దలవలె పొడుపుగను, పూవులు కేసరములవలె నుండును గాని అంతకంటె కొంచెము పెద్దవి. పూవులకు కొంచెము పరిమళముండును. ఆకు ముసగాటవలె నుండును గాని అంతకంటె కొంచెము పెద్దది. కాయలు 4 నుంచి 9 అంగుళములవరకు పొడవుండును. ఒక్కొక్కకాయలో పదిగింజలకంటె ఎక్కువయుండవు. దీనిచెక్క ఆకురసము వెగటుగ నుండును. వేడిచేయును. దీని వేరులను ఆకులరసమును వాత రోగములలో నుపయోగించు

దాయకట్టునిపు తన్నకమానదు.

మండలలోకలిపి వాడుదురు. దీరిసెనాపపసరు, నరమూత్రము, పనుపు, నల్లేరుకలిపి గుండెవగర్చు దగ్గలకు పెట్టిన తగ్గును. తెలియని రోగములకు ఈ ఆకుపసరు, పనుపు కలిపి పెట్టిన తగ్గును. ఈ ఆకుపసరు రక్తసంబంధముగు రోగముల కన్నిటికి బాగుగా పని చేయును.

మోతాదు:—ఆకు చెక్కరసము సేరువరకు.

మాసరి (Cocculus Villosus)

శ్లో॥ ఛలిహింటో మహామూలః పాతాళగరుడాహ్వయః.

ఇది తీగబ్రాహ్మణు. వేగు మిగుల గాఢముగ పాటుకొనును. ఆకులు కొంచెము కొలగ చిన్నవిగ మిక్కిలి ముగ్గురొకటి పచ్చరంగు గలవిగ నుండును. నీలికాయ చిన్నది. పచ్చిగ నున్నచుడు ఆకుపచ్చరింగుల పండిన తరువాత పలుపు గంగా నుండును. ఆకుగసము చలువచేయును. విశేషము కలిగిండును. మాత్రమును వెడలి చును. మాసరితీగను త్రాడుగాదుట్టి పశువులకు కురుకొగ్గము వచ్చింపును మెడలోవేసిన తగ్గును. పశువులకువచ్చు మూతరోగములలో ఈ ఆకు బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—ఆకురసం సేరువరకు.

దుష్టుపుచ్చెట్టు (Odina Wodier)

ఇది తీగబ్రాహ్మణు. ఆకుగిలినను ఆమితిముగా పాలుకారును. ఆకులు గుండ్రముగ కొనచేలియుండును. పూవులు గుత్తులుగా తెలుపుగ ఆంక్షముగ నుండును. ఇది మిక్కిలి వేడిజేయును. విశేషము గానిండును. దొమ్మలు కురును మొదలగు రక్తసంబంధముగు వ్యాధులకు బాగుగా పనిచేయును. ఈ తీగను పలుపుగాదుట్టి చలిపరమ తగిలినదాని మెడలోవేసిన తీగ పూటునకు తీవ్రజ్వరము తగ్గును.

మోతాదు:—పకకు అర్థసేరువరకు.

దొండ (Momordica Monodelpha)

శ్లో॥ బింబీరక్తఫలాగోళాతుండీ దంతచ్చ దోపమా ।

మధుపక్వా మహద్రాశీశ్లేష్మ కృద్బోధనాశినీ॥

దొండతీగ బ్రాహ్మణు. చేదుదొండ, తీయదొండయని రెండువిధములు. ఇంకను కాకిదొండ మరుదొండ, నాగదొండ, అను రకములుకూడగలవు. తీయదొండ దొడ్లలోవేసి పెంచబడును. చేదుదొండ అరణ్యములలో స్వయముగా మొలచును. దొండతీగసరికి పాలినబ్రతుకును. దొండకాయలు కొంచెముకొలగ గుండ్రముగ నన్నగ నుండును. పచ్చికాయలు ఆకుపచ్చగను పండినపుడు పగడమువంటి చక్కని ఎరువు

మలుగులు కంగిలే మాపటికి ఈనును.

తంగును కలిగియుండును. దొండ్రాకు మూడు అంచులుకలదై వృదువుగనుండును. తీయ దొండ్రాకులను కూరపండుకొని తిందురు. ఆకుగలము వేడిజేయును. ఆకుపసరును అర్రువాపులకు వెన్నలో కలిపిరాసిక బాగుగాపనిచేయును. శిశోవాతములకు ఆకుపస రును చెవులలోపోసిక తగును. చర్మరోగములకు ఈపసరుతో ముద్దకర్పూరము కలిపి రాసిక తగును. తీయదొండ్రాకు రసమును రక్తసంబంధముగు రోగములకు త్రాగించిక పనిచేయును.

మోతాదు :—పసరు నేరున్నరవరకు.

నల్లేరు

శ్లో॥ ఆస్థినంహారణో వజ్రవల్లరీ క్రోష్టు ఘంటికా |

వజ్రాంగీ గ్రంథిమాన్ వజ్రః ప్రోక్తస్యా దస్థిశృంఖలః॥

దొంకలనిదను, చెట్లనిదను ప్రావీణీగ నాలుగైదు అంగుళముల కొకకణుపును, కణుపువద్ద అకులును ఉండును కాడ పలకలుగా నుండును. ఇందు రెండు మూడు నాలుగు పలకలుగల కాడలుండును. మూడు పలకలనల్లేరు కొన్ని భస్మములు చేయుటకు వాడవిద్యయం దుపయోగించుటకు పనికివచ్చును. నల్లేరుకాయలు పచ్చివి ఆకుపచ్చగ పండినవి నల్లగ గుండ్రముగ చిన్నవిగ కరివేప పండ్లంతయుండును. కాడలుమాత్రము జొవ్వము వాడనగును. దీనిసము శరీరమునకు తగిలిన దురదప్రభృతి దద్దురులేదును.

ఆకులు కాడలు దురదగలిగియుండును. వేడిజేయును. పశువులకు కలుగు ఉంగిడి విషపురుగులకాట్లు నల్ల లెవులు ఎడతెగనిపారుడు మున్నగు రోగములకు పనిచేయును.

మోతాదు :—నల్లేరురసము అర్థ నేరువరకు.

నల్లజీలకర్ర (Migella Sativa)

ఈ మొక్కలు విస్తారముగా పంజాబు దేశమునందు పెరుగును. వీని ఆకులు చీలియుండును. పువ్వులు గుత్తులుగుత్తులుగా నుండును. ఇవి నలుపుగ మిగిసిరిలాడుచుండును. చేతితోపలిపి వాసనజూచిన గాటుగల నువాసన వచ్చును. ఇవి కారముగ నుండును. జీర్ణరోగములకు ఇవి బాగుగా పనిచేయును. కడుపుబ్బు అజీర్తి మలబద్ధములకు వీటిని ఉపయోగించవచ్చును.

మోతాదు. —4 తులములవరకు.

నల్లమందు (Opium)

ఇది గలగసాలమొక్కల కాయలనుండి తయారు చేయబడును. నల్లమందులో జారణము, మారణము, ధారణము, సారణము అని నాలుగిధములు. జారణము తెలుపు

గను, మారణము నలుపుగను, ధారణము పచ్చగను, సారణము చిర్రవర్ణముగను యుండును. ఇది విదేశీయమైన బోషధము.

నల్లమందు చేదుగనుండును. మత్తును కలుగజేయును. మలమూత్రముల బంధించును. రక్తమును విరచును. పశువులకుకలుగు అతిసారము, రక్తాతిసారము, కడుపునొప్పి మొదలగు జీర్ణసంబంధముగు రోగములకు పనిచేయును. ఎండువాతముగల పశువునకు అర్ధశేరు అవుపాతలో ఒక అరతులముగాని పావుతులముగాని నల్లమందుకలిపి త్రాగించిన తగును.

మోతాదు :—తులమువరకు.

నల్లవప్పి (Volkameria Inermis)

దీనినేరు ఆకులరసము చేరుగనుండును. ఇప్పుడెక్కడయు నాచార్యులములకు బాగుగా పనిచేయును.

నీరుల్లి (Allium Ceba)

శ్లో॥ పలాండుర్ధ్వలఘ్యశ్చ దుర్గంధో ముఖమాషకః.

ఇదియొక చుంపజాతి. ఎరువుగ, తెలుపుగ నుండును. ఈ చుంపనుండి సన్నముగ అర్ధగజమునా చి గజమునా పువ్వులగు అమృతవర్షి కాంచనపువ్వులు. కాంచనపువ్వు తెలుపు రంగుగల పూవులుపూచును. ఉల్లిసము చెగయుగ నుండును. చలువచేసి అర్చును. రక్త శుద్ధిచేయును. నయిములకు నత్తువలయును. వాన, శ్వాసశ్లేత్రరోగముల కన్నిటికి ఇది బాగుగా పనిచేయును. నిక్కాక గల పశువులకు పులిచల్లలో ఉల్లిగడ్డలు నాననేసి పెట్టిన శాంతించును.

మోతాదు:—నీరుల్లి సవాసేరువరకు.

నేరేడు (Eugenia Jambolana)

శ్లో॥ మహాజమ్బూ రాజజమ్బూ మహాస్కంధాబృహత్ఫలా.

నేరేడుచెట్లలో నేరేడు, అలనేరేడు, జిన్ని, నేలనేరేడు కాకి నేరేడు, అవి అయిదురకములుగలవు. నేరేడు పెద్దవృక్షము. ఆకులు కొలగ చెరుసుగ, పచ్చి కాయలు అపవచ్చగ దోరకాయ కొంచె మెరుపుగ బాగుగా పండినది నలుపుగ నుండును. చెక్కరసము వగరుగ నుండును. రక్తమూత్రము విరేచనముల కట్టించును. చెక్కపాడి రసికాయపుండ్లకు పనిచేయును.

మోతాదు :—చెక్కరసము అర్ధసేరువరకు.

నేలవేము (Cherayta)

శ్లో॥ కిరాతతి క్తః కైరాతో భూనింబో రామసేనకః.

మిగపమొక్కలవలె గుబురుగా పెరుగును. ఈ మొక్కయొక్క ప్రతిభాగము చేదుగ నుండును. సమూలము వేడిజేయును: రక్త జీర్ణవాత విషరోగములన్నిటికి ఈ సమూలమంతయు పనిచేయును. బలవర్ధకావధములలో దీనిని కలిపి వాడుదురు.

మోతాదు :—పాడి 2 తులములవఱకు.

నువ్వులు (Sesamum Indicum)

శ్లో॥ తిలంఫలస్థైలఫల స్థిలపింజో పరస్పితః జాతినో వనజాతిస్సాస్వత్॥

నువ్వులు కారముగ వగరుగ చేదుగ నుండును. బలము గలిగించును. వేడి జేయును. నల్లనువ్వులు మంచివి. మావిపడిని పశువులకు ఆర్షసేరుత్రోక్తి వేడినీటిలో కలిపి త్రాగించిన పనిజేయును. నువ్వులసిండిని వెన్నలో కలిపి పైత్యపుద్దుగునకు రాసివ పనిజేయును. నువ్వులు కల్లుబెల్లము కలిపి త్రోక్తి బలవర్ధకము దుక్కిపెద్దులకు పెట్టిన బాగుగాబలియును.

పంచలవణములు (Five kinds of Salts)

స్నేధవణము, సోవర్చలవణము, బిడాలవణము, కాంచలవణము, సముద్ర వణము అని ఆయాదువస్తువులుకలసి పంచలవణములనబడును. ఇవి ఉప్పుగ రుచిగ నుండును. శరీరమును పోషించును. రుచివిప్రుట్టించును. మలమును వెడలించును. వాతజీర్ణ రోగములకు బాగుగాపనిచేయును. ఆకలిని బుట్టించును. బలవర్ధకావధములలో కలిపి వాడవచ్చును.

పటిక (Alum)

సోరాష్ట్రదేశపు గనులలోపుట్టు ఒకవిధమైన మన్నుగుడ్డలకు రంగువేయుటకు లోహములను స్వచ్ఛముగ ద్రవింపజేయుటకు ఉపయోగింతురు. ఇందు పటిక, పుల్లిక అను రెండు రకములుగలవు. పటిక కొంచెము పచ్చగాను, బరువుగను, సునువుగను ఉండును. పుల్లిక తెలికగా తెలుపుగా ఫుల్లగ సునువుగ నుండును. ప్రస్తుతిము తెలుపుగ రాళ్ళవలె నుండుపటిక మనకు దొరుకుచున్నది.

ఇది వగరు కారము పులుపు రసములుగలిగియుండును. వేడిజేయును. రక్తము నాత్తును. విరోచనముల కట్టించును. నోటికాళ్ళకు పటిక చిటిచి ఆప్పుడప్పుడు కడుగు కుండిన గారపట్టును. కంటిరోగములకు ఈ పటిక చిటిచుక్కలు వాడిన పనిచేయును. నోరు దుర్వాసనగానున్నపుడు ఈపాడితో కడిగిన రుచివిప్రుట్టించును. నోరుపొక్కినపుడు పూతకు ఈ నీరు బాగుగా పనిచేయును.

పసుపు (Turmeric)

శ్లో॥ మార్ద్రదారజనీ శారీ రంజనీ వరవర్ణినీ,
పిండాపీతా వర్ణవతీ నిశావర్ణవిలాసినీ.

దుంప ప్రధానముగాల మొక్క. అవలు పొడవుగ కొనచేయుండును. అవలకు గూడ పసుపు వాసం గలదు. గెలవేసి పూవులు పూడును. ఇందు అనేకకణములు గలవు. ఇది వెగటుగ చేరుగ నుండును. ఉద్రేకకారియు, బలకారియునగు వస్తువు. వేడి జేసి ఆర్చును. జీర్ణకరిని గలిగించును. బలవర్ధకాషధములలో కలిపి వాడవచ్చును. చర్మ వ్యాధులకు నేత్రరోగములకు మూత్రరోగములకును దీనిని వాడవచ్చును.

మోతాదు :— 2½ తులములవరకు

పిప్పళ్లు (Piper Longum)

శ్లో॥ పిప్పలీ చపలాకృష్టామాగధీ మగధాకణా,
విశ్వోపకుల్యావై దేహీ శౌండిప్యా త్రిక్షతండులా.

పిప్పలితిగ మల్లయాళము మున్నగు చల్లనిదేశములందు పుట్టును. అవలు ముదురు, తమలపాకు ఆకాగముగ నుండును. తీగబ్రాహ్మ. పిప్పళ్లు చమురు గలిగియుండును. వేడిజేయును. రక్త, వాత, శ్వాస నేత్రరోగముల కన్నిటికి ఇది బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు :— 4 తులములవరకు.

పుగాకు (Tobacco)

పుగచెట్లకు శీతకాలముల పెంచుదురు. మూకుమాసములకు తయారగును. అవ సన్నముగ పొడవుగ నుండును. పొడవైన వెన్నుచేయును. గింజలు మిక్కిలిసన్నముగ గనగ సాలవలెనుండును. అవలు మిక్కిలి తీక్షణమైవని. పొగాకుఅరియు దీనిని వాడుదురు. పుగాకు చేదు, కాఠిముగా నుండును. వేడివిగలుగ జేయును. దీనిలో “నికోటిన్” అను విషపదార్థమున్నది. పొగాకుతోటలోనికి సామాన్యముగా పాము వెళ్ళును. ఇది విషపదార్థము. చర్మవ్యాధులకు, నేత్రవ్యాధులకు, గాయములు, వ్రణములు మొదలగు వానికి అవరోధము, అవపాడి పనిచేయును.

పెన్నేగు (Physalis Flexuosa)

శ్లో॥ అశ్వగంధాతురంగాహ్వో గోకర్ణ శ్వానరోహకః
వరాహకణ్ఠో వరదాబల్యా వాజీకరీవృషా.

కోటివికృత కంటే కొంచుకొని పొలందున్నడం మంచిది.

అకులు గుండ్రముగ మృదువుగనుండును. ఇది వేరుప్రభాసముగాగల శూలిక. దీనిపండ్లు ఎరువుగ, గుండ్రముగ పగడమువలె నుండును. పండ్లలోని గింజలు మిక్కిలి సన్నముగ తెలుపుగనుండును.

దీని దుంప సువాసనగనుండును. చలువచేయును. వాతమును హరింతును. దుంప రసము వెగటుగనుండును. ఇది దేహములోని ముఱుమును వెడలించును. దగ్గు వాతము చర్మవ్యాధులకిను దూడలకు ఆజీర్ణ చేసి. పుంస ఈ గుంపకము బాగుగాపనిచేయును.

మోతాదు:—పొడి 6 తులములవరకు.

ప్రత్తి (Gossypium)

శ్లో॥ కార్పాసః పటశూలశ్చా చ్ఛాదనీ బాదరః పిచుః.

పశువులు పారుకొనినపుడును రక్తవిశేషములను ఈఅవపసరుగాని అపత్రోక్తిగాని పక్షిగలోగాని పెరుగులోగాని కట్టినప్పుడుగాని కలిపి పెండుమూడు మోతాదు లిచ్చిన తిగును. కాయలరసము పాలలోకలిపి దగ్గులకువాడిన తగ్గును.

మోతాదు :—అవపసరు ముప్పాతిక సేరువరకు.

బ్రహ్మాదండి (Argemone Mexicana)

దీనినే సిచ్చిసాన చెట్లనియు, నాలిపుచ్చి యనియు, బలుకక్కిన చెట్లనియు నందురు. ఇది పన్నపువ్వు పువ్వులు పూనెడిచెట్టు, ఏటేట మొలచును. దీనిగింజల నుండి చమురుతీయుదురు. ఈ కొమ్మలనుండి పచ్చసానను దీర్ఘతలమాదలకు పని చేయును. ఇంకను బ్రహ్మాదండి సమాలమునుదంచి రసముతీసి చర్మవ్యాధుల కుపయోగించిన బాగుగా పనిచేయును. ఇంకను ఈపసరు విషపురుగుల కాట్లకు పనిచేయును. అకును ఉడికించి కట్టిన కాళ్ళవాపులు తగ్గును. నేళ్లరసము నెరిడికు పనిచేయును.

బాడిద (Erythrina Indica)

శ్లో॥ పారిభద్రోనిమ్బవృక్షోరక్తపుష్పః ప్రభద్రకః

కంటకీ పారిజాతస్యాన్యన్తందార కటికింశుకః.

ఇది పెద్దచెట్టు, చూసు తెలుపుగనుండును. తెలుపు ఎరువు పూవుల భేదములు గలవు. తెలుపుది మంచిది. చెక్క అకురసము వెగటుగ కారముగ నుండును. వాత లోగములకు చర్మలోగములకు కర్ణలోగములకు రసము పనిచేయును.

గూనిదున్నకంటె గుడ్డిదున్న శ్రేష్టము.

మిరప (Capsicum Annum)

దీనిపువ్వులు చిన్నవిగా తెలుపుగ నుండును. పచ్చిమిరపకాయలు అట పచ్చగ, పండినవి ఎరుపుగ నుండును. ఇందులో పొట్టిమిరప శశివాళీమిరప నీనుమిరప మొదలగు అనేకరకములు గలవు. ఎఱుమిర్చి వేడిజేయును. నేరుజీడిలో మూడుగుప్పెల్ల ఎండు మిరపకాయలను వేసి ఉడికించి చేతితో విసికి ఎడపానిన కాగవుపాలందురు. ఈపాలను రక్త వారి జీర్ణరోగములలో వాడిన బాగుగా పనిచేయును. కడుపునొప్పి దొమ్మ, కురమ, ఇంక తెలియని రోగములకు ఈపాలు వాడిన పనిచేయును.

మోతాదు :—4 తులములవరకు.

మొత్తులు (Fenu Greek Seeds)

ఇదియొక చిన్న మొక్క. ఆవలు చిన్నవిగా కొంచెము గుండ్రముగ నుండును. అట చేదుగ నుండును. మొత్తులు వేడిజేసి ఆర్చును. పశువులకు దూడలకు ఆజీర్ణివిరేచనములు కడుపుబ్బ మున్నగు వ్యాధులలో పెరుగులో కలిపి పెట్టిన కాంతించును.

మోతాదు :—6 తులములవరకు.

మిరియాలు (Black pepper)

శ్లో॥ మరిచంవల్లిజంతీక్షృం మలిసం శ్యామభూషణం.

తెల్లమిరియాలు, నల్లమిరియాలు అని రెండురకములు. మిరియపు తీగెం మళ్లయాల రేళమునంగు తిరువాన్కూరు తోటయందు వేసి పెంచబడును. తీగెన ముక్కలుగా నరికి పాతిపెట్టుదురు. ఇవి మూడు సంవత్సరములకు పెద్దవై పంటనవచ్చును. మిరియపుతీగెల వెన్నునందు మిరియము లేపుడును. పండుమిరియము తెల్లగ నుండి ఎండి చిన పిదప నలుపుగ నుండును. మిరియాలను నానబెట్టి పెపాట్లు తీసివేయబడినవి తెల్లమిరియాలనియు, పాట్లు తీయని నల్లమిరియాలనియు చెప్పుదురు. గాని పుట్టుకతోనే తెల్లమిరియాలగునని చెప్పుదురు. తెల్లమిరియాలు కనపడవు. మిరియాలు వేడిజేయును. ఇవి అన్నిరోగములలో అమోఘముగా పనిచేయును. రక్త, శ్యావ, జీర్ణశీత్ర, వాతరోగములలో ముఖ్యముగా మందుగా వాడెడి మందులలో కలిపి వాడుదురు.

మోతాదు :—3 తులములవరకు.

మొదుగ (Butea Frondosa)

శ్లో॥ పలాశః కింశుకః కర్పర్యాజ్ఞికో బ్రహ్మపాదపః,
క్షీరశ్రేఘ్నో రక్తపుష్ప స్త్రీ వృతస్సమిదుత్తమః.

అచ్చివచ్చిసభూమి; అడుగిడేచాలును.

ఇది పెద్దపుష్కము. అపలు గుండ్రముగ ఒక తొడిమప మూడుఅకులు విడివిడిగ నుండును. శత్రుఅపలు ఎరువుగను ముదిరిన అపలు పచ్చగనుండును. కాయలు పొడవు గను కాయలని గింజలు బద్దలవలె గుండ్రముగను నుండును. గింజలపై పొట్టు ఎరువుగ నుండును. మోడుగ పువ్వు పసుపుపచ్చగ నుండును. తొలుపు, పసుపు, ఎరుపు, నలుపు రకముల పూల భేదములుగలవు. నలుపు, ఎరుపుని దొరకుటకష్టము.

మోడుగ పువ్వు వెగటుగ కారముగ నుండును. చలువచేయును. రక్త, జీర్ణ, వాత ములకు ఈ పువ్వును జొన్నఃలిసికోగాని బియ్యపుకలిసికోగాని కలిపి పెట్టిన లిగును.

మోతాదు:—పువ్వు 4 తులములవరకు.

ముమీశి (Nux Vomica)

దీనినే విషపష్టి, గుండ్రపష్టి అంటారు. అపలు గుండ్రముగ కాయలు నిమ్మకాయల త్రవచూరముగ లిగి గుండ్రముగను నుండును. పండించుచు దీనిపట్టు ఎరువుగ, అందముగ నుండును. దీనిలో గింజలు గుండ్రముగ బద్దలవలె నుండును. ముషిటిగింజలు మహాచేడుగనుండును. ఈ గింజలనుండి చురుచు దీముగురు. ఈ గింజలపొడి విరేచనముల గావించును. బలవర కౌష్ఠ్యములలో ఈ గింజలపొడి కలిపి వాడుదురు. రక్త, మూత్రము, మలబద్దము, పక్షివాతము మున్నగు రోగములకు ఈ గింజలపొడిని తదితర మందులలో కలిపి వాడిన బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—పొడి 1 తులమువరకు.

మునగ (Moringa Pterygosperma)

శ్లో॥ శిగ్రుశ్శ్చోభాంజనః కృష్ణగంధస్యాశ్చసలులచ్చదః,

ఇది సాధారణమైన పుష్కము. ఎరుపు తెలుపుగల పూవులు రెండు విధములు. ఇవిగాక నల్లపువ్వులమనగ కూడగలదు. ఇది అరుదుగ దొగను. ఈ గింజలనుండి పరిశుభ్రమైనహూనె తీయుదురు. దీని చెక్కరసము వేడిజేయును. దొమ్మ, నాలిదొమ్మ, గురక మున్నగు వ్యాధులకు బాగుగా పనిచేయును. అపను అముదముతో వుడికించి బొడ్డు వాపులకు బెణుకులకు కట్టిన లిగును. పువ్వులరసమును తేనెతోకలిపి కంటి పువ్వులకు రేజీకటికి పెట్టిన లిగును.

మూర్ఖొండ (Acalypha Indica)

అపయొక్క గుండ్రతనము కోలదనము భేదముచేత రెండువిధములు. గుండ్రఅప అది మూర్ఖొండఅనియు కోలఅపఅది మప్పింటఅనియు వాడుదురు. అప రసము వేడి జేయును. పురుగులు పడినపుండ్రు ఈ అపనువాడిన పురుగులు చచ్చును. వీసన మొగ బంతి మున్నగువాటికి ఈ పసరును 10 చుక్కలు పోసిన వెంటనే తుమ్మును.

మోతాదు:—పసరు 1 తులమువరకు.

తాచి (Ficus Religiosa)

శ్లో॥ పిప్పలశ్యామలోశ్వత్థః క్షీరవృక్షైగజాశనః,
హరివానశ్చలదళోమజ్జశోభోధి పాదతః.

ఇది పెద్దపుత్తము. మిగుల ప్రసిద్ధమైనది. చెక్కరసము వగరుగ నుండును. చలువ జేయును. చెక్కపాడి పుండ్రు పరిచేయును. మనీబాగులో చెక్కపాడికలిపి రసికారు పుండ్రు పట్టించినమానును. చెక్కను బీటిలో నావనేసిగాని, కాచిగాని నోటివూతలకు తుక్కిలింపు చేయించవచ్చును. రోగ పశువులకు కాచి చల్లార్చి ఈ వగరునీటిని పథ్యముగా పెట్టవచ్చును. పక్షవాతముగల పశువునకును, నోటినుండి వదరు కక్కులకును చెక్కరసముతో ఆవుపాలు కలిపిపెట్టిన తగును.

మోతాదు:—చెక్కపాడి 2½ రులములవరకు.

రేవల్పిన్ని (Roeum Emodi)

ఈ మొక్కలు హిమాలయ ప్రాంతములం దెక్కవగా పెరుగుచున్నవి. ఈ మొక్క నేరునుకొని పైచర్మమును వలచి ఎండబెట్టుదురు. ఇది పసుపు పచ్చగనుండును. రసము చలువజేయును. వంటివీరు దీయును. విరేచనము గావించును. మలబద్ధకమును పోగొట్టును. మజ్జగలో రేవల్పిన్ని కలిపి వాడిన మూత్రరోగములు పోవును.

మోతాదు:—రసము నేరువరకు.

వన (Acoveus Calamus)

శ్లో॥ వచోగ్ర గంధాగోలోమీ వడ్డ్రంధా జటిలామతా |
జటిలాశతపర్వాన్యాలోమశా హేమవత్సవి.

ఈ మొక్కల ఆవలనుండి తైలమును దీయుదురు. దుంప మదపువాసనగలిగియుండును. సొంటివంటిది. వేడిజేయును. శిరోవాతములకు ఆవుపాలలో వనకలిపి త్రాగించిన పరిచేయును. వనపాడి పురుగులను చంపును. ఘాటయిన వాసనకొట్టును. ఆకలిని పుట్టించును.

మోతాదు:—వనపాడి 1 రులమువరకు.

వాము (Ptychotis Ajown)

శ్లో॥ జవానీదీప్యకోదీప్యో దీపనీయాజవానికా |
జవసాహోగ్ర గంధాస్యాజ్జవాహ్వభూకదంబకః |

అవు చనిలోమేస్తే; దూడ గట్టనమేయునా |

వామచెట్టు చొడుగల పొలములలో నేలమీద ప్రాకడు చిన్న చెట్లుగ నున్నవి. కొన్ని చోట జానెడెత్తువరకు పెరుగును. దీని కిఖరములందు గుత్తులు గుత్తులుగా పువ్వులు తూచి క్రమముగా పువ్వులలో గింజలేర్పడును. వాము చీర్చికొరియగు వస్తువు. చీర్చికొగముల కన్నిటికి బాగుగా పనిచేయును. బలవర్ధకావధములలో కలిపి దీనిని వాడవచ్చును.

మోతాదు:—వాము 6 రులములవరకు.

వాయింట (Cleome Penlaphylla)

శ్లో॥ అజగంధా వస్తుగంధా కబిరపూతబర్బరా॥

ఇది చిన్న మొక్క, గజముయెత్తులోపుక పెరుగును. చెట్టున కింకరకు ఒకవిధమగు వెగటవాసనయు, తెల్లనితూపులును, సన్నగా పొడవుగా నుండు కాయలును, కాయలలో నల్లని చిన్న గింజలును యుండును. ఇందు వాయింట, మక్క-వాయింటయని రెండుజాతులుకలవు. ఆకులు గుండ్రముగ చిన్నవిగ నుండును. ఆకుపసరు వేడిజేయును. చర్మకొగములకు, కర్ణకొగములకు బాగుగా పనిచేయును.

వావిలి (Vitex Negundo)

శ్లో॥ నిర్దుండీ శ్వేతకుసుమస్సింతుక స్సిందువారకః॥

ఇది పెద్దవృక్షము. మారేడాకులవలె దీనియాకులు మూడు చిల్లలుగ నుండును. తెల్లవావిలి ఊదారంగుగ నుండును. ఈ చెట్టుక్రి దనుండు మట్టికూడ నలుపుగ నుండును. దీనికర్రతో అన్నము వండునపుడు, కలియబెట్టిన అన్నమంతయు నలుపుగ నుండును. దీనిపూవులుగుత్తులు కొలగ నుండును. ఆకుపసరు వేడిజేయును. వాతకొగములలో ఆమోఘముగా పనిచేయును. కశువునకు వెన్నెముకకు వెనుక మొత్తలకు దెబ్బలు తగిలినపుడు, పుటనున్నతో వావిలాకు ఉడికించి గోరువెచ్చనిది రెండు మూడు పర్యాయములు కొట్టినరగును.

మోతాదు:—పసరు అర్ధసేరువరకు

వేప (Melia Azadirachta)

శ్లో॥ నింబోనియమనోనేతారిష్టస్సాన్యతాపరిభద్రకః,
సుతిక్తస్సర్వతోభద్రకః పిచుమందః ప్రభద్రకః,
కుష్టదేహదేవదత్తశ్చరవిసన్నిభ సూర్యకః.

ఇదియును పెద్దదియగు ప్రసిద్ధమైన వృక్షమైయున్నది. ఆకు చెక్కకాయ పువ్వు మున్నగునవి వైద్యమున కుపయోగపడుచున్నవి. దీనిసమూలమందలి యేభాగము

అవుల సాధుత్వమా; బ్రాహ్మణుల పేదరికమాలేదు.

చూచినను మిక్కిలి తేడాగానుండును. ఈచెట్టునందు గాలిని శుభ్రముచేయు నుంచి గుణముకలదు. చెక్కపాడి పుండ్లకు పనిచేయును. వేపఆకు పసురులో తగినంత మంచి నూనె కలిపి గోమారులున్న పశువుల శరీరమునకు రాసి ఒకఆరగంట ఎండలో కట్టిక అన్నియు రాలిపోవును. చర్మవ్యాధులకు, గాయములకు చెక్కరసము బాగుగాపని చేయును. పాముకొటునకు వేపచిగుళ్లరసము పశువు ముక్కు రంధ్రములలో పింఠిన తుమ్ములు వచ్చును.

మోతాదు :—చెక్కపాడి 3 రులములవరకు.

వెలులి (Allium Sativum)

శ్లో॥ గృంజనోన్యోమహాకందోదుర్జరోద్ధీర్ఘప్రతకః.

వెలులి ఘోటువాసవ గలిగియుండును. ఆకులు సన్నముగా పొడవుగ నుండును. పులుపు ఆనురసము ఒకటితప్ప తక్కినరసములన్నియు కలవుగనుక దీనికి రసోనయని పేరు. తెలుపుగనుండును గనుక వెలులియుందురు. వెలులిదుంపయందు కారము, అకుల యందుచేదు, కాడియందు వగరు, కొడిచివర ఉప్పు, బీజములందు తీపిరుచులుండును. వెలులి నీరులినలెనే యుండును. వేడిచేయును. వెలులిగసము పేగులలోని క్రిములను చంపును. దీనియందు శ్రుశ్శబ్దముగుణము కలదు. వాత, రక్త, జీర్ణ, చర్మ, వేత్రరోగముల కన్నిటికి బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు :—3 రులములవరకు.

వెదురు (Bambusa Arundinacea)

శ్లో॥ వంశావేదుః కీచకస్సౌత్కరాస్త్యచి సారకః,
మన్మరశ్శతపర్యాచ కంటాలుః కంటకీతథా.

ఇదిపొడ. పొడవుగా పెరుగును. వెదురు కర్రలను ఇండ్ల వపయోగించుదురు. ఆకులు సన్నముగా పొడవుగా నుండును. పూవులు తెల్లగనుండును. వెదుళ్ల మధ్య నుండి బియ్యముపంటి యొక పదార్థము ఒక్కొక్కప్పుడు వచ్చును. వెదురు చేదుగ పులుపుగ వగరుగ నుండును. ఆకులో కొతకొయు స్వభావముగలదు. అకురసము కారముగ చేదుగ నుండును. కసిమిరి, మొగబంతి, తెలియని రోగములు, నల్లకత్తు మున్నగు వ్యాధులకు బాగుగా పనిచేయును. లేతయావలలో కొద్దిగా మిరియాలు ఉప్పుచేర్చి తినిపించిన పశువులకు కలుగు విరేచనముల కట్టించును.

మోతాదు :—ఆకులు 8 రులములవరకు.

ఇంటివాడు గొడ్డు గేదె అంటే, పొరుగువాడు పొడిగడెఅన్నట్లు.

వెట్టిపుచ్చ (Citrullus Colocynthus)

ఇది యొక తీగ. పుచ్చతీగ వలెనుండును. దీనికాయలు దబ్బకాయలంత యుండును. తీగ అంతయు అమితమైన చేదుగలిగి యుండును. కాయలలోని గింజలు నలుపుగ గుమ్మడి గింజలవలెనుండును. కాయలు గుండ్రముగ నుండును. ఆకులపై తెలుపుజీరలుండును. ఆకురసము చేదుగనుండును. చర్మరోగములు నశించును. కాయలను వాతరోగములకు వాడుదురు.

వాకుడు (Solanum Vacquini)

దీనినే చిన్నములక యందురు. నేలమీద ప్రాకును. ముండుండును. ముండు వసుపువచ్చ వన్నెగలిగి తెలుపుగనుండును. నేలములక కాయలవలనే కాయలు కాచును. ఊదా తెలుపురంగుల పూవులుపూచును. తెలుపుపూవులది మంచిది. దీని ఆకులు వంగఆకులవలె నుండును, గాని వాటికన్న చిన్నవి. కాయలు చిన్నవిగ గుండ్రముగ నుండును. పండినపుడు పసుపువచ్చగ నుండును. ఆకుపసరు వెగటుగ కారముగ నుండును. కాకజేయును. కొమ్ముద్వీల్లు నాసికారోగములు శిరోరోగములకు ఈపసరు పనిచేయును. కొందరు వైద్యులు పశువునకు కలుగుపుండులో పురుగులుపడినయెడల ఈచెట్లలో ఒక దానిని తీసివేయుదురు.

నీతాఫలము (Anona Squamosa)

ఇది సాధారణమైనచెట్టు. దీనిఆకులు కొలగా బలమైన పసరువన్నె గలిగి మృదువుగానుండును. దీనిలోని గింజలు నలుపురంగుగ నుండును. పండ్లు ప్రైభాగము బుడుపులు కలిగియుండును. గుజ్జా తెలుపుగ మధురముగనుండును. ఆకును తేళ్ళుగల రంధ్రములలో పెట్టిన తేళ్ళు బైటికి వచ్చును. అపిరసము పురుగులు పడిన పుండ్లలో వేసిన పురుగులు తచ్చును.

కొంతి (Zingiber Officinale)

కొంతి మంతి విశ్వోషధం విశ్వం కటుభద్రం కటాత్కటం,
మహాషధం శృంగిబేరం నాగరం విశ్వభేషజం.

అల్లమును నున్నపురిళ్ళలో ఉడికి బెట్టి ఎండించిన కొంతియగును. అన్నియుండు కన్న యోగ్యమైనదిగాన మహాషధమనియు విశ్వభేషజమనియు నందురు. కారము గలది కనుక క్షత్రుగంధియనియు, కఫమును హరించునదిగాన కఫాదిక యనియు, శరీరము నార్చునది గాన శోషణమనియు, దీనికిపేరు గలిగెను. కొంతి వేడిజేయును, కారముగ నుండును. వాతజీరణోగములకు ఆమోఘముగా పనిచేయును.

హితాధ్యుః—4 కులములవరకు

సోపు (Pimpinella Anisum)

జీలకర్రవలెనుండునుగాని అంతకన్న పెద్దది; వడ్లగింజలో నాల్గవంతు ముందును. నువాసనగానుండును. సమలిన తీసిగానుండును. జీర్ణక కిని కలుగజేయును. రక్తవార జీర్ణరోగముల కన్నిటికి యిది బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—4 $\frac{1}{2}$ తులములవరకు.

హంసపాది (Vitis Pedata)

పాలములలో భూమునంటుకొని ప్రాకు ఒకజాతి మొక్క. ఆకులు పక్షియొక్క ఆడుగువలె గొంగులుగలిగి చిన్నదిగ నుండుటచే దీనికి హంసపాది యని పేరువచ్చివది. మాతులు చెరువులు మొదలగు ప్రాంతములందు ఎక్కవగా మొలచును. ఆకుపసరు చేదుగ స్వాదుగ నుండును. చర్మవ్యాధులకు పనిచేయును. సాలెపురుగుల విషములకు కూడ పసరును వాడవచ్చును.



ఆంగ్లేయపశువైద్యవస్తుగుణదీపిక

ఎ ని మి ద వ భా గ ము

ప్రస్తుతకాల పరిస్థితులనుబట్టి ప్రతిరైతు ఇంగ్లీషుమందులను గూర్చి తెలిసికొనుటకు ఆసక్తి పడుచున్నాడు. పశువులకుకూడ ఇంగ్లీషుమందు లున్నవాయని ఆశ్చర్యపడే వారున్నారు. అందుచేత రైతులు, గ్రామములలో పశువైద్యముతోయు నాటువైద్యులు కూడ తప్పక ఈ వస్తుగుణ దీపికలోని సారాంశముల గ్రహించుదురుగాక. మీకు తెలిసి నంతవరకే ఇంగ్లీషుమందులు వాడవలెనుగాని తెలియకపోయినచో, వాకుట మహాదోషము. మీరింతా ఇంగ్లీషుమందులను పశువులపై వాడమని నా యుద్దేశ్యముకాదు. ఆయుర్వేద పశువైద్య మూలకము ఇంగ్లీషువైద్య మందులకు వ్యత్యాస మెంతయున్నదో గ్రహించ గలందులకు ఈ గ్రంథములో తెలుపవలసి వచ్చినది. ఇంగ్లీషు వెటరినరీ వారు చేసే వైద్యము, వారి బెటుగుట్టులుకూడ గ్రహించుట మంచిదని నా యభిప్రాయము. ప్రతి రైతుకూడ ఈరెండు వైద్యములగుట్టు గ్రహించి ఏది చివుకగా నుండిన దానినే ఆచరణలో పెట్టుదురుగాక.

అమోనియంక్లోరైడ్ (Ammonium Chloride)

ఇది తెలుపు రంగుగ నుండి వెగటుగానుండును. సారాయిలోను వేడినీటిలోను కరగును. ఇది కాలేము సంబంధముగు రోగములకు, రొంప, ఆజీర్తి, కామెర్లు, లివర్ రైట్, మున్నగు రోగములలో వాడుదురు. సాధారణముగా దీనిని నేలవేసుతోను, నూకేశారముతోను కలిపి వాడుదురు. పైకి చలగానుండు లోషముగా పొటూష్ నైట్రిక్ తోగాని, సోడియంక్లోరైడ్ తోగాని కలిపి వాడుదురు.

మోతాదు:—పశువులకు $\frac{1}{2}$ బొన్నునుండి $1\frac{1}{2}$ బొన్నువరకు మాత్రమే.

అమోనియంకార్బనేట్ (Ammonium Carbonate)

ఇది ముక్కలుగానుండి ఘాటుగా తెలుపురంగుగా నుండును. విశేషము గావించును. పొట్టలోని గాలిని తీసివేయును. ఇంకను విశ్మయములకు, కీటకముల కాటకు, దగ్గునకు, రొంపకు, కడుపునొప్పికి, నెరురుపొట్ట ఆజీర్ణ ఆహారముతో దట్టమై యున్న పుడు పెద్దపేగులో మలము చిక్కుకొని పోయినపుడు దీనిని వాడవచ్చును.

మోతాదు:— $\frac{1}{2}$ బొన్నునుంచి 1 బొన్నువరకు.

అయోడిన్ (Iodine)

ఇది నలుపురంగుగ 8 శతశత మెరయుచు పొరలుపొరలుగా నుండును. ఇది విష పదార్థము. క్రుశ్మిపండ్ల జేయును. తత్వమును బాగుచేయును. దీరవాతములకు, అతి మూత్రమునకు, నావులకు, బెనుకులకు, చర్మవ్యాధులకు పనిచేయును. లోనికి ఈయ వలసి వచ్చినపుడు జాగ్రత్తగా తదితరమందులతో కలిపి ఈయవలెను. వ్యానులైన్తో గాని క్రొవ్యుతోగాని దీనిని కలిపి నావులకు బెనుకులకు వాడవచ్చును.

మోతాదు :—30 నుంచి 60 గ్రెయినుల వరకు.

అయిడోఫారం (Iodoform)

ఇది పసుపుపచ్చగ స్ఫటికమువలె మెరయుచుండును. దీనిలో బలముగ క్రిమి సంహారక శక్తిగలదు. గాయములకు చీముపట్టిన పుండ్లకు, కాలిన బొబ్బలకు చర్మ వ్యాధులకు బాగుగా పనిచేయును. ఆకుభాగముల బోరిపిఆసిడ్తో ఒకభాగము అయిడోఫారం కలిపి వాడిన పుండ్లకు గాయములకు బాగుగా పనిచేయును. వ్యాను లైన్లో ఈపొడిని కలిపి క్రుశ్మిపండ్ల జేయుటకు మరికొకగాయములకు పట్టించవచ్చును.

మోతాదు :—1 నుంచి 10 గ్రెయినుల వరకు.

ఆర్సెనియస్ ఆసిడ్ (Arsenious Acid)

దీనినే శిల్లిపాషాణ మందురు. ఇది మిగుల విషవస్తువు. తత్వమును బాగు చేయు టకు బలవర్ధకావధములలో కలిపి వాడుటకు ఉపయోగపడును. చర్మముపై రాసిన పొక్కును. చర్మరోగములకు కూడ వాడవచ్చును. కొని జాగ్రత్తగా వాడవలెను.

మోతాదు :—2 నుంచి 8 గ్రెయినుల వరకు.

ఆసిడ్ బోరిక్ (Boric Acid)

దీనినే బోరిక్ ఆమ్లమందురు. దీనిలో వెలిగారము కలియును. స్వచ్ఛమగు తెలుపురంగుగా నుండును. మంటలేని మందు. ప్రతిదాక్తరు దీని నెక్కువగా వాడును. ఈపొడి నూళ్ళుచీవులను వెంటనే చంపలేదుగాని వాటివృద్ధిని మాత్రము నావును. దీనిని లోపలికిచ్చిన మాత్రవ్యాధులు తగ్గును. ఇంకను చర్మవ్యాధులకు నోటిపుండ్లకు బాగుగా పనిచేయును. తగినంత వ్యానులైన్తోగాని క్రొవ్యుతోగాని వెన్నలోగాని మెలతుత్తము $\frac{1}{8}$ భాగము గంధకము అంభాగము బోరిక్ ఆసిడ్ రెండుభాగములు కలిపి అర్రువాళు లకు బెనుకులకు తదితరనావులకు అప్పుడెప్పుడు రాసి మర్చనచేసిన తగ్గును. ఈ పొడిలో చీముపట్టపండ్లనుండు గుణముకలదు. ఒక బొన్ను డిస్టిల్లవారులో 30 గ్రెయినుల బోరిక్ ఆసిడ్ను కలిపి కంటి ఎరువులకు, కండ్ల పునులకు వాడవచ్చును. గొంతులో

త్రుండు తేర్చుడినపుడు గ్లిసెరైన్లలో ఈపాడిని కలిపి రాయవచ్చును. ఈ ఆసిడ్ ను లోపలికిచ్చిన 12 గంటలలోపలనే అందు సగభాగము మూత్రముద్వారా పదిపోవును.

కాల్షియం క్లోరైడ్ (Calcium Chloride)

ఇది నున్ననుంచి తయారగును. గాలితగిలిన ద్రవరూపముగా నగును. తెలుపు రంగుగల గడ్డలుగానుండును. దీనిని చర్మవ్యాధులకు రసికారు వుండకు వాడుదురు. మావిని ప్రోసివేసి వెటరినరీ డాక్టరు ఈ గుండును తదితర మందులతో కలిపి ఇంజెక్షను యిచ్చుదురు. ఇంకను గాలికుంటుమీద వచ్చు కసిమిరికికూడ పనిచేయును.

మోతాదు:—1 నుంచి 2½ డ్రాములు.

క్రిసాల్ (Cresol)

ఇది కొంచెము నలుపుగంగుగా వాసనగా నుండును. పశువు మందమరిగ నున్న పుడు, పారుడెక్కువగా నున్నపుడు గంజిలో కలిపి పెట్టిన తగ్గును. శస్త్రసంబంధముగా లోషనుగా వాడవచ్చును.

మోతాదు:—½ నుంచి 2 డ్రా.

జెంటియన్ (Gentiana)

ఇది ఒకచెట్టుచేళ్ళతో తయారగుపాడి. చేరు, రుచి, గలిగి బలవర్ధకావధముగా పనిచేయును. ఇంగ్లీషు వైద్యములో ఈపాడిని ఎక్కువగా వాడుదురు. కార్లముపై చురుకుదనము వుట్టించును.

మోతాదు:—2 నుంచి 6 డ్రాములు.

జింకు క్లోరైడ్ (Zinc Chloride)


ఈ లవణము తెలుపుగానుండును. రక్తనాళములను ముడుచుకొనునట్లు చేయును. దుర్గంధగాయుములను, కిన్ను శస్త్రముచేసిన తరువాతను, మాదలకు, డెక్కిగాయములకు లోషణగాచేసి వాడిన బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—1 నుంచి 2½ గ్రెయినులవరకు


జింకు సల్ఫస్ (Zinc Sulphas)

దీనినికూడ బలవర్ధకావధములలోను, అతిసారమునకు, కంటివాపులకు, అనికి, దుర్గంధ వుండకు వాడవచ్చును.

మోతాదు:—2 నుంచి 3 డ్రాములు.



సాంప్రదాయముగల ఇంగ్లీషుజాతి గోవులు



గోసంరక్షణ సంఘము. తెనాలి



శ్రీ వే. కె. వెం. సత్యనారాయణరాజుగారి పాడిగడ్డ. పాండువ్వ (ప. గో.)



శ్రీ నిమ్మగడ్డ వెంకటసుబ్బయ్యగారి ఎద్దు—పెదగొట్టిపాడు (గుం. జి.)



శ్రీ కొండపల్లి సోమయ్యగారి నాగశుక్ర — వేటపాలెం (తూ. గో.)

టర్పెంటైన్ (Oil of Turpentine)

దీనిని కర్పూరమునుండి తయారు చేయుదురు. ఇది స్వచ్ఛముగ నిర్బలముగ నుండి చురుకుదనము కలిగించును. నొప్పిని వాయువును పోగొట్టును. ప్రశ్నకుండ జేయును. ప్రైభాగమందువాడిన మంటగానుండును. న్యూమోరియా కశీమిరి, యెగబంతి, వీనస మున్నగు రోగములలో దీనిని అవిరిరూపముగాచేసి వాడిన తగ్గును. చర్మముపైనుండు పురుగులను బోపలనుండు ఎలికపాములను చంపును. అన్నిరకముల బెంటులకు నొప్పులకు పనిచేయును.

మోతాదు:—1 నుంచి 1½ ట్రాన్సులవరకు.

టానికు ఆసిడ్ (Tannic Acid)

ఈ చార్బము కొంచెము బూడిదరంగుగానుండును. మాచికొమునుంచి తయారుగును. ఒగరుగల వాసనగానుండును. గాలిక్ ఆసిడ్, టానిక్ ఆసిడ్ ఒకే పదార్థము నుండి తయారుచేయుటనుగాని గాలిక్ ఆసిడ్ను బోపలికి ఇచ్చుదురు. టానిక్ ఆసిడ్ను వాపులనొందిన భాగముల పువ్వుయొగించుదురు. గొంతుకలలోను, పంటిదిగుళ్లయందును, వాపులనొందిన భాగములపై గిలపై నుండి తగిలించి కలిపిరాసివ తగ్గును.

మోతాదు:— 20 నుంచి 60 గ్రాములు.

ఆంటిమోనియం టార్టారం (Antimonium Tartaram)

ఈ పొడి తెలుపుగానుండును. దీనిని పెద్ద పెద్ద మోతాదులిచ్చిన విషముగా పరిగించును. ముక్కువీసము, యీమందును రక్తములోనికి చూడునాలుగు ఇంచెక్ష్ను యిచ్చిన తగ్గును. కాని జాగ్రత్తగా అనుభవముగల వైద్యునిచే యిప్పించవలెను. ఇంకను జ్వరములను, జలుబులను, వాపులను, చర్మముపైని కిలుగు మంటలను పనిచేయును.

మోతాదు:— 1 నుంచి 6 గ్రాములు.

ఎక్స్ట్రాక్టుమ్ బెల్లాడొనా (Atractum Belladonnae)

ఒక చెట్టుయొక్క లేత ఆకులనుండి లేత కొమ్మలనుండి వచ్చుననుతో తయారుగును. నలుపురంగుగా మెత్తగా వెగటు వాసనగానుండును. విషజ్వరము, గురిక వత్తుకవాపు, జలుబు, నెరముల సంబంధముగు రోగములను యిచ్చిన బాధను తగ్గించును.

మోతాదు:— 1 నుంచి 2 గ్రాములు.

ఎడ్డేమి యెరుగురా అటువలచవి; గాడ్డేమి యెరుగురా గంధపుపొడి వాసన.

ఎక్స్ట్రాక్టుమ్ కన్నబిస్ ఇండికా (Extractum Cainnabis Indicae)

గంజాయి పొడి తయారగును. కురుకుదనము కలిగింతును. నొప్పినితగింది మత్తును కలుగజేయును. ధనుర్వాతము, శరములబలహీనత, వాతము, కడుపునొప్పి మున్నగు వాటికి పనిచేయును.

మోతాదు:— 2 నుంచి 4 గ్రా.

క్లోరల్ హైడ్రేస్ (Chloral Hydras)

ఇది నిర్వర్ణముగా స్ఫటికములుగ నుండును. దీనిలోకూడా మత్తును కలుగజేయు గుణముకలదు. నల్లనుండువలెనే పనిచేయును. నీటిలోగాని నావలోగాని కలియును. కడుపుబ్బనకు, కడుపునొప్పికి పశువులోపల విండముచెడినపుడు తీసివేసిన తరువాత దీనిని గంజితోకలిపి ఈయవచ్చును. ఇంకను వాతలు వేయునపుడు శస్త్రము చేయుటకు ముందు మత్తునుండుగా వాడవచ్చును.

మోతాదు:— $\frac{1}{2}$ నుంచి 1 $\frac{1}{2}$ టేబుల్స్పలవరకు.

క్రియోసోట్ (Creosote)

ఇది కొంచెముబూడిదరంగునండి ఒకవిధముగా వాసన కలిగియుండును. పైప రాసి పొక్కుగుణము కలదు. దుర్వాసనను పోగొట్టును. ప్రల్లభుండజేయును. చీడ పాగు తగిలినపుడు వెటరినరీ డాక్టరు దీనిని నావలో కలిపి యిచ్చుదును. వ్యానులైనులో కలిపి చర్మకోగములకు వాడిన పనిచేయును.

మోతాదు:— 1 నుంచి 1 $\frac{1}{2}$ గ్రాము.

కార్బాలిక్ ఆసిడ్ (Carbolic Acid)

ఇది స్వచ్ఛముగ గడ్డలుగ నుండి కలిగిన తరువాత బూడిదరంగుగా నుండును. ఇది విషవస్తువు. ఎగురుగ సోకుడు పరిహారముగ నుండును. దీనిలో ప్రల్లభుండనుండు శక్తి కలదు. చర్మమునకు తగిలిన పొక్కును. బండబారును. చర్మకోగములకు గాయములకు ఒకపాలు కార్బాలిక్ ఆసిడ్, నూనె 15 భాగములు కలిపివాడిన పనిచేయును. ఇంతియే గాక దొమ్మ, గురక, జెబ్బవాపులకు ఒకగ్రాము తీసికొని నేరు గంజితోగాని నావలోగాని ఆరంభములో యిచ్చిన తగ్గును. తగినంత వ్యానులైనులో ఈ ముగ్గును కలిపి చర్మ కోగములకు వాడిన పనిచేయును.

మోతాదు:— $\frac{1}{2}$ గ్రామునుంచి 1 గ్రామువరకు.

లెడ్ అసిటేట్ (Led Acetate)

ఇది తెలుపుగానుండిరక్తస్రావము నందును. దీనిని లోషనుగాచేసి గారపట్టుటకు, చలదనమునకు, నలుగుడు గాయములకు, వాపులకు, బెబుబులకు, కొమ్ములు విరిగినపుడు మంటను, తగ్గించుటకు వాడవచ్చును. ఈ లోషనునే వైట్ లోషన్ అందురు. దీనిలో $\frac{1}{2}$ పంతు జింకుసల్ఫేటు ఒక భాగము లెడ్ అసిటేట్ ను కలిపిన తయారగును.

మోతాదు:— $\frac{1}{2}$ నుంచి 2 డ్రాములవరకు

లిక్వర్ అమ్మోనియా ఫార్టస్ (Liquor Ammoniae Fortus)

ఇది స్వచ్ఛముగా ద్రవరూపముగానుండును. వాసనచూచిన ప్రమాదము కలుగును. కర్పూర తైలముతో దీనిని కొదిగాకలిపి బెబుబులకు వాపులకువాడిన పనిచేయును. దీర కడుపుబ్బులకు తదితర మందులతోకలిపి యిచ్చిన తగును.

మోతాదు:—1 నుంచి 3 డ్రాములు.

లిక్వర్ ఆర్సెనికాలెస్ (Liquor Arsenicalis)

ఈ ఆశువు కసిమిరి, వగర్లు మున్నగు క్వాసరోగములకు వాడవచ్చును.

మోతాదు:— $\frac{1}{2}$ నుంచి 1 టేస్పూనరకు.

సోడా బై కార్బనేట్ (Soda Bicarbonate)

దీనినే సోడాఉప్పు అందురు. తెలుపుగా చిరిచేయగనుండును. కడుపునొప్పి కడు పుబ్బుసూలలు మున్నగు జీర్ణనాళరోగములలో బాగుగాపనిచేయును. బలవర్ధకాషధములలో కలుపవచ్చును. కాలిన స్థలములందు ఈపొడిని అద్దిన బాగుగా పనిచేయును. వివిధ పురుగులకాటకు ఈపొడిని పట్టించిన పనిచేయును.

మోతాదు:—1 నుంచి 3 టేస్పూనరకు.

సోడా సాలిసైలెస్ (Soda Salicylas)

పొడి తెలుపుగా మెత్తగానుండును. ఇది వాతరోగములకు కీళ్లనొప్పులకు జ్వరములకు పనిచేయును. వెటరినరీవారు ఈ మందునే వాతనొప్పులకు బెబుబునొప్పులకు చర్మముక్రిందకు ఇంజెక్షన్ యిచ్చుదురు.

మోతాదు:— $\frac{1}{2}$ నుంచి 1 టేస్పూనరకు.

ముఖ్యముగా నాలుక యెట్లాతిప్పినా తిరుగుతుంది.

సోడా సల్ఫస్ (Soda Sulphas)

ఇది తెలుపుగ పెరియుచుండును. పేగులయందలి గ్రంథులకు చురుకుదనము బుట్టించి విరేచనము గావించును. విరేచనమగుటకు, తత్వమును బాగుపరచుటకు వాడ కచ్చును.

మోతాదు:— $\frac{1}{2}$ నుంచి 1 పానువరకు.

స్పిరిట్ ఈథర్ నైట్రస్ (Spirit Ether Nitrous)

ఇది ఘోటుగానుండును. పొక్కును. ఇది జ్వరములకు, మ్రగ్గిమండజేయుటకు, మాత్రము జారీయగుటకు, వాయువును హరింపజేయుటకు, చురుకు దనము కలిగించుటకు కిలామేహ వాతమునకు ఈ మందును ఓటిలో కలిపి వాడవలెను.

మోతాదు:— $\frac{1}{2}$ నుంచి 1 ఔన్సు.

స్పిరిట్స్ అమ్మోనియా ఆరోమాటికస్

(Spirits Ammoniae Aromaticus)

ఇది శరీరములోని పులుపును తగ్గించి జీర్ణశక్తి కలుగజేయును. ఆకలిని పుట్టి చును. కడుపునొప్పి కడుపుబ్బరము మున్నగు వాటికి బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:— 1 నుంచి 2 ఔన్సులు.

సిల్వర్ నైట్రేట్ (Silver Nitrate)

ఇది తెలుపుగ గడ్డలుగ నుండును. దీనిని లోషుచుగాజేసి ప్రణాళులకు కంటి తెలుపులకు కంటి పొరలకు వాడవచ్చును. కొయ్యగండలు పెరిగినపుడు ఈ మందును రుద్దిన తగును.

మోతాదు:— 1 నుంచి 3 గ్రెయిసులవరకు.

సల్ఫర్ సబ్లిమటం (Sulphur Sublimatam)

దీనినే గంధకమందురు. ఇది తత్వమును చక్కపరచును. విరేచనము గావించును, క్రిమిని హరించును. చర్మరోగములలో పైకి లోపలికి వాడవచ్చును.

మోతాదు:— $\frac{1}{2}$ నుంచి 2 ఔన్సులు.

హైడ్రాజరీ అయోడైడ్ రుబ్రం (Hydrargyri Iodide Ruibrum)

ఈ పొడి ఎరుపుగా నుండును. ప్రతి డాక్టర్ వాడును. 4 భాగముల వ్యాసు లైనులో 1 భాగము మందునుకలిపి గుటిగడ్డలకు, పంపరకు, అర్రవాపులకు, గట్టి కంతు

వీరుస్తూ యెరువాకసాగిస్తే; కాడిమెతులు దొంగలు యెత్తుకొని పోయినారట.

లకు వాడిన పొక్కి పనిచేయును. ఒకేపర్యాయము రాసి విన్న పైన రాయవలెను.

మోతాదు:— 1 నుంచి 6 గ్రాములు.

ఫెనైల్ (Phenol)

నలుపుగా వాసగానుండును. పురుగులుపడిన పుండ్లలో దీనిని దూదితోముంచి పెట్టిన పురుగులుచచ్చును. పుండ్లకుపట్టించిన పుండుపెడనగును. దుర్వాసనగానుండు నపుడు దీనిని లోషనుగా చేసివాడవచ్చును.

టింక్చరు అయోడిన్ (Tincture Iodine)

ఇది ఎరుపురంగు నుండును. దీనిలో మిక్కిలి తీవ్రమగు శక్తిగలదు. నిమిషముగా శూక్ష్ణజీవులను చంపును. ఇది పుండునకు తగిలిన మంటగలుగును. ఈమందు ప్రతి ఆంగ్లేయ పశువైద్యశాలలోను యుండును. గాయములు తగిలినవెంటనే వాడరాదు. అట్లువాడిన చాలా మంటగానుండును. మందగుదికి దీనినే వాళమునకు యంతక ను యిచ్చుదురు. అయోడిన్ పావుఅవున్సు, పొటాషియంఅయోడైడ్ ఔన్సు, స్పిరిట్ 20 ఔన్సులు కలిపిన టింక్చర్ అయోడిన్ అగును.

మోతాదు:—1 నుంచి 3 గ్రాములు.

టింక్చర్ జింజిబ్రస్ (Tincture Zingiberis)

ఇది సొంటితో తయారగును. మన దేశములో పండిన ఓషధులను విశేషములను పసికొనివెలి పరిశోధించి వివిధకముల టింక్చర్సును తయారుచేసి వచ్చుచున్నారు. దీనిని నీటిలో కలిపిన పాలవలెనగును. దీనిని వాతజ్వర్రోగములలో వాడిన పొగుగా పని చేయును.

మోతాదు:—2 నుంచి 4 ఔన్సులవరకు.

టింక్చర్ ఓపియం (Tincture Opium)

దీనినే నల్లమంద ద్రావకమందురు. ఇది నలుపు ఎరుపు బూడిదవర్ణములు గలిగిన ద్రవపదార్థముగా నుండును. మత్తును కలుగజేయును. నిద్రను పట్టించును. కొన్ని రోగములకును, విశేషములు, రక్తి వికేచనములకు పొగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:— $\frac{1}{2}$ నుంచి 1 ఔన్సువరకు.

టింక్చర్ అసఫటేడా (Tincture Asafoetida)

దీనినే ఇంగుప ద్రావకమందురు. ఓటిలోకలిపిన పాలవలెనగును. పాకిపసుపులకు తవుడు విస్తారముగా పెట్టుటచేత బీగము కానప్పుడు ఒక ఔన్సు మందును వేరు ఓటిలో కలిపియిచ్చిన తగును.

మోతాదు:—1 నుంచి 2 ఔన్సులవరకు.

ఏనుగునెక్కినవాడు మక్కకూతను జడియడు.

టింక్చర్ కార్డిమం (Tincture Cardimom)

దీనిని ఏలమలతో తయారుచేయుదురు. ఈ ఆరణు ఆకలిని వృద్ధింపను. చిన్న చూడలు తెలుపుగా పారునపుడు దీనిని ఇంగువతో కలిపి యిచ్చిన పనిచేయును.

మోతాదు:—1 నుంచి 4 ఔన్సులవరకు.

టింక్చర్ చైరేటా (Tincture Chiretta)

దీనిని నేలవేమలతో తయారుచేయుదురు. చేరుగనుండును. బలవర్ధకావధముల లోను, జ్వరములకు వాడవచ్చును.

మోతాదు:—1 నుంచి 2 ఔన్సులవరకు.

టింక్చర్ జెంటిన్ (Tincture Gentian)

దీనిని బలవర్ధకావధములలోను, వాత జ్వరరోగములలోను వాడుదురు.

మోతాదు:—1 నుంచి 2 ఔన్సులు.

టింక్చర్ నక్సువామికా (Tincture Nux Vomica)

విషమష్టి గిరిజలతో తయారుగును. బలవర్ధకావధములలోను పక్షవాతము అజీర్ణములబడకము మున్నగు వాటికి వాడవచ్చును.

మోతాదు:—1 నుంచి 2 ఔన్సులవరకు.

పొటాషియం పర్మాంగనేట్ (Potassium permanganate)

ఇది ఉదారంగుగ పలుపలుగ నుండును. దీనికి అధికముగ క్రిమిచంహరకశక్తి గలదు. అందుచేతనే పశువులకు కలుగు గురక, దొమ్మ, పెద్దరోగము మున్నగు అంటు రోగములలో నీటిలో కలిపి లోపలికి యిచ్చుదురు. ఈ పొడిని నీటిలో కలిపినపుడు చంద్రకాంతివంటి ఎరుపురంగుల ద్రవమేర్పడును. ఈ ద్రావకము ద్రుణ్ణముండు పదార్థములతో చేరినపుడు ప్రాణవాయువు వెలువడి అది ఆ పదార్థముతో కూడి వానిని శుద్ధి చేయును. నూరు భాగముల నీటిలో ఒక భాగము పొడిని కలిపి శస్త్రచికిత్స చేసినపుడు తదితర వుండ్రును కడుగుటకు లోషముగా నుపయోగపడును. శస్త్ర పరిముట్టు ఈ లోషములో చేసిన నెల్లబడును.

మోతాదు:—2 నుంచి 4 గ్రాములవరకు.

ఏలేవానియెద్దు పోలేనేమి; కా చెవానికన్ను పోలేనేమి.

పొటాష్ క్లోరస్ (Potash Chloras)

ఇది నిర్దోషముగ పలుకులుగనుండును. పటికవలెనే యిదియును పరిచేయును. నీటిలో చక్కగా కలియును. నోటినుంచి దీని కారువపుడు, దీని సడిశమువడు, అది కలిగించిన తరువాత బాధగానున్నపుడు, నోరు పూచివపుడు, వాల్చుగ వాచివపుడు ఈ మందును లోపలికి బైటప వాడవచ్చును. రెండువేళల బెల్లముతోగాని లేనతోగాని కలిపి ఈయవలెను.

మోతాదు:— $\frac{1}{2}$ నుంచి 1 ఔన్సువరకు.

పొటాష్ బై కార్బనేట్ (Potash Bicarbonate)

ఇది తెలుపుగానుండును. నీటిలో కలియును. ఔషధముల కన్నిటికి యుండునది గుణములు ఈ లవణమునం దొక్కదానికి గలదు. ఇది వాతములకు, తత్వమును బాగు చేయుటకు వాపులకు శ్రుణ్ణిశ స్థలములకు పరిచేయును.

మోతాదు:— $\frac{1}{2}$ నుంచి 1 ఔన్సువరకు.

పొటాష్ నైట్రేట్ (Potash Nitras)

నూకకారమునుంచి తయారగును. తెలుపుగానుండి మెరయుచుండును. నుంచి చురుకుగల పదార్థము. దుదికి కారముగ చిరుచేడుగ నుండును. తత్వమును బాగుపరచును. జ్వరమును తగ్గించును. గంజిలోగాని బావలోగాని ఈపాడినికలిపి దాహముగా నీయ వచ్చును. మూత్రరోగములలో బాగుగా పరిచేయును. నేసవికౌలములో వేడిచేసినపుడు, శిశుమేహ వాతమునకు, శేరుమాదకు, మేయిగినపుడు, చూడిపకుపులమీదకు ఆదోతు ఎక్కుగా మానము వాచివపుడు నూకకౌలము పరిచేయును.

మోతాదు:—4 నుంచి 10 గ్రాములవరకు.

ఫార్మలిన్ (Formalin)

ఇది ద్రావకముగానుండును. విషవస్తువు. తెల్లపుటిలో కొన్ని చుక్కలు కలిపి కడుపునోప్పి, కడుపుబ్బలుకు ఈయవచ్చును. కొమ్ములు విరిగినపుడు లోషనుగా చెసి కలుకటిక మానును.

మోతాదు:—1 నుంచి 2 గ్రాములవరకు.

మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ (Magnesium Sulphate)

ఇది తెలుపుగ నుండును. విశేషముగా విరిచును. తత్వమును బాగు చేయును. దీనిని లోషనుగాజేసి కీళ్లవాపులకు బెలుకులకు వాడవచ్చును. కడుపులోపల గాని శేరి నతో సాంటిపాడితో వేడిచిరు కలిపి ఈయవలెను.

మోతాదు:— $\frac{1}{2}$ నుంచి 1 ఔన్సువరకు.

ఔషధావధానము అవసరమగుచున్నట్లు; రోగము పైపెట్టు.

శారీరశాస్త్రము

తొ వ్వి ద వ బా గ ము

పశు దేహ నిర్మాణము


(Parts of the animal body)

పశు శరీరమునందలి వివిధభాగములను వివరముగా వర్ణించి, వానిస్వభావ ప్రయోజనముల దెలుపుటయే శారీరశాస్త్రముయొక్క పరమోద్దేశము. శరీరమంతటినీ, అందలి భాగములను ఆలోచ్యవంతములుగా నుంచి జీవికి జీవిత సౌఖ్యమును గూర్చుటయే స్వస్థ పృత్తిముయొక్క పరమగమ్యము. కాబట్టి శారీరస్వస్థవృత్తముల కవివాభావసంబంధము కలదు. శరీరభాగముల ఆకారస్వరూపములను నూత్నముగా వివరించునది ఆనాటమి (Anatomy) వాటి యుపయోగ ప్రయోజనములను, వాటి క్రియావిధానములను వర్ణించునది శారీరశాస్త్రము (Physiology). ఈ రెంటి నిజపరిస్థితుల నెరింగి ఆలోచ్య సంధానముజేయు మార్గముల నెరిగించునది ఆలోచ్యశాస్త్రము లేక స్వస్థవృత్తిము. శరీర నిర్మాణమునకై అసి, ఉపాసి, కండరము, నాడి, క్రొవ్వు, బంధకము, రక్తము విస్తరుపబడి యున్నవి. ఇవి శరీర మంతటను వ్యాపించి ఎచ్చటనున్నను ఏకకార్య నిర్వహణమే జేయుచుండును. ఇవిగాక శరీరమునందు అచ్చటచ్చట స్థిరములై విశేషకార్య నిమగ్నములగు భాగములుకూడ గలవు. ప్రతి రైతు ఈ చింతామణిలో తెలిసిన ప్రాథమిక పశుశరీర శాస్త్రములోని ముఖ్యాంశములను గ్రహించి నోరులేని పశువులకు పరోపకారము చేయుదురుగాక.

చతుష్పాద జంతువుయొక్క అస్థిపంజరములోని వివిధభాగములు పైపటమునందు చూడుదు. అస్థిపంజరము రెండుభాగములుగా విభజింపవచ్చును. ప్రక్క ఎముకలు వెన్నెముకతో కూడుకొని యుండును. వెన్నెముక చిన్నచిన్న ఎముకలతో కూర్చబడి యుండు భాగమునకు పూస ఎముక యని పేరు. దానియొక్క చివరభాగముతో తలను, రెండవ చివరభాగముతో తోకను నిలబెట్టుచున్నది. ఈ వెన్నెముక నంతటినీ చిన్నచిన్న భాగములుగా విభజించవచ్చును. వీనినిబట్టియే మెడ, రొమ్ము, పొట్ట, మున్నగు అవయవములు కూర్చబడి యున్నవి. పశుశరీరములో ఎముకలు ఒకటొకటిగా కట్టరేజ్ తో బిగించబడి యుండుటకు అస్థిపంజరమని పేరు.

అస్థిపంజరము శరీరములోని మృదువగు కండరములను చుట్టములవలె కాపాడును. అది పెద్ద పెద్ద ఎముకలను కలిగియుండును. కాని అది కొన్ని భాగములలో గట్టిగా

వంచెడుగిండలకు కూలికపోలే, తూమెడుగిండలు దూడతిన్నట్టు.



- 1, 2 లోపలి ముఖ్యజీర్ణావయవములు. 3. ప్రేవులు.
 4, 5 సప్తపథ, ఉమ్మినిటి గ్రంధులు వగైరాలు. 6. దంతములు.
 7, 8, 9, 10 పొట్టలోని భాగములు.




శ్రీ వేదశ్ల పాకటసుబ్బయ్యగారి ముద్దలమూటగట్టు ఎక్షజర.
పల్లెకోన (గుంటూరు జిల్లా)



మా ఆంధ్ర జాతీయ పసుపైద్య కళాశాల విద్యార్థులు
శ వ స రీ క్ష చే యు ట.

నుండును. ఎముకలు అనేక ఆకారములుగా నుండును. పైన చూపించిన అస్తిపంజరము యొక్క భాగములను చూచిన ఎచ్చటెచ్చటెన్ని ఎముకలున్నవి విశదమగును. ఈ ఎము



1. ఎముకలగుడు 2. తలలోని భాగములు 3. దవ్రక భాగములు
4. వస్తికము 5. పైదవ్రకభాగము 6. పండ్లు
7. మోకాలు 8. కాళ్ళలోని భాగములు.

గొడ్డుకాచేవాణ్ని కొట్టనివాడున్ను, గొట్టెలకాచేవాణ్ని తిట్టనివాడున్ను లేడు.

కలు సంభిబంధనముచేత కాళ్ళను కలుపబడి మెత్తని కండరములపై ఒక చట్టమువలె కట్టబడియుండును. గర్భములోని పిండముయొక్క అస్థిపంజరము మెదటిలో వృద్ధిపొంది ఉపాసిని కలిగియుండును. ఉపాసిచివరకు ఎముకగా మారును. కాని కొన్నిచోట్ల ఉపాసి ఎముకగా మారుదు. ప్రక్క ఎముకలు హృదయవహరముండుండు అవయవములను, తల ఎముకలు మెదడును, వెన్నెముక వెన్నుపామును ఆపాయము కలుగఁకుండ కాపాడుచున్నవి. అన్ని ఎముకలు కలిసి శరీరమునకు ఆకారము నిచ్చుచున్నవి. గనుక శరీరమునకు ఆకారము దిట్టతనము నిచ్చుటయు, మెత్తని భాగములకు కండరములు ఆధార మగుటయు శరీరముండు మృదువగు అవయవములను కాపాడుటయు, శరీరమును కదల్చుటకు తోడ్పడుటయు అస్థిపంజరముయొక్క ముఖ్యోపయోగములై యున్నవి.

అస్థిపంజరమునందెన్ని యెముక లేయో సాసములం దున్నవో తెలిసికొనుట మంచిది. పశువు నడచునపుడు పనిచేయునపుడును ఉపయోగించు ఎముకలు గుల్లగాను పొడవుగాను నిబ్బరము గాను ఉండును. ఇవి కాళ్ళయందుండును. వీనికి గుల్ల ఎముక (Hollow bones) అని పేరు. ఇది తేలికగను బరువుగను ఉండును.

శరీరములోపల మెత్తని పదార్థములను కాపాడు ఎముకలు వెడల్పుగ చదునుగ నుండును. వీనికి బలపరుపు ఎముక (Flat bones) అనిపేరు. ఇవి కపాలముం దుండును.

బరువును మోయుటకు ఆధారముగా నుండునవి మందముగ కడ్డిగానుండును. ఇవి వెన్ను పూగలండుండును. వీనికి వంకగ ఎముక (Irregular bones) అనిపేరు.

ఎముకలలో జంతుపదార్థము లోహపదార్థము ఉండును. ఈ రెండును బాగుగా కలిసియున్నను ప్రయత్నించిన విడదీయవచ్చును. ఎముకను నిప్పులోవేసి బాగుగా కాల్చిన యెడల అందుండు జంతుద్రవ్యముపోయి లోహపదార్థము మిగిలి బూడిదవలె రాలిపోవును. మరియొక ఎముకను తీసికొని పాత్రలో నుంచి అందు ఘాతైన పుల్లని రసము (Vinegar) ను పోసి నాలుగు దినములుంచిన అందలి లోహపదార్థము కరగి పోయి జంతుపదార్థమాండును. అట్టిసితిలో ఎముక మెత్తనగును. దీనిని వంచి ముడిపూడ వేయవచ్చును. పశుశరీరము ఎదిగిన కొలదిని జంతు పదార్థము తగుడు ఎముకలు తేలిక యగును. కాబట్టి దెబ్బతిగిలినయెడల నవి సులభముగా విరిగిపోవును. దూడల ఎముకలలో లోహపదార్థము తక్కువగ నుండును. అందువలన అవిశ్వరగా విరుగవు.

ఎముకలన్నిటి యందును పై భాగమందు దంతమువలె తేలువుగను గట్టిగానుండు పొరయొకటి యుండును. దీనినే గట్టిపొర (Dense tissue) యందురు. దీనిలోపల స్పంజరవంటి మెత్తనిపొర (Spongy tissue) యుండును. ఇది ముఖ్యముగా ఎముకల చివరయుండును. గుల ఎముకలను (Flat bones) బ్రదలు కొట్టిన యెడల మధ్య భాగమున మూలుగ (Marrow) యను పదార్థముండును. దీనియందు రక్తనాళములు

క్రొవ్యుతో నిండినకణములు ఎక్కువగానుండును. ఈ మూలుగ పనువుపచ్చగా నుండి పైన చెప్పిన రెండు పొరల మధ్యనుండును. ఇది గుల్లెముకలలో కడ్డివలెనుండును. ఇది తినుటకు రుచిగా నుండును. బలపరువు ఎముకలయందును పంకర ఎముకలయందును గుల్లె ఎముకలయందువలె పైన గట్టిపొర దానిక్రింద మెత్తనిపొర యుండును గాని మూలుగ ప్రత్యేకించి యుండక అది మెత్తని స్పంజివంటి పొరలలో నుండు ఆరలలో నిమిడి యుండును. ఇది ఎరువురంగుగా నుండును. ఇది గుల్లెముకలలో మూలగంత బరువుగా నుండదు.

తలయందుండు ఎకములు (The head and its Bones)

తల వెన్నెముక మొదటి భాగమునకు రెండు గుబ్బులుగల అసితో నమర్చబడి యున్నది. ఈ అసికాండెస్ అను పేరుతో పిలువబడుచున్నది. ఈ అమర్చబడియున్న అసికంధరము (Atlas) ముందును రెండు గుడ్డములలో నమర్చబడియున్నది. దీనినే కంధరము లేక వెన్నెముకలోని మొదటిపూస యుదురు. ఈ కంధరము అమర్చబడి యున్న కీలు బంటిగిన్నె కీలుయందురు. ఇది యిటుండి ఆ ప్రజేశములోనున్న కండర ముల వలనను స్నాయువుల వలనను స్వేచ్ఛగా తలను కదలించు శక్తిగలిగి యున్నది.

పశువు కపాలమందుండు ఎముకలు.

లలాటాసి (Frontal bone)	— 2
సౌమంతాస్థులు (Parietal bones)	— 2
శిరఃపృష్ఠాసి (Occipetal bone)	— 1
కర్ణాస్థులు (Temporal bones)	— 2
జల్లెడఎముక (Ethmoid)	— 1
స్ఫీనాయిడ్ (Sphenoid)	— 1
పుట్టెమధ (Inter parietal)	— 1

స్ఫీనాయిడ్, జల్లెడఎముక కపాలముయొక్క ఆడుగుభాగమునందే యుండును. శిరఃపృష్ఠాసిమధ్య 1 లేక 2 అంగుళముల వెడల్పుగల గంధ్రముగలదు. దీనిగుండ మజ్జ బయలు దేరి వెన్నెముకగుండ వ్యాపించును. కపాలమొగిన్నె ఎముకలన్నియు ఒక దానితోనొకటి పెట్టె చెక్కలవలె అటుకబడియున్నవి. వీనిసంచలయందు రంపపు పండ్ల వంటి శోతలండి ఒకదానిలో నొకటి యిమిడియుండును.

కపాలమునగా మొదడు కలిగి యుండును. ముఖమునగా కపాలమునకు ముందున్న భాగము. ఈ ముఖము చుట్టు కన్నులు నోరు దివుడలను కలిగియున్నది.

దున్నబోలే చూడలతోనూ; మేయబోలే ఆవులతోనూ.

క్రిందిదవుడ తప్పు లలాటాసి ఎముకలన్నియు మెడటిలో పెద్దవిగానుండును. పుట్టిట ముందునున్న ఎముకలన్నియు వెడల్పుగ బల్లపరుతుగ గునిగూడి యుండుటవలన పుట్టి యొక్క ఆకారమేర్పడుచున్నది. మెడటిలోనున్న లలాటాసి నునువుగానుండి అనిగమైన ఆకారముగల ఒకపదార్థమును కొమ్ములలోనికి (Horn Process) తీసికొని పోవు చున్నది. ఈ కొమ్ము రోద్రముపైనే కొమ్ముఅను గట్టిపదార్థముచే కప్పబడి యున్నది. ఈ కొమ్ము పదార్థము చాలాచిక్కిగానుండును.

ముఖమునందుండు ఎముకలు (Nasal bones)

ముక్కు పొడవుగానుండును. ఇది రెండుభాగములుగా గడులవలె విభజింపబడి నది. వీటినే ముక్కుగడులు లేక ఆరలు అందురు. రెండు జిహ్వములు (Nasal bones) గలసి ముక్కు ముక్కుదూలమగును. వీటి చివరభాగము శిషి (Cartilage) లో చేయబడును. అందుచేత దెబ్బతిగిలినపుడు ఈ ఎముకలు విరుగజేవు. ముక్కు చివర భాగమున ఈ రెండు గడులు కలిసినచోట ఒకమెత్తని అతిమున్నితమైన ముట్టి అనునది కలదు. దీనిలో జిల్లేడ ఎముక ఒకటిగలదు. ప్రతిముక్కు గదియును బయటికి సప్తపథ గుండను, నాసాపశ్చిమ ద్వారముగుండను ముక్కుదూలముల వలన తెరువబడుచున్నవి. రెండు ఎముకలు నల్గిలవలె మెలికలుతిరిగి యుండును. ఇవి ముక్కులందుండును. ఇట్టి మెలికలవలన పీల్చుగాలి చామూరము ప్రయాణము చేయవలసియుండుటవలన అగాలి యూసిరితిత్తులలో ప్రవేశించకవూర్వము వెచ్చనగును.


ముక్కు ఎముకలు, పై దవుడఎముకలు, ముందు దవుడఎముకలు గండాసి, కంటి ఎముకలు అంగుడు ఎముకలు మున్నగు ఎముకలు గుట్టములకు పశువులకు మక్కలకు 18 వంతున ముఖము నందుండును. కబ్బిటి ఎముకలు రెండుకండయందుండు వీటి లింగు వులను ముక్కులోనికి సన్నని కాలువలద్వారా తీసికొని పోవును. ఇందువలననే పశువు విచారముగా నున్నపుడు ముక్కులనుండి నీరుగాగుండును. ముక్కులో నాగలివలె ఎముకయుండి ముక్కును రెండు భాగములుగా చేయుచు దానిమధ్యభాగమును పొడవుగా నుండునట్లు చేయును. ఇది సరిగా ఎదుగని యెడల ముక్కు పొట్టికగును.

ముఖభాగమందున్న ఎముకలలో రెండు దవుడయెముకలు కొన్నిటికి యెత్తుగా నుండును. రెండు పైదవుడ ఎముకలలోనే పై పండ్లు ఆమర్చబడియున్నవి. ఇవి కదలక నిరముగా నుండును. పశువు ఆహారము నములు నపుడు క్రిందిదవుడ మాత్రము కదలును. అంగుడుఎముకలు అంగిటి భాగమునందుండును. క్రింది దవుడ ఎముకకు క్రింది పండ్ల న్నియు ఆమర్చబడియున్నవి. ఈఎముక పైకి క్రిందికి ప్రక్కలకు గుండ్రముగ కదలు చుండును. గుట్టములకు 40 ని, పశువులకు 32 ని, మక్కలకు 42 పండ్లునుయుండును.

చెవిభాగమునందు నుత్తిఎముక, దాగలిఎముక, అంకపన్నెముక, గోభాకార ఎముకయను 8 ఎముకలు గుట్టములకు పశువులకు మక్కలకు యుండును.

దూడచస్త్రీ కమ్మలం ; యెనుముచస్త్రీ నిమ్మళం.

వెన్నెముక (The back bone)



మొండెముకను వెన్నెముక ప్రక్క ఎముకలు, తొంటి ఎముకలు భుజపుటెముకలు రొమ్మెముక మున్నగు ఎముకలుండును. మొండెముకను ముఖ్యధారకుగు వెన్నెముక వెన్నెపూసలను ఒక దానిపైనొకటి ఆమర్చబడుటచే కలుగుచున్నది. దీనిలోని ఎముకలన్నియు చాలగట్టివై ఒకటితో నొకటి కూర్చబడియున్నను వెన్నెముక ఏ వైపునకైనను వంగగలిగియుండును. చిన్న ఎముక లొక్కొక్క దానికిని పూసలతోపాటుగా మధ్యనొక గొట్టముకలదు. ఒకదాని పైన ఒకటి ఆమర్చబడి నంగున ఒక్కటే ఎముకగా నుండిను. వీని పొడుగునను ఒకకాలువవలె త్రోవ యేర్పడియుండును. ఈ వెన్నెపూసలతో కూడిన వెన్నెముక మెగడు నుండి తొకచివర వరకు వచ్చియున్నది. ఇది నాటియుక్కడకలనుబట్టి కొన్ని భాగములుగా విభజింపబడియున్నది.

అభాగములేవనగా:— మెడపూసలు, వీపుపూసలు, నడ్డిపూసలు, తొంటిపూసలు. తొకపూసలు అని అయిదు గణములుగా విభజింపబడియున్నవి. మెడపూసలు 7 వీపుపూసలు 13 తొంటిపూసలు 6 నడ్డిపూసలు 5 తొకపూసలు 18 లేక 20. వీటి నన్నిటిని మనము ఒక గణితముగా జ్ఞాపకముగదుకొన వలెననిన మే 7 నీ 13 తో 6 న 5 తో 18, 20.

వెన్నెముకలోనున్న ఎముకలన్నియు నాటి సామలందు ఆవయవములనుబట్టి పీలవబడు చున్నవిగాని మొదటిది రెండవది ప్రత్యేక పేర్లు కలిగియున్నవి. మొదటిది

స్కంధర పూసయనియు రెండవది మేరువు పూసయనియు పిలుతురు. స్కంధరపూస తప్ప వెన్నెముకలన్నియు ఒకేరీతిగా నిర్మింపబడియున్నవి.


వెన్నెపూస

ఈ పూస కాడీ (Body) ఆకారముగానుండును. ఇది వెన్నెపూసయొక్క అడుగుభాగమున నుండును. వెన్నెపూస రెండు పూసలతో నమర్చబడియుండి మధ్య కాలువవలె అమర్చబడి యుండుటచే వెన్నెముక యగుచున్నది. వెన్నెపూసలు ఒకదాని నొకటి కలసియున్నపుడు మధ్యన దిండవంటి మెత్తని ఎముకపదార్థము (Cartilage) అమర్చబడి యుండును. అంగుచేతనే పిన్నముకను పంచుటకు వీలగుచున్నది.

రోమ్ము ఎముక (Sternum)

ఇది బల్లపరుపుగానుండి రోమ్మును చదరముగా చేయుచున్నది. ఈఎముక అడుగు భాగమున వెడల్పుగను బల్లపరుపుగను యుండును. ఇట్లుండుటవలన రోమ్మునకు ఆకారము గలిగియుచున్నది.

ప్రక్కఎముకలు (Ribs)



ప్రక్కఎముకలు

ఇది హృదయ వహరముగానున్న ముఖ్య అంగములను కాపాడుచున్నది. ఈ హృదయ వహరపు వెనుక భాగమునందు వెన్నెముకవలనను, క్రిందిభాగమునందు రొమ్మెముక వలనను ప్రక్కలందు ప్రక్క ఎముకలవలనను బిడాయించి యున్నది. ఈ ప్రక్కఎముకలు వంకరటింకరిలుగా నుండును. ఇవి హృదయ వహరపు గోడలనుంచి వంకరగా తిరిగి పంజరమువలె నుండును. ఇవి గట్టిగను వెడల్పుగను కుక్కిరి కఠినము గను యుండును. జంతువులయందు 13 జతల ప్రక్కయెముకలుయుండును. ఇవి హృదయవహరపు రెండు ప్రక్కలనుండును. ఇంక నివి వీపునముకవ అతుకుకొని యుండును. క్రిందిభాగమున కడివలెనుండు ఉపానులచేత పొపొందించుచుండును. మొదటి 8 జతల ప్రక్కఎముకలు కీళ్లచే నాకియొక్క మోసలవద్ద అతుకుబడి యుండును. మిగిలిన జతలు రొమ్మెముకవ అతుకుకొని యుండవు.

కూపము (Pelvis)

దీనినే లొంటిఎముకల అస్థిపంజరమునందు. ఈ అస్థిపంజరమునుండి మలాశయము, మూత్రాశయము, పోవుచుండును. ఇది ఒకదానితో నొకటి సంబంధించని ఎముకలతో అడుగునను ప్రక్కలను లొంటి ఎముకలపై ప్రక్కల సమర్పబడియున్నది. ఇంకను పశువు శరీరములోనుండు ప్రాణాధారముగు అవయవములు ఈ వస్తికమునందనుర్పబడి యున్నవి.

భుజపు టెముకలు (Shoulder bones)

ఇది స్పష్టముగా తెలియుటకు అనేక తునకలుగా విభజింపబడి యున్నది. మొదటి భాగమును భుజపు కొనయందురు. ఇది అంశఫలకమును ఎముకచేత నేర్పడి యున్నది. రెండవదానిని బాహువుకొనయందురు. ఇది ప్రగడాసియొక్క అస్థిపంజరము. మూడవభాగము ముంజేయి. ఇది ప్రతిష్ఠికయొక్క కూర్పరాసికయొక్క అస్థిపంజరము వలన యేర్పడియున్నది. నాలుగవభాగము చతుష్పాక జాతువుయొక్క మూడవభాగము. ఇది మానవుని చేతిని పోలియుండును. దీనిలో మోకాలువేళ్లు, కర్రగుళ్యాధారాస్థులు మరియు నాలుగు ప్రేక్షునుగలవు. భుజము ఎముకలు 2, ప్రేక్షుయ్య ఎముకలు 4 ముం జెయ్య ఎముకలు 2 మోచేతి ఎముకలు 2 యుండును.

అంశఫలకము (The Scapula)

ఈ ఎముక బల్లపపురగ త్రికోణముగ కొమ్ముభాగమునను ముందువైపున కండర ములచేత సమర్పబడి యుండును. ఈ ఎముక ప్రైబాగము కెండుభాగములుగా విభజింప బడినది. ఇవి కండరములను కాపాడుచుండును. భౌతికము కలిగియుండుటచే భుజపు కేలందురు.

ప్రగడాసి (Humarus)

దీనినే భుజాసి లేక దండ ఎముకయందురు. ఇది పొడవుగానుండి చుట్టలువలె మెలితిరిగి పైకియుండును. ఇది భుజపుకీలునుంచి మోకాలిచిప్ప క్రిందవరకు వ్యాపించి యుండును. దండ ఎముకపైన మాడవభాగమున ఒక రంధ్రముండును. ఇది కండరము నకు సహాయకారిగా నుండును. మందముగల రెండు రంధ్రములు ముంగాలియొక్క కండరములకు సహాయకారిగా పనిచేయుచున్నవి.

బంధధారాసి కూర్పరాసి (The Rodius and ulna)

ఇవి రెండును మోకాలుయొక్క ఎముకలు. ఈ రెండును ప్రగడాసిని అంటి యుండుట వలన వీటిలోపలికిప్పు ప్రత్యేకముగానుండును గాన ఫలసములేదు. మనుష్యులు మక్కలు త్రిప్పనట్లు పశువులు త్రిప్పులేవు. బంధధారాసి కూర్పరాసికన్న పెద్దది. ఈ బంధధారాసి తిన్నగా మోకాలిచిప్ప పైవరకును, మోకాలి కీలు పైవరకును వ్యాపించియుండును.

కూర్పరాసి (The ulna)

ఇది బంధధారాసియొక్క బీజాంకురము. ఇది సన్నగానుండి బంధధారాసి యొక్క పైభాగములో క్రిందకు అతుకబడియున్నది. ఈ కూర్పరాసియొక్క అడుగు భాగము లావుగానుండును. ఇది మోకాలు చిప్పయొక్క అసిపంజరము నేర్పరచుచున్నది.

మణికట్టు (Carpal bones)

దీనిని జంతువులలో మామూలుగా కాలిముడుచు కీలందురు. ఇది మానవుని యొక్క మణికట్టును పోలియుండును. ఇది ఏడు ఎముకలను కలిగియుండును. ఈ యేడు ఎముకలలో రెండు ఎముకలు ఒకదానితో నొకటి కలసియుండును. అందుచేత ఆరు ఎముకలే కనబడుచుండును. ఈ ఏడు ఎముకలును అడ్డముగా రెండువరుసలుగా చేర్చబడి యున్నవి. ఈ రెండు వరుసలలో పైవరుస నాలుగు ఎముకలుకలిగియున్నది. ఈ నాలుగు ఎముకలును బంధధారాసి, కూర్పరాసికి అడుగు భాగపు కొనను కీలుపెట్టె చేర్చబడి యున్నది. రెండవ వరుసయందు మూడుఎముకలు గలవు. ఇవి కరంగుశ్యామలమగు కీలుచే చేర్చబడియున్నవి.

కరంగుశ్యామలు (Metecarpal bones)

మానవునివలె పశువులమగూడ కరంగుశ్యామలు వ్యాపించియుండును. ప్రతి అంగి ఒక ఎముకను కలిగియుండును. కాని పెద్దవాటిలో కొన్ని కరంగుశ్యామలును

వాటినుపరించి వ్రేళ్ళను యొగడును. మొదటి అసి రెండవది అంతగా కనపడవు. అయినవది మిక్కిలి చిన్నది. మూడు నాలుగు బాగుగా పెరిగి పెద్ద ఒక కరంగుర్యాస్థిగా వగుచున్నది.

పశువుయొక్క కరంగుర్యాస్థులు రెండుభాగములుగా విభజింపబడుచున్నవి. అందులో మొదటిది చిన్నదిగానుండును. దీనినే అయిదవకరంగుర్యాస్థి (Splint bone) అందురు. రెండవది మూడునాలుగు అనులచే కలుపబడి పెద్దదిగా వగుచున్నది. ఈ పెద్దది అర్థవర్తుల స్తంభాకారముగా నుండి మణికిట్టుపైగా వ్రేళ్ళకింద వరకు వ్యాపించి యుండును. ఈ పెద్ద కరంగుర్యాస్థియొక్క అడుగుకొన రెండు ముఖ్యమైన వ్రేళ్ళను కలిగియున్నది. దీనివెనుక చివరకొననంటి నాలుగు చిన్న ఎముకలుండును.

(వ్రేళ్లు (Fingers))

ఇవి మనుష్యుని చేతి వ్రేళ్లను విల్లివ్రేళ్లను మక్కువ్రేళ్లను పోలియుండును. మొదట వ్రేలు రెప్ప పశువునకు కూడ నాలుగు వ్రేళ్ళుండును. ఈ అయిదువ్రేళ్ళలో రెండవది, అయినవది ప్రథమముగా పచ్చిపిచి. రెండవది, మూడవది గింసకేలు యొక్క వెనుక భాగము. అసగా పెద్ద కరంగుర్యాస్థికి కడపటి మూడువ్రేళ్ళను మధ్యగనుండును. ఈ రెండును గట్టిగానుండును. చిన్నవ్రేళ్ళు యెమాత్రము ప్రవాటివలె శక్తిని కలిగి యుండవు. ఎందుచేతనా అవిరువును మోయజాలవు. కాబట్టి ఒక్కొక్క వ్రేలు రెండు చిన్న వ్రేళ్లను కలిగియుండును. తిక్కిన రెండువ్రేళ్ళు అసగా మూడునాలుగు వ్రేళ్ళు బాగుగా పెరుగబడి పుష్టిగానుండి శక్తిని కలిగియుండును. ఇవి పెద్దకరంగుర్యాస్థియొక్క చివరకొననుండి ముందునకును క్రి దికిని వ్యాపించి చిన్నచిన్నవిగ నుండును. ఒక్కొక్క పెద్దవ్రేలు ముఖ్యమైన అనులను కలిగియుండును. అవియే అంగుర్యాస్థు అనబడును. అవి మనుష్యుల అంగుర్యాస్థులవలె నుండును. పెద్దవ్రేలులో కీలుయొక్క వెనుక భాగమున ఒక అస్థిగలదు. ప్రతి ముఖ్యమైన వ్రేలుయొక్క ప్రభాగము మందముగల చర్మముతో కప్పబడియుండును. ఆ చర్మము నే గిట్టలుగల వాదమందురు. దీనితోనే పశువుభూమినిదాడ నడచును.

కాలి ఎముకలు (Bones of the legs)

మందుకొలును 13 ఎముకలు వెనుక కొలును 15 ఎముకలు నుండును. వెనుక కొలుమాత్రము మనుష్యుని కాలియొక్క చివరభాగములో అర్థ వంద్రాకారమును పోలి యుండును. ఈ కొలు షైభాగమున తొడ అనబడి కలదు. ఈ తొడయొక్క అస్థి పంజరము షార్వస్థి (Femur) అనబడు మోకాలిచిప్ప (patella) వలనను విస్తరించుచున్నది. షార్వస్థి శరీరమునకు ఎముకలన్నిటిగా నిది పొడవుగ బలముగలదిగా నుండును. మోకాలియుండు దు చిన్నది. అందు కీళ్లను బెబ్బరగుల పియకుండ కొలు నుండును. కాలియొక్క అస్థిపంజరము జిహ్వి (Tibia) బానుక (Fibula) ల వలన

తేర్చుచున్నది. వెనుకకాలు చీలమండ ఎముకలు (Tarsal bones) ను పదిపాదాంగుల్య ధారానులు (Meta tarsal bones) ను, నాలుగు పాదాంగుల్యములు (Phalanges) ను కలిగియున్నది.

తొంటిఎముక (Hip Bone)

ఇది సరియగు ఆకారము గలిగియుండదు. ఇది తొంటియొక్క ఆకారమును తేర్చుచున్నది. దీనిచివరను త్రికాసికి ఎదురుగాకలసి కూపకము (Plevis) అను ఆకారము యేర్పడుచున్నది. త్రికాసి మగచి బలమగు కీలుచే నమర్పబడి యుండును. ఆకీలు వెనుకకాలును, ఎదురురొమ్ము భాగపు వెనుకకాలును కలుపుచున్నది. గర్భములోని పిండముయొక్క తొడఎముక మూడుభాగములు కలిగియుండును. మొదటిది ఘనకపాల మందురు. ఇది శ్రోణిఫలకముయొక్క ప్రైభాగమున నుండును. రెండవది కలకందరాస్తి. ఇది క్రిందిభాగమునకు నుండర పిండముతో కూడియున్నది. మూడవది భాగస్తి ముందు భాగమున నుండును. మంచి వయస్సులో నున్నపుడు ఈ మూడుభాగములు కలిసి ఒక ఎముకయగును. ఇది కలియునోట వంక్షణోల్లాఖణ మొకటి యున్నది. ఆ భాగమందే తుర్వసియొక్క ప్రై చివరభాగము కలియును. జఘన కపాలముయొక్క మొదటిభాగము కూడ అచ్చట నేయుండును.

ఊర్వాస్తి (Femur)

ఇది శరీరములోనున్న అనులకన్న చాలా బరువుగా నుండును. ఇది నిలువుగా నుండును. ప్రై భాగమున ఇది తొంటికిలు వరకును క్రిందిభాగమున మరియొకకీలువరకును వ్యాపించియుండును. ఈ ఎముకయొక్క ప్రైభాగ గోభాకారముగల అసితోకలియును. దీని తల ప్రైభాగమున ప్రవర్తనము యుండును. ఇది మహాశిఖరమును (Trochanter major) పేరుతో పిలువబడు కండరములతో కట్టబడియుండును. ఈ ఊర్వాస్తి లోపలి భాగములో అనగా తన క్రింద మరొక చిన్న ప్రవర్తనము (Process) గలదు. దీనిని అఘుశిఖరమందురు. ఇంకను ఈ ఎముకచివరకొన వెనుకభాగమున అనగా, జంఘిక ప్రై భాగమున రెండు అండాకారములుగల మహార్బదములు గలవు. ఈ మహార్బదముల మధ్యగా జంఘికబొవురు రెండు వదరులచే ఆక్రమించబడి యున్నది. దీనినే అర్థ చంద్రాకారముగా ఉపాసియందురు.

పటలాస్తి (Patella)

ఇది మానవునియొక్క మోకాలిచిప్పనుబోలి సన్నముగా నుండును. జంఘిక యొక్క ప్రైభాగమున పటలాస్తియుండును. మూడుచోట్ల నాడాలు బిగించినట్లు కట్టబడి యుండును. ఇంతియేగాక లోపల కండరములుండును. జంఘిక, జానుకయనునవి కాలులోపల నుండును. జంఘిక యనునది పెద్దదిగను త్రికోణాకారముగ నుండి పాదమా

లానీవరకును పెరుగును. జంఘికయొక్క ప్రైభాగము కొనతో బానుకయొక్క ప్రైభాగము కొన కలిగియుండును.

కీళ్లు (Joints)

పశువుయొక్క అస్థిపంజరమంతయు చిన్న చిన్న ఎముకలతో గూర్చబడియున్నందున యిష్టమువచ్చినట్లు కీళ్లభాగములు వంగుటకు వీలగుచున్నవి. పెద్ద ఎముకలలోపల మూలుగును మెత్తని పదార్థముండును. ఒక ఎముక మరియొక ఎముకతో కలసియుండుచోటునకు కీలుఅని పేరు. ఈ కీళ్లలో కొన్ని కదలును మరికొన్ని కదలకయే యుండును. కీళ్లు సులువుగా చలిచునపుడెల్ల చమురును స్రవించజేయునట్టి చమురుతిత్తులు కీళ్ల నడుమనుండును. కొన్ని ఎముకలు నీలిముగానుండక చలనములకు అనుకూలపడును. వీటిని కదలెడుకీళ్లు అందురు. వీటిలోనే బారెడుకీళ్లు, యనునవి యుండును. ఇవి మజి కట్టు నందును, చీలమట్టలయందును యుండును. ఇంకను మడతబండుకీళ్లు యుండును. దవుడకీలు, ముంజేతికీలు, మోకాలుకీలు, వ్రేళ్లకీళ్లు చీలమండల కీలుకూడ మడతబండు కీళ్లుండురు.

బంతిగిన్నెకీళ్లు (Ball and socket Joints)

ఇరిస్నాయువుల అనుమత్యగా నుంచబడక ఒక ఎముకలోనుంచి మరియొక ఎముకలోనికి పోవుచు కీలుచుట్టు తిరుగును. ఇట్లు తిగుటవలన ఆ ప్రదేశములో ఒక రంధ్రమేర్పడును. వ్యతిరేకముగానున్న ఎముకలు వీటిని తాకుచుండును. కాని అవి ననువుగను పనువురంగుగను, బారునవిగను యుండు స్రవపదార్థములచే నిండియుండును. ఆ ప్రపపదార్థము పై నాలియల్ అను పలుచని చర్మముతో కప్పబడియుండును. ఈరీతిగా కీలుచుట్టును స్నాయువులు అడుగువరకును యుండును.

ఇంకను బొంగుకీళ్లు (Pivot Joints) యుండును. ఇవి మెడపూసలయందుండుటవలన అర్థచంద్రాకారముగ త్రిప్పుటకు వీలుగానుండును. కాళ్లలోనుండుకీళ్లు పెద్ద విగనున్నను చిన్నవిగా నున్నను కదలుటకు వీలుగానుండును. కీళ్లజబ్బులు అనగా కీళ్ల వాపులు, కీళ్లనొప్పులు, తొడలందును మోకాలు కీలునందును పరుపులుండుట మున్నగు వాటినిగూర్చి ముందు తెలుపబడును.

సంధిబంధనములు (Ligaments)

రెండు ఎముకలు కలియుచోట నవి కట్టబడియుండని యెడల వాని సానములందుండక అవి జారిపోవును. కాబట్టి కీళ్లుండెడిసానములందు ఎముకలను త్రొళ్లతో కట్టబడియుండును. వీటినే సంధిబంధనములందురు. ఇవి తెలుపుగల నారతోచేయబడి చాలా గట్టిగానుండును. వాటికి రబ్బరుగాసాగెడి శక్తి యుండుటవలన ఎముకలు కదలునపుడు అవికూడ కదలుచు ఇతర అవయవములకు దెబ్బ తగుటకుండ కాపాడుచుండును.

శరీరములో నుండు మెత్తని భాగములు (The soft parts)

పశువు శరీరమందుండు మెత్తని భాగములకు అవయవములు (organs) అని పేరు. వీటిలోనొకటి గాని అనేకముగాని ఒకపనిని నేరవేర్చుచుండును. కొన్ని అవయవములు అహారమును జీర్ణముజేయును. మరొన్ని పదార్థములు రక్తమును ప్రసరింపజేయుచుండును. ఇంకొన్ని పరిశిమాలిన పదార్థములను విసర్జింపజేయును. వీటివ్యాపారము అనుబట్టి ఇవి మండలములు (Systems) గా భాగింపబడినవి.

1. కండరమండలము (The Muscular system). ఇది శరీరఅవయవములకు చలనము కలిగించును.

2. జీర్ణమండలము (The Alimentary system). దీనియందు ముఖ్యముగా నోరు, జీర్ణాశయము, ప్రేవులు చేరియున్నవి. ఇవి అహారమును జీర్ణింపజేసి జీర్ణమైన ద్రవమును రక్తమానందు కలుపుచుండును.

3. రక్తప్రసరణ మండలము (The Circulatory system). దీనిలో గుండె కొయ్య, రక్తనాళములు, చేరియున్నవి. ఇవి శరీరమందు ప్రతి అవయవమునకు రక్తమును పోషణపదార్థమును తీసికొనిపోయి అక్కడ రక్తయారగు కలుషమును పదార్థములను తెచ్చుచుండును.

4. శ్వాసమండలము (The Respiratory system). దీనియందు ముఖ్యశ్వాసనాళములు, ఊపిరితిత్తులు చేరియున్నవి. రక్తమునకు మంచిగాలి నిచ్చి యుండుండు వివచాయువులను బైటికి ప్రోసివేయును.

5. బహిష్కర్మ మండలము (The Excretory system). దీనియందు ఊపిరి తిత్తులు, చర్మము, మాత్రసిండములు, చేరియున్నవి. శరీరమందు తయారగు వ్యర్థపు పదార్థములన్నియు విడిచిపెట్టుచుండును.

6. నాడీమండలము (The Nervous system) దీనియందు మెదడు, మజ్జా నాడులుకలవు. ఇవి శరీరమందుండు అవయవములను యుక్తముగా చలంపజేయును.

టిస్యూలు (Tissues)

పశువు శరీరములోనుండు వివిధభాగములన్నియు పనిచేయుటకు తగినట్లుగా నుండుటకు ఈ టిస్యూలుకూడ కండరములందును, నాసలయందును, ఉపాసియందును, చర్మమునందును యుండును. ఈ టిస్యూలను నూత్నదర్శియంత్రము (Microscope) చూచిన ప్రాణముగల కణములను తెలిసికొనవచ్చును. ఇట్టి కణములు ఒకటిగాని అనేకముగాని వరసలుగానుండి దారిముపలె నేర్చుదును. దీనికే ఒకవిధమును నాయుండురు. ఇట్టి నారవంటి పోగులు అల్లుకొని కణముల సంఘికొని తగినపని చేయుచుండును. ఇట్టి కణముల సమూహమునకు ఇంగ్లీషులో టిస్యూ (tissue) అందురు.

1. కండరసంబంధముగు టిక్యూ (Muscular tissue). ఇది వరుసగానుండు కణములతో చేయబడియుండును. సరముల సంబంధముగు కణములనుండి వచ్చిన ఆజ్ఞల వలన ఈ కణములు సాగుచుండును.

2. సరముల సంబంధముగు టిక్యూ (Nerve tissue). దీనియందుండు కణములు మిగుల పొడవుగల కాఫిలుండును. అనేక కణములనుండి బయలుదేరిన కాఫిలు పెన వేసుకొని దారములవలె వేర్పడును. ఇట్టిదారములకే నాడులనిపేరు.

3. ఆధారపు టిక్యూలు (Connective tissue). తక్కిన టిక్యూలవలె దీని యందుగూడ కణములుగలవు. ఈ టిక్యూ ప్రతిఅవయవ గునందును యుండును. చర్మ ముం దెక్కువగానుండి బాగుచేయును.

4. ఎపిథీలియల్ టిక్యూ (Epithelial tissue). ఇది ఆహారనాళమునకు లోపలభాగమందుండు తడిచర్మమందుండును.

5. కార్టిలేజినస్ టిక్యూ (Cartilaginous tissue). ఇది పెరునుగానుండి సాగెడి గుణము కలదు. చెవులు, ముక్కుగర్భములనివర, గొంతుకయందుండు నాళము దగ్గర ఈ టిక్యూయుండి మెత్తగా కనబడును. ఈ మెత్తనిపదార్థము ఉపానియందురు.


కండరమండలము (The Muscular system)

పశువుశరీరముపైనుండు చర్మమును తీసివేసిన ఎరువుగానుండు మాంసపుముద్దనే కండర లేక కండరమనబడును. ఈకండరము లా యా ప్రదేశములనుబట్టి రూపపరచూరణ ములయందు ఒకేషే భేదముపొందుచు లెక్కకు గమ్యామి ఏడువందలకు పైబడియున్నవి. పై పటమునందు పశుకండరమండల ఘాతీయచూచిన యే యే భాగములందు ఏ యే కండరములున్నది లేటలెల్లమగును. ప్రతి కీలుదగ్గర మెత్తనిపదార్థముండును. కీలుకదలి నపుడెల్ల యీ పదార్థము పొట్టిదగుటయు, లావగుటయు, గట్టిగానగుటయు కనబడును. దీనినే కండరమందురు. శరీరమందుండు అవయవములలోనుండు కండరపదార్థములనే కండరమండలమందురు. ఈకండరములు మాంసముతో చేయబడి కంటికగపడని స్పష్టని అతినూత్నములగు దారములుకొన్ని కట్టలుగాకట్టబడి నాటిపై పలుచని పొనే కప్పబడి యుండును. ఈ పొర కండరములకట్టనుండి రెండువైపులకు పొడవుగాపోయి అన్ని యను జేరి బలమగుత్రాడుగా నేర్పడుచున్నవి. ఈత్రాళ్ళకున్నాయువు లేక కండర బంధనములనిపేరు. ఈ బంధనములచే కండరముల ఎముకలకుకట్టబడును. ఇవి ఎంత లాగినను తెగవు. ప్రతి కండరములోనికి ఒకనాడియు, కొన్ని రక్తనాళములు పోవు చుండును. కండరములరంగు ఎరువుగానున్నట్లు కనపడును. ఈ ఎరువు నలువైపుల రక్త నాళములుండుటవలన కలుగుచున్నది.

దొమ్మలన్నిటిలో మిడిదొమ్మ చెడ్డది.

కండరములచలనము (Muscular Action)

ఎముకలను వంచుటకు, సాగతీయుటకు, నిలబడుటకు కండరములు పనిచేయు చున్నవి. పశువులు స్వేచ్ఛగా కండరించుచున్న చలిండునపుడు అవి సాధారణముగా ఒక



ఎముకను ఆధారము చేసికొని కదలును. బరువును లాగవలెననిన అనేకకండరము లొకటిగాజేరి చలనమును కలుగజేయుచున్నవి. మెడయొక్క వెనుకభాగమందుండు కండర

మందులు పోనేటప్పుడు దగ్గరీయరాదు.

ములు ముడుచుకొనుటవలన తలపైకత్తబడును. ముందు భాగమునందుండు కండరములు ముడుచుకొనుటవలన తలను క్రిందకుదించును. పిక్కకండరములు ముడుచుకొనునపుడు బలము ప్రయోగింపబడును. అప్పుడు పాదములనువంచును. తొడమీద కండరములు మోకాలునువంచును. ఈరీతిగా కండరముల చలనము కలుగుచుండును.

కండరముల రకములు (The kinds of Muscles)

కండరములలో అనేకములు పొడవుగను గుండ్రముగను దళసరిగను యుండును. కండరములన్నియు నాగుల నూలమున నే చలించుచుండును. కండరములలో రెండురకములు గలవు. స్వేచ్ఛగానుండునవి, స్వేచ్ఛగానుండవండనుండునవి. స్వేచ్ఛాకండరములు అసంపజరము నెరియుండి మెదడుయొక్క ఆజలకు లోబడి పనిచేయుచుండును. స్వేచ్ఛగానుండవండనుండునవి ఊపిరితిత్తులు, గుండెకాయ, జీర్ణాశయము, ప్రేవులు మున్నగు అవయవములందుండును. పశువు నిద్రపోవునపుడు మేలుకొనునపుడు ఈ కండరములు వాటంతటనే పనిచేయుచుండును. పాదములు భూమిమీద ఆనియుండి నానుక జంఘికలను నిలుపుగానుంచుటకు పిక్కకండరములు ప్రయత్నించును. తొడవిముకను మోకాలిమీద నిలబెట్టుటకు తొడవెనుక నుండుచుండు కండరములు ప్రయత్నించుచుండును. సరిగావంచుటకు భుజకండరములు, వెన్నెముకమీద తలను నిలబెట్టుటకు మెడ నుండువెనుక కండరములును అమర్చబడియున్నవి. కన్నులగర్గ కండరములు గుండ్రముగానుండును. ఏయే అవయవములు కదలుచుండునో వాటికి పెద్దవియు బలిష్ఠములైన కండరము లమర్చబడియున్నవి. కాళ్ళలోనుండు ఎముకలకుట్టు గట్టికండరములుండును. తలలోను ముఖమందునుండు కండరములు పలుచగా ఒలపరుపుగామండి పెద్దవల యొక్కయు దన్నువలయొక్కయు కనుమలయొక్కయు కదలికకు సహాయపడుచున్నవి. విప్రు నడ్డిపూస ప్రక్కఎముకల పైభాగమున పెద్దకండరములుండును. ప్రక్కఎముకలలో పలుచని కండరములుండును. ఈరీతిగా వివిధరకములుగా కండరములుండును.

కండరములు పెరుగుట (Growth of Muscles)

పశువు శరీరమంద పనిచేయు అవయవములకు ఎక్కువయు, పనిచేయక విశ్రాంతిగానుండు అవయవములకు తక్కువయు రక్తము ప్రసరించునట్లు స్పష్టమై యుండేవాటని చేయబడియున్నది. అవయవములు పనిచేయునప్పుడు రక్తనాళములు పెద్దవియగుటవలన ఎక్కువ రక్తముపొందును. పనిచేయు కండరములు ఎక్కువరక్తమును పోషణపదార్థములను సంపాదించుటవలన వృద్ధియగుచున్నవి. పనిచేయుకండరములు పెద్దవిగ దృఢమైనవిగనుండును. పనిచేయుచి మెత్తగా చిన్నవిగా క్రాంతి తక్కువగనుండును. దూడ వయస్సునందే కండరములను బలపరచుటనుంచిది. కాని చిన్నవాటితో మించినపనులు చేయించిన కండరములు అరిగి దూడ గిరిసబారిపోవును. ప్రతికండరమునకు దానిపని

నరిగా నెరవేర్చుకొనుటకు తగినంత శరీరపరిశ్రమ ఈ కుసులయును. ఈకండరములమీద శ్రుట్టు వ్యాధుల విషయమై ముందు తెలుపబడును.

ఎముకలెదుగుట (Growth of bones)

ప్రతిఎముకను ఆవరించుకొని తెల్లనివారతో చేయబడిన పొరయుండును. రక్త నాళములు ఎముకలలో ప్రవేశించకపూర్వము ఈ పొరలో నవి యల్లుకొనియుండును. ఈ పొర తీసివేసినయెడల ఎముక యెరుగనేగును. ఈ పొరనుంచిక్రిందిఎముక భాగమున తీసినచో పోయిన యెముక తిరిగి యెరుగగలదు. కాబట్టి ఎముకలెదుగుటకు మూలాధారము రక్తమేయని గ్రహించవలెను.

వికారరూపములు (Deformities)

పశువు శరీరమందుండు ఎముకలు దృఢముగానుండినను వక్రరూపమును బొందవచ్చును. శరీరమందలి యేభాగమైనను వికారరూపమును బొందినయెడల తపననిచక్కగా నెరవేర్చలేదు. ఇట్టివికారరూపములు అనేకరకములుగా రావచ్చును. ఎముకలకు వ్యాధులనుగూర్చి ముందు తెలుపగలను.

జీర్ణమండలము (Digestive system)

తరుగుట పూర్తియగుట

పశువు ప్రతిదినము అనేకపానుల ఆహారమును తీసికొనుచున్నప్పటికి అది బరువునుబట్టి. ప్రతిదినము దాని దేహములోనికి యెంతపదార్థము పోవుచున్నదో అంత పదార్థము తిరిగి మరల దేహమునుండి నిష్కలుచున్నదని తెలిసికొనవలెను. చూడఁగా పశువు నవ్వును దినదినము వృద్ధియగు దేహముయొక్క బరువు, అది తీసికొను ఆహారముయొక్క బరువునకు సమానమగుటలేదు. ఇటుల దేహమునుండి బైటపోవు పదార్థములకే తరగుట యందురు. పశువులోపనికి తీసుకొను ఆహారపదార్థమే ఈ తరుగున పూర్తిచేయును. పశువు పాలునపుడెల్ల మేలి కగురుమారుచుండును. ఇందువలన దాని దేహములో తరుగుచున్నదని గ్రహించుచున్నాము.


జీర్ణకోశము (Stomach)

సెమరువేయు జీవులకు జీర్ణకోశము నాలుగుభాగములుగ విభజించవచ్చును. ఆహారముపోవు మార్గమునుబట్టి వాటి నామములు నిర్ణయించబడినవి. 1 పెద్దపాట్లు 2 కాసులపాట్లు 3 అల్లిపాట్లు 4 నాంగవపాట్లు.

జీర్ణమునందలి తరుగు చాలకన్యెను.

పెద్దపొట్ట (Rumen)

జీర్ణమండలము ఫోటోలో జీర్ణశోశపు భాగములనుచూడుము. మొదటిదానినే పెద్ద పొట్టయందురు. ఇది అన్నిటికంటె పెద్దది. పశువు తిను ఆహారము ఈతి తిలోనికి చేరును. ఈ తిత్తి లోపలిభాగమున ఒకవిధముగ పొరయుండును. ఇంకను ఇది పీచు, ఎనిమిది ప్రక్కటెముకలమధ్యగా పత్తికమునకు వెనుకగానుండును. చిన్నపశువుల పొట్ట 20 నుంచి



జీర్ణ శోశ ము

30 గాలనులును, మధ్యవయస్సుపొట్ట 25 నుంచి 35 గాలనులును, పెద్దపశువుపొట్ట 48 నుంచి 50 గాలనుల ద్రవపదార్థములవలెను పట్టును. దీనిలోపల కండరములు ఎల్లప్పుడు లేచుగానుండును. ఈలేచుగానుండు కండరములు వ్యాపించుటవలన దీనిలోనున్న పదార్థములు ఉండలుండలుగాగును. ఈ కండరములు లేచియెడల దానియొక్క వ్యాకోచశక్తి నశించును. దానిలో ఆహారము జీర్ణమగు రసముతయ్యగును. కాబట్టి ఈపొట్ట ఆహారపదార్థమును నిలువయుంచునదిగా సుపయోగపడును. బొగ్గు సంబంధముగ నత్ర సంబంధముగ పదార్థములు దీనిలోనుండును.

కాసులపొట్ట (Reticulum)

దీనినే రెండవపొట్టయందురు. దీనిలోపలిభాగము కాసులుకాసులుగానుండును. నెమరువేయుటకు కావలసిన ఏరు ఇందులోజేరును. ఇది పెద్దపొట్టకంటె మందముగా

నుండును. నెమరువేయుటకు కావలసిన రసములు యిచ్చటజేరును. పెద్దపొట్టలోనున్న మేత ఈతిత్తిలోనికిజేరి ఉండలుండలుగానగును. ఈ యుండలను పశువు నోటిలోనికి దెచ్చుకొని చక్కగా నమలిమింగును. ఇంకిన ఇనుపముక్కలు రాళ్ళు మున్నగు అస్వభవదార్థములు ఈపొట్టలోజేరును. ఈతిత్తి అన్నిభాగములకంటె చిన్నదిగ అరచంద్రా కారముగనుండి పెద్దపొట్టకు ముందుభాగమున నుండును.

అరలపొట్ట (Omasum)

దీనినే మూడవపొట్టయందురు. ఇది పైరెండుపొట్టలనుండి విభజింపబడియున్నది. పశువుచే పూర్తిగా నెమరువేయబడిన ఆహారము ఈతిత్తిలో జీర్ణమగును. ఈపొట్ట కాగితమువలె పొరలుపొరలుగానుండును. ఈపొరలకు ఒకవిధమగు నూత్నజీవు లంటియుండును. ఇంకినది 7 నుంచి 11 వరకున్న ప్రక్క ఎముకల మధ్యగాను కార్జమునకు వడి ప్రక్కగను యుండును. కామలపొట్టకంటె కొంచెము పెద్దదిగానుండును. ఎందు పదార్థములన్నియు దీనిలో చేరును. ఇచ్చటనుంచి వచ్చు ఆహారపదార్థమంతయు ఆవిరియై పోవుచుండును.

నాలుగవపొట్ట (Abomasum)

జీర్ణమైన మేత ఈపొట్టలోనికిజేరును. దీనిలోపలిభాగమునందు ఎరుపురంగుల ముడుతలుండును. ఇచ్చటనే జఠరరసము పుట్టుచున్నది. ఇది పుల్లగు రుచిగనుండి రుచి కలిగించును. నీరు మొదలగు ద్రవపదార్థములు పశువుమ్రొంగిన వెంటనే ఈ పొట్టలో జేరును. 7 నుంచి 12 ప్రక్క ఎముకలమధ్య ఈ పొట్ట యుండును. ఈపొట్ట చివరనుంచి వ్రేపులు ఆరంభమగును. దీనికి మొదటికేగునకు మధ్య కంఠము (Pyloric ring) వీడ్చడియుండును. నెమరువేయుట అసాధ్యముగా లినినమేత ఉండలుండలుగా నోటికిరెచ్చు కొని బాగుగానమలి మింగుట. దీనినే నెమరువేయుటయందురు.

నోరు (The mouth)

ఇదియొక పెట్టెవలెనుండి ముందు పెదవులతోను ప్రక్కలను దవ్వుడలతోను పైభాగమునందు అంగుడుతోను అడుగుభాగమున నాచుకతోను అమర్చబడియుండును. నోటిలోపలి భాగమంతయు నూత్నమైనట్టియు, మెత్తనైనట్టియు చర్మముతో కప్పబడి యుండును. ఈచర్మమునే తడిచర్మము (Mucous membrane) అందురు. దీని యందు నరములు, రక్తనాళములు యుండుటచేత పలుచని పొరగుండ రక్తము మెరయుచుండి నోటిభాగమంతటికి ఎరుపురంగునిచ్చును. దవ్వుడలయందు పెదవులయందు తడి చర్మమేగాక కండరములకూడ యుండును.

నాలుక (The Tongue)

ఇది పశువునోటిలో నడుగుభాగమున పరువువలె దాడలకు మధ్యగా నేర్పడి యున్నది. ఇది మూడుభాగములుగానుండును. 1 మూలము 2 మధ్యము 3 అగ్రము. మూలము నోటిద్వారమునకు దూరముగనుండి నాలుకను గొంతుకకు అంటియుండునట్లు చేయును. దీనిమధ్యముమధ్యభాగమే. దీని అగ్రము నోటిద్వారమునకు దగ్గరగనుండి పలు చని మెత్తనిపదార్థముతో చేయబడియుండును. నాలుక కండరపదార్థముతో చేయబడి యుండును. అందువలన నమలునప్పుడు నానాముఖముల తిరుగుచుండును. నాలుక అకురాయివలె గరకుగానుండి బాహ్య చక్రమునందు కండరములుండును. ముందు భాగ ముననుండు కండరములు మొనలు తేలి నిడుపుగానుండును.

నాలుకవలన మూడుప్రయోజనములు గలవు. 1 పదార్థమున నమలునప్పుడు దానిని క్రిందకు పైకి తిరుగ చేయుచుండును. 2 పశువు అరచుటనో సహకారిగానుండును. 3 రుచిని తెలుపుట కుపయోగించును. నోటివలెనే నాలుకగూడ తడిచర్మముతో గప్ప బడియుండును. నాలుక క్రిందిభాగమునందు ఈపొర మిక్కిలి సునువుగా మృదువుగా నుండును. కాని పైభాగముమాత్రము గుట్టలవలె ఎగుడుదిగుడుగానుండును. వాటి మూలముననే పశువు రుచిని తెలిసికొనుచున్నది. నాలుకకు ముందుభాగమునందు కండరములవలన పులుపుతోపు వెనుకభాగమునందున్న కండరములవలన ఉప్పు చేదు వస్త్ర పుల రుచిని గ్రహించుచుండును.

గ్రంధులు (Glands)

పశువు తిను మేత నోటిలో ప్రవేశించునంతలో అచ్చటికి ఉమ్మిరియచ్చి మేతను తడుపుచుండును. ఆహారము నమలునపుడును ఆహారమును చూచినపుడును, ఆహారపు వాసన తగిలినపుడును ఈ ఉమ్మిరియ నోటియందు యారుచుండును. రక్తమునుండి తమకు గావలసిన పదార్థములను తీసుకొనుకొని గ్రంధులకుగలదు. ఈ గ్రంధులు మూడురకము లుగ నుండును. 1 బాతుకలము పెండటిభాగమువలె సన్నముగ లోతుగనుండునవికొన్ని 2 సన్నని మూతిగలిగి గుండ్రని అంచులవలె నుండునవికొన్ని 3 పాముచుట్టలవలె చుట్టు కొనియుండునవికొన్ని యుండును. అవి చేయుపనినిబట్టి గ్రంధులు రెండువిధములుగా మారుచుండును. కరీరమునకు కావలసిన పదార్థములను తయారుచేయు గ్రంధులను స్వీకారగ్రంధులు (Secreting glands) అనియు, అక్కరలేని పదార్థములను వెలు పలకు త్రోవవేయు గ్రంధులు (Excreting glands) అందురు. స్వీకారగ్రంధులు రక్తములోనున్న కొన్ని పదార్థములను దీసికొని వాటివలన తదితర క్రొత్తపదార్థములను తయారుచేసికొని దాచుకొనును. ఇంకను ఉమ్మిరిటిగ్రంధులు, జాకరరసగ్రంధులు, అంతరసగ్రంధులు, కాలేయము, పుక్వకము. చెనుటగ్రంధులు, మాత్రస్పిండములు అను రకములు గలవు.

పేరాటిడ్ గ్రంథి (Parotid glands) పశువు అరచునపుడు విడువవుడు ఈ గ్రంథి స్రవించి కావలసిన తేమనిచ్చుచుండును. ఇవి చెవులకు దగ్గరగా క్రిందివపుడ పైకి క్రిందికి నాడునట్టిచోటుననుండును. సబ్ మాక్సిల్లరీ గ్రంథి (Submaxillary glands) రెండు గ్రంథులు దవుడల క్రిందిభాగముననుండును. వీటిలో స్పృ నాలుకకు క్రిందనుండును. ఈ గ్రంథులు రమారమి రెండంగుళముల పొడవు నాలుగు అవున్సుల బరువుయుండును.

సబ్ లింగ్వల్ గ్రంథి (Sublingual glands) ఈ రెండు గ్రంథులు నాలుకకు క్రిందిభాగముననుండుండును. ఇవి నాలుక క్రిందివపుడతో నతుకబడియున్న యీ గ్రంథి భాగమున కిరుప్రక్కలనుండును.

ఉమ్మిబిటివలన ఆహారమును తడిచేయును. నవలిన ఆహారమును జీగురుగా నుండవలెను. కట్టించుటకుపయోగపడును. ఆహారములోనున్న పిండిపదార్థములను చక్కెరగా మార్చును. ఉమ్మిబిటి గ్రంథులు రక్తమునుంచి ఉమ్మిబిటినితయారుచేసి నాలుక చివరభాగమునకు దగ్గరగాపోవుచుండును. ఈనీరు తేమను కలంగజేయుచుండును.

సప్తపథము (Pharynx)

ఈభాగములోనికి ఏమదారులుండుటవలన సప్తపథమున పేరువచ్చినది. చెవుల నుండి ముక్కులనుండి, ఉపవీరితులనుండి జీర్ణశోశమునుండి ఏమదారులుండుటవలన సప్తపథమున పేరువచ్చినది. ఇది గళ్ళమాదిరి సంచివలెనుండును.

ఆహారనాళము (The gullet)

ఈనాళము కుత్తుకగుండపోవును. ఇది పెద్దగొట్టములవలె నుండి మడతలుమడతలుగా నుండును. ఉమ్మిబిటి గ్రంథులు, కాశేయము, వృక్కము మున్నగునవి ఈ నాళము నంటియుండును. ఈనాళము పశువుతిన ఆహారపదార్థములను జీర్ణముచేయుటకు తగిన రసమును పుట్టించుచున్నది. ఈనాళము తడిచర్మముతో గప్పుబడి కొద్దిగ రసమును పుట్టించు గ్రంథులుగా తయారగుచున్నది. ఇంకను ఈనాళము నోరు, సప్తపథ, పొట్ట ప్రవేశముల కలిగియున్నది. పశువు పొడవు ఒకగజమైనతొడల ఆహారనాళము యొక్క పొడవు 20 గజములుండును. ఈనాళమునకు స్పర్శజ్ఞానమెక్కువగానుండి గొంతుకకు ఎడమప్రక్కగానుండును. మేత నీరు దానిగుండా పోవుచుండును.

ప్రేవులు (Intestines)

జీర్ణశోశమునకు మొదటిపేగునకు మధ్య కంతమేర్పడి మొదటి పేగునుండి ముడి వరకు పేగుండును. పశువుజీవా మొంతపొడవుండునో అంతవరకు 20 నుంచి 25 రెట్లు పొడవుగల పేగుండునని పశుశాస్త్రజ్ఞులు తెలుపుచున్నారు. పేగులోపలపొర తడిచర్మముతోను, పైపొర కండరములతోను జేయబడియున్నది. కండరభాగములు గుండ్రముగ

పొడవుగనుండును. శేగులు ముడతలుపడి పాముచుట్టలవలె చుట్టుకొని కొదినలములో నిమిడియున్నట్లు చేయబడియున్నవి. ఇంక నీశేగులలో గ్రంధులు, వెండ్రుకలవంటి సన్నని గొట్టములు వేలకొలదిగా నుండును. పశువు శేదసరిగావేయక మలబద్ధకముగా నున్నపుడు శేగులలో వ్యాధియున్నదని గ్రహించవలెను.

పెద్దశేగు (The large intestine)

ఈశేగు చిన్నశేగువలె చుట్టగానూడక పలముకొరముగా నుండును. దీని లోపలిపార తడిగొమ్మలతోను వెహ కంఠముతోను చేరుడియున్నది. శీర్షము పదారములో మిగిలిపట్టి శరీరమున వుపయోగించునట్టి పదార్థమునంతను ఎక్కువ పటిని పెద్దశేగు గ్రహింతును. ఇంకనిది చిన్నశేగుకంటె బావుగానుండును. శేద సులభముగా బయలువెడలుటకు గాను పెద్దశేవులోని తడిచర్మము జీర్ణమవటికి పదారము కలిగించును. పెద్దశేగుయొక్క కడపటి భాగమునకు పుష్కలనాళమునీశేగు. పెద్దశేగు 35 అడుగుల పొడవుండును.

చిన్నశేగులు (The small intestine)

ఇవి పాముచుట్టలవలె చుట్టుకొని కొదినలములో ఇమిడియుండును. జీర్ణాశయములోవలె దీనిలోకూడ పారలుండును. ఈ పాళలలో గ్రంధులుండి న్రవసాధికముగా న్రవించుచుండును. వీటిలోపలనుండు పారతడి చర్మముతో చేయబడి గ్రంధులతో కూడియుండును. ఇంకను శ్రేవులు ముడతలు పడుటకు తగిన గ్రంధులును, వెండ్రుకల వంటి సన్నని వేలకొలది గొట్టములుండును. చిన్నశేగుల పొడవు 130 నుంచి 150 అడుగులవరకుండును. రెండంగుళముల మధ్యకొలత యుండును.

జీర్ణరసములు

చక్కెరపదారములు:—ఇవి ఆహారములో తక్కువగానున్నచో రక్తవృద్ధి, శ్వాస, జీర్ణశక్తి మున్నగునవి సరిగా పనిచేయజాలవు. ఇంకను పిండిపదార్థములుగామారిప వెంటనే రక్తములో ప్రవేశించుచున్నవి. పశువు నెమరువేసిన మేత ఆరలపొట్టలోజేరి నారవంటి పదార్థముగానై ఆరలమధ్య జేరియుండును. మృదువైనది నీటిలో కలిపి నాలుగవపొట్టలోనికి జేరును.

క్షారరసము:—పైస చెప్పబడిన నాలుగవ తిత్తిలో నుత్పత్తియగు క్షారరసము యొక్క సహాయముచేత ఉమ్మి పటివలన జీర్ణింపగా మిగిలిన పిండిపదార్థములును, మాంసకృత్తులును జీర్ణముకొని శ్రోమృష్పదార్థములును నాలుగవ తిత్తిలోనుండి ఈ కోశము చివరయందుండు కంఠద్వారముగుండ మొదటి భాగములోనికి ప్రవేశించును.

పైత్యరసము:— ఇది కార్జముగావుట్టును. కార్జము రక్తమునుండి కొన్ని పదార్థములను దీసికొని వానిని పైత్యరసముగా మార్చుచున్నది. ఇది ఈరసము కొవ్వుపదార్థములను జీర్ణముచేయుటలో మధురరసమునకు సహాయపడి విశేషముకూడ చేయుచును.

మధురరసము:— పితౄశయమునుండి బయలుదేరు పైత్యరసము మధురవాహిక అనెడి అవయవముచేత ఉత్పత్తిచేయబడిన మధురరసము రెండుగొట్టములగుండా మొదటి దానిలోఁగిజేరి అచ్చటజేరియుండు మాంసకృత్తులుపిండి లవణపదార్థములు రక్తములో జేరుచున్నవి. మిగిలిన పదార్థములు ప్రేగులగుండ బారిపోవుచు అందుండెడి మంచినదార్థములను రక్తములోనికి తీసికొనిపోవుచు మిగిలిన పదార్థములను విడచుచుండును.

జీర్ణరసము:— ఇది ఆహారశోశములోని జీతరసగ్రంథులవలన మారుచు మాంసకృత్తులను కరగించి గంజిపంటి పదార్థముగా మారుచుండును.

అంత్రరసము:— ప్రేవులయందుండు తడి చర్లమునందు కొన్ని గ్రంథులుండును. అగ్రంథులు అంత్రరసమును ఒకపదార్థమును తయారుజేయును. ఈపనితో జీర్ణముముగియును. అన్ని పదార్థములను కరుగజేయును.

కార్జము (The liver)

ఇది పశువు మడిదొక్కలో మడివైపుననుండి తెలుపురంగుగా నుండును. దానిపైన కఠినమగు పొర క్రమ్మకొని యుండును. దీనియందు పైత్యరసము తయారగును. ఈ పైత్యరసము పనువురంగు గలిగిన ఆకుపచ్చగానుండును. ఇది పులుపు పదార్థములకు వ్యతిరేక గుణములు కలిగియుండును. కాలేయము చేయుపని మరొకటిగలదు. విషపదార్థములను పశువు మ్రింగునపుడు ఇది కాపాడి అట్టి పదార్థములు రక్తములో చేరకుండ నాళసము చేయును. ఇంకను యిది రక్తమును పరిశోధించి దాని యందుండెడి విషమును పట్టుకొని రక్తమును విడచుచుండును. కార్జము 12 పానుల బరువుండును.

పైత్యపుత్తి (Gall bladder)

కార్జములోని పైత్యపుత్తియు రక్తకేశ నాళికలలోనుండి తమకు కావలసిన పదార్థములను తీసికొని తమలో చేయబడిన లవణములతోను రంగులతోను చేర్చి పైత్యరసమును చేసి కణములనుండి చిన్నకాలువగుండ పైత్యపుత్తికి పంపించి అచ్చట నిలువ చేయును. పైత్యపుత్తి 5 లేక 6 అంగుళముల పొడవుండును.

సీహము (The Spleen)

దీనినే మెడగుండెయందురు. ఇది కాలేయమునకంటె పలుచగ నున్నపుక నుండును. గొట్టములులేని గ్రంథులలో నిదియే పెద్దది. దీని ప్రభాగమున చిగువగు తెలుపు పొర క్రమ్మకొని యుండును. ఇది దొక్కలో ఎడమభాగముననుండును. ఇది మెత్తగా

అంటురోగములు తగ్గవరకు చచ్చి పుట్టురాదు.

నుండు స్పృశవంటి పదార్థముతో చేయబడును. పశువు మేతమేసిన తరువాత పెద్దదిగా నగును. ఆహారము జీర్ణమైన తరువాత చిన్నదగును. జీర్ణరసములు పనిచేయునపుడు చిన్నదిగానుండి అవి పనిచేయుక నిలచినపుడు చిన్నదగును. వీరమును మనముకొని పరిక్షించినచో నారవంటి పదార్థముతో చేయబడిన గొట్టములలోపల వ్యాపించియున్నట్లు కనపడును. ఈ గొట్టములమధ్యనున్న ఖాళీసలములు గుంజావంటి పదార్థముతో నింపబడి యుండును ఈ గుంజాపదార్థమునకే నేరడీగుంజా అందురు. ఇది దోమ్మ మున్నగు రోగములు సంభవించినపుడు ఆ విషమువలన జీహమున కపాముమురాకుండ కాపాడును. ఈ కారణముచేతనే విషాడ్యము సంభవించి చనిపోయిన పశువు వీరము పెచ్చి యుండును. వీరము 2 పానులబరువు 20 అంగుళముల పొడవు 6 అంగుళముల వెడల్పు 1 అంగుళము మందముయుండును.

రక్తప్రసరణ మండలము (Circulation of blood)

పశువు రక్తము జలము వలె ప్రవహించెడి ద్రవపదార్థము. ఇది జలముకంటె చిక్కినను బరువుగనుఉండును. దీనియందనేక పదార్థములు తేలుచుండును. రక్తము నందు నీరు ఖనిజపదార్థములు బొగ్గుసంబంధమగు పదార్థములు ఉండును. ఇంకను ఎర్ర కణములు, తెల్లకణములని రెండురకములుండును.


ఎర్రకణములు (Red corpuscles)

రక్తము ప్లాస్మామాయను పేరుగల పలుచని శుభ్రమైన పదార్థమును కలిగి యున్నది. ఈ ప్లాస్మా (Plasma) లో చిన్నవగు కణములుండును. రక్తకణములు రెండురకములు. మొదటివి ఎర్రకణములందురు. ఈ కణములు గుండ్రముగను చిగురుగను మధ్యభాగము సలుచగను చుట్టును దళిరిగను ఉండును. ఈకణములలో ఇనుము అను లోహముండును. ప్రాణవాయువుతో సమ్మేళనమందిన యీఇనుము పశువులోపలికి వీల్చు గాలిలోని ప్రాణవాయువును గ్రహించుకొని శరీరమంతటను సంచారముచేయుచు దేహోష్ణమును నిలుపుచు ప్రాణములను కాపాడును. ఈ ఎర్రకణములలో ఇనుమును లోహపదార్థముండుటవలననే రక్తములోకూడ ఈపదార్థముండును. ఇవి రక్తముతో కొట్టుకొనిపోవునపుడు నాణెముల దొంతరలవలె నేర్పడి ప్రవాహ వేగమువలన ఒకదాని నొకటి త్రోసికొనును వాని యాకారమును మార్పుకొనుచు తిరిగి వెనుకటినితని బొందు చుండును. రక్తములో ఈ ఎర్రకణములు 50 లక్షలవరకుండును.

తెల్లకణములు (White Corpuscles)

ఇవి ఎర్రకణములకంటె కొంచెము పెద్దవిగానుండును. వాటంతటనియే జీవించి యున్నంతవఱకు వాటియాకారము మార్పుకొనుచుండును. ఈకణములలో పశువుపచ్చని పదార్థముండును. ఆపదార్థమునే హెమోగ్లోబిను అందురు. ఇది ప్రాణవాయువును

వీల్చుకొని టిన్యూలకిచ్చుచుండును. ఈకణములు గొప్ప వైద్యనివంటివి. పురుగులుగాని అశ్యపదార్థములుగాని రక్తములో చేరినపుడు ఈకణములు వాటిని అడ్డగించి నిర్మూలము చేయును. దెబ్బలుగిగిలిన గాయములవెంట నెక్కురు కారునపుడు ఈకణము



1. రక్తప్రసరణము డెలము 2. తలలోని రక్తనాళములు 3. గుండె 4. అహార శోభములోని రక్తనాళములు 5. ప్రేగులలోని రక్తనాళములు 6. కాళ్ళలోని రక్తనాళము.

లచటికిపోయి మార్గనిశోధముచేసి నెమ్మదిగ వ్రుండను మాన్పును. శరీరమందు విషపదార్థము లెక్కువగయున్న ఈకణములకు బలముతగ్గును. ఎఱ్ఱకణములకంటె తెల్లకణములు చాలా తక్కువగానుండును. అనగా నూటికి 2 నుంచి 10 వరకు యుండును.

హృదయము లేక గుండె (The Heart)

ఇది గోళురపు ఆకారముగా బోలెన కండరములు కలిగిన అవయవమైయున్నది. హృదయమును ఆవరించుకొని హృత్కోశము (Pericardium) అనబడుతోలునంది యొకటి యుండును. హృత్కోశము గుండెపై సంరక్షణ నిమిత్తముండుటయేగాక దాని యందుఊరెడు ఒకవిధమైన ద్రవ్యమువలన గుండెలు కొట్టుకొనునపుడు రాపిడిలేకుండ జేయును. గుండెకాయ శ్వాసకోశముల రెంటి మధ్యను, క్రింది భాగమున రొమ్మము కడు సమీపమున ఎడమ ప్రక్కను, నేలొడుచుండును. దాని వెడల్పును భాగము కొంచెము కుడివైపుగా విడిచియుండును. మొత్తము భాగము ఎడమవైపున క్రిందికి యుండును.

గుండెకు రెండు ప్రక్కలను హృత్కోశము అంటుకొనును. హృదయము నాలుగు గదులుగా విభజించబడినది. వుడి ఎడమ కలి కలు పైభాగమునకు, వుడి ఎడమ జతరికలు క్రిందిభాగమునకు యుండును. ఈగుండె ముడుచుకొనుట వలనను, తెరుచుకొనుట వలనను యీ గుండెలోనున్న నెత్తురు శరీరములోనున్న అన్ని అవయవములలోనికి పోవును. ఈ గుండెకు గదులుండుటవలననే రక్తప్రసరణ జరుగుచున్నది. హృదయము ఉబికినపుడు రక్తమునిరలలోనుంచి ధమనులలోనికి పోవును. హృదయము ముడుచుకొనునపుడు రక్తము జతరికలలోనించి ధమనులలోనికి పోవును. గుండెబరుపు 4 నుంచి 5 పానులవరకు వుండును.

ధమనులు, నిరలులోని రక్తము

ధమనులలో నుంచి రక్తము ప్రవహించును. నిరలలో చెడురక్తము ప్రవహించును. రక్తము ప్రవహించునపుడు అన్ని వాహికలలోని జీర్ణించిన పదార్థమును, ఊపిరితిత్తులలోని ప్రాణవాయువును తీసికొనిపోయి శరీరమునందు శ్రుతిభాగమునకు సరిపమానముగా పండును. అదియునుగాక టిన్యూలనుంచి మూత్రపిండములకు బహిష్కరింపబడును. మరియు ఊపిరితిత్తులనుంచి ఆపరిశుద్ధవాయువునుకూడ బహిష్కరించును. రక్తముచేత తీసికొనబడిన ప్రాణవాయువు శరీరములో నున్న టిన్యూలన్నిటికి సమానముగా తీసికొని వెళ్లును. ఆటిన్యూ (Tissues) లలో ప్రాణవాయువు చెడిపోయిన పదార్థములను కాల్చివేయును. కాల్చివేయగా ఆప్రాణవాయువు అంగారజ్ఞు రవాయువుగా మారి పోయి ఊపిరితిత్తులలోనికి తీసికొనిపోబడి బైటికి విడువబడును. ఇదివరకు టిన్యూలలో ప్రాణవాయువుచే కాల్చబడిన చెడుపదార్థములు నుంచి రక్తముతో వేరుచేయబడి మూత్రపిండములోనికి పంపబడి మూత్రరూపముగా బైటికి పోవును.

కొద్దిసేపును కొద్ది చెడుపదార్థమును చెమటరూపముగా శరీరములోనుంచి బైటకి పోవును. రక్తసాళములలో రక్తము రెండువిధములుగా ప్రవహించును. 1 క్వాసకోశసంబంధమైన ప్రవాహము. 2 క్రమ ప్రకారమైన ప్రవాహము. మొదటి దానిలో రక్తము హృదయమునుండి ఊపిరితిత్తులకు మరల చెనుకకు ప్రవహించును. రెండవదానిలో రక్తము హృదయమునుంచి శరీరములోనున్న టిన్యూలన్నిటికి (ఊపిరితిత్తులలోని టిన్యూలకప్పు) మరల హృదయమునకు ప్రవహించును క్వాసకోశసంబంధమైన ప్రవాహములో మడిజరకలోని రక్తము ప్రప్రథమములోనికిన్ని తరువాత ఊపిరితిత్తులలోనికి పుపుసనిరలచే గుమి కూడబడును. తరువాత పుపుసనిరలచే (Pulmonary veins) లేబడిన రక్తము యెడను కర్లికలోనికి పోవును. ఈ ఎడమకర్లికలోనుంచి ఎడమ జఠరకలోనికిన్ని, తరువాత బృహద్ధమని (Aorta) లోనికిని పంపబడును. అనగా క్రమప్రకారమైన ప్రవాహము లోనికిని తరువాత శరీరములోని టిన్యూలకును, ఈ టిన్యూలనుంచి రక్తము క్రమక్రమముగా నిరలలోనికిని, తరుపరి మడిజరక లోనికి తిరిగి వచ్చును. ఈ మడిజరకలోనుండి అది మడి జఠరకలోనికిని తరువాత నది పుపుసధమనిలోనికి కొట్టబడును.

ధమనులు, సిరలు (Arteries, Veins)

ధమనులు మిక్కిలి దృఢముగా, రబ్బరువలె సాగునవిగనుండును. ఇంక నివి మృదువైన గోడలను కలిగియుండును. ఇవి హృదయమునుండి శరీరములోని వివిధభాగములకు రక్తము తీసికొనిపోవుటకు ఉపయోగించుచున్నవి. ధమనులు ఎల్లప్పుడు రక్తముతో నిండి ఉలికినట్లుండును. సాధారణముగా ఎక్కువ రక్తము ఈ ఉలికిని ధమనులలోనికి పంపబడినయెడల హృదయము కొట్టుకొనునపుడును ఈ ధమనులయొక్క గోడల మృదుత్వముచే అవి ఉలుకును. ఈ ఉలుకునకే “హృదయపు చెప్పు” యనబడును. కొన్ని పెద్ద ధమనికలలో చర్మముక్రింద “నాడి” యుండును.

సిరలు పలుచనిగోడలను కలిగి రక్తమును టిన్యూలనుండి హృదయమునకు తీసికొని పోవును. కాలిభాగములోనున్న ఎక్కువ సిరలు మూతలు కలిగియుండును. ఈమూతలు బండుటవలన సిరలలోని రక్తము ఒకేచోటములోనికి పారుదలగుటకు వీలుండును. ఒకే చోటమున గుండెకు ధమనులను సిరలను కలుపు కేళనాలికలను నన్నవి కలుపునన్నవి. ఈ కేళనాలికలయొక్క గోడలు పలుచగా మృదువుగానుండును. కొన్ని కేళనాలికలు గలసిన ఒక టిన్యూ తయారగును. ఈ కేళనాలికల గోడలద్వారా ప్రాణవాయువు తీర్చిందిన యాహారము రక్తమునుంచి టిన్యూలకుపోవును. అప్పుడే టిన్యూలలోనున్న బొగ్గుపులునుగాలి చెడుపదార్థములు రక్తమతీసికొని చెడురక్తముగా నగుచున్నది. ప్రాణ వాయువు చెడురక్తముతో వీల్చుబడి బొగ్గుపులునుగాలి బైటకు విడిచిపెట్టబడును.

రక్తప్రసరణము

క్వాసాశయధమని చెడురక్తమును కలిగియున్నది. ఈ ధమని మడిజరమునుంచి ఊపిరితిత్తులలోనికి శుద్ధిపరచుటకు చెడురక్తమును తీసికొనిపోవును. ఆరక్తము హృదయ

మును దాటగనే రెండు భాగములుగా విభజింపబడును. ఒకభాగము కుడిఊపిరితిత్తి లోనికి మరియొక భాగము ఎడమ ఊపిరితిత్తి (left lung) లోనికిపోయి అచ్చటనుంచి చిన్న చిన్న రక్తనాళములుగా విభజింపబడి కేళనాలికలగువరకు పోవును. తుదకు వాయు గోళములచుట్టు ఈరక్తనాళములు తయారగును. ఈరీతిగా రక్తము ప్రాణవాయువుతో సంబంధించును. తరువాత ప్రాణవాయువును ఊపిరితిత్తులు తీసికొని బొగ్గుపులునుగాలిని తడిచెన్నును ఇచ్చట కేళనాలికల గోడలవద్ద జరుగును. ఈరీతిగా పరిశుభ్రము చేయబడిన రక్తము సిరలగుండా క్యాసకాళములలో తయారగును. తదుపరి పరిశుభ్రమైన రక్తము ఎడమ కిరీకలోనికి తీసికొనిపోవును. ఎడమ కిరీకనుంచి పరిశుభ్రమైన రక్తమును బృహదమని శరీరములోనున్న టిన్యూలకన్నిటికి పంపబడును. ఆటిన్యూలకు రక్తము ప్రాణవాయువు నిచ్చి వాటినుంచి బొగ్గుపులునుగాలిచే చెడురక్తముగా తయారగును. బృహదమని ఒక పెద్ద రక్తనాళము. ఇది ఎడమ జిరీకనుంచి పరిశుభ్రమైన రక్తమును తీసికొనిపోయి శరీరమున కంతకును వ్యాపింపజేయును.

నాడి (Pulse)

వైద్యులు పశువుశరీరాలోగ్యమును తెలిసికొనుటకు తోకమట్టుకిందను, దాడ వద్దను చేతితోపట్టుకొని చూచుచురు. ఇట్లు పట్టుకొనునపుడు చేతికి ఒకవిధమైన శబ్దము తట్టును. ఇట్టిచలనము ధతునలగోడ లుబ్బుట వలనను, తిరిగి యధానీతిని పొందుట వలనను కలుగుచున్నది. దీనినే నాడియందురు.

చురుకైన రక్తప్రసరణమువలన లాభములు:—

శరీరమండ్రుట్టు కల్పవృక్షాధిమూలములు త్వరగా విసర్జింపబడును.


శరీరమందు అధికముగానుండు క్రొవ్వు కరిగిపోవును.

కండరములకు పోషణ బాగుగా జరిగి అవి బలముగను గట్టిగను పెద్దవిగను వృద్ధి పొందును.

శరీరావయవము లన్నియు నుంచి రక్తమును నుంచి పోషణనుపొంది ఆలోగ్యస్థితి యందుండి వాటివాటి పనులను సరిగా చేసికొనగలుగును.

రక్తమెందుకు ప్రసరణ చేయవలయును?

పశువు శరీరమందలి టిన్యూలు (Tissues) పోషింప గలుగుటకు కావలసిన పదార్థమంతయు రక్తమువలననే కొనిపోబడుచున్నది. ఈ టిన్యూలకు కావలసిన యాహారమును తీసికొని వచ్చుటకు రక్తము, పశువు తినెడి ఆహారమును జీర్ణింపజేయు అవయవములగుండను గాలిలోనుండి ప్రాణవాయువును తీసికొనివచ్చుటకు క్యాసాళములు (Lungs) గుండను, ప్రయాణము చేయవలసియున్నది. ఇంతేగాక శరీరమందలి



1. హృదయము 2. ఊపిరితిత్తులు 3. కుడిభాగపు ఊపిరితిత్తిపైభాగము 4. కుడి భాగపు ఊపిరితిత్తి లోపలిభాగము 5. ఎడమభాగపు ఊపిరితిత్తిపైభాగము 6. ఎడమ భాగపు ఊపిరితిత్తిలోపలిభాగము 7. కార్డము, వైర్మపుతిత్తి 8. క్వీసకేశము, క్వీస నాళము 9. కుడివైపు మూత్రపిండముపైభాగము 10. కుడివైపు మూత్రపిండము లోపలి భాగము 11. నెరడి.

కలుషపదార్థములను బయటకు బంపివేయుటకు అట్టి పదార్థములు రయోరుదేయు అవయవముల (చర్మము, మూత్రపిండములు మొదలగువాని) ద్వారా రక్తము ప్రవహించవలసియున్నది. కావున రక్తము శరీరమంతయు ప్రయాణము చేయవలసిన విధి ఏర్పడుచున్నది. రక్తప్రసరణమునకు సాధనమైనవి గుండె, ధమనములు, కేశనాళికలు, సిరలు. వీని సమూహమునకు రక్తప్రసరణ మండలము (The circulatory system) అని పేరు.

శ్వాసమండలము (The respiratory system)

ఊపిరితిత్తులు (The Lungs)

హృదయపూర్వమునెడి గాలివొచ్చిపెట్టెలో శ్వాసశయము విడిచియున్నది. ఈపెట్టె షెభ్రగమున వెన్నెముకవల్లను, ప్రక్కలయగు ప్రక్కలెముకల (Ribs) వల్లను, ముందుభాగమందు రొమ్మెముక (Sternum) వల్లను ఆవరింపబడినది. ఈ షుహరమందు హృదయము అక్రమించుకొనిన భాగముగాక తక్కినవంతయు ఊపిరితిత్తులు అక్రమించుకొని వుడివెల్పున నొకటియు, నెడమవెల్పున నొకటియు నుండును. వీని పీక రెండుగా చీలుచోట కలిసి ద్రవసహితమైన తెల్లని పారదేత క్రమ్ముబడియుండును. వీనిలో అడుగుపార తిత్తులనంటియుండును. ఇవి కమ్మునని కొలిమితిత్తులవలె నుండును. ఈ ఊపిరితిత్తులలో రక్తకేశనాళికలు, గాలిగొట్టములును, రబ్బరవంటి మాంసపదార్థములు నుండును. ఇవి బహిష్కరావయవములలో నొకటి. ఇవి ప్రాణ వాయువును వీల్చును. చెమగాలిని విడిచిపెట్టును. ఊపిరితిత్తులు 75 పానుల బరువు యుండును.

శ్వాసనాళము (Bronchia)

గాలిగొట్టము పశువు దేహములో రెండుగా చీలియుండును. వాయునాళములు కాఖోపకాఖిలుగా ప్రసరించి యుండును. వాయునాళములు ఎల్లప్పుడును వాయువు నిమిత్త మెదురు చూచుచుండును. కాబట్టి వాయునాళములలో ప్రవేశించిన గాలి క్రమముగా వాయునాళముల నిండించును. ఇది పశువు గొంతుకవద్దనుండి ఆరంభమై ఊపిరితిత్తులవద్ద రెండుగాచీలును. శ్వాసనాళము 20 అంగుళములపొడవు 3 అంగుళము వందము 2 అంగుళముల వెడల్పు యుండును.

శ్వాసవద్ధతి

పశువు ముక్కులగుండా కొంతయును, నోటిగుండా కొంతయును, బుర్రముల ముగా కొంతయును ప్రాణవాయువు వీల్చుటకలదు. అది నురుగుదబ్బలలో అనగా ఊపిరితిత్తులలో జేరయుండును. దేహమంతట వ్యాపించి నలుపునగముగా మారియుండు అశుద్ధరక్తము హృదయమునకు నలుపురక్తము తీసికొనిపోవు రక్తనాళముద్వారా, వుడివిలమునుండి ఊపిరితిత్తులలో ప్రవేశించిన నే బుర్రగుండా అచ్చట చేరియుండిన ప్రాణ వాయువు దానిని శుభ్రపరచి యెరుపురంగుగా మార్చును. ఇట్లు అశుద్ధరక్తము శుభ్రము

కాగానే దానిలోని విసర్జన వస్తువులు బటియావిరితోగూడ బుసగుండా వెలుపలికి వచ్చును. శురక్షితముగానుండు పశువులకు నిమిషమునకు 15 మొదలు 18 వరకు క్యాసములు ఆడును. బుస లోపలికిపోయి నురల వెలుపలికి వచ్చునది ఒక క్యాసగా నెంచవలెను.

ఉచ్ఛ్వాసము (Inspiration)

ఉచ్ఛ్వాస నిశ్శ్వాసములద్వారా హృదయకుహరము పెదవగుటకును, ముడుకు కొనుటకును క్యాసముని పేరు. పశువు ప్రక్కయెముకల మధ్యనుండు కండరములలో పై భాగమందలి కండరములు ముడుచుకొనుటవలన ప్రక్కయెముకలు పెరిగెను. పిన్నుట ముడుచుకొనును. ఈరీతిగా హృదయకుహరము పెదవయగును. దీనితోగూడ ఊసిరితిక్తులు పెదవగును. పిన్నుట వాయువు గొట్టములగుండాపోయి ఊసిరితిక్తులను నింపును.

నిశ్శ్వాసము (Expiration)

రబ్బరు సిరిగ లిగియుండిన హృదయకుహరముయొక్క గోడలును, ఊసిరితిక్తులును ముడుచుకొనును. పైనుండు కండరములు యథాస్థితియందుండును. ప్రక్కయెముకలలోపలి కండరములు ముడుచుకొనును. ప్రక్కయెముకలు క్రిందికి దిగివచ్చి హృదయకుహరమును చిన్నదిచేయును. వాయువు గాలి గొట్టములగుండా వెలుపలికి వచ్చును.

నాడీమండలము (The Nervous System)

నాడి అనగా సన్నని నూలుదారములను పోలియుండెడికట్ట. ప్రతిదారము చమురుతో నిండిన సన్నని గొట్టమును పోలియుండును. ఈ చిన్నదారములు చర్మచేషము వలన కట్టబడియున్నవి. ఇదియేనాడి. దీనికి స్వతంత్రముగా ఆడ లున్న కలుగజేయుకక్తి లేదు. పుర్వనాడులు, జ్ఞాననాడులు, చలననాడులు, మిశ్రమనాడులు అను రకములు గలవు. అన్ని ఇంద్రియములనుండి మెదడునకు వార్తలను కొనిపోవు కొన్నినాడులు గలవు. ఇవి శబ్ద, స్పర్శ, రస, రూప, గంధములను మెదడునకుకొని పోవుచు, జ్ఞానమును గలిగించుచుండును. గాన పీనికి జ్ఞాననాడు (Sensory Nerves) అని పేరు.


బాహ్యవ్యాపారము లనుకూలపడెడు ప్రతి కండరమునకు మెదడునుండి ఆజ్ఞలను గొనిపోయి సాధారణముగా అట్టి కండరములయందు చలనమును బుట్టించు నాడులకు చలననాడులు (motor nerves) అందురు.

ఒకప్పుడు నాడులతోనుండు సన్నని దారములయందు జ్ఞాననాడులు, చలననాడులు కూడ కలిసియుండును. ఇట్టి నాడులకు మిశ్రమనాడులు (mixed nerves) అని పేరు. ఇట్టివి కఠిన మందనేకములు గలవు.

జ్వరముతోగలిసిన పశువుమూత్రము పనువుపచ్చగా వేడిగా నుండును.

మెదడు

పశువు మెదడు చనునుగనా, నునుపుగనా ఉండక, మునుకులుపడియుండును. ఇటుండుటవలన రక్తవాహికలనుండి ఎక్కువ రక్తము (సపహించునుండును. అందువలన



1. నాడీమండలము 2, 3 కాళ్లలోని నరములు 4 చెవిలోని నరములు 5 తలలోని నరములు 6 వ స్త్రీకృత ఎడమభాగమునందుండు నరములు 7 మెదడు 8 మెదడులోని నరములు.

వారితోగముగల పశువు పేడి కొంచెము పలుచగా పులుసువాసనగా నుండును.

బోషణపదార్థ మెక్కువగా మెదడు సంపాదించును. మెదటిలో ఒకవిధమైన రసముండును. ఇది యుండుటవలన దెబ్బతిగిలినప్పుడు అంతగా నొప్పికలుగదు. మెదడుబరువు 16 నుంచి 17 బొన్నల బరువుండును.

పెద్దమెదడు (Cerebrum)

ఇది పశువు శిరస్సునందు కపాలకుహరమునం దెక్కువ సలము నాక్రమించుకొనును. ఈ మెదడు లేనియెడల పశువునకు ఆలోచన, జ్ఞాపకశక్తియుండవు. ఇది ఇంద్రియ జ్ఞానమునకు ఆధారము. ఇదిలేనియెడల పశువుచూడలేకు. విసలేదు. వాసనయు రుచియు తెలియదు స్ఫుర్భజానము కలుగదు. ఇంక నిద్రలేనియెడల శరీరమందలి కండరములను చలించునటుల చేయలేదు.

చిన్నమెదడు (Cerebellum)

ఇది పెద్దమెదడుకంటె చిన్నది. ఇది నడిపించుటకును, పరుగెత్తించుటకును సహాయపడును. ఇది చెడిపోయినయెడల పక్షవాతము కలుగును.

మజ్జాముఖము (Medulla oblongata)

దీనిని వెన్నుపాముయొక్క అంతుపాటి మొదలని చెప్పవచ్చును. దీనికి అపాయము కలిగినవెంటనే మరణము సంభవించును. ఊపిరితిత్తులయొక్కయు, హృదయముయొక్కయు, కండరములును, మేతదీనులును మ్రింగునపుడు చలించునట్టి కండరములును దీనియొక్క ఆజ్ఞవలననే పనిచేయుచుండును.

వెన్నుపాము (The spinal cord)

ఇది వెన్నుముక పైటెలోనుంచుబడి దెబ్బతిగులకుండ భద్రపరచబడియుండును. దీనిలో కొన్నిరకముల పదార్థములుండును. ఇది లేనియెడల ఇంద్రియ జ్ఞానము, ఇచ్ఛాధీనమైన చలనము కలుగదు. మెదడునకున్న, మెదడునుండి పోవు జ్ఞానవార్తలును, చలనవార్తలును దీనిగుండా బోనిచ్చునది. ఇది 65 లేక 67 అంగుళములపొడవు. 16 లేక 17 బొన్నల బరువుయుండును.

మూత్రపిండములు (Kidneys)

ఇవి పశువువెన్నుత్రాసలకును, లోంటియెముకలకును నడుమగా వెన్నెముకకు ఇరుప్రక్కలను చెరియొకటియు నుండును. మూత్రపిండమును బ్రద్దలుగా కొనిచూచినయెడల విస్తార రక్తనాళములుండి యెరుపుంగుగా నుండును. ప్రతిపిండముయొక్కలోపలిభాగము పల్లముగానుండి వెలుపలికి ఉబ్బెత్తుగా నుండును. ప్రతి పిండముయొక్కగుంట భాగమందుండియు మూత్రనాళమును ఒక గొట్టముండును. మూత్రపిండములు మూత్రమును తయారుచేయును.

మలబద్దకముగల పశువుపేద గట్టిగా నుండును.

రక్తములోనుండి మూత్రమును తీసికొని రెండుగొట్టముల ద్వారా శుచ్యబుడ్డలోనికి పూపుట వీరియుక్త్యోగమై యున్నది. ఈరెండు గొట్టములగుండా మూత్రము బొట్టుగొట్టుగా శుచ్యగుండములోనికి పడుచుండును. మూత్రపిండములు రక్తమును శుభ్రముచేయును. చేపవలెనుండును, పశువుబాగుగా కష్టించి పనిచేయు నపుడును, రక్తములోనివిరు దెనుటయాపమున చర్మమువలన తీసివేయబడును. అప్పుడందుచే మూత్ర పిండముల పని తక్కువగా నుండును. మూత్రపిండములు 20 లేక 25 బొన్సులబరువును, బుడి పిండము 3 అంగుళములుండి 4 అంగుళములపొడవు 3 అంగుళముల వెడల్పును, ఎడమపిండము ఒకటి రెండుగుళములుండును. పుష్కలముల బరువు 10 లేక 12 బొన్సుల బరువుండును. పుష్కలములు 10 అంగుళములుండును.

మూత్రకోశము (Urethra)

ఇది అసలము వద్దనుండు పుష్కలమునకు దగ్గరగా నుండును. మూత్రముతో నిండియుండిన యెడల నది ఉబ్బియుండును. లేనియెడల తగ్గియుండును. మూత్రకోశము వంపుగా నుండును. అందువలన శిశుమేహవాతము సోకినపుడు కడీ యెక్కిండుటకు అవంకర యుండుటవలన వీలులేదు. శస్త్రము చేయవలసి వచ్చినయెడల వంపుదగ్గరనే చేయవలెను. మూత్రకోశము పొడవు 3 అడుగుల పొడవు యుండును.



పశురోగ విజ్ఞానము

పదియవభాగము

శ్లో॥ నమామి ధన్వంతరిమాదిదేవం సురాసురైర్వన్దితపాదపద్మమ్॥
లోకేజరారుగ్భయమృత్యునాశందాతారమీశంవివిధౌషధీనామ్॥

“చరకసంహిత”

అక్షిపురుషుడైనట్టియు, దేవతల చేతను, రాక్షసుల చేతను నమస్కరింపబడిన పాద పద్మములుగలిగినట్టియు, లోకమునందు వృద్ధాప్యముయొక్కయు, శోగములయొక్కయు భయమును, మృత్యువును నశింపజేసినట్టియు, సమస్త ఓషధులయొక్క జ్ఞానమునిచ్చినట్టియు, ప్రభువైనట్టియు ధన్వంతరిని ప్రార్థించుచున్నాడ.

ప్రాచీన ఆయుర్వేద పశువైద్య చరిత్ర

ఇటీవలనేను ఇండియా గవర్నమెంటు ఎగ్రికల్చరల్ సర్పిలైవ్ స్టాఫుకమిటీ మీటింగునకు ఢిల్లీపోయినపుడు ఈదిగువ వృత్తచరిత్రను ఇండియా గవర్నమెంటువారు పశువైద్య పత్రికలో ప్రకటించగా ప్రకటించుచున్నాను. భారతీయుల సకలవిజ్ఞాన శాస్త్రములకు నేడములు మూలాధారములు. పాశ్చాత్యహైందవులనుండి పెక్కువిషయములు తెలిసికొనిరనిన యతిశయోక్తికానేరదు. కాని క్రమక్రమముగా నేడములలోని విషయములు స్వయముగా గ్రహించి వ్యాపింపజేయుట యచుగంటినది. రానురాను పెక్కువిషయములను గ్రీకులు, ఫ్రెంచివారు, ఆంగ్లేయులు, జర్మనులు ప్రచురించిన గ్రంథములనుండి మనవారు నేర్చుకొని తుదకు ఈవిజ్ఞానమంతటికి నేడములే ప్రమాణగ్రంథము అని గ్రహించి వానికి తగిన గౌరవమిచ్చుట తమవిధియని గ్రహించుచున్నారు.

ఆయుర్వేదములో మానవులకు సంబంధించిన వైద్యవిషయములను, పశువైద్య విషయములునుగలవు. ఆయుర్వేదము ప్రత్యేకముగా మానవులకు వచ్చురోగములు వాని చికిత్సనుగురించి మాత్రమేలేదు. దానిలో పశువైద్య విషయములు పూర్తిగా వివరింపబడినవి. జంతువుల అనీపంజరము, వానిలక్షణములు, రోగములు, వానిచికిత్స, మొదలగు పెక్కువిషయములుగలవు. ఇవిగాక పశుశరీరశాస్త్రము, ప్రతిజ్వరముల లక్షణములు, కొమ్ములు, చర్మము, తోక, కన్నులు, చెవులు, డెక్కలు, నోరు, ముక్కురంధ్రములు, గంగడ్డోలు మొదలగునవియును, పశువులకు కలిగిడు రోగములు వాని చికిత్సావిధానము మొదలగునవియునుగలవు.

ప్రతిజంతువును మనము జాగ్రత్తగా పరీక్షించుచుండినచో స్వభావసిద్ధిముగ కొన్ని రోగములను తుడుర్చుకొను జ్ఞానము వానికి సహజముగ భగవంతునిచే కలుగ జేయబడినదని గ్రహింపగలము. వాంతిచేసికొనుటకు కొంచెము కొంచెముగా గడితిని వాంతి చేసికొనును. కడుపునొప్పి పోగొట్టుకొనుటకు కొన్ని చెట్లయాకులను భుజించును. అదేవిధముగా లేళ్ళు, దుప్పలు గాయములు మాన్చుకొనుటకు కొన్ని చెట్ల ఆకులను రాచుకొనును. కొన్ని జంతువులు వైద్యమున దుపయోగించు ఆకులను మూలికలను ఇతర చెట్లఆకులనుండి వేరుచేయగలవు. మేకలు వైద్యమునకు పనికివచ్చు కొన్ని యాకులు, వేస్సు గ్రహింపగలిగినట్లు మన పూర్వగ్రంథములలో గలవు. ఆర్యులు మన దేశములోనికి వచ్చినప్పటినుండి పశుశస్త్రచికిత్స విరివిగానున్నట్లు తెలియుచున్నది. పూర్వపురోజాలలో యుద్ధమే పరమావధిగా నెంచబడుచుండెడిది. యుద్ధములో గుఱ్ఱములకును, ఏనుగులకును సైనికులకును ఆస్త్రశస్త్రములవలన కలిగిన గాయములకు కట్టు కట్టుటకును, చికిత్స చేయుటకును మన పూర్వులు పశువైద్య విద్య నేర్చియుండెడివారు. చారిత్రక విషయములనుబట్టిచూడ హిందూదేశములో పశువైద్యమునుగూర్చిన విద్య ఋగ్వేదకాలమునుండి అనుస్వరముగా కొద్దిగనో గొప్పగనో వ్యాప్తిలోనున్నట్లు కన్పట్టుచున్నది. ఋగ్వేదకాలము 200-1400 బి. సి. రాసురాను, హిందూదేశములో పూర్వ విజ్ఞాన మడుగంటుచున్నది. బౌద్ధయుగమువాడు ఏవిధమైన జంతువధ చేయబడలేదు. జంతువుల కేవిధమైన బాధకలుగలేదు. ప్రజలను జంతువులను వైద్యకాలము వానికి సంబంధించిన పాఠకాలము నాపించుట జరిగినది. ఆరోగ్యచక్రవర్తికాలములో పశు వైద్యము చాలా ప్రబలముగానుండెను. ఆకాలమున తక్షశిలలోగల వైద్యపాఠశాలలు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిని బడసినవి.

సుశ్రుతి చరకులు మానవవైద్యమునకెల్ల మేరువడసిరో పశువైద్యమునకు శాలి హోత్ర, పాలకావ్య, అనువారలు ప్రఖ్యాతిబడసిరి. యూరపుఖిండమున గేలకునకు అంత ప్రఖ్యాతిలేదనిన ఆశ్చర్యముకాదు. మహమ్మదీయులు హిందూదేశమునకు వచ్చిన తరువాత యూనానవైద్యము క్రమముగా వృద్ధిపొంది ఆయుర్వేద మడుగంటినది. కాని మన పూర్వులవైద్యజ్ఞానము ఇప్పటికీ శాస్త్రరీతిగావించిన పునాదిపండితని నవీనశాస్త్ర జ్ఞులు చెప్పుచున్నారు. ఇటీవలి పరిశోధనలు గ్రీకు దేశములనుండియును, ఫిజీషియా, క్రీటు, బాబిలోనియా, ఈజిప్టు దేశములనుండియును క్రమముగాసింధులోయలో నివసించు ప్రజలనుండియును విజ్ఞానముసంపాదించినట్లు నూచించుచున్నది. పురాణగాథలతిలకించిన మహాభారతములో రోగవీడితులైన ప్రజలను, పశువులను నిరోధులగు జేయుటకు ఆయుర్వేదమును ప్రజలకు బోధించుటకు బ్రహ్మధన్వంతరిని సృజించినట్లు చక్కని కథగలదు. హిందూ పురాణకథలలోను గ్రీకు పురాణకథలలోను ఒకేవిధమైన కథలుగలవు. దాని వలన గ్రీకులు హిందూదేశము వచ్చినపుడు హైందవ పురాణగాథలనుండి యీకథలను గ్రహించినట్లు తెలిసికొనవలెను. మన పురాణములలో అర్చింపమారల జననము చదివిన తెలియును. గ్రీకుగాథలలో ట్రానోను, పిలిరాయను సముద్ర దేవతను ప్రేమించెను. తన

భార్య కామెయం దనూయలేకుండుటకై యాదేవతప “క్రూరోరస” అను వసుమారుడు కలిగెను. భారవ సగము మువ్వగూపము సగము గుట్టమురూపము కలిగియుండును. మన కథలలోగూడ సంగాదేవిని నూన్యము ప్రేమించునట్లును, నాని తీక్షణుని భరింపజేక గంగాదేవి యాడగుట్టమైనట్లును తగువారే వామె నూన్యనివలసి “నిసత్య, దస్త్ర” లను కవలలను కన్నట్లును ఆశ్వినివసుమారులు ఆయుర్వేదమును ఆ కవలలయందుంచినట్లును కలదు.

క॥ విరటుని పట్టణమందున
వరసహదేవుండు తంత్రిపాలకుడయితా
సురభులకు జేసె నీక్రియ
లరయగ నా చంద్రతారకంబుగ వెలయున్.

“భారతము”

(పథమమున ఇంద్రుడు “దధియాన్వియను” ఋషికి పశువైద్య విద్య నేర్పినట్లును, ఆ ఋషి నాశ్రయించి ఇంద్రుని మోహించి ఆశ్వినివసుమారులు నేర్పుకొన్నట్లును, తరువాత వారే పాండురాజుయొక్క రెండవభార్యయగు మాద్రికి నవలసహదేవులై జన్మించినట్లును భారతములో కలదు.

నీ॥ వంజలనైనను వలనేర్పడగనొక
భంగి జేవగజేసి పాడిగొనగ
బడుగులనైనను బాటించి పరికించి
గోమునమెయి గండక్రొవ్వుచేర
దెవులుగొంటులనైన దీర్చి సంకటముల
కోపిముందటియట్ల రూపునేయ
నట్టిలనైనను ననువైన వెఱువున
ముట్టయంటగబట్టి కట్టి విడువ

ఆ॥ వె॥ బిడుక గడువునేర్ప బెదురువాపగనీరు
మేవుగలుగు నెడల మెలగ వెలవ
మెకమునరయముచ్చు మెలగినగొట్టంగ
నేర్తు బసికి జాలగూర్తునేను.

“భారతము”

ఇంకను పూర్వజన్మములో వీరు ఆశ్వములకు పశువులకు సంబంధించిన సకల విషయములకు గూర్చియు, ఆవులకు గూర్చియు తనకు తెలియునని నకులసహజేవులు విరాటకొలుపుభో జెప్పిరి బ్రహ్మవైవర్త పురాణములో వైద్యక సాంస్కృమను గ్రంథమును నవలకును, “వ్యాధినిర్ధునిమ్న” అను గ్రంథమును సహజేవుడును రచించినట్లు చెప్పబడెను. కాని ఈ గ్రంథములు ప్రచారములో కనపడుటలేదు. శిథిలమై యుండవచ్చును. “అశ్వదిక్ష్వి” అను గ్రంథము నవలకును రచించిన వ్రాత ప్రతిగలదని ఉమేశ చంద్రగుప్తకవిగత్నయను వారు ప్రచురించియుండిరి. ఇదేతీగా నలచక్రవర్తికి అశ్వవిద్య పూర్తక తెలిసియున్నట్లు పురాణములలోగలను. బౌద్ధబౌద్ధ రాజధానిలోగల కొన్ని పుస్తకభాండాగారములగు నలునిచే రచింపబడిన కొన్ని వ్రాతగ్రంథములున్నవి బంగారుగార్ అను వారు తెలిపి యుండిరి. ఈ పురాణవిషయము బాధారము జేసికొని “సర్కార్” పశువైద్యము పురాణమునకు పూర్వమే ప్రాచీనపులకు తెలిసియున్నట్లు చెప్పియుండిరి

1. అశ్వవిద్య, 2. పశువిద్య, 3. హస్తీవిద్య. ఋషి శాలిహాస్రకు బ్రహ్మ వలన తాను విద్యనెట్లు సంపాదించినది; పూర్వము గుఱ్ఱములకు రెక్కలున్నట్లును, ఇంగ్లూ ప్రాంతక శాలిహాస్రకు రెక్కలకు ఛేదించినట్లును మొదలగు విషయములు శాలిహాస్ర శాస్త్రములో వివరింపబడెను. ఇదేవిధముగ పూర్వము ఏనుగులకుకూడ రెక్కలున్నట్లును, దీర్ఘతప ఋషియాశ్రమములో ఏనుగులు చాల వృక్షములను నాశ నము చేసి ఆశ్రమవాసులకు భీతికలిగించుటచేత ఆయన శాపమువలన రెక్కలుపోయి నట్లును గలదు. రోమవాసుని యాశ్రమమున “పాలకౌప్య”యను గొప్పవిద్వాంసుడు గలడు. ఆయన తన పూర్వజన్మము వలన మచ్చిక చేయుట వానిరోగములు పుడుర్చుట మొదలగు విషయములు తెలిసికొనెను. ఆయన హస్తీ ఆయుర్వేద విద్యనేర్చుచుండెడి వాడు.

పశువైద్య ప్రారంభకాలము

చారిత్రకముగ పై విషయముల నూచనలను పునర్వర్ణించుకొని పశువైద్య విషయ ప్రారంభ మెచ్చటయని నిర్ధారణ చేయుట సులభముకాదు. వ్యాధి మానవులయొక్కయు పశువులయొక్కయు ఆయురారోగ్యముల నిర్బంధించుచున్నది. వ్యాధిని అరికట్టుటలోనే వీరి జీవితము సగము వ్యర్థమగుచున్నది. కావున మానవులు ప్రపంచములో నొక ప్రదేశమునుండి మరియొక ప్రదేశమునకు వలసపోవుచుండెడివారు. అట్లు బోవునపుడు వారు జంతుజాలమును, పచ్చికబీడులను విశేషముగా నెక్కడకలవో ఆప్రదేశమునకు బోవుచుండెడివారు. పూర్వపు ఇండోఆర్యులు మధ్య ఆసియాను వదిలి హిందూజాతము నకు వలసవచ్చినపుడు వారి మేకలు గొట్టెలు పశువులను కూడ తీసికొని వచ్చియుండిరి. వారికి తెలిసియుండిన ప్రథమ చికిత్సా విజ్ఞానముతో ఆర్యావర్తమున ప్రవేశించిరి. వీరు వేదములనుండి ప్రథమ విజ్ఞానము సంపాదించియుండిరి.

ఋగ్వేద, యజుర్వేదములలో వారికి వారి జుతువులకు అనగా ఎరులు, మేకలు, గొట్టెలు, గుఱ్ఱములు పశువుల ఆరోగ్యము కాపాడుకొనుటకు సంబంధించిన ప్రార్థనలు తదితరశ్లోకములుగలవు. కాని పూర్వులు పూర్తిగా దేవతలమీద భారమువేసి చికిత్స చేయక యుండివారు. పూర్వులు రోగములు పీశానములవలనను, రాక్షసుల వలనను కలుగునని నమ్మేడివారు. సీసము, నూవంటురాయి, రత్నరేపలు, తాయిత్రులు, రోగముల నివారణనిమిత్తమును, తగులమండుటకును ఉపయోగించెడివారు. ఈ రోజులలోకూడ పాడిపశువులకు దృష్టిదోషమును తొలగించుటకు బ్రాహ్మణ వేయుచుండురు. అధర్వణవేద కాలములో పశుచికిత్సకును, మనుష్యులకును, రోగనివారణమునకు మూలికలు, ఆకులు ఉపయోగించుచుండినట్లు నిదర్శనములుగలవు.

ఒక్కొక్క రోగముకొక్కొక్క మూలికగలదు. అదేవిధముగ పెక్కురోగములకు పెక్కుమూలికలున్నట్లు గ్రంథములవలన తెలియుచున్నది. సోమ, వస్తా, మంజాం, ఆరుంధతి, త్రియంబక, వక్క, వివిష్ట, భేషజ, జంగిడ, మొదలగు నోషధులు ఆ నేక విధములగు వ్యాధులకు పయోగ పడినవని అధర్వణ, యజుర్వేదములలో నున్నట్లు తెలియుచున్నది. ఏని సగము రోగములకు పురుషుడు. ఈ కాలములో సాధారణ ఉపయోగములో నున్న ఓషధులెవ్వి యనగా “గాడిదగడప, వజ్రవల్లి, నేలవేము, బోడతరము, తిప్పీగ, చిత్రమాలము తెలికపండి” మొదలగునవి. వీనిని మన పశువుల కాపరలు అవసరముకొలది ఉపయోగించుచుండురు. ఆవులు గొడ్డుబోతులగుట, అకస్మికముగ వట్టిపోవుట, నెత్తునకు పాలిచ్చుట, పాటలు నేలాడుట, మొదలగు దుర్గుణములు పై సంబంధమని నమ్మేడివారు.

అధర్వణవేదములో శ్రీమిరోగములగుర్చి విస్తారముగాగలదు. కిండ్లు, ముక్కుపండు, ప్రేగులు వీరిలో శ్రీములుచేరి వింతవింత రోగములు కలిగించును. ఇవన్నియు జంతువులకు సాధారణముగ సోపవ్యాధులు. కటురత్న, విక్యగూప, సరంగమార్జున, కుశూచి, మొదలగు శ్రీములు మూత్రతిత్తులలోనుండును. వీటిని నివారించుటవరకు లేని యెడల రోగములను కలిగించును. ఇవిగాక దోమలు, పోగీలు, గోమారులు, ముసకాను ఈగలు పశువులకువట్టి ఆనేక విధముల బాధపెట్టును. ఇట్టివిలేవండ మాడలకాలందు పొగబెట్టు చుండెడివారు. పశువులకు బెణుపులు, గాయములు తగిలినపుడు వానిని వారణోపాయములుగూడ పూర్వగ్రంథములు తెలుపుచున్నవి.

పశువైద్యుల పలుకుబడి

పరాశర సంహితప్రకారము పశువైద్యులకు పూర్వకాలములో మంచి గౌరవము పలుకుబడి యుండిడిది. శాస్త్రజ్ఞానము తగినంత అనుభవము లేక వైద్యము చేయువారిని వండించెడివారు. సంపూర్ణ బాధ్యతవహించి పశువైద్యుడు చికిత్సచేయుమొదల క్షేత్ర పాత్రుడగునని మనుభర్షిశాస్త్రము తెలుపుచున్నది. ఎవరైనను పశువుమొక్క

అవయవములకు గాయములు కలుగజేసినను, నెత్తురు చిమ్మునట్లు గాయపరచినను వారి కుదుర్చుటకగు వ్యయముంతయును హానికలిగించినవారే ధరించవలసి యుండునట్లు మనుధర్మ శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. ఎవరైన నొక ఆవును సంపినయెడల దారిరక్తము పరీక్ష చేసి దానికి రోగమున్నది లేదని తెలిసికొనెడివారు. అట్టిగోవునకు చేయవలసిన కర్మవిధానము వేరుగానుండెడిది. చవిపోయిన జంతువుయొక్క రక్తమును రాతినిదపోసి ఆరక్తమును కుక్కలు కావలు త్రాగినయెడల నాశోగ్యవంతమైనదనియు, త్రాగినయెడల నారక్తము చెడగనియు నిరారణచేసెడివారు. పశువులకొపరి యాధీనమునంగుంచబడిన పశువులను జాగ్రత్తపెట్టవలసిన బాధ్యత పశువులకొపరిని. దారిలో నెదైన పారిపోయినను, ఇతరులు దొంగిలించినను, దానిలోటు భిక్షియును, పశువుల కొపరినిధిగానుండెడిది. ఒకవేళ ఆవుగాని దూడగాని గేదెగాని వారి కావులదలలోనున్న యే పశువుగాని చచ్చిపోయిన యెడల దానితాలూకు చెవులు నోక చర్మము తీసికొనివచ్చి యజమానికి చూపి చలవలసి యుండెడిది. ఇదిగాక సాధారణముగ పశువులకువచ్చు సామాన్య రోగముల కుదుర్చుకొనుటకు తగిన ఒషధులను పశువులకొపరి తెలిసికొని యుండవలెను. ఈవిధముగ పశువులనుగూర్చి జాగ్రత్త తీసికొనబడినట్లు మనువు, పరాశరుడు, ముఖోపాధ్యాయుడు మొదలగు వారివలన తెలియుచున్నది.

శరీరావయవములస్వరూపము

యజ్ఞయాగాదులందును బలులందును పశువులను ఆర్పించెదరు. ఆవయవ స్వరూపము నిర్ణయితమందినాడిగల ఆయుధముతో విడదీయుటలో ఇప్పటి వైద్యులకున్న కాళము పూర్వపువారికిలేదు. వారు మోటుగాచేసెడివారు. కాని యజ్ఞయాగాదులకుపయోగించు పశువును నోరు ముక్కు చెవిమూసి ఊపిరాడకుండకేసి చంపెడివారు. పూర్వము మహాముఖులు దర్భనుమంత్రించి పశువునిద వేసినతోడనే అది అనువును పడలేడిది. పూర్వపు వ్రాతలలో పశువులవిషయమున శరీరములో నేభాగ మెచ్చుట యున్నది, దాని యాకారము హిందువులకు పూర్తిగా తెలిసినటుల కన్పట్టుచున్నది. అర్చకులు బలులు చేయించెడివారు. వారు కొయుటయందు నిపుణతకలవారే ఏర్పరచెడివారు. తమిలి ఎటు జరుపవలెనో, శరీరవయవముల నెటు విడదీయవలెనో అధగ్రహవేద, ఆత్రేయబ్రాహ్మణ, యజుర్వేద, తైత్తిరీయ, శతపథబ్రాహ్మణ, వాజసనీయ సంహిత, మైత్రేయసంహిత, మొదలగువానియందు వ్రాయబడినది. పశువుయొక్క ప్రతి అవయవము, దానివర్ణము, అభాగమే దేవతను ప్రీతియో, దేని కర్పించవలెనో వ్రాయబడినది. బాహ్యదృష్టివలననే చాలాభాగాములు గోచరించుచుండును. నోరు, రిల, కన్నులు, చెవులు, కాళ్లు ఇవిగాక క్వాసనాళము, ఊపిరితిత్తులు, పెద్దమెదడు, మిశ్రమనాడులు, కార్జము, పైత్యపుతిత్తి, ప్లేహము, పంగియున్న ఎముకలు, రక్త ప్రసరణమార్గములు, గొంతుమార్గము మొదలగునవి యెచ్చట యెట్లుండవలసినంతయు విపులముగా వర్ణింపబడి సంఖ్యరూపముతో కెప్పబడినవి.


పశువైద్య ఆధారములు

వ్యక్తిగతముగా వేదకాలమునుండియు రాజులు పశువైద్య విజ్ఞానమును మన దేశములో వేదజలుటకు వాడకాలలుపెట్టి విద్యాస్థులను తయారుచేసి పశువైద్యులను, ఉద్యోగులను ఏర్పాటుచేసినట్లు సంగ్రహము తెలుపుచున్నది. రాజులకు చతుఃశబలములు అత్యవసరము. ఆదు ఆస్థానము, హస్తీదళము రెండును రాజునకు భుజములవలె టివి. ఇవిగాక జంతువులకాఖిలుని పరిపాలనకాఖిలో నొకటియుండెను. వైద్యవిద్యాకాలములో జంతుశాస్త్రమునకు సహాయభాగముగ నున్నట్లును, ఆత్రేయులవద పశువైద్యవిద్యార్థులు నేర్చుకొనినట్లును చూడ సంహిత తెలియజేయుచున్నది.


చంద్రగుప్తమౌర్యునికాలములో (322-298) కాటిల్యూనిచే రచింపబడిన అర్థ శాస్త్రమునందు పరిపాలనలోగల వివిధకాఖిలలో జంతువుల పెంపకపుకాఖిల ప్రాముఖ్య మియ్యబడినది. అశోకచక్రవర్తి మనుష్యులకును జంతువులకును తన రాజ్యమంతటను పశుచికిత్సాకాలలు సాపేక్షముగా ఉత్తములు. ఇతడు బి. సి 273-233 కాలమువాడు. 161 బి. సి లో సింహాశ్రమమునందు దురగామిని ఆనువాడు సైన్యములో సైనికులకొరకును, ఏనుగులకొరకును, అశ్వములకొరకును వైద్యుల నియమించినట్లు తెలియుచున్నది. కనిష్ఠునికాలములో (120-160 ఎ. డి) పశువైద్యకాఖిలో మంచి శిక్షణదొలుచున్నది. 9 వ శతాబ్దములో శుక్రనీతియందు రాష్ట్రములో వివిధములైన పెంపుడుజంతువులకు సంబంధించిన వివిధతరగతుల అధికారుల నియమించినట్లు తెలియుచున్నది. 13 వ శతాబ్దములో హంసదేవుడు (జైనసతముడు) మృగపక్షిశాస్త్రమును గ్రంథమును జనపురకాలగుడిగు నీరదేవుని యాజ్ఞానుసారముగా ప్రకటించెను. 18 వ శతాబ్దములో సింధురాష్ట్రమును ఆర్యులు జయించినపుడు హిందూవైద్యవిజ్ఞానమును హిందూదేశమంతటను యితరదేశములకుగూడ వ్యాపింపజేసిరి. ఆవులు, ఏనుగులు, మక్కలు, కోళ్ళు, మేకలు, గుఱ్ఱములు, ఏనుగుల లక్షణములనుగూర్చి బృహత్సంహితలో అనేక ఆధ్యాయములుగలవు. అగ్నిపురాణములోగూడ గలవు. జంతువులయొక్క గుణములు వానిని జాగరూకతతో పెంచువిధానము, గోగములకునుర్బరీతి, మొదలగు విషయములగుర్చి ఎంగ దేశమున ప్రప్రథమమున ప్రారంభించినట్లు తెలియుచున్నది.

పశువులకు మందులు


విదేశములో గోవునకు పవిత్రమైనదిగను, ఆరికముగను ఆగ్రసానము ఈయ బడినదో ఆహిందూదేశములో పశువుల వైద్యవిషయమై చాలతిక్కువగా కన్పట్టుచున్నది. కాని గోరక్షణ, గోశాలలయందు పథముగా చికిత్సావిధానములనుగూర్చి పైనుదహరించిన గ్రంథములలోను, ఆయుర్వేదమునందు పెక్కుచోట్లను విపులముగా చెప్పబడినది. పాండివులలో సహదేవుడు గోక్షిపినుగూర్చి పుట్టుకతోనే నేర్చినట్లు నకులసహదేవులు అగ్నినీమహారులనియు దానివలన వీరికావిద్య యుండినట్లునుగలదు.




శ్రీ గుంటుపల్లి సూర్యనారాయణగారి 'సర్దావడ్డివభ' పెదగొట్టిపాడు.



శ్రీ కాకర్ల కాకుళస్వామిగారి ఏర్లజర -- పెదముత్తేవి (కృష్ణా జిల్లా)



శ్రీ బెల్లం రాఘవయ్యగారి ఎద్దులజత, కేశవర్పాడు- గుం. జి.



శ్రీ రావెళ్ల వెంకట్రామయ్య చౌదరిగారి బెంగుళూరు పశు ప్రదర్శనములో దు 116
తీసికొన్న ఎద్దులజత, జుజ్జువరం - కృ. జి.



శ్రీ వంకమామిడి వెంకటసుబ్బారావుగారి ఎద్దులజత, వరహాపురం - గుం. జి.

కాని సహజేవుడు రచించిన గ్రంథమున్నట్లు కనపడుటలేదు. అగ్నిపురాణములోను, పశాళర, అత్రి, సంహితలలోను, గృహ్యసూత్రములలోను, మత్స్యపురాణములోను, వృషాత్సర్గలోను గోవులకు సంబంధించిన విషయములు పెక్కుచోట్ల చెప్పబడెను. చువడు అదృశ్యముగా నొకగోవును వైద్యకాల ఆవరణమునుంచవలెననియు దాని దూడలన్నియు బ్రతికియుండవలెననియు, దూడలు చిన్నతమునందే చనిపోయిన తల్లి గోవు ఆనారోగ్యముగలదని భావింపవలయునని చెప్పియుండెను.

అప్పుడు తనకాలములో ఎడమ బుడ్డలు మతపర్వదినములలో కొట్టగూడదని శాసించెను. మంచి యాబోతులను పెంచుటకు సగుపాయములను గల్గించి ప్రజలను ప్రోత్సహించెను. పైవిషయమును గురించి కాత్యాయనశ్రాంత నూత్రములు, శాటిల్య వాక్యములుగూడ తెలియజేయుచున్నవి. పశువైద్య విషయములకు సంబంధించిన ముఖ్య విషయములు, పశుపాలకులకు పశువుల కాపర్యము తెలిసియుండుట ఒకవిధముగా నుండెడిది. అట్లే కర్ణాకర్ణి వీరి వంశపరంపరగ పశువుల కాపర్యము తెలిసికొనెడివారు.

వ్యాధులునివారణ:—శాలాత్తరము, చరకసంహిత మున్నగు గ్రంథములలో సాధారణముగ పశువులు, అశ్వములు, గజములు, వివ్యాధులకు లోనగునో వానికి చేయవలసిన విధానము వివరింపబడినట్లు ఇదివరకు వ్రాయబడినది. శరీరమునకును ఇతర అయవములకును కన్ను, ముక్కు, చెవులు, కడుపునకు వివిధమగు రోగములు సోపను. వీనినే జ్వరము, దొమ్మ, వాపులు, సుడివారము, మొదలగు పేరులుగలవు. వాని కన్నిటికి తగు చికిత్స ఆయుర్వేదములో వివరింపబడినది. సాధారణముగ మనుష్యులకు పయోగింపబడు నౌషధములు జంతువులకుగూడ నుపయోగించును. ఈదిగువ వస్తువులు పశువైద్యమునకు పయోగించును. కరక, తాడి, ఉగరిక, ఆమ్ల, గుగ్గిలము, వేప, ఆవాలు, ఆవనానె, సైంధవలవణము, మిరియాలు, వేపుళ్లు, తమలపాకులు, మొదలగునవి ఆవుసరమునుబట్టి వాడుచుండెడివారు. వీరికితోడు ఆవుమూత్రము, పాలు, నెయ్యి, తేనె ఉపయోగించెడివారు. శస్త్రచికిత్సగూడ చేయబడినట్లు గలదు. రక్తలునేయుట, కొన్ని అవయవములను తొలినేయుట, తిరిగి కట్టుట మున్నగు విషయములు సుశ్రుతములో తెలుపబడినవి.

ముగింపు

పైవిషయములు పూర్వము ధీరతఖాడమునందు పశువైద్య మెట్టిప్రాముఖ్యత నీయబడినవో నిరూపణ చేయబడినది. ఆగ్రంథములు చరిత్రకొరకుగాని వైద్యవిషయములు విధానము గ్రహించుటకుగాని నవీన పశువైద్యులు ఆశ్వేషించిన బాగుండును. విద్య స్వీకరించుటలో నది యేగ్రంథములో విభాషలో ఎప్పుడు వ్రాయబడినవను అవశ్యత గ్రహింపబడవలెను.

పశుజాతులు - వాని సానము

హిందూదేశములోగల పశుజాతులెచ్చటనుండి తీసికొని రాబడినవో, యీ జాతులు పూర్వమెచ్చట నభివృద్ధి గానుండెడివో తెలిసికొనుట చాల చిత్రముగానుం

దును. గాని క్రీ.పూ. 3000 సంవత్సరములనుండియు, ఆవు, గేదె, గాడిద, గొట్టె, మేక, పంది, ఒంటె, పిల్లి, తుక్క, గుఱ్ఱము మొదలగు జంతువుల నిండ్లలోనే పెంచుట వాడుక గలదు. ఇవి యన్నియు పెంపుకు జంతువులు. విరోహ, ఉత్తరఅసియాలోగల ఆవులకును ఎడమను మూపురములులేవు. హిందూదేశములో పెంచుట ఆవులకు, ఎద్దులకు, ఆబోతులకు మూపురములుగలవు. సింధునది లోయప్రదేశములలో రెండు జాతులుగలవు. 1. పొడుగుకొమ్ములు ఎక్కువ మూపురములుగలవి 2. పొట్టి కొమ్ములు చిన్న మూపురములుగలవి. సాధారణముగా సింధు, ఉత్తరఘాగ్రరము, రాజపుత్రసాసము నందు బూడిద తెలుపురంగుల ఆవులు విశేషముగాగలవు. చిన్నమూపురము, చిన్నఆకొరముగలవి మధ్యరాష్ట్రములలో గలవు. ఆర్యులు హిందూదేశమునకు రాకపూర్వమే పెనుదహరించిన జాతిపశువులు వృద్ధిగాగలవు. సింధునది తుపనదియగు గోమతి ప్రాంత మందును శ్రీకృష్ణుడు తిరిగిన ప్రదేశములగు మధురానగరప్రాంతములు, బృందావనము లందును, సింధునది పరిసరప్రాంతములందును, ఎక్కువ పాలిచ్చునటువంటివి, బలముగలవి, అందుముగలవినగు ఆవులు, ఆబోతులు, ఎద్దులు విశేషముగా పెంచుటకుచుండెడివని హయాన్ త్యాంగు వ్రాతలవలన తెలియుచున్నది. మార్కోపోలోపరియన్ సింధుకాఖా ప్రాంత తీరప్రదేశములందు మరియొకజాతి ఎద్దులు గోవులు గలవని వ్రాసియుండెను.

ఆహారము:— అగ్నిపురాణములోనుంచి పృథువులను తగూరుచేయుటకు మాష, నువ్వు, గోధుమ, నెయ్యి, వెన్న, ఉప్పు వీనితో మిశ్రమమైన పదార్థము మామూలు ఆహారముకాక చేరుగాపెట్టవలెను. మార్కస్ అనాస- పృథువులకు ఈ దిగువవిధమున ఆహారము పెట్టెడినాడు. 1 క్లి భార పచ్చిక 1 క్లి భార పట్టిగడ్డి, 1 తులం తెలికపిండి, 10 అధికాచిట్టు, 5 పలముల ఉప్పు, తులం పండ్లతోక్కలు, 1 ద్రోణము బార్లీ, 1 అధిక పెరుగు 1 ద్రోణంపాలు 1 అధిక సారాయి 1 ప్రస్తనెయ్యి, 1 పలముఅల్లం వినిఅక్కరీయములో ఎనుగులకు బియ్యముగాని ధాన్యముగాని గడ్డిలోచుట్టి పెట్టవలెను. 5 సేర్ల పంచదార 2 సేర్ల నెయ్యి అర్ధమగుగు బియ్యం మీయాలు కలిపి పెట్టవలెను. ఇవిగాక అడవులలోని ఆకులు దుంపలు పెట్టవలెనని వ్రాయబడినది. సాధారణముగా పశువులకు గడ్డి, ఉలవలు, నీరు, చిట్టు, చమురుగింజలపిండి ముఖ్యమైన ఆహారము.

కాలలు:— కృషిసంగ్రహమును గ్రంథముప్రకారము పశువులపాక 50 మూలల చతురముగలిగి యుండవలెను. దూడలకాలలు పడమరవైపున నుండవలెను. పశుకాలలో విషవ్రేలుము తేరకుండుటకు దేవదారు, వక్క, పండ్లతోక్కలపొడి, గుగ్గిలము, ఇంగువ, అవాలు కలిపిన పాడుము కలిపి పొగ చేయుటవలన చాల ఆరోగ్యముకలుగును. ఆవులకున్న కాలలో మేకలనుంచరాదు. గుఱ్ఱపుకాలగుఱ్ఱమునకు రెండురెట్టుండవలెను. నాలుగుద్యారములు మధ్య ఖాళీసలముండవలెను. గుఱ్ఱములు దొర్లుటకు తగిన ఖాళీ యుండవలెను. ఎనుగులకు వానియెక్కునుబట్టి రెట్టింపు సలముండవలెను. ఆనగా ఎనుగు నడుముపైనుంచి యొకత్రాడును రానిచ్చి రెండువైపుల నేల తగులునట్లు చేసి దానికి రెండురెట్టుండవలెను.

ఈజంతువుల యభివృద్ధికొరకు వాని యారోగ్యము కాపాడుకొనుటకొరకు వారికి తగిన సౌకర్యములు సమకూర్చుటకు చంద్రగుప్తుడొక యధికారకాఘను నియమించెను. వ్యవసాయమున తపయోగింపబడు ఎడ్లు దున్నలు గుఱ్ఱములు మొదలగువానితో ఎంతకాలము పనిచేయింపవలసినది, ఎంత విశ్రాంతి ఈయవలసినది మొదలగు విషయములగూర్చిన పదతులు చట్టముగలదు. వైవిషయములగూర్చి అత్రిసంహితలో వివరింపబడెను.

రోగవిజ్ఞానసూత్రములు

యశ్చమేకులీనాః పర్యవదాత్ర శుతాః పందృష్టకర్మణో
దక్షాః శుచయో జితహస్తా జితాత్మానః సప్రకరణవస్త్రః
సర్వేంద్రియోపపన్నాః ప్రకృతిజ్ఞాః ప్రతిపత్తిజ్ఞాస్తే ప్రాణా
నాభినరా హస్తారో రోగాణాం॥

మంచులమునందువుట్టి, స్వచ్ఛులగు శాస్త్రజ్ఞానము, అన్ని కర్మలయందు అనుభవజ్ఞానము, సమర్థత, శుచిత్వము, హస్తవాసి, ఇంద్రియ నిగ్రహము గలవారు, అన్నిపరికరములను సంపాదించినవారు, అన్ని ఇంద్రియములతో నున్నవారు, ప్రకృతుల నెరిగినవారు, వెంటనే ప్రవృత్తియ చేయుగలవారు రోగములను నశింపజేసి ప్రాణముల నిచ్చువారుగనుదురు.

అతో విపరీతో రోగాణామభినరా హస్తారః ప్రాణానాం
భిషక్చంద్ర ప్రతిచ్ఛన్నాః కణ్ఠకభూతాలోకస్య ప్రతిరూపకత్యక్త
ధర్మాణోరాజ్ఞాం ప్రమాదాచ్ఛరన్తి రాష్ట్రాణి తేమామిదం
విశేష విజ్ఞానంభవతి॥

వైశ చెప్పబడిన లక్షణములను విపరీతములగు లక్షణములు కలవారు రోగములను వృద్ధిచేయుదు ప్రాణములను హరింపజేయుదురు. అట్టివారు లోకమును వంచించుటకు వైద్యజేషమును ధరించి రాక్షసభూతులై ద్రోహమును కలిగించుదు ధర్మమును విడచి రాజులయొక్క అజాగ్రత్తలను దేశములందు తిరుగుచుదురు.

భిషక్చంద్ర ప్రవిశ్యేవం వ్యాధితాం స్తర్కయన్తి తే .
ఏతం సమివ సంశ్రిత్య వనే శాకున్తికో ద్విజాన్॥

పిట్టలను పట్టువాడు అడవియందు వలననే పిట్టలకొరకటలు నిక్షేపించుచుండునో అటులే వైద్యజేషమును ధరించినవాడు రోగులనిగుండు పట్టుచుండును.

శ్రుతదృష్టిక్రియా కాలమాత్రాజ్ఞాన బహిష్కృతాః
వర్జనీయాహితే మృత్యోశ్చరస్త్వను చరా భువి॥

కాస్త్రము, కర్ణదర్శనము, చికిత్స, కాలము, పరిమాణము, వీని సంబంధమును జ్ఞానము లేనివారు మృత్యువునకు అనుచరులై లోకమున తిరుగుదురు. కాబట్టి వీరిని విడిచి పెట్టవలయును.

వృత్తిహేతోర్భిష జ్ఞానపూర్ణం మూర్ఖవిశారదాన్
వరయేదాతురో విద్వాక్ సర్వాస్తే పీతమారుతాః॥

జాననిమిత్రము వైద్యవేషముతోకూడిన వారును, మిక్కిలి మూఁకులునునగు వైద్యులు వాయుభిక్షణమును చేసిన సర్పములతో సమానముగ నుండురుగాన అట్టివారిని కూడ విడిచిపెట్టవలెను.

పాణిచారాద్యధా చక్షురజ్ఞాదీత భీతవత్
నేర్మారుతవశేవాజ్ఞో భిషక్చరతి కర్మసు॥

అంధుడు తెలిసికొనక పోవుటవలన చేతులతో తడుముచు భయపడుచు ఏరితిగా తిరుగుచుండునో, నావ గాలిచే కొట్టబడినపుడు ఏరితిగా సంచరించునో అరితిగనే తెలియని వైద్యుడుకూడ సంచరించుచుండును.

యదృచ్ఛయా సమాపన్న ముత్తార్య నియతాయుషమ్
భిషజ్మానీ నిహన్త్యా శుశ్రాన్య నియతాయుషామ్॥

నిర్ణీతమైన ఆయువుగల ఒకకోగిని దైవపశున జీవింపజేసి వైద్యుడనని తలంచుచు నియతములేని ఆయువుగల వందలకోలది జీవములను జంపుచున్నాడు.

“శరకసంహితా”

మైత్రీ కారుణ్య మార్తేషు శక్తే ప్రీతిరుపేక్షణమ్
ప్రకృతిస్థేషు భూతేషు వైద్య వృత్తిశ్చతుర్విధా॥

సమస్త భూతములయందు మైత్రీ కలిగియుండుట, బాధపడుచున్నవారియందు కరుణగలిగియుండుట, శక్తమైన వ్యాధిని చికిత్సింపుటకు ప్రయత్నించుట, మరణము జూండుటకు సిద్ధముగనున్నవారిని చికిత్సచేయక నుకేషించుట అని వైద్యవృత్తి నాలుగు విధములుగ నుండును.

తస్మాచ్ఛస్త్రేర్థ విజ్ఞానే ప్రవృత్తే కర్మదర్శనే
భిషక్ చతుష్టయే యుక్తః ప్రాణాభినర ఉచ్యతే॥

కాస్త్రము సభ్యసిచుట, అర్థము తెలిసికొనుట, లక్షణములను తెలిసికొనుట, కర్మలనుచూచుట స్వయముగ నాచరించుట ఈనాలుగింటితో కూడిన వైద్యుడు ప్రాణ భాస్కరుడని (పోవుచున్న ప్రాణములను నిలుపునని) చెప్పబడును.

వ్యాధే స్తత్త్వ పరిజ్ఞానం వేదనాయాశ్చ నిగ్రహః
ఏతద్వై వైద్యస్య వైద్యత్వం న వైద్యః ప్రభురాయుషః॥

వైద్యుడు తత్త్వమును సంపూర్ణముగా తెలిసికొనుటయు, రోగియొక్క బాధను సకింపజేయుటయు, అనునవియు, వైద్యునియొక్క వైద్యతత్త్వమై యున్నది. కాని అటువునట వైద్యుడు ప్రభువుగాడు.

భిషణాదౌ పరీక్షేతరుగ్ల స్థాయుః ప్రయత్నైః
తతలయుషి విస్తీర్ణే చికిత్సా సఫలాభవేత్॥

వైద్యుడు ముందుగా రోగియొక్క ఆయువును అతిప్రయత్నముతో పరీక్షించ వలెను. ఆయుస్సుదీర్ఘముగా నున్నచో యేమి చికిత్స ఫలించును.

సర్వే ద్రవ్యమపేక్షతే రోగిప్రభృతయో యతః
• వినావిత్తం న భైషజ్యం చికిత్సాంగం తతోధనమ్॥

రోగి మొదలుకొని ఎల్లరకు ధనముయొక్క అవుసముగలదు. ధనముపెట్టి కొన నదే ఔషధము దొరకును. అందువలన ధనముకూడ చికిత్సాంగ మగుచున్నది.

జాతమాత్రః చికిత్సస్యాత్ పేక్ష్యో ల్పతయాగదః
వహ్నిశత్రువిషైస్తుల్య స్స్వల్పో పి వికరోత్యసా॥

వ్యాధిపుట్టిన వెంటనే చికిత్స చేయవలెను. వ్యాధి అతిస్వల్పముగా నున్నదని అశ్రద్ధచేయరాదు. స్వల్పముగా నున్నప్పటికి అగ్ని, శత్రు, విషములతో సమానమైన దగుటచేత విస్మయ కలుగజేయును. కనుక వ్యాధి పుట్టినవెంటనే చికిత్స చేయవలెను.

రోగమాదౌ పరీక్షేత తతోనంతరమాషధం
తతః కర్మ భిషక్ పశ్చాత్ జానపూర్వం సమాచరేత్॥

వైద్యుడు ముందుగా రోగిని పరీక్షింపవలయును. అటు తరువాత నా రోగము నకు తగిన ఔషధమును విచారింపవలయును. ఇట్లు విచారించిన తరువాత మంచిరోగ జ్ఞానముగలవాడై ఏయే రోగములకట్టి చికిత్సపద్ధతుల నవలంబించవలెనో, ఎట్టి ఔష ధము నియవలెనో బాగుగా విచారించి చికిత్స చేయవలెను.

యస్తురోగవిజ్ఞాయ కర్మణ్య రభ తే భిషక్
అప్యోవధ విధానజ్ఞ సస్యసిద్ధిర్య దృచ్ఛయా॥

ఎవడు రోగములయొక్క నిదానము తెలియక చికిత్స ప్రారంభించునో, ఔషధోపయోగవిధానము తెలిసినవాడైనప్పటికి సతనికి చికిత్సయందు అయితే అగుటయో, లేనిచో లేకపోవుటయో కలుగును.

భేషజం కేవలం కర్తుం యో జనాతి న చామయం
వైద్యకర్మ న చేత్సు ర్యాద్యధమర్వా తి గాజతః॥

మరియు ఎవడు ఔషధమును చేయుట మాత్రమే తెలిసికొని, వ్యాధిని తెలిసికొనక వైద్యము చేయునో అట్టివాడు రాజుచే పధింపబడుట కర్హుడగును.

యస్తుకేవల రోగజ్ఞో భేషజేష్య విచక్షణః
తంవైద్యం ప్రాప్య రోగోన్యాస్యద్యధా నేర్నావికం వినా॥

ఎవడు కేవలము రోగమునే తెలిసికొని కర్మలయందు నేర్పరిగాడో అట్టివైద్యుడు రోగిపద్ధతుబోయి (భయముగలవాడు యుద్ధమునకుపోయి కంగారు పొందునటులనే) కంగారుపడును.

యస్తు రోగ విశేషజ్ఞ స్వర్య భైషజ్య కోవిదః
దేశకాలవిభాగజ్ఞ సస్య సిద్ధిర్న సంశయః॥

ఎవడు రోగములయొక్క విశేషజ్ఞానముగలవాడో, సమస్తమైన ఔషధోపయోగములు తెలిసినవాడో, దేశముయొక్కయు, కాలముయొక్కయు, విభాగముల తెలిసినవాడో అట్టివాడు చేయు చికిత్స సంపూర్తిగా సిద్ధించును.

ఆదావం తేరుజాం జ్ఞానేప్రయతేత చికిత్సకః
భేషజనాం విధానేతతః కుర్యాచ్చికిత్సితమ్॥

వైద్యుడు రోగములను మొదటినుండి చివరవరకు తెలిసికొనుటకు ప్రయత్నించకలెను. అటుతరువాత ఔషధోపయోగ విధానమును తెలిసికొని చికిత్సచేయవలెను. రోగముయొక్క పేరు తెలిసికొనవలెనని హెచ్చుకాల మూరుకొనరాదు.

యేన కుర్వంత్య సాధ్యానాం చికిత్సాం తే భిషగ్వరాః
అతోవైద్యైః శ్రమః కార్యః సాధ్యాసాధ్యాపరీక్షణే॥

అసాధ్యములైన వ్యాధులకు ఏవైద్యులు చికిత్సచేయరో వాళే వైద్యశ్రేష్టులు. అందువలన వైద్యులు వ్యాధులయొక్క సాధ్యాసాధ్యత్వములను అతికష్టముగ పరిశ్రమ చేసి తెలిసికొనవలెను.

శీతేశీతప్రతీకారము ప్లే తూష్ణనివారణం

కృత్యాకుర్యాత్క్రియాం ప్రాప్తం క్రియాకాలం న హాపయేత్ ।

వ్యాధిశీతప్రధానమైనపుడు శీతిమునకు చికిత్సయు, ఉష్ణప్రధానమైనపుడు ఉష్ణ నివారక చికిత్సయును చేయవలెనుగాని చికిత్సాకాలమును గూర్చిను జేయరాదు.

అప్రాప్తేవాక్రియాకాలే ప్రాప్తే వాన క్రియాకృతా
క్రియాహీనాతిరిక్తా చ సాధ్యాష్వసి న సిద్ధతి॥

చికిత్సించవలసిన కాలముగానప్పుడు చికిత్సించినచో, సరియగు చికిత్సజేయవలసిన సమయమున చికిత్సచేయకపోయినచో, హెచ్చుగా చికిత్సచేయవలసినపుడు తక్కువగా చికిత్సచేసినచో, తక్కువ చికిత్సచేసినపుడు హెచ్చుగాజేసినచోనూడ వ్యాధిసాధ్యమైనప్పటికి సిద్ధించజాలదు.

క్రియాయాస్తుగుణావే భే క్రియామన్యాం ప్రయోజయేత్
పూర్వస్యాం శాంతవేగాయాం న క్రియాస కరోహితః॥

చేసిన చికిత్సలన ఫలములేకపోయినయెడల మరొకక్రియను మొదటిచికిత్స యొక్క శక్తితగ్గిన తరువాత నుపయోగింపవలెను గాని రెండు చికిత్సలను కలిపి చేయరాదు.

న చైకాంతేన నిర్దిష్టే శాస్త్రే నివిశతే బుధః

స్వయమవ్యత్ర భిషజా తర్కనీయం చికిత్సితా॥

పండితుడైన వైద్యుడు కేవలము శాస్త్రమునందు జెప్పబడిన విధానమునే నమ్ని యుండడు. స్వయముగా వైద్యుడనూడ సంపూర్ణముగా నాలోచించవలయును.

“భావప్రకాశిక”

పశువైద్యులు

పూర్వకాలమున ఆకు అలములు తినుచు విరాగులై సంచరించువారు గోసాయిలు. గోసాయిలు సాధారణముగా తమ సహజవృత్తులతో జీవింపుచు వైద్యము చేయుట ఒక గౌరవముగ నెంచుచుండెడివారు. వారికి వైద్యశాస్త్రాభ్యాసము ప్రభావవృత్తి కాక పోవుటచేత దానియందు వారికి ఆభిరుచి తగిలెననునది తగ్గుచూ వచ్చినది.

తెలిసి తెలియని పశువైద్యుల నేపథ్యమున గాని వ్యాధినిర్ణయము తెలియక పశువులను చంపుదురు. పీడ మోటువైద్య మెక్కువగా చేయుదురు. మన దేశములో నచ్చటచ్చట మిక్కిలి తెలివితల అనుభవముగల పశువైద్యులున్నారని వారు తదితరులకు మాత్రము చెప్పరు. ఏపశువునకు వ్యాధి సంభవించినప్పుడు తాము స్వయముగ యెవరికి తెలియకుండ నే యాపపసునో తెచ్చి పోయియుండు. ఈరీతిగా తమగుట్టును బయట పెట్టక వైద్యమును వృద్ధిగొని కిరావండు వానము చేయుచున్నారు. మనకు అనుభవ పశువైద్య శాస్త్రము సరియైనది లేకపోవుటవలననే సర్వము చికిత్సలు దొరకుటలేదు.

కొందరు దోగనిదానము గ్రహించక తమ యిష్టమువచ్చిన మందుల నుపయోగించి పశువులను చంపుచున్నారు. నాకు ఇరువది సంవత్సరములనుంచి ఈ వైద్యములో ప్రవేశమున్నది. ఈ వైద్యపరిశోధన కొరవ కొన్ని వేలరూపాయలు ఖర్చుపెట్టి, ఎన్నో గ్రంథములు పరిశోధించి తంటాలు పడుచున్నప్పటికి ఇంకా చాలా అనుభవము కావలెనేమోయని అప్పుడప్పుడు సందేహపడుట తటస్థమందును. కాబట్టి శాస్త్రజ్ఞానము గలిగిన అనుభవము చికిత్సలు చేయువాడే వైద్యుడనించుకొనును.

వైద్యులవలన ప్రమాదములు

శాస్త్రము తెలియని వైద్యుడు యయూతయని పెద్దలుచెప్పిన వాక్యమునందు చాల నిజముగలదు. కొన్ని పందలరూపాయల ఖరీదు చేయగల పశువునకు ఏ ఏవజాడ్యమైన సంభవించినప్పుడు ఆరైతుపడు ఆకుత ఇంతింతయని చెప్పుటకు వలచిగాదు. శాస్త్రజ్ఞానము గలిగి పశువైద్యము తెలిసినవారు గ్రామములలో చాల తక్కువగా నుండురు. రైతునకు గతిలేక ఆ వైద్యులనే రిప్పించి చికిత్సలు చేయించుదురు. ఇది చాల పొరబాటు. రైతులు తమ మూఢవిశ్వాసముచేతను, వేరొకవైద్యుడు ఆపత్కాలమగు రాబోవు సంవత్సరములను తెలిసికొనక కనపడిన ప్రతి యాకుపసరును వనమాలికలను వ్యాధి సంభవించిన పశువులకు పెట్టుటచే వెంటనే ఆపశువు ప్రాణమును కోల్పోవుచున్నది. ఇంకను కొందరు మోతాదు తెలియక ఎక్కువమోతాదుల నిచ్చెదరు.

రైతుల ఆతురత

మన రైతుసోదరులు తమ పశువులకు జబ్బురాగానే వెంటనే పోవలెనని గ్రామములోనున్న పూర్వవైద్యులను రిప్పించెదరు. కాని ఈ వైద్యులలో కొంతమంది ఆతి గర్వముగానుండురు. వాఱుంటిమట్టు తిరిగినప్పటికి ఒక్కొక్క సమయములోరారు. రైతు నిరుత్సాహముకొందును. ఒకవేళ ఆ వైద్యుడువచ్చినను ఆకుతబెట్టుగానుండి తానే గొప్ప సహజేవుడన్నట్లు నటించుచుండును. ఇట్టివారితో వైద్యముచేయించుట పొరబాటుగాకుండ ఆరైతునకుకూడ మహాపాతికము చుట్టుకొనును. శాస్త్రజ్ఞానము మిగుల అనుభవముండిన భూతద ముగలవారి చేతనే వైద్యముచేయించుదురుగాక.

ఏవైద్యునితో తమపశువులకు మీరు చికిత్సలు చేయించుచుందురో అతనితోనే చికిత్స అభిరుచిరకు చేయించవలెనుగాని పశురోగిని చేయించరాదు. ఇట్లు చేయించుటవలన ఉభయభ్రష్టత్వము గలుగును. కొందరు భూతవైద్యుల రప్పించెదరు. మరి కొందరు మంత్రవైద్యుల రప్పించెదరు. ఇంకొన్నియోత్ర వైద్యముల చేయించెదరు. ఎంతమందియున్నను అనుభవము, శాస్త్రజ్ఞానముగలవారిచేతనే వైద్యము చేయించమని నాశోరిక.

తెలిసి తెలియని చికిత్సలను చేయరాదు.

పశువున కరోగ మైన గోకినమెడల ఆరోగమునకు నిదానము జాగ్రత్తగా పరిశీలించి చికిత్స చేయవలెను. పశువులు నోరులేనివ తువులుగాన మనమ్యులే బాగుగా వానిని పరీక్షించి తగిన సమపాఠములు చేయవలెను. కొందరు వైద్యులు దొమ్మకు తురును యనియు, తురుమకు దొమ్మయనియు చెప్పి చేతగాని చికిత్సలు చేయుచుందురు. కాబట్టి భూతదయాపరులగు పశువైద్యులు తగినంత శాస్త్రజ్ఞానముగలిగి చాల అనుభవముతో చికిత్స చేయవలెను గాని “రైతులు నీవంటి మహావైద్యులలేకు” నవలనే తురోగము పోవడని హెచ్చుచేయించుచుందురు. కాని వైద్యమంతా నాకే తెలియునను గర్వముతో తెలిసి తెలియని మందులపోసి చంపరాదు. అట్లు చేసిన నీకీగాక విటులు ముసకుకూడ మహాపాతకము నట్టుకొనును.

వ్యాధియొక్క గుణములను తెలిసికొనిన తరువాత చికిత్సలు చేయుట సులభము. ఇంతియేగాక కొందరువైద్యులు గ్రంథాలుచదివి అనుభవములేక చికిత్సలు చేయుదురు. మరికొందరు డబ్బుసంపాదనకొకై బెట్టుగుట్టులతో రైతుల నేడ్చించుదురు. ఇట్టి వైద్యులను విస్మించుటయే మంచిది. కొందరు వైద్యులు తమ శాస్త్రమే ప్రపంచములొ నున్న శాస్త్రములకంటె మించినదని విదోషిధముగ ఋజువుపరచుటకు ప్రయత్నించుదురు. ఇట్టి అభిమానము కొంతవరకు యుండవలసివచ్చేగాని మంచిచెడ్డల నుపయోగించక తాబట్టి కుండేటికి మూడుక్కలేయను వారికి క్రొత్తవిషయములు బోధించుట చాల కష్టము.

నిండుమండ తోణెకుడుగాని శాస్త్రజ్ఞానములేని వైద్యులు తదితరాలకంటె గంభీర వాక్యములు పలుకుచు అన్నివ్యాధులు తామే వదర్చగలమని చెప్పదురు. మరికొందరు అమాఘమైన పశుసేవ చేయుచుందుమని, విట్టివిగుచు తదితరులను చూపించుచుండురు. మరికొందరు గ్రంథములను వ్రాయుచున్నామని తప్పుడు మోతాదులు వ్రాయుచు వస్తుగుణముల తెలుపకనున్నవారుకూడ గలరు. కాబట్టి శాస్త్రజ్ఞానము, అనుభవముగలవాడే సరియగు పశువైద్యాచార్యు డనిపించుకొనును.

వైద్యములో గలుగుచుండు మార్పులు

మనదేశములో కాలపరిస్థితుల ననుసరించి రోగములుకూడ పరివర్తనములుగా మారుచున్నవనుటలో సత్యమొక్కలేదు. నేను ఇంతవరకు 25 పశువైద్య గ్రంథములు వ్రాసితిని. ఎన్నో విషయములు పరిశోధనచేసితిని. ఎంతోమంది విద్యార్థులకు నేర్పితిని. ఎన్నో పశువులకు చికిత్సలు చేసితినిగాని పరింతగము వైద్యములో మార్పులు చెందుచునే యున్నవి. ఇప్పుడవ మనము చేయుచున్న పశువైద్యపద్ధతి మరియొక నూతనరూపమునకు రావచ్చును.

పూర్వము పెద్దరోగము (4:3) అనుకోగమున రావండజేయుటకు శిముకు పాలటీకాలను వేసెడియు, బొన్నకలి, తడితర పుష్పములపట్టి ఆ రోగములను నిర్మూలము చేసెడివారు. ఇప్పటి కాలపరిస్థితులనుబట్టి ఈ రోగవిధానమునూతనముగా నూతనరూపముగా దేశమంతటను వ్యాపించి రైతుల నాందోళన పరుచుచున్నది కాబట్టి పరిశీలనలు బట్టి వ్యాధులుకూడ మార్పుజెందునని ముఖ్యముగా గ్రహించవలెను.

ఆంగ్లాయుర్వేద బోషధముల వ్యత్యాసములు

ఆయుర్వేదబోషధములలో మిక్కిలి పరిమోక్షిష్టముగు వస్తువుల నేతములున్నవి. మిక్కిలి ప్రయోజనకరముగు వస్తువులు అతివిశేషముగా హిమాలయప్రాంతములందు దొరకును. పూర్వమునాడెప్పుడు ఆయుర్వేదబోషధములే మిక్కిలి ప్రసిద్ధిగా నుండును. కాని నాటినుండి గ్రహించి ఆచరణలో పెట్టు పశువైద్యులు చూచుకొన్నవిగాన న్నవి.

ఎటువంటి లీకరైతెనను తనపశువున కేదెం రోగముపరివర్తించినపుడు కొంత సైతము తిసికొనివెళ్ళి వస్తువులను తిసికొనిరావలసివ గతికట్టిపడి. పూర్వమెప్పుడు జూచినను వనమూలికలుదొరికెడివి. ఏవ్యాధికిచికిత్సచేయవలెనో ఆవస్తువులను సుపాదించి తికితల్లు చేయుచుండెడివారు. ఆపరివర్తనలలోకూడ ఆనేక సుగుణములున్నవి.

ఆంగ్లేయబోషధములకంటె ఈపదార్థలలో మంచిగణముకలదు. మనదేశములో నుత్పత్తియగు నేలనెము, సాంఘి, విషముష్టివగైరా ఔషధులను విదేశములకు తిసికొని వెళ్ళి అమ్మచాలులలో కలిపి శుద్ధి చేసి నీసాంఘి పంపుటవలన చూపుటకు అందముగా కుండుటచే అనుండులగిరాక చెప్పనక్కరలేదు. ఇప్పటి యుద్ధపరిస్థితులవలన మన ఆయుర్వేదమూలికల ప్రభావమెంతవరకున్నదో ఎల్లరివి జెల్లినయే మున్నది.

పశువైద్యముచేయు ఆంగ్లేయపశువైద్యుల ఆయుర్వేద సలహాలడిగి మాకింతగా తెలియవందురు. కాబట్టి ప్రతివైద్యుడూ ఆంగ్లాయుర్వేదబోషధముల గుణముల రెండింటిని తప్పక గ్రహించవలెను. దేశకానుగుణ్యముగ నిప్పుటిపరిస్థితులనుబట్టి ఆంగ్లేయబోషధములే ప్రచారమునకు వచ్చుచున్నవి. ప్రభుత్వాదగగ శిక్షాపుటచే ఆయుర్వేదపశువైద్య మరి పుద్ధి గాండుచుండుటలేదు.

వైద్యుడు తెలిసికొనవలసిన వ్యాధిచరిత్ర

రోగనిర్ణయమునకిదియొక ముఖ్యసాధకము. ముఖ్యముగా రోగపశువు ప్రస్తుతమున అనుభవించుచున్న బాధలను, రాత్రిలవఱకు ఎట్టిచేతలయందు బాధ లధికమగునో, రోగపశువునకు చలనమువలనగాని, ఉష్ణోశీతములకారణముల వలనగాని, మరియుతరకారణములవలనగాని, అధికమగుట, ఉపశమనము కలుగుచున్నదో ముఖ్యముగ కనుగొనవలసిన ఆశయాలై యున్నవి. ఇదివఱకు పొందినబాధలను, అస్వస్థత మొత్తకాలము నుంచి యున్నదియు, ప్రారంభములో తేలికముగ గలిగి, వీటిగా అప్పటికి చూయుచున్నదియు సవిస్తరముగా తెలిసికొనవలయును.

పశువును పరీక్షించినవెంటనే వైద్యుడు పశువుయొక్క యజమానునిగాని, పశువులకొరవరిగాని ఆరోగ్యమును బట్టి గూర్చి తెలిసికొనవలసిన అంశములను వివరించుచున్నది. కొన్నికొన్ని విషయములలో కొందరికి అనుభవము లేకపోవుటచేత సరియగు చరిత్రకూడ తెలిసికొనుట మర్లభిము. అంతియేగాక పశువులకొరవరి జాగ్రత్తవలనగాని లేక లోపము వలనగాని పశువునకు వ్యాధి కలుగుచుండును. కాబట్టి ఆకొరవరిచెప్పు అన్ని విషయములను పూర్తిగాపట్టుక వానిని బాగుగా పరీక్షించి అడుగవలెను. తుదకు ఆతనిని ధయిపెట్టిమనన నిజమైన కారణములను తెలిసికొనవలెను.

ప్రస్తుతము యజమాని స్వాధీనములో ఆపశువు ఎంతకాలమునుండి ఆరోగ్యముగ నున్నదో, ఎంతకాలమునుండి బాధపడుచున్నదో యిదివిషయములను అపశువు యే రోగముచేతనైన బాధపడినదోనును విషయములు జాగ్రత్తగా ముందు తెలిసికొనవలెను. పోటకే యొక్క చిత్తువు స్థగము పై రోగపశువు యొక్కయజమానిపేరు, పశువు రోగలక్షణములను వ్రాయవలెను. వైద్యమే నిర్దిష్టగాగలిగి పశుచికిత్సాలయము లేవురకు కొనుగోని ఒకేదినమున పెక్కు పశువులను పరీక్షించి బోషధర్మియమునకు పోబడకుండు వ్రాసికొనవలెను.


రోగపశువు యొక్క కొరవరిచెప్పిన సంగతులపల్ల నే రోగనిర్ణయ మొనర్చుటకు వలనపడదు. వైద్యుడు వ్యాధిగ్రస్తమునందు గానించు తదితర లక్షణములనుకూడ కనిపెట్టి జాగ్రత్తగలిగి రోగమును నిదానించవలెను. రోగనిదానమునందే వైద్యునియొక్క శక్తి సామర్థ్యములు తెలియదగియుండును.

లక్షణములను కనుగొనుట

పశువునకు వ్యాధిసోకినదిలగాయతు కనబడుచున్న లక్షణములనుగూర్చియు, యింకను ఆపశుకాలలోనున్న పశువు లేయితరవ్యాధులవలననైన బాధపడుచున్నదో లేదో మొదలగునవి జాగ్రత్తగా తెలిసికొనవలెను. సామాన్యముగా మేరలనుచున్నదియు లేనిదియు పనిచేయుటకు యిష్టమున్నదియు లేనిదియు తెలిసికొనవలెను.

శరీరోష్ణము రాత్రింబవళ్ళు విడువకుండుట, పారుదు మున్నగునవి యున్నవి తనివి శరీరావయవములనుండి వెలువడెడి చెమట, నులము, మూత్రము, శ్లేష్మము మున్నగునవి వానివాసన, రంగు, మొదలగునవియును, రక్తప్రవాహ సంచారవిధమును తెలియజేయు నాడియొక్క నీతిని, ముఖము, నాలుక, శ్రేత్రములు, ముక్కురంధ్రములు, పెదవులు మొదలగునాటి లక్షణములును, అడపకువైచిలో శరీరసితి, చన్నులు, పొడుగు, గర్భకోశము మున్నగునాటినిగూర్చియు పరీక్షించవలయును.

మనముచూడుటకు ముందు ఆపశువునకు ఏవికిర్పిలుచేసిరో, యేవిషపుతుండు లిచ్చిరో, ఇచ్చినందులూ ఇంక ఎంతకాలమువగకు నిలువయుండునో, ఇదిమట చికిత్స చేసిన వైద్యులు ఈపశువునుగూర్చి వివిషయములు చెప్పిరో ఆ విషయములను వివ్రల ముగా తెలిసికొనవలెను.



రోగముల పరీక్షింపవలసిన సాధారణాంశములు

కడుపునొప్పి విషయములో ఏనుమయమునందు ఆనొప్పివచ్చినదో, లేక విడువ కుండ వచ్చుచున్నదో, అదివచ్చునపుడు ఎట్లు బాధపడుచున్నదో, ఆనొప్పి అగిఅగివచ్చు చున్నదో, లేక విడువకుండవచ్చుచున్నదో, తెలిసికొనవలెను. దగ్గుగాని, చీమిడిగాని కాయచుప్పయెడల అదిమెప్పుటినుండి పడుచున్నదో తెలిసికొనవలెను.

పేగులు సరిగాపనిచేయుచున్నది లేనిది, మాత్రము తక్కువగాగాని ఎక్కువగాగాని పోయుచున్నదో, మాత్రపురంగు విరీతిగానున్నదియు గ్రహించవలెను. ఇంకను ఆడపశువైనయెడల చూడిదైనదియు లేనిదియు, విశేషము గట్టిగా మెరుపుగానున్నదో పలుచగానున్నదో, పశువునకు సుగుడు ఉపయోగించినవెంటనే దగ్గువచ్చుట, ఆయాస పడుట మున్నగునవి జరుగుచున్నచేత తెలిసికొనవలెను.

అవయవములను పరీక్షించుట

నాడికొట్టుకొనుట, శీనోష్ణస్థితి, శ్వాసస్వస్వాసములును, ఏమైన బొకతొగూడి పొగలుపడుచున్నదియు, దగ్గు వచ్చుచున్నదియు, కడుపులో నేవైనాపియున్నదియు, చెవులనుగూర్చియు, పొట్టలోని యితరభాగములను గూర్చియు విడివిడిగా పరీక్షింపవలెను. ఇతరయే గాక ఊపిరితిత్తులను, హృదయకోశమును పరీక్షించుచుండవలెను. కడుపునొప్పి మొదలగుపొట్ట సుబంధముగు వ్యాధులు సంభవించినప్పుడు మూత్రయములను పరీక్షించుటవసరము.

పశువు ఒక్కొక్కప్పుడు ఒకే అవయవమునకు జందిన రోగములవలన బాధపడుచుండును. అట్టి విషయములందు చివరకు ఒకేవిధమగు లక్షణములు కనబడవు. ఇతర అవయవములందుకూడ ఈ అవయవముల దీర్ఘరోగముచే కొన్నికొన్ని నష్టములు కలుగవచ్చును. ఇట్టి వ్యాధిమూలముననే పశువులు ఎక్కువగా చనిపోవును. ఒక్కొక్కప్పుడు దీర్ఘమగు మాత్ర సంబంధముగు వ్యాధులచేతగాని, ఆడపశువులై కమెడల లోపలవీండము తిరిగి అడ్డము తిరుగుటవలనగాని, హృదయరోగమువలనగాని పశువు ఆకస్మికముగా చనిపోవుటయుగలదు.

వ్యాధిని నిర్ధారణచేయుట

ఒక్కొక పశువు విషయములో ఆయారోగములనుబట్టి మనము వెంటనేగాని, చాలా కాలమైనప్పటికైనా రోగనిర్ధారణ చేయజాలము. అట్టి సమయములందు ఆప్పుడు కనబడు రోగ చిహ్నములనుబట్టి దానికి చేయవలెను. వీడితమగు పశువును చూచినవెంటనే వ్యాధియని తెలిసికొనినవెంటనే దానికితగిన చికిత్సచేయుటగాని లేక వెంటనే దానిని తొలగించుటగాని మనకు వీలగును.

మన అనుభవ పశురోగలక్షణ శాస్త్రమునుబట్టి పశువునకు లోపలిభాగమునున్న అవయవములను యేవిధముగా సరియైన మార్గమునకు తీసికొనివచ్చుటకు వీలగునో తెలిసికొనవచ్చును. జ్వరమానమునుబట్టి జ్వరపు పౌచ్చురీగ్గులను, మలమాత్ర విసర్జనములనుబట్టి రోగనిర్ణయమును కనుగొనవచ్చును.

రోగమునకు పేరువెంటనే పెట్టరాదు.

వైద్యుడు పశువును చూచినవెంటనే వ్యాధిపేరు చెప్పరాదు. ఎందుచేతననైనా రైతులలో కొందరు పాములుంటురు. ఏకీతోషనీతివలన నైన పేరుచెప్పిన వ్యాధియొక వ్యాధిగా పరిణమించినయెడల ఆపాములగు రైతులు వైద్యులను చూపించుచుండును. అవైద్యుడు యేమి తెలియవనికూడ చాటును. కొబ్బటి రోగనిదానము గ్రహించి పేరు పెట్టటమంచిది. కొన్నికొన్ని రోగములలో గుణాలక్షణములు ఆరోగకారణమును గూడ తెలిసికొనునంత అస్పష్టముగ నుండును. అట్టివిషయములందుగూడ మనము రోగ లక్షణములను పరీక్షించి, రోగనిర్ణయము బాగుగా చేసిన తరువాత సాధ్యమైనంత నుంచి చికిత్స చేయుటకు ప్రయత్నించవలయును. ప్రతిరోగమునకు మనము సిగ్గుమైనకొవధ పని అనుభవమువల్లనే గానక అనుభవము వల్లనే, చికిత్సలను చేయు జాలముగాన వేటనే రోగమునకు పేరు పెట్టరాదు.

మందులిచ్చుటకు పూర్వము గ్రహించవలసిన విషయములు

రోగపీడితునకు పశువునకు మందీయవలెనన్న ఆరంభములో అన్యధియొక్క గుణమును, లక్షణములను తెలిసికొనవలెను. రోగనిర్ణయము, రోగలక్షణములనుబట్టి చేయవలెను. వ్యాధివ్యాధిమూలకూడ రోగకారణమును తెలిసికొనవచ్చును. రోగనిర్ణయముచేసిన తరువాత ఆపశువునకుండున్న బాధనుమాన్వి దాని జబ్బును పూర్తిగా పోగొట్టి దానిని పూర్వస్థితిలోనికి తీసికొనివచ్చుటకు వలయు చికిత్సలనుగూర్చి ఆలోచింపవలయును. ఒక్కొక్క వ్యాధివిషయములో మనము రోగనిదానము గ్రహించి వెంటనే ప్రథమ చికిత్సచేసి ఆబాధను నివారించవచ్చును. ఇదిముఖ్యముగ చికిత్సలలో శోకటి. కొన్నికొన్ని విషయములలో మనము రోగకారణమును గురించి వెంటనే ఎక్కువగా తెలిసికొనక పోయినను ఆరోగమువలన కలిగిన బాధను మాన్పుటకై చికిత్సకై ప్రయత్నించవలయును.

వ్యాధియొక్క నడకనుగుర్తించుట

నోరులేని పశువువ్యాధియొక్క ముందునడకను గుర్తించుటకు మిగుల అనుభవము, మంచిబుద్ధి, కళలతయు గావలయును. వ్యాధియొక్క ముందునడకను సరిగా చెప్పగలుగుటకు వ్యాధియొక్క సహజగమనిమును జుక్కుగా దెలిసినవాడై ఆరోగ్యముయొక్క సహజ తత్వమును యెరిగినవాడై తానుపయోగించు గుణములను శక్తులను గ్రహించుట నుండుటకు అనుభవముగలవాడునై యుండవలెను.

వ్యాధియొక్క ముందునడకనుగూర్చి వైద్యుడు తనంతటతాను పశువుయొక్క యజమానిక చెప్పరాదు. ఎవరైన అడిగినయెడల స్పష్టముగా తెలిసియున్న సంగతి మాత్రము చెప్పవచ్చును. అనుమానముగానున్న సంగతి మాత్రము చెప్పటలో బహు

జాగ్రత్తగానుండవలెను. వైద్యులుచెప్పు పంగతులు సాధ్యమైనంతవరకు ఆశను కలగ జేయుటకుగా నుండవలెను. స్పష్టముగా పశువునకు మరణము సంభవించు నీతియందు వైద్యుడు తానెరిగిపొగతివంతము స్పష్టముగా యజనానికి చెప్పవలెను.

బాధలను గమనించుట

రోగపశువునకుగల బాధలను గమనించుట. బాధగల పశువునులను తాకి పరీక్షించి నొప్పిగను నేడిగను యున్నచోదల నిని చెప్పి నావురోగము బాధలు యుండును. ఒక్కొక్కపుడు బాధయొప్పు అవయవములలో ఆయదన్నను లేక కనబడుచున్న ఒకపైబడి హృదయములోను, మరియు హృదయమున దీ సమీప అవయవములలోను ఉండవచ్చును. కిందికివలె బాధ ఎప్పుడుగా గునిన ఆది కలదనిపించుకొనుదిగా నెరుగవలయును.

శీతోష్ణ పరిమాణములు తెలిసికొనుట

పశువు శరీరమందు ఉష్ణమధికముగా నున్నచోదల జ్వరముగును. చూచితిముల హృదయమున ఇదియొక రోగలక్షణము. మరల ముట్టించుట రోగపశువును పరీక్షించి పశువు జ్వరము కొంచెముపొచ్చుగానున్నను వారివారి హృదయమున తలంపరాదు. కొని అది తీవ్రముగా వచ్చుచున్నచోదల తీవ్రము చెడవచ్చునులని గ్రహించవలెను.

కొంతమంది పశువైద్యులగును, ఆయన పశువైద్యులుగురును సామాన్యజ్వరమునకు లక్షణశీతోష్ణపరిమాణము హృదయము, ఆంతిగులుము, మందులగునగును యని అభిప్రాయ పడుచున్నారు. జ్వరమువచ్చునపుడు పశువునకు యేఅవయవమోదల మునుతప్పటగాని, శీతమైనది కనుగొనుముగా శీతోష్ణపరిమాణము హృదయమిది సామాన్యమునకుగాని రావచ్చును. తరువాతి పశువు కొలదిదములలో న్యాధిపదిరి మధ్యమకొముగా ఆరోగ్యమును కిందుచుండును. ఈతరగా విషజ్వరములో కలుగుచుండును. అప్పుడు జ్వరముయొక్క విజస్వభావము ఇదియని వుష్ణముగా చెప్పుట కష్టము. రోగలక్షణములతో ఆకసేద కొంతమంది వైద్యులు ఆ న్యాధి అకాలముగవుట్టి విషజ్వరములయొక్క ప్రధాన సోపానములని చెప్పుదురు. ఇదివలె పశువునకు జ్వరము వచ్చినచోదల దానికి బోషక మిచ్చినచోదల ఆజ్వరము తగ్గించు ముఖ్యమైనదిగాని అట్లేప్పుడుగాదు ఆ జ్వరమున కుపయోగములే ప్రయోగమున బాధలనియె తిగును కొంచె జ్వరముతో ముదలిపి న్యాధి శ్లోపమిది ఆరోగ్యమునకు దీక్షయేరాదు

ధర్మామీటరుతో పరీక్షించుట

ధర్మామీటరును గురించి కొంత పండితుల తిరువారి జ్వరమునకు తగిన చికిత్స చేయవలెను. అదేసమయమున రోగపశువును పరీక్షించుట తరువాతి లక్షణములను కనుగొనుటకును ధర్మామీటరు నుపయోగించవలెను. పశువు రోగచిహ్నములు స్పష్ట

ముగా తెలిసినప్పటినుండియు దానికేవిధమగు పనిచేయునుండి విక్రాంతి నీయవలెను. శస్త్ర చికిత్సాసంబంధమును రోగములయందు జ్వరమువచ్చినచో అదిహానికి ముఖ్యమైనదైనది. సరములసముదాయము ఎక్కువగా పనిచేసినప్పుడు ఉండవలసిన పరిమాణముకన్న ఉష్ణము తక్కువయ్యుండిన అది అపాయమైనదైనది. పశువుయొక్క శీతోష్ణపరిమాణము కనుగొనవలసినది ధర్మామీటరును దానియొక్క మూత్రములలోపెట్టి ఆధర్మామీటరు యొక్క మంచిచెడ్డలను అర్థమివ్వవలయునుండి మూడునిమిషములవరకు వుంచినయెడల జ్వర మెంతయున్నది తెలియును. ధర్మామీటరుయొక్క పాదరసమునుబోట (గుచ్చి) పశువుయొక్క కేగుఖట సరియగుచును పాలనలుబుగొనుట జాగ్రత్తగా వెల్లుబులు తోయవలెను. అంతవరకు పోనియనియెడల శీతోష్ణపరిమాణము తెలియదు.

ఉష్ణతాపక యంత్రపుకొలతలు

పశువుయొక్క ఉష్ణోగ్రతను పరీక్షించుదానికి ఉష్ణతాపకయంత్రము (ధర్మా మీటరు) అందురు. ఉష్ణతాపకముగా వాయువుయొక్కయు, బలముయొక్కయు, రక్తద్రవ్యములయొక్కయు ఉష్ణోగ్రతను పరీక్షించుట. ఉష్ణముయొక్క ముఖ్యధర్మము విస్తరించుట. శీతలముయొక్క ముఖ్యధర్మము ముడుచుకొనుట. ధర్మామీటరుయొక్క క్రిందిభాగమున ఉబ్బుగానుండుదానిలో పాదరసమునుబోసి గొట్టములోని గాలిసంతయు దీనివేసి పైభాగమున సెగజూసిమూయుదురు. ఆగాజాగొట్టము పొడుగువరకు శీతోష్ణ పరిమాణం ఆంశములు డిగ్రీలుగ విభజించెను అంశము గీసెదరు. ఆధర్మామీటరు పైన కచ్చితమైన కొలతలును వీలగునట్లు అంశములు 93 నుంచి 110 వరకు విస్తరించి పదిభాగములుగా విభజింపబడియుండును. ప్రతిరైతునకుగల నీధర్మామీటరునుబట్టివలెను. రోగపశువుయొక్క శీతోష్ణమును ధర్మామీటరుతో దినమునకు రెండు మూడు పర్యాయములు కొలువవలెను.

ఉదయము 6 గంటలనుంచి 9 గంటలవరకు


సాయంత్రము 5 గంటలనుంచి 7½ గంటలవరకు

కొలుచుటనుంచిది. అవుసరమునుబట్టి మధ్యకాలములోకూడ కొలువవచ్చును. చెవిదగ్గరగాని, ఎదరానిలోగాని, ఆసనములోగాని, కాలికి గంగడోలునకు మధ్యగాని, జ్వరముయొక్క పాదరసభాగమును 4 లేక 5 నిమిషములుంచి కొలువవలెను. ఆసన ములోకంటె తదితరభాగములయందు పెట్టి చూడబడిన యుష్ణము ఒక డిగ్రీతక్కువగా యుండును. కనుక తదితరభాగములందు పెట్టిచూచినపుడొక డిగ్రీ అదనముగా కలుపు కొని లెక్కచూడవలెను. జ్వరముకొలుచునపుడు రెండుమూడు నిమిషములుంచి చూడ వలెను.

అంటుబొడ్డు ఆవృతల ఎడ్డుకు : జారుబొడ్డు చనుకట్టులపుడు.

జ్వర మానము

ఆరోగ్యస్థితిలో పశువు శరీరముయొక్క వేడిమి 102 డిగ్రీలుండును. అంతట యధికముగనున్నను, తక్కువగనున్నను ఆపారోగ్యముని యెరుంగవలెను. పశువునకు సామాన్యముగా జ్వరమున్నచో సామాన్య ఉష్ణము 100 డిగ్రీలకంటెగా పాదరసము ప్రవహించును. సామాన్య గుర్తుకు అనగా 101 డిగ్రీలకు తక్కువగా పాదరసము దిగిన యెడల పశువు నిస్త్రాణస్థితిలోను, వాతములోనున్నదనియు తెలిసికొనవలెను.



జ్వర మానము

107, 108 పైసయున్నచో దాడుగాపైన వేడియని గ్రహించవలెను. 104 నుండి 105 వరకు దీర్ఘకాలము నిలబడియున్నచో ప్రమాదము రావలయున్నదనియు, 102 నుండి 104 వరకున్న సామాన్య జ్వరమునియు భావింపవలయును. 95 డిగ్రీలవరకున్న అధికఅపాయమునియు అంత్యదశయునియు తెలిసికొనవలెను. పశువుయొక్క ఉష్ణము కొలిచినతరువాత ధర్మామితరు క్రిందివైపునకు జూడించి దానిలోని పాదరసమును సామాన్యపు గుర్తుకంటె క్రిందికిదింపి వేడిస్థితిలోగాని, తదితర ద్రావకములలోగాని కడుగవలెను.

ఎక్కువ వెలపెట్టి గుడ్డను : తక్కువ వెలపెట్టి గొడ్డునుకొనరాదు.

నాడి, క్వాస, ఉష్ణము, తెలుపు పట్టిక

జంతువు	నాడి నిమిషమునకు	క్వాస	తెలుపుచేయు
గుఱ్ఱము	... 35-45 ...	10-12 ...	100-102
ఎద్దు	... 50-60 ...	12-16 ...	101-101½
దొడ్డు	... 45-50 ...	20-25 ...	100-101
గొట్టె	... 70-80 ...	30-40 ...	102-104
మేక	... 60-70 ...	25-30 ...	101-103
బక్క	... 70-95 ...	15-25 ...	101-105
దూడ	... 65-వరకు ...	12-16 ...	102-104
కోడి	... 65-వరకు ...	8-12 ...	102-103

ఉష్ణము తగ్గిపోవుట

చెమటపట్టి జంతువులను చక్కమైన ఎక్కువరోమములుగల జంతువులను నేడి ప్రదేశములలోగాని నేడిగాలి ఎక్కువగాతగులు ప్రదేశములలోగాని యుంచినయెడల దానికి ఆనేడి రోపప్రదేశించి అపాయము కలుగజేయును. ఈవిషయములో చెమట రంధ్రములుగల పశువులను అట్టి ప్రదేశములలో నుంచినను ఏవిధమున ఉష్ణముకలుగించదు. దానికి కారణములు చెమటరంధ్రములనుండి చెమట బయలుదేరి పైపొంపు నేడిమిని అపినేయును. అదేకారణముచేత గుఱ్ఱము ఎంతమాగ్రమైనను నేడిమివలన అపాయము లేక చెమటరంధ్రముల సాయముచే పరుగిడుక కిగలదై యుండును. ఎద్దు అటుగాక గుఱ్ఱమువలె ఎక్కువమారము పరుగెత్తిన యెడల చెమటరంధ్రములు లేకపోవుటచేత ఉష్ణము రోపనికి ప్రవేశించి ఎక్కువసప్తము కలిగించును.

ఏ పశువైనను మిక్కిలి చల్లని ప్రదేశములోనుంచినయెడల కొంతసేపటికి దాని యొక్క సహజ వృష్ణతగ్గిపోయి చలిచే అవరింపబడి కొంతసేపటికి చల్లించును. అటులనే యూరకుండిన యెడల కొంతసేపటికి ప్రాణశబ్దముకూడ కలుగును. అప్పుడు మనము దానిని 96 డిగ్రీలనేడిమి యున్న ప్రదేశము ప్రకుత్పించవలెను. శీతలముచే పశువు బిగిసి పోయినయెడల అది సరియగు నీటికివచ్చుట, బ్రతుకుట చాలకష్టము.

పశువులకు తగినంత ఆహారము పెట్టకపోవుటవలన కూడ ఉష్ణత తగ్గును. చల్లని ప్రదేశములలోని జంతువులు ఆహారము ఎక్కువగాతగును.

హృదయపరిక్ష

పశువుప్రాణమునకు హృదయము. క్వాసరోశములును విభ్యాధారములగుటచేత దాని సంరక్షకారము సర్వేశ్వరుడు వెన్నెముక చేతను, ప్రక్కటెముకలచేతను, రొమ్మ

పంశ మెరిగి పనితన : పన్నెయిరిగి పశువును సంపాదించాలి.

ముకచేతను ఒక పేటికను నిర్మించి వానియందు పదిలపరచియున్నాడు. పశువు ఎక్కువ పాటువడుకొంటిని గుండె ఎక్కువపనిచేయునని తలంచవలెను. ఈపని చేయుట మనము వదలినయెడల మనముచేయు చికిత్సలలో చాలపొరపాలులు కలుగును. అట్లు చేయని యెడల పశువు ఆకస్మికముగా చనిపోవుటయు గలుగును.

సైతన్ కోవుతో పరీక్షించుట

గుండె యేసామమునందున్నదియు తెలిసికొనుటకు సైతన్ కోవుఅను ఒక పరికరమున్నది. దీనిని పశువుహృదయసానము నందుంచి దాని కమర్చబడిన గబ్బరుగొట్టముల రెండింటిని రెండు కుహరములయొక్క జొనిపియుంచి పరీక్షించినచో రెండువిధములగు లబ్ డబ్, లబ్ డబ్ అను శబ్దములు విసబడును. ఈ పనిముట్లు నుపయోగించి హృదయములోని ధ్వనులను తెలిసికొనుటవలన చాలా బాధముండును. పెద్దపేగు సంబంధమైన ధ్వనులను గూడ గుర్తొనవచ్చును.

ఈ పనిముట్లను చాలాజాగ్రత్తగా నుంచవలెను. గాని దానినుపయోగించు ఫలితము త్వరగా మాత్రము చెప్పరాదు. మిక్కిలి అనుభవముగల పశువైద్యుడే ఈ సైతన్ కోవుతో పరీక్షించవలెను గాని తదితరులు పరీక్షించినను బాధములేదు. కొందరువైద్యులు ఈ పనిముట్లు చేతిలోనుండి చాలునని డాంబికముతో నటునిటు త్రిప్పుచుండుదురు. ఒక్కొక్కప్పుడు దీనినుపయోగించునపుడు అది వెండ్రుకలకు తగిలిగాని లేక చర్మము యొక్క కదలిక మొదలగునవి వలనగాని ఒకవిధమగు ధ్వనికలుగును. ఆ ధ్వనిని మనము హృదయసంబంధమగు ధ్వనిగ భావింపక మగల మగల అతిజాగ్రత్తగా పరీక్షింపవలెను.

ఈ విధమగు తప్పులే ఊపిరికిత్తుల వలన ధ్వనికలిగినపుడుగాని పేగులయొక్క కదలిక చే కలిగిన ధ్వనులవలనగాని వైద్యులు తప్పుత్రోవను పోక జాగ్రత్తగా పరీక్షించు ముండవలెను. ఈ పరీకరము నుపయోగించుటలో అనుభవమున్నయెడల ఇట్టి కష్టములుండవేరవు. ఆ పశువునకు చుట్టుప్రక్కల నిశ్శబ్దముగా నుండవలెను. రోగనిర్ణయము చేయుటకు ముందు ఒకేసారి ఆపరీకరము నుపయోగించి ఫలితము చెప్పుటకన్న కొంచెము అగి అగి పరీక్షించిన పిమ్మట రోగనిర్ణయము చేయుటనుంచిది.

నా డి

రక్తనాళములలో రక్తము కదలుటయే నాడి లేక ధాతువు కొట్టుకొనుట యందురు. పశువు పడి ఎడమలనుండు త్రింది దవుడలప లోపలిభాగమునను కాలి యొక్క రక్తనాళములదగ్గరను, కాలిచీలముండల వెనుక వైపున వెండ్రుకలుండెడు ఉబ్బెత్తు భాగములోను, తోకమట్ట మొదటిభాగములోను ధాతువును చూడవచ్చును. బొటనవ్రేలుగాక చేతియొక్క నాలుగువ్రేళ్ళచేత శుద్ధరక్తనాళములుండు ఎముకలకు వసి అదిమి చూచిన ధాతువు స్పష్టముగా కొట్టుకొనుట తెలియును. నాడి మనవ్రేలు

నకు తగులుటకు కారణమేమన వృద్ధయతోక మెల్లప్పుడును వికసించుటయు, ముడుచుకొనుటయు జరుగుచుండును.

సుఖముగానుండు గొడవ ఒక నిమిషమునకు 45 నుంచి 60 వరకును ఇంతకు పాచ్చు తగ్గులుండిన ఆ జంతువు అనారోగ్యముగా నున్నదనియు గ్రహించవలెను.

రక్తనాళముల కదలిక

రక్తనాళముల కదలికను డాక్టర్ బరోన్ సాండర్సన్ దొరగారు దుర్బిణీయంత్ర పరీక్షించుచే కనుగొనిన ప్రకారము నాడియొక్క కదలిక ఈదిగువ రీతిగానుండును. వృద్ధయతోకము ముడుచుకొనుటకు ఆరంభింపగానే వృద్ధయ పార్శ్వమునగు పెద్దరక్తనాళమునందుండు రక్తముకదలుటకు ప్రారంభించును. జ్వరకభాగము అనగా ఆకలి వుట్టించు భాగముకూడ ముడుచుకొనునపుడు రక్తపుపోటు అనగా కదలిక వృద్ధయతోకమువద్దనుండు ఒక గుండ్రనితిలికి తగులును. జ్వరక ముడుచుకొనునపుడు రక్తపు పోటు వృద్ధయమువైపునకు పోవును. ఈప్రతిరక్తపు కదలిక రక్తప్రవాహమువైపునకు నిమిషమునకు 90 అడుగుల వేగమువంతున ప్రవహించును.

నాడియొక్క కదలిక ప్రేతచెప్పిన రెండు కదలికలవలన దుర్బిణీయంత్రముపైటి శరీక్షించగా ఈక్రిందివిధముగా నుండునని తెలియుచున్నది. మొదటిరక్తపు కదలిక గుండెకు నిలువుగా పైకిపోవుటచేతను, రెండవది క్రిందికి దిగుటచేతను నాడియొక్క కదలిక కలుగును. ఒకటితరువాతనొకటి నెమ్మదిగా క్రిందికిని పైకిని తిరుగుటచేత నాడి కూడ నెమ్మదిగాదిగును. ఒకకదలికకు మరియొకకదలికకు మధ్యనుండు విశ్రాంతి సమయమును కనుగొనుట వృద్ధయము ముడుచుకొనుటలనుబట్టి సరిగా కనుగొనవచ్చును. ఎటులన ఒకకదలిక జ్వరక ముడుచుకొనునపుడు గలుగు గట్టితనమువలన యేర్పడును. రెండవ కదలిక వృద్ధయమునకు ఎడమపార్శ్వమునందుండు పెద్దరక్తనాళముయొక్క మడత ముడుచుకొనుటచేత దిగువుగలిగియుండును.

కదలికల వ్యయంకృతి

ఈరెండుకదలికలు కొన్నికొన్ని విషయములలో ఇతరవిషయములకన్న అవియే వ్యయముగా లేటెల్లముగా తమకదలికను తెలియబరుచును. ఈవ్యత్యాసములకు కారణము వానివానికి సంబంధించిన శుడతలు చాలపని చేయవలసియుండును. అదియును గాక వృద్ధయము కదలుటకు కారణము అకస్మికముగా రక్తనాళములు ముడుచుకొని నందువలన గలుగు దిగువులేనమైయున్నది.

జ్వరక ముడుచుకొనుట ప్రారంభమైనతోడనే నెత్తురుగొట్ట సమదాయమంతయును, ఆ నాళములలోనుండు కదలికయు ఒకేసారిగ అతిత్వరికముగా పాచ్చిపోవును. ఆరంభములో రక్తనాళములు రక్తప్రవాహములకు లోనుగాక సరియగు స్థితిలోనికి

పచ్చును. ఈ కడలికలకు మధ్యనుండు విక్రాంతి సమయము నాశములలో రక్తము తూర్తిగా ప్రవహించునపుడు ఎక్కువగ నుండును. రక్తప్రవాహపు వడి హెచ్చినపుడు విక్రాంతిసమయము తగ్గును.

నాడిని తెలిసికొనుట

వ్యాధిని తెలిసికొనుటకును, చికిత్స చేయుటకును ముందుగా నాడిని పరీక్షింప వలయును. ఈ నాడి పశువు హృదయము నుండి శరీరమంతటను రక్తము వ్యాపింపజేయు శుద్ధరక్తనాళములలోని రక్తప్రవాహమువలన కలుగుచుండును. ఆరోగ్యస్థితియందు ఈ నాడి దెబ్బలసంఖ్యి పశువువయస్సునబట్టి మారుచుండును.

పశువుయొక్క రోగలక్షణములను వివరించునాగు నాడి కొట్టుకొనుటను గూర్చి బాగుగా పరీక్షింపవలయును. ప్రతిరోగ విషయమున నాడిని, హృదయమును పరీక్షించినయెడల రోగలక్షణములను కనుగొనుటకుగాని, తగుపరిచికిత్సచేయుటకుగాని మిక్కిలి కష్టమగును. అప్పుడప్పుడు నాడియందు కలుగు మార్పులను బట్టి అది ఒకటని వెంటనే తెలింపరాదు. హృదయ పరీక్షయిన తరువాత నాడిని పరీక్షించిన యెడల రోగనిర్ణయము నకు కొంతవరకు పయోగించును.

నాడికొట్టుకొనుటలో వ్యత్యాసములు

చాలారోగములలో నాడికొట్టుకొనుటకు గల భేదములనుబట్టి రోగముయొక్క ముఖ్యలక్షణములను తెలిసికొనవచ్చును. హృదయమునుండి రక్తనాళములలోనికి పోవు రక్తప్రవాహముచే ఈ నాడి కొట్టుకొనుట జరుగును. పశువు ఆరోగ్యస్థితి యందున్నపుడు లేక హృదయమును ముడుచుకొను నపుడెల్ల నాడి కొట్టుకొనుటయని యిదివరకే చెప్పబడెను. మొట్టమొదట చేసిన హృదయపరీక్షను బట్టి నాడి ఆగి ఆగి కొట్టుకొనుచున్నదో లేక తరచుగా ఆగక కొట్టుకొనుచున్నదో తూర్తిగా ఆగిపోవు స్థితిలోనికి రానున్నదో తెలిసికొనవచ్చును. నాడి యెక్కువ కొట్టుకొనుటను బట్టి అదియొక రోగలక్షణముగ గ్రహింపరాదు. కారణమేమన కొత్తమనిషి పశువుయొద్దకు వచ్చినపుడుగాని నెమరు వేసినవెంటనేగాని నరములు సరియగుస్థితిలో లేకపోవుటవలనగాని, ఎటువంటి మొదలగునవి చేసినప్పుడుగాని నాడి క్రమము తప్పి కొట్టుకొనును.

త్వరగా కొట్టుకొనుట

పశువు సరియగు ఆరోగ్యస్థితియందున్నప్పటికన్న ఎక్కువపర్యాయములు కొట్టుకొనుటయే త్వరగా కొట్టుకొనుట యనబడును. మంచి ఆరోగ్యవంతములగు కొన్ని పశువులు మాత్రము వానినాడి మామూలుగా కొట్టవలసిన వేగముకంటె కొంచెము త్వరగా కొట్టుకొనును. జీర్ణమునకు సంబంధించిన అవయవములు అలసియున్నపుడు, పనిచేయుటకు ఎక్కువైనపుడును నాడిత్వరగా కొట్టుకొనును. జ్వరముయొక్క ప్రారంభదశయందుకూడ నాడి తీవ్రముగా కొట్టుకొనును.

నెమ్మదిగా కొట్టుకొనుట

ఈనాడియొక్క సడకయంతయు పైసచెప్పిన త్వరితనాడియొక్క సడకకు వ్యతిరేకము, నాడి నెమ్మదిగా కొట్టుకొనుటయన పశువు ఆరోగ్యస్థితియందున్నపుడు కొట్టుకొను పరిమితికంటె తక్కువగా కొట్టుకొనుట. మెదడు సంబంధముగు రోగమువలనను, రక్తపుప్రవాహ లోపమువలన కలిగిన జబ్బులవలనను నాడి నెమ్మదిగా కొట్టుకొనును.

ఈనాడి విషయములో సామాన్యపు నాడి ఒక సారి కొట్టుకొనుటకు పట్టుకొలము కన్న దీనికిపట్టుకొలము తక్కువైయుండును. కాని సామాన్యపునాడి 45 సార్లు కొట్టుకొనవలసియుండినయెడల త్వరితనాడి 50 సార్లువరకు కొట్టుకొనును. సామాన్యపునాడి నిమిషమునకు 45 పర్యాయములు కొట్టుకొనును. దీనికికొలము మధ్యమధ్య ఆగుటయే.

శ్వాస

ఆరోగ్యవంతిమగు పశువు గాలిని మెల్లగను దీర్ఘముగను వీల్చుట విడచుట జరుగుచుండును. పశువు ఆయాసముగానుండు సమయమునందును, పనిచేయుచున్న సమయమునందును ఆవలించుట దగ్గుట మొదలగు గుర్తులు కనబడును. శ్వాసకొంచెము వేడిగానుండును. జ్వరమువచ్చినపుడు అది విడచుగాలియును దానిశీతము వేడిగానుండును. సైలివోక్రొఫో చూచినయెడల ఉచ్చాస్య నిశ్వాసములు వీల్చుటలో గలుగు భేదములు తెలియును. శ్వాసవీల్చునపుడు గలుగు శబ్దము తూములోనికి గాలి జొరబడునపుడుండు శబ్దమువలె విసబడును. ఊపిరివదలునపుడు ఇంత శబ్దముండదు. ఊపిరితియునపుడుండు శబ్దము విడచునపుడుండు శబ్దమునకంటె మూడువారుగు రెట్లెక్కువగానుండును.

త్వరగా వీల్చుట

చాలావ్యాధులయందు పశువుగాలిని త్వరగావీల్చును. అట్లువీల్చుటకు రక్తప్రవాహమునుబట్టియు, ప్రవాహ అవశ్యతనుబట్టియు జరుగుదుండును. అతిశయావస్థను చెసినపుడు రక్తము త్వరగా ప్రవహించుచు గాన త్వరగా గాలినివీల్చును.

కష్టముగా వీల్చుట

కష్టముగా గాలినివీల్చుకొనుటకూడ వ్యాధియొక్క ముఖ్యలక్షణమే. అదిఅనేక కారణములవలన గలుగుచుండును. ఊపిరితిత్తులయొక్క నాళులకు కారణము ఉచ్చాస్య నిశ్వాసముల నాళుటయే. అట్లు ఆళుటవలన బాధకూడుచుండును. శ్వాస మసకు విసబడకపోయినంతమాత్రముననే పశువునకు వ్యాధియున్నదని చెప్పుటకష్టము. ఒక్కొక్క వ్యాధిసోకినపుడు పశువు గాలిని అతిత్వరితముగను, మిక్కిలి వేడిగనువీల్చును. గాలిని కష్టముగవీల్చునపుడుగూడ ఒకవిధమైన వ్యాధికి రోగిచిన్నతని భావింపవచ్చును.

ఈరిముందర చెన్న నా, ఉలవపాట్లు అయినా మరియొకకొండ దున్ను తాండ్రుండినదొ.

ధ్వనియుతమగు శ్వాస

దీనినే గురికయంగును. ఇది మెదడునందు పుట్టికన్యాధివలకలుగను. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు స్పష్టముగను బలముగను త్వరితముగను యున్నంతవఱకు ఆపాయము పొటనే యుండను. కాని ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములయొక్క బలము, త్వరితము తగ్గగనే ప్రసగణమ ముఖ్యమైనది హృదయకోశమై యున్నది. ఈసమయములో ఆపాయము కలుగునని గ్రహించవలెను. ఊపిరితిత్తులు జబ్బుగనున్నచో ఊపిరి దురుహగను, పిగస ముగిమన్నచో మందముగను దీసికొనును. ఆరోగ్యవంతమగు పశువు ఊపిరి సమశీతోష్ణ ముగనుండును. రోగ పశువు విషమ గాలి చల్లగనున్నచో కష్టసాధ్యము. ఊపిరిదీయుట కష్టముగానుండి గురికశబ్దము ఊపిరితిత్తులయందు విరివించినయెడల ఊపిరితిత్తులలో శ్లేష్మమున్నదని గ్రహించవలెను.

ఆరోగ్య లక్షణములు

పశువు ముఖ్ఘ్నితీయందుండునపుడు గుంపులో కలిసి మెలసి వలసివత్తుడు మేత మరియు కాలమెరిగి నెమరు వేయుచుండును.

చెవులు చూటిమాటికి ఆడించుచు నిక్కొడుగుచు ఆనందముతో నుండును. ముక్కు చూతి కాంతి నుండి చెమ్మగలిగి యుండును.

కన్నులు నిర్మములగ కాంతిగ నుండును.

చర్మము మృదువుగనుండి రోమముకలు చర్మమువీరగ వ్రాలి యుండును.

పశువు ఒకదాని నొకటి నాకికొనుచు కాలోచితముగ పేదనేయును. ఆపేద మెత్తగానుండును.

మూత్రము ధారాళముగా నొప్పిలేకుండు పోయును.

యజమానియందు ఉత్సాహముగా నున్నావని ఒక విధముగా ప్రేమదృష్టిని చూపించును.

ఏ అవయవమునందును నావుకాని పంటగాని లేకుండును.

పశువునకు ఆకలికలుగుట, సరిగా వీచుట, బాగుగా పేదనేయుట మొదలగు నవి సక్రమముగా జరుగుచున్నయెడల ఆరోగ్యముగా నున్నదని గ్రహించవలెను.

అనారోగ్య లక్షణములు

కొమ్ములు వెచ్చగను, మూతిని చెమ్మలేక, మూత్రము పశువునాగువలె కొంచెము కొంచెము పోయుచు పేడగట్టిగావేసి, మేలేనూని మిక్కిలిదాహముగొని, మందవిడిచి దూరముగాపోయి నల్లకప్పువేసి యుండినయెడల అనారోగ్యముగా నున్నదని గ్రహించవలెను. ఇకను శరీరము వెచ్చగను, పొడిగాను, నుట, ఆకలినుండిగిందుట, ముఖభద్రకము నిస్సత్తువ మొదలగు లక్షణములునూపి రోగి యుండును.

ముఖపరీక్ష

ముఖము పశువుశరీరమునకు అద్దమువంటిది. ముఖముననుసరించి బట్టి శరీరమందలి రుగ్మతలను తెలిసికొనవచ్చును. శ్వాససంబంధముగ వ్యాధుల యందు ముఖము చూచుచు కొని ఆందోళనలను జేయును.

రక్తసంబంధముగ రోగములందు పెదవులు ముఖము వెలవెలబారును.

వారసంబంధముగ రోగములందు ముఖము కాంతి హీనముగా నుండి నుంచి అక్షణములే కలిగియుండును. శరీరము మెరుపుగానుండును.

మాత్రసంబంధముగ రోగములందు ముఖము కాంతి హీనముగా నుండును.

మెదడు సంబంధముగ రోగములందు ముఖము గాఢముగా నుండి నేత్రము లలో దోషముండును.

నేత్రపరీక్ష

పశువు నేత్రములు ఎరువురంగుగానుండి వునులు కట్టుకుండిన యెడల కాకరోగ మనియు, నేత్రములు పసుపురంగుగ నున్న కామిల రోగమనియు కన్నులాచి నీరు గారుచున్న వాతరోగమనియు గ్రహించవలెను.

నాలుక పరీక్ష

పశురోగనిదానమునందు నాలుక పరీక్షయవసరము. పశువు నాలుకను బాగుగా చాచునట్లు చేయవలెను. నుంచి వెలుతురునకు తీసికొనివచ్చి వైద్యుడు ఎదురుగా నిలబడి నాలుక సైభాగమంతయును బాగ్రత్తగా పరీక్షించవలెను. సామాన్యముగా పశువులలో కొన్ని నోరు తెరువనియక నానాచిక్కులు పెట్టును. అట్టి సమయములలో బాగ్రత్తకట్టివేసి బలవంతముగా నొక్కొక్క పరీక్షించవలెను. నాలుకయొక్క ఆకారము, సైజు, ప్రక్కభాగములు ఎట్లున్నది తెలిసికొనవలెను. నాలుక మందముగా నున్నదో, పటచగానున్నదో, వ్రేలాడుచున్నదో కనుగొనవలెను. నాలుకయొక్క సైభాగము మెత్తగా, కాంతిగానున్నదా? లేక ఎండియున్నదా? పాచిబట్టి వాసన వేయుచున్నదా? రంగు ఎరిగిగానున్నది పరీక్షింపవలయును. దీనినిబట్టి ముఖపరీక్ష, దంతపరీక్ష చేయవలెను.

రక్తసంబంధముగ రోగములలో నాలుక ఎరువురంగుగానుండి పలుచబారి కాఢగానుండును, వాతరోగములలో నాలుక మెదురుగా తెలుపుగా ఒకవిధముగ వాసనగానుండును. ఇట్టిసమయములలో దంతములచుట్టు పాచియుండును. అంగిటి ముండు మెరుగును. జీర్ణరోగములందు నాలుకపాచి తెలుపుగా, కొంచెము వాసనగా, మెత్తగా నుండును. మలబద్ధకముగానున్నపుడు నాలుకమీద పాచికట్టును.

పశువులకుమాడ వారి, పిత్త, కఫము లున్నవని తెలిసికొనుము.

మలపరీక్ష

పశువు శరీరములో ఆహారము జీర్ణమునొంది సారగూఢముగను, కీటకూపముగను ప్రేగులలోనున్నప్పుడు సారభాగము రసాయనములు మున్నగు నాశీములద్వారా హృదయమునకు తీసికొని పోబడును. మిగిలిన కీటకభాగము ద్రవ్యశూన్యమై గట్టిపడి పేడ రూపముగ బయటకువచ్చును. ఇట్లు సక్రమముగా రాకపోయిన పశువు పలువిధరొగముల పాలగును.

ప్రతిదినము ఎన్నిసార్లు పశువు పేడవేయుచున్నది, పేడరంగు, వాసన ఎట్లున్నది కనుగొనవలెను. పేడచల్లగా, దుర్బంధముగ జిగటగ నున్న వాతరొగమనియు, గట్టిగా, వేడిగా, మెరుపుగా, వంటలువంటలుగా నున్న కాకిరొగమనియు, మిక్కిలి పలుచగ, తొంగిరాడు పేడవేయుకొని కొంచెము గుడ్డవలెగా నున్న జలుబు రొగమనియు గ్రహించవలెను.

మూత్ర పరీక్ష

మూత్రపిండములకు సంబంధించిన కొన్నివ్యాధులకు మూత్రపరీక్ష చేయు రొగ లక్షణములు కనుగొనుటకు ముఖ్యసాధనము. కాని రొగ నిర్ణయముచేయుటకు పూర్వము ప్రతివైద్యుడూను ఒకగాఢపాత్రలో ఆవ్యాధిగలపశుముమూత్రముపోసి దానిలో ఒకచుక్క మహాద్రావకమును వేసి దీపపుబుడిమీదగాని, స్పిరిట్ ల్యాంపుమీదగాని కాచవలెను. కాచినపిమ్మట మూత్రముమీద ఒకవిధమైన పదార్థము తేరుకొనును. తేరుకొనిన పదార్థముమీద ఆద్రావకపుబ్బువేసినపుడు అది కరుగనియెడల పశువునకు శుక్లశవ్వమున్నదని తెలిసికొనవలెను. అది విరిగియెడల జబ్బులేదని గ్రహించవలెను.

ఒకగాఢులో మహాద్రావకపుబ్బు ఒకటిగాని రెండుగాని నేసితరువాత కొంచెము మూత్రమును గాఢులోపలిభాగపు ప్రక్కన అంటుకొని జారునట్లుపోయవలెను. ఆ మహాద్రావకమును ఈ మూత్రము కలసినచోట ఒకవిధమగు తెలుపుపదార్థము వలయా కారముగా నేర్పడును. ఈపదార్థముయొక్క ఘనపరిమాణము ఆమూత్రములో శుక్రమే గాక తదితరపదార్థములుకూడ కలసియుండును. పిండటివిధానమే రూఢిగా తెలుపును. అదియే శ్రేష్ఠము.

రంగునుబట్టి వ్యాధులు నిర్ణయించుట

సామాన్య మూత్రస్వభావము లేక ఎరుపురంగుగగాని, కిరిరంగుగగాని, యుండును. ఒక్కొక్కపుడు ముదురు ఎరుపురంగుగానుండును. పలువురంగుగానున్నచో వ్యాధి ఎక్కువగా నున్నదనియు, పలుచగానుండి కొంచెము తెలుపుగానున్న వాతరొగమనియు, పసుపుపచ్చగానుండి కొంచెము తెలుపుగానున్న వాతరొగమనియు, పసుపుపచ్చగానుండి ఎక్కువవేడిగానున్న జ్వరమున్నదనియు, మాంసము కడిగినవిరువలెన్న మూత్రము వెంట రక్తము పోవుచున్నదనియు గ్రహించవలెను. మూత్రము పోయునపుడు భూమి మీద నురుగు బాగుగాకట్టును. వివ్యాధియు లేని పశువు మూత్రము తెలుపురంగుగానుండి అంతవేడియుండదు.

భేషజకల్పము

పదునొకండవ భాగము

ఓషధీర్షా మరూపాభ్యాం జానతే హ్యజపా వనే
అవిపాశ్చైవ గోపాశ్చ యే చాన్యే వనవాసిनః.

అరణ్యములందు మేకలను గొట్టెలను ఆవులను మేఘవారును, వనములందు
నివసించు వారును, ఓషధుల యొక్క పేర్లను, వాటియార్యములను తెలిసికొని
యుందురు.

ననామజ్ఞానమాత్రేణ రూపజ్ఞా నేనవాపునః
ఓషధీనాం పరాం ప్రాప్తి కశ్చిద్వేదితు మర్హతి॥

జానుములను, రూపములను తెలిసికొనినంత మాత్రమున ఓషధులయొక్క
సంపూర్ణజానము నెవడును పొందజాలడు.

యోగ విన్నామరూపజ్ఞస్తా సాంత త్వ విదుర్యతే
కింపునర్యో విజానీయా దోషధీః సర్వథా భివక్తః॥

జానుములను రూపములను తెలిసికొని ప్రయోగించు విధమును తెలిసికొనిన
వాడు ఓషధులయొక్క తత్వములను తెలిసినవాడని చెప్పబడును.

యోగమాసాం యో విద్యాదేశ కాలోపసాదితమ్
పురుషం పురుషం వీక్ష్య సవిజ్ఞే యో భివక్తమః॥

ఏ నైద్యుడు ఓషధులను సర్వవిధముల తెలిసికొనునో వాడు ఓషధులయొక్క
తత్వమును తెలిసిన వాడని వేరుగ చెప్పవలయునా? ఎవడు ప్రతిమానవుని పరీక్షించి
తాళకాలముల ననుసరించి ఓషధులయొక్క ప్రయోగమును తెలిసికొనునో వాడు భిషగ్య
రుడుగ నుండును.

యథావిషం యథాశస్త్రం యథాగ్ని రశనిర్యదా
తథోషధమ విజ్ఞాతం విజాతమమృతం యథా॥

పాడి పశువును మిక్కిటముగా మేపరారు.

తెలిసికొనకుండ ప్రయోగింపబడిన ఔషధము విషమువలెను శస్త్రమువలెను అగ్నివలెను పిడుగువలెనుండును. తెలిసికొని ప్రయోగింపబడిన ఔషధము అమృతము వలెనుండును.

ఔషధం హ్యనభిజ్ఞాతం నామరూప గుణైస్త్రిభిః
విజాతమపి దుర్యుక్తమనర్థయోవ పద్యతే॥

నామరూప గుణములు ఈ మాడింటితోడను తెలిసికొనబడని ఔషధమునకు, తెలిసికొనియు సరిగా ప్రయోగింప బడని ఔషధము హానికలిగించును.

యోగాదపి విషం తీక్ష్ణముత్తమం శేషజం భవత్
శేషజం చాపి దుర్యుక్తం తీక్ష్ణం సంపద్యతే విషమ్॥

తీక్ష్ణమైన విషముగూడ సరిగా ప్రయోగింపబడినచో శ్రేష్ఠమైన ఔషధముగను, ఈ తక్కుమైన ఔషధముగూడ సరిగా ప్రయోగింపబడినచో తీక్ష్ణమైన విషముగనగును.

తస్మాన్న భిషజాయుక్తం యుక్తిబాహ్యే నశేష్యజమ్
ధీమతా కించితాధేయం జీవితారోగ్య కాజీణా॥

అందుచేత జీవితమును ఆరోగ్యమును కోరుపట్టి బుద్ధిమంతుడు యుక్తితెలియని వైద్యునిచే ప్రయోగింపబడిన ఔషధము కొలదిగాకూడ గ్రహింపరాదు.

“చరక సంహిత ”

సర్వాణ్యేవ చాభిన వాన్యన్యత్రమధు ఘృత గుడ వివృతీ
విడంజ్జేభ్యః తేషాను సమృత్తావలిక్రాంతవత్సరాణా దదీతేతి॥

తేన బెల్లము పిప్పలివాయు విడంగములు వీటినిడిచి మిగిలిన వన్నియోషధులను నూతనములగువాటినే యుపయోగించినచో బలముగలవగును. తేనె మున్నగునవి చాలా పాతవియయినచో మిక్కిలి బలముగలవగును. అంతిపాతవి దొరకనిచో నొక సంవత్సరము బూర్వపువైనను తీయవచ్చును. కాని ఒకసంవత్సరమునకు లోపుగా తీసినవి పనికిరావు. అనగా బలములేని వగుననిభావము.

“సర్వావయవసాధ్యేషు పలాశ లవణాదిషు
వ్యవస్థితో న కాలోస్తి తత్ర సర్వవిధీయతే”॥

దుక్కిటెద్దనకు బలకరమగు పదార్థములు పెట్టుము.

వేళ్ళు మొదలగు సర్వాత్యయవములగు ఉపయోగించు నోళ్ళుధులను, అకులు, అవలు మూలు మొదలగునవియును నియమితకౌలములేవంటే సర్వకౌలములయందును దీక్షిత నుపయోగించును.

“విగడ్డనా పరామృష్ట మవివన్నం రసాదిభిః
నవం ద్రవ్యం పురాణం వా గ్రాహ్యమేవ వినిర్ధికేత్”

దుర్గంధములేవియు, రసాదులచే విపత్తును పొందినవియు, నగు ద్రవ్యములు కొత్తవిగానున్నను పాతవిగానున్నను గ్రహింపవచ్చును.

“ధూమవర్షాసిలక్లేదైః సర్వర్తుషనభిద్రుతే
గ్రాహ్యత్వా గృహే న్య స్నేద్విధిసౌషధసంగ్రహమ్”

పొగ, వర్షము, గాలి, లేమి, ఇవి యేముగురువగును సోకకుండ గృహము నందు ఔషధసంగ్రహములను యథావిధిగాజేసి యుంచవలెను.

ప్లోతమృద్భాణ్ణ ఫలకశబ్ద్యువిన్యస్త శేషజమ్
ప్రశస్తాయా దిశి శుచౌ శేషజాగారమివ్యతే॥

పస్త్రఖండములు, మట్టిపండ్లు, పలకలు, కొమ్మలు, వీనియందుగుంచబడిన మందు లకు నీరు లేమి సోకకుండ పరిశుద్ధముగాను చి గూర్పు లేక పుత్తగదివృత్తులందుంచినచో శ్రేష్ఠతనొందుననిగా నుండును. (‘‘మశ్రుత సంహిత’’)


ఉర్ధ్వ మాచ్ఛాదితే దేశే వస్తాద్విశావృతేతథా
గృహేవా నిర్జనే పూతే శేషజం కారయే ద్రుధః॥

ఉర్ధ్వభాగమున నాలుగు పార్శ్వములయందు వస్త్రాదులచే కప్పబడియుండెడి ప్రదేశమునగాని, పవిత్రగృహమునగాని, జనసమూహములేని గృహమునగాని ఔషధ ములు చేయవలెను.

ఉర్ధ్వముఖై శ్శిలాపుత్రైశ్శిలాయా మర్దయేత్సదా
తదాహి ద్విగుణం వీర్యం స్యాదీశానముఖో యది॥

ఔషధములు నూరు రాతిని ఉర్ధ్వముఖమున నుంచుకొని, ఈశాన్యముఖమున గూర్చుండి ఔషధమును ఫిల్వమున మర్దించినదానికి ద్విగుణవీర్యము గలుగును.

“అనుపానమంజరి”



బౌద్ధములు త్రాగించు విధానము

బౌద్ధములు త్రాగించునపుడు పశువుయొక్క తలను మోచియుకొని నోగుతెంచి ఒక్కొక్క గొట్టమువంతున గాని అంగొట్టము వంతునగాని త్రాగించవలెను. మందులు పోయునపుడు జాగ్రత్తగా పశువునోగుతెంచి నాలుక నొక్కిపెట్టి యుక్తిగా పోయవలెను. పశువుయొక్కతలను, మందుపోయుటకు వీలుగ నుండునట్లు మెత్తిపట్టి పశువు అట్టునిటు తూటవండునట్లు చూచి మందుత్రాగించవలెను. కొన్ని పశువులు అల్లరిచేయుచు, అరచుచు క్రిందపడును. అట్లు పడుటవలన పశువునకు అపాయము కలుగుటయేగాక అచారశాస్త్రమునకు ద్రవ్యదలను దెబ్బలు తిగులును. కాబట్టి మందులు త్రాగించునపుడు జాగ్రత్తగా పశువును చూచునుండువలెను. దగునట్లు పశువు కన్నులనీటి పట్టుచుచు దగ నిచ్చినతరువాత మందు నోటిలో పోయవలెను. వ్యాధిగల పశువునకు ఒకేసారి అచార మంతయు పెట్టరాదు. కొంచెమొకచెముగా పెట్టవలెను. ద్రవరూపముగల మందులు గల నీసాలను (Bottles of Liquid medicines) చేతిలో కుదిసి త్రాగించవలెను. పాత్ర అడుగుభాగమున మెట్టియున్నచో దానిలో కొంచెము నీరుపోసి త్రాగించవచ్చును. దీర్ఘ (Colic) వ్యాధులకు తల్చి అన్నము వ్యాధులకు ఎక్కువగా మందులను

కండి పొదుగుగల పశువు అంత మందిదికాదు.

వాడరాదు. అట్లు వాడినయెడల పశువునకు ప్రాణాపాయము కలుగును. పశువు మిక్కిలి బలహీనముగా నున్నయెడల ఆహారము తినుటకుగాని త్రాగుటకుగాని లేవదీయరాదు. అది లేవలేదను యుద్దేశముతో శరీరముపై దెబ్బలు కొట్టరాదు. త్రాళ్ళతోనటునిటులాగ రాదు. బలవంతముగా నటునిటు ప్రోయరాదు. పరుండనిచ్చియే నెమ్మదిగా ఆహారము పెట్టవలెను. అన్నివ్యాధులయందును ముఖ్యముగ తీవ్రదశ (Predominating stage) యందున్నపుడు కఠిన పవార్థములను మాత్రము వాడరాదు.

ఇంతియేగాకుండ మందులు శరీరములోనికీపోయి త్వరగ జీర్ణము కావలెననిన ద్రవరూపముగ మంగు (Liquid of medicines) అను పోయవలెను. మందు వృధాగా పోకుండునట్లు చేయుటకును నెమ్మది నెమ్మదిగ కొంచెముకొంచెముగా వెదురుగొట్టము అతో పెట్టవలెను.

వెదురుగొట్టములు ఉపయోగించుట

సామాన్యముగా పల్లెటూళ్ళలోని కైతులు వెదురు గొట్టములతోగాని ఇత్తడి గొట్టములతోగాని మందులు పోయుదురు. ఈ గొట్టములు నునువుగ వెడల్పుగ అంకి పొడవు లేకుండునట్లుగ తయారు చేయించి వాడుట మంచిది. గొట్టములు గరుకుగ చివరభాగము నూది మొనవలెనున్నచో పశువుఅంగిటికి నాలుకకు గ్రుచ్చుకొని గాయములు (Wounds) పడును. కాబట్టి గొట్టములు నునువుగనుండి చివరభాగము వెడల్పుగ నుండుటమంచిది.

గొట్టములను వాడునపుడు చూపల పురుగులు, శేళ్ళు, బూజు వగైరాలు లేకుండ చూచి మందులుపయోగించవలెను.

సీసాలను ఉపయోగించుట

గొట్టములకంటె సీసాలతో పోయుటకూడ మంచిపద్ధతియైయున్నది. ఇట్లు పోయుటవలన పశువునోటిభాగమునకు ఆపాయములు రావు. సీసాను నోటిలోనుంచి పోయినపుడు అది బ్రద్దలుకాకుండ చూడవలెను. తలను మెడకు సమానముగ ఎత్తి పెట్టవలెను. మందులనువాడు సీసాలు కొంచెము పొడవుగ నుండవలెను. మందులను త్రాగించునపుడు అకాగ్రతగానుండిన యెడల ఆ నేకవిధములగు ప్రమాదములు సంభవించును.

సాంక్రమిక వ్యాధులలో మందులు త్రాగించుట

(Administration of medicines in contagious diseases)

వైద్యరోగము, కుర్రము, గాలికుంటు మున్నగు వ్యాధులలో అవుసరమున్నప్పుడే మందులనియవలెనుగాని అవసరముగా నెల్లవేళలనీయరాదు. అంటువ్యాధులుగల పశువు

అంటురోగముగల పశువును దూరముగా నుండుము.

అట వాడు గొట్టములు, నీసాలు, తదితరపాత్రలు ప్రత్యేకముగా నుండవలెను. అప్పు డప్పుడు వగరుగిటిలో పనిముట్లను కడుగుచుండవలెను. వైద్యుడు చెప్పినరీతిగా పథ్యా పథ్యములు చేయించుచుండవలెను. అత్యంత మున్నపుడు ముక్కురంధ్రములవ్యాధి మందుల నుపయోగించవచ్చును.

తత్వములనుబట్టి మందులు వాడుట

(Administration of medicines according to constitution)

కొన్ని పశువులు ఆశ్చర్యకరమగుగుణములు కలిగియుండును. కొన్ని పశువులు మంగున సరిగా జీర్ణముచేసికొనును. మరొన్ని అట్లు కాక మందులను సరిగా జీర్ణముచేసికొనక పరియైనఫలితముకలుగ నీయవు. కాబట్టి ఒక్కొక్కప్పుడు వాటిని చూచి నుండవలెను. అపశువు యొక్క తత్వమునుబట్టి వానిఫలితము కనబడును. దీనినే పశువ్రయోక్త గుణతత్వము లందురు. ఒక్కొక్కప్పుడు పొమ్మ (Blisters) మందులు వాడినప్పుడు అతిగా పని చేసి కొంచెము నష్టము కలిగించును. కొన్ని పశువులకు విషపుములు పెట్టినను జీర్ణము చేసికొని ఎట్టిచూరీ పాలుకావు.

పశువ్రయోక్త వయస్సునుబట్టి మోతాదులు వాడుట

(Dosage according to age)


కొందరు వైద్యులు మందులను మహారుగ తూచవలెడగనే వాడుదురు. ఇది చాల పొరపాటు. మోతాదు ఎక్కువపడవచ్చును. లేక తక్కువపడవచ్చును. కాబట్టి తగుబాగ్ర తపహించి సరిగాచూచి మోతాదులను వాడుట మంచిది. పెద్ద పశువులకంటె చిన్న పశువుల విషయమై చాల బాగ్ర త్తగా వాడవలెను. విషపుములను మాత్రము అతిబాగ్ర త్తగా వాడవలెను. బలముగల పశువులకు మోతాదు నెక్కువ రియుటవలెను.

మోతాదుల నిగ్రయము

మనుష్యులకు వాడు మోతాదులకంటె పశువులకు నెక్కువగా నీయవలెను. మనము నోటిద్వారా పోషినందు ఒక మార్గమునంచి మరి యొక మార్గమునను పోవుచు చాల అలస్యముగా నాలవపట్టులోనికి చేరును. కాబట్టి అవిధముగా వాడవలెను మందులు చాల అలస్యముగ పనిచేయును. అదియునుగాక ఈమందు నాలుగవత్తిలోనికి పోయి పనిచేయవచ్చుటో ఆప్రాంతములందుండు జీర్ణముగాని పదార్థములతోయు అమందు చేయ బోవుపని ఆడ్డిగించుచుండును. అందుచేతగూడ నోటిద్వారా వాడినమందులు వ్యాధిని చాల అలస్యముగ కారణపఱచేయును.

పశువులయందు మానవులకంటె చురుకుదనము తక్కువగ నుండునుగానె పెద్ద పెద్ద మోతాదులుగా విశేషముల మందుల (Purgatives) నీయవలెను. అట్లు యిచ్చిన

యెడల అది మందమతిగ నుండుటచేత భగించుకొన గలిగియుండును. మోతాదుల హెచ్చుతగ్గులనుబట్టి మందులు పనిచేయును. భేది ఉప్పు కొంచెముకొంచెముగా యిచ్చిన యెడల విశేషము గలిగకాదు. ఈయనలనీ మోతాదుకంటె తక్కువ యిచ్చినయెడల దానివలన నేమియు ఫలితము కనబడదు. అప్పుడు వైద్యుడు గ్రహించి మరల మందు యిచ్చునపుడైనను తగిన మోతాదు నిచ్చునెడల ఫలితము కలుగును.



బొప్పనిర్ణయము చేయుటకు సాధనములు

ఏవ్యాధి కీమంగునీయవలెనో నిర్ణయించుటయే బొప్పనిర్ణయము (Prescription) అనబడును. పశువైద్యులందరును తమయొక్క నోకపుస్తకము నుంచుకొని దానిలో తాము యేయే పశువునకు యేయేసమయమునందు ఏవ్యాధికి ఎంత మోతాదు నిచ్చినది, లేనిది విడివిడిగ వ్రాసుకొనుచుండవలెను. శస్త్రము చేసినప్పుడు యేరితిగ చేసినది, యేమందులు వాడినది వ్రాసికొనవలెను. దివమునను వారమునను సంవత్సరమునను యేయేవ్యాధి లో యెట్టి చికిత్సలు చేసినది ఎన్నిచచ్చినది మున్నగు విషయములు ప్రత్యేకముగా ఒక టుక్కుమీద వ్రాసియుంచవలెను. ఇతర గ్రామములకు వెళ్ళినపుడు ఒక ప్రత్యేక టుక్కు యుంచుకొనవలెను. వైవిషయములన్నియు వ్రాసికొనినయెడల తా నేమైన మందులు

నూతికావాలముగల పశువునకు వెంటనే చికిత్స చేయుము.

వాడుటలోగాని లేక మందులు యిచ్చుటలోగాని తప్పుచేసినయెడల దిడుకొనుటకు వీలుండును. రోగనిర్ణయము చేయుటయే దుర్లభము. అటు చేసినప్పటికి ఆ రోగము నకు యేవిధమగుచుండు వాడవలెనో జాగ్రత్తగా పరిశీలింపవలయును.

ఔషధములను కలుపుట

ఔషధములను ఉపయోగించునపుడు జాగ్రత్తగా పరిశీలించి సరియైన మోతాదు (Dose) తీసికొని కలిపి పశువున కీయవలెను. లేనియెడల నష్టము హానియు కలుగును. రోగనిర్ణయము స్పష్టముగా గ్రహించినతరువాత అచికిత్స చేయవలసిన విధానము బాగుగా అరమైనయెడల ఎప్పుడ మందులను కలుపవలసిన అవుసర ముండదు. ఒక్కొక్కపుడు వైద్యుడు తాను ఆశక్తులగుటకు కలిపియిచ్చినచో వ్యాధిమదురుగని కలంచి అట్లు కలిపి యిచ్చును. డాటునరిచేయును. కొని దానివలన లాభము కలుగకపోవుటయేగాక నష్టము కలుగుటయో హాని కలుగుటయో సంభవించును. కావున మందులను ఇచ్చుట యందు అనుభవముండవలెను. ఇట్టి మందులను కలుపుటకు కొంతవరకైనను జ్ఞానము యుండవలెను.

ఘనపదార్థములను వాడుట

మందులను ఉపయోగించువిషయములలో బాగుగా తెలిసికొనియుండి అనుభవము కూడ కొంతవరకు సంపాదించియుండవలెను. ద్రవపదార్థములుగాక ఘనపదార్థములువాడు నపుడు మాత్రల గూఢముల వాడుటకుండి యెక్కువగా వాడుటకు తూర్పుము పశువులోపలి భాగమున నున్న తక్కువపదార్థమంతయు వెడలగొట్టి తరువాత మందు నుపయోగింపవలెను. అనగా విశేషములను మందీయవలెను. ఇదివరకువలెగాక ఇత్రుడివుడే నూతనరకముల మాత్రలు, టూనిక్స్ (Tonics) వచ్చుచున్నవి. ఇవి పశువుమింగుటకు వీలగు పరిమాణము కలిగి వానిపైన ఒకవిధమగు పదార్థముచే కప్పబడియుండును. ఘన పదార్థములను మెత్తగా నూరియో, లేక నీటిలో నానజేసియో, ఔషధములలో కలిపి వాడుట మంచిది.

రసములు (Tastes)

తీసి, పులుపు, ఉప్పు, చేదు, కారము, వగరు అని షడ్రసములు. తీసి, పులుపు, ఉప్పు వాతతత్వమునకును; చేదు, వగరు కారము క్లేష్ణతత్వమునకును చైరద్వయమున కర్పించును. వగరు, చేదు, తీసి రసములు పిత్తవ్యాధుల కమింపజేయును. ఉప్పు, పులుపు, కారము పిత్తరసము ఎక్కువగా నూరునటుల జేయును.

తీసి (Sweet) పుండ్లమును పృథ్విపరచును. పాల నెక్కువజేయును. కన్నులకు చలువజేయును. క్లేష్ణమును నెక్కువగా బుట్టించును. దీనినే మధురరసము లేక స్వాదురసమందురు.

వీలిపెనర, తత్తడు విస్తారముగా మేపరాదు.

పులుపు (Sour) దీనినే అమృతమందురు. ఉష్ణమును గలుగజేయును. వాతకోగముల పోగొట్టును. మలబద్ధమును హరింపజేయును. జీర్ణకృత్తిని కలిగించును.

ఉప్పు (Salt) దీనినే అవణరసమందురు. ఎముకలకు బలము కలిగించును. పిత్తశ్లేష్మముల హరింపజేయును. విరేచనము గావించును. త్రిమిని చంపును.

కారము (Pungent) దీనినే కటురసమందురు. ఇది ఉష్ణకారిగా నుండును. రక్తకోగములను హరింపజేయును. పాలను తగ్గించును. జ్వరాన్ని కలిగించును. దీనినే ఉష్ణరసమందురు.

చేదు (Bitter) దీనినే తిక్తరసమందురు. రక్తకోగముల తొలగించును. విషపురుగులకొట్టకు పనిచేయును.

వగరు (Astringent) దీనినే కషాయరసమందురు. ఇది గాయములను మాన్పును. విరేచనముల కట్టించును. చర్మము మృదువుగా నుండనటుల జేయును.

బోషధములు చేయుట

(Preparation of medicines)

వ్యాధికి తగినందును రయ్యారుచేసి అవసరముగ నెడల కొన్ని వనమాలికలను జానితో కలిపి-ఒకే మందుగా చేయుదానికి బోషధము (Medicine) అనికేరు. ఇది అనుభవముమీదనే చేయవలెను. వైద్యుడు మందులను చేయుటలో కూడ జాగ్రత్త పహించి యుండవలెను గాని వాటిని ఉపయోగించునపుడు అతి జాగ్రత్తతో నుండవలెను. బోషధములు చేయుటలో పూర్వపద్ధతికి ఇప్పటిపద్ధతికి చాల వ్యత్యాసముగలదు. పూర్వమువలె యేమూలికల నుండియో లేక యే యితర పదార్థములనుండియో మనము స్వయముగ మందును తయారు చేసికొన నవునరములేదు. రసాయన శాస్త్రజ్ఞులే మనకు మందులలో నుండు మురికిని తీసివేసి వాటిని సరియగు నీటికి తెచ్చిపెట్టుచున్నారు. కాని పశువైద్యులు అవసరమునకు మందు ఒక్కసారిగ మందులను తయారు చేసికొనవచ్చును. అట్లు చేసినయెడల అకస్మికముగ వచ్చు వ్యాధులకు కాలయాపన చేయక త్వరత్వరగ చేయుటకు వీలుగనుండును. ఆకుపసరమును ఒకపూటకంటె నిలువ యుంచరాదు. అట్లుంచిన యెడల పశువులకు మరియొక క్రొత్తవ్యాధి కలుగవచ్చును.

లేపనము చేయుట

(Application to the skin)

బోషధములను కలిపి వ్యాధిగల ప్రదేశములందు ఉపయోగించుదానికి లేపనము అందురు. కొన్నిమందులను అముదముతోగాని, వ్యామలైనతోగాని, వెన్నతోగాని కలిపి పశువుయొక్క అస్వస్థభాగమునకు ఇంకునటుల రుద్దవలెను. ఇంకను వానలను

లేజీకటిగల పశువును చీకటిలో నుంచుము.

తగింతుటకువాడ ఈ లేపనము బాగుగా పనిచేయును. లేపనము తోగముల నశింప జేయును. ఎక్కువగా లేపనము చేసినచో శరీరకాంతిని జెరచును.

క్షౌరకర్మ

(Application of caustics)

పుండును గావించు మందులను రాచుటకే క్షౌరకర్మ లేక పాష్కమందుల వేయుట యందురు. కంటులను కొయుట కంటే క్షౌరావధములను వాడుటే ప్రాశస్త్యముగ నెంచుదురు. జిల్లేడు, చిత్రమాలము, అవాలు మున్నగువానిని ఉపయోగించుదురు. ఇంతియే గావండ ఈ క్షత్రలేటి దంటునునీ, పరిగడ్డినునీ, మున్నగువాటిని క్షౌరావధములుగా తయారుచేసి లోపలికివాడ వాడవచ్చును,

సీసాలపైన చీట్లు

(Lables upon bottles)

మందుండు ప్రతి సీసాలపైనను ఆమందుయొక్క పేరును ఆచిత్యాలయముపేరును వరుసనెంబరును ఒక చీటిమీద వ్రాసి అతికించవలెను. ఏదైన విషపుమందు (Poisonal medicine) ఉన్నయెడల ఆసీసాకు ప్రత్యేకముగా ఒకరంగుకాగితము మీద దానిపేరు వ్రాసి అతికించవలెను. కొంచెము విషసంబంధమైనట్టియు ఘాటయినట్టియు మందులను పశువు యజమానునికి వాడుట కీచీసపుడు ఇవ్వవలసిన మోతాదులకంటే ఎక్కువ వాడినయెడల అపాయము (Danger) కలుగునని చీటివ్రాసి దానిమీద అతికించి యజమానునికిగూడ నొక్కిచెప్పువలెను. వివిధములగు తైలములు, ద్రావకములు, చూర్ణములు, కషాయములు యున్న సీసాలకు వివిధరంగుల చీటిలు అంటించిన యెడల వైద్యులు తొందరపనులమీద నున్నపుడుగూడ పారబాటు పడుటకు అవసరమండదు. విషసంబంధమగు మందుల నన్నిటిని యితరమందులతో కలిపియుంచక ప్రత్యేకభాగములందుంచవలెను.

పనిముట్లను శుభ్రముగా నుంచుట

సీసాలనుండు బీరువాలను వారముదినముల కొకసారి పరిశుభ్రము చేయుటండవలెను. బీరువాలమందు అద్దములను శుభ్రముగా తుడుచుచుండవలెను. రంధ్రములుపడిన సీసాలను తీసివేయవలెను. ప్రతిదినము నుపయోగించుమందులను, పనిముట్లను ప్రత్యేకముగా ఒకబీరువాలలో నుంచవలెను. శస్త్రము చేయు పనిముట్లను కొలతగ్లాసులను ఉపయోగానంతరము పరిశుభ్రముగా కడిగి శుభ్రము నుపయోగించుటకు సిద్ధపరచుకొనవలెను.

మందు పోయునప్పుడు దగ్గకుండ చేయుము.

లేహ్యములు (Electuary)

పశువునాలుకతో నాకించి చప్పరింపజేసి తినిపించు వానికి లేహ్యములందును. కొవ్వుద్రవ్యములను మంచిబెల్లము, కలుబెల్లము, లేనె మున్నగు మధురద్రవ్యములతో తేర్చి చప్పరింపజేయ దగినవిగ తయారుచేయబడు ఔషధములకు లేహ్యములు (Electuary) అందును. వీటిలో కొంచెము పలుచగ తయారుచేయబడు ఔషధములు కూడ గలవు. లేహ్యములను జేయుటకు ఔషధచూర్ణము, బెల్లము, ద్రవము, లేనె, ఇతర ద్రవ్యములు కావలసియుండును. ఇంకను ఇందులో వేయబడు చూర్ణములు (Powders) అన్నియు వస్త్రగారితములుగానే యుండవలెను.

లేహ్యములను తయారుచేయుటకు జిగురు వచ్చునట్లు తయారుచేయబడిన పాక మవసరము. లేహ్యములను జేయుట యందుగాని, యెంతరఁద్రవ్యములను జేయుట యందుగాని పనిచేయు వైద్యుడు పనివారులను వివిధమైన చర్మరోగములు లేని వారు గను, చేతులు పరిశుభ్రముగ కడుగుకొనిన వారుగను నుండవలెను.

వెంటవెంటనే మందులువాడుట (Repeated doses)

ఔషధములు వాడినయెడల అవి చేయుపని మంచి ఫలితముతో కూడుకొని యుండును. కొన్నిమందులను ఒకసారికంటె మరియొకసారి ఎక్కువ యిచ్చినయెడల వానివలన లాభమేమియు కలుగదుగాని పశువుమాత్రము ఓర్పు పొందును. పాపాణము అను విషపుమందును తక్కువయేగవారుని కొద్ది కొద్దిగ వాడినను కొంతకాలమువరకు తేలికగానుగనవచ్చును కన్పట్టదు. కాని కొంతకాలమునకు ఆకస్మికముగా ప్రమాదము సంభవించును. అప్పుడు మరల జాగ్రత్తగా పశువును బరిశీలించి తగిన విరుగుడుమందులను వాడినయెడల దానిని ఆపాయపెరినుండి కాపాడవచ్చును.

తూనికలు, కొలతలు

(Weights & Measures)

కొవ్వుద్రవ్యములు తూచుటయందు ఐహు ఖండితములుగా నుండవలెను. పశువులకు రెండునుంచి 3 కొన్సులకంటె నెక్కువగ తూచుట యెప్పుడును సామాన్యముగ దట సీంకదు. కొన్ని విషయములలో ద్రామువరకు మాత్రము తూచుటయు మరికొన్ని విషయములలో గ్రామునవరకు మాత్రము తూచుటయు తటస్థించుచున్నది. ఈ తూనికకొరకై ప్రత్యేక త్రానులుండును.

కాకిగొట్టు పడినపుడు వీటిలో నుంచునము.

జౌషధములు కొలుచుట లేకయెడలనే గాని కష్టము వాటివల దీనియందును జాగ్రత్తయు నలవాటును యుండవలయును. ఈ కొలతలు గుర్తుపెట్టుటకు గాజుగ్గానులు అమృతబడును. ఆ గ్గానుల కిరువైపుల కొన్ని గుర్తులు వేసియుండును. కొలతగ్గానుకు ఎడమచేతియొక్క బొటనవ్రేలునకును, పిమ్మటి రెండువ్రేళ్ళకును మధ్యగా బట్టుకొని కంటితో సమానమైన యెత్తునకు దీసికొని రావలెను. ఏ సీసాలలోనండి మందును పోయ వలెనో ఆ సీసాను వడిచేరీతో పట్టుకొని దానియొక్క మూతను ఎడమచేతి చిన్ని వ్రేలుతో బట్టుకొని యుండవలెను. ఈ మూత బ్రహ్మకాయము బట్టుకొనుటకై కొంతవరకు నలవాటు కొవలయును. కాబట్టి అట్లు జేయుటలో భారవిడిచి దానిని పగులగొట్టు ఆపాయమునుండి తొలగుటపగాను కొలుచునపుడు దానిని విడిగా నుగ్గురుట యుత్త మము.

జౌషధము లిచ్చు వేళలు

(Times of Administration of medicines)

వైద్యుడిచ్చినమందులను యజమాని చాల జాగ్రత్తగానుంచి ప్రతిదినము నిర్ణయ కాలమునకు పశువును బలవంతము చేయక సాధ్యమైనంతవరకు అది యిష్టముతో గ్రహిం చునట్లు చేయవలెను. కొన్నికొన్ని మందులు పశువులకు ఉపయోగమునకు, కొన్నిటికి మేత మేనీసతరువాతను, మరికొన్నిటికి మేతమేయునపుడును, మరికొన్నిటికి ఎల్లవేళల ఈయ వలసి యుండును.

ద్రావకములను కలుపుట

చిన్నదూడలకు ద్రావకములు కలిపి వాడవలసి వచ్చినపుడు కొన్ని షరతుల వంటి తీసిపదార్థములు కలిపి యిచ్చినయెడల అది ప్రీతితో త్రాగును. కర్పూరతైలము మొదలగు వెగటువస్తువులు వాడవలసి వచ్చినపుడు పాలు మున్నగువానిలో కలి త్రాగించవలెను. సీసాలలో పోనియుండు మందులు ఒక్కొక్కపుడు అడుగున పేరు కొని యుండునుగాని మందును వాడనపుడు సీసాను బాగుగా కదల్చి పేరుకొనిన దానిని బాగుగా కరుగజేసి తరువాత వాటిని వాడవలెను. అట్లుగాకపోయినయెడల సరియైన మందు అంతయు అడుగున పేరుకొని పోవుటచేత వైసయుండు సారహీనపునుండును వాడుటచే యిసుమంతయును లాభముండదు.

శీతోష్ణనిత్యిబట్టి మందులు చేయుపని

నిద్రను కలుగజేయునట్టి మత్తుపదార్థములు చల్లని ప్రదేశములలోకంటే వేడిగా నుండు ప్రదేశములలో త్వరగా పనిచేయును. పచ్చికమీన ఆధారపడు పశువులకు ఇతర జంతువులకన్న మత్తుమందులు త్వరగా పనిచేయును.

ప్రేగులలో మందులు చేయుపని

పశువునకు విరేచనములకు ముదిచ్చినతరువాత అది లోపలకు పోయి ప్రేగుల (Intestines) లో నుండు మలమునంతయు బయటకు పోవునట్లుచేయును. ఈక్రింద చెప్పినట్టిగా పనిచేయును. పశువు జీర్ణము జేసికొనగా ప్రేగులలో మిగిలిన పిప్పిని ఈ విరేచనపుమందు బయటకు పోవునట్లు చేయును. ఉప్పుగానుండు విరేచనపుమందు ఆహారనాళములోని ద్రవము నెక్కువజేయును. భేదిమందులను కొన్నిరకములుగ రయారుచేయుటకు పశువైద్యశాస్త్రజ్ఞులు (Veterinary doctors) ప్రయత్నించిరి గాని అవి నేటివరకు సిరపడి యుండలేదు. ఈక్రింద చెప్పిన భేదిమందులను చాల ముది పశువైద్యప్రవీణులు మంచివిగ నె చుచున్నారు.

ఆముదము, నేపాళనూనె, అవిసెనూనె, సామాన్య భేదిమందుగా వాడవచ్చును. ఇవి త్వరితముగ నెప్పుదిగ విరేచనముల కలగజేయును. ఆముదమును సామాన్యముగా పశువులకే వాడుదురు. కాని దానిని చూడలకుకూడ వాడవచ్చును. భేదిమందులను వాడినయెడల ప్రేగులలో నిలవయున్నదానిని బయటకు త్రోసివేసి ఆ భాగమును ఖాళీచేసి శుభ్రపరుచును. నేపాళనూనె, దుబ్బపాకుపసరు, గురిగింజనెరు, అకుపసరు మున్నగునవి ప్రేగులపైనుండు కండరములను బాగుగా మడుచుకొనునట్లు చేయును. ఆ మందులు వాడినప్పుడు అప్పుడప్పుడు బాధ కలుగును. వీరి నియమనిన మోతాదు కంటే ఎక్కువ యిచ్చినయెడల కొంచెము నష్టము కలుగును.

మోతాదులిచ్చు క్రమము

గుట్టమునకు 1 మోతాదు, పశువునకు $1\frac{1}{2}$, గొట్టెలకు మేకలకు $\frac{1}{2}$ వంతున ఈయవచ్చును. గుట్టమునకు మూడేండ్లున్నపుడును, శుక్లకు ఒక సంవత్సరమున్నర, పశువులకు గొట్టెలకు రెండేండ్లున్నప్పుడును పూర్తిమోతాదు ఈయవచ్చును.

ఒక నెలనుంచి మూడు నెలలవయస్సు గల జంతువులకు పూర్తిమోతాదుమాత్రమే ఈయవలెను. జుతువు పెద్దదగుకొలది మోతాదు క్రమముగ హెచ్చించవచ్చును. వడిగల ప్రదేశములలో ప్రమాదముగు అనగా విషముగు వసమూలికల మోతాదును తగ్గించి వాడవలెను.

నస్యములు

(Using Snuffs)

ఔషధములను ముక్కురంధ్రములలో పిండుట, ముక్కురంధ్రములతో వీల్పించుట అనుదానికి నస్యకర్ష (Snuff for inhalation) అందురు. ఔంగుంటి, పీసస, రొంప మున్నగురొగములకు త్రిఫలచూర్ణముతో వీల్పించి తుమ్ములు వచ్చునట్లు చేయవలెను.

వడిమిలేనిచో ఎక్కువ చేయరాదు.

ఇంకను శిరోవారము, మూర్చ, ప్రాణేంద్రియశక్తి నశించుట, ఊర్ధ్వశ్వాసరోగము మున్నగువాటికి నస్యకర్మ చేయింపవలెను. ముక్కులలో కరువులు, ముక్కుమాద, ముక్కువీసస మున్నగు వ్యాధులలో ఆకుపసరులు, కారముల ద్రవపదార్థములు పిండ వచ్చును. నస్యములు చేయించుట విషయములలో రోగ నిదానము గ్రహించి ఆవసరా నవసరములనుబట్టి ఉపయోగించవలెను.

ధూమము (Using smokes)

పొగను ముక్కురంధ్రములగుండ నోటిగుండ వీల్చిండుదానికి ధూమము అందును. రొంతు, ఊర్ధ్వశ్వాసరోగము, న్యూమోనియా. క్షయ, ఉబ్బసము, ముక్కులనుండి నీరు గారుట, ముక్కురంధ్రములలో దుర్గంధము, దవుడలు విగబట్టుట, మెడనరములు విగబట్టుట, దంతములు దుర్బలమగు నుండుట, తుమ్ములు, కునికిపాటు, శిరోరోగములు మున్నగువానికి ధూమపానము నుపయోగించుట మంచిది. ఒక్కొక్కసారి మాడుకాలుగు పర్యాయములు వీల్చించవలెను. సాంబాణి, కర్పూరతైలము, యాకలిప్తస్ ఆయిల్, మద్దకర్పూరము, వసపాడి మున్నగునవి పొగకు వాడవలెను.

హృదయము, మెడభాగము శిరస్సుభాగములు ధూమమునకు నొగ్గములు. అధికముగాని అకౌతమునందుగాని ధూమము చేయించినచో నేత్రరోగములు మెడటి రోగములు సంభవించును. పశువునకు విరేచనములకు మండిచ్చినపుడు, ఎరీమాచేసి నపుడు, విషసంబంధమైన పదార్థములు తినినప్పుడు, మాడిగానుండు పశువులకు ఆకలి, దప్పికగానున్నపుడు, కంఠులు, గాయములు, శస్త్రము, మున్నగు వాయుగు ధూమ పానము చేయరాదు. శిరస్సునందును, ముక్కురంధ్రములందును, నేత్రములందును దోషమయ్యున్నచో ముక్కురంధ్రముల (Nostrils) గుండను, కంఠము నాశ్రయించి యున్నచో నోటిగుండను ధూమము పట్టించవలెను.

అంజనము (Eye salve)

కన్నులలో కలికము వేయుట, కాటుకవలె నుండును కండ్రో పెట్టుట మున్నగు వాటికి అంజనము అందురు. పశునేత్రాంజనము నేత్రములకు హితకరమైనదిగ నుండును. అందువలన దానిని ప్రతిదినమును నేత్రములయందు రుపయోగింపవలయును. నేత్రముల యందలి దుష్టజలమును స్రవించిపోవుటకు వారము లేక పక్షముదినములకు ఒకసారి నేత్రములయందు ప్రయోగింపవలయును. నేత్రములు లేదస్వరూపములుగ నుండునుగాన వానికి శ్లేష్మము కలన భయము గలుగుదుండును. అందువలన శ్లేష్మహరమైన కర్మను చేసినచో నేత్రములకు నిర్మలత్వము కలుగును. నీరు స్రవించిపోవుటచే దుర్బలముగ నుండి దృష్టి నూర్చునివలన బాధకలుగునుగాన పక్షియందు తీక్షణమైన అంజనమును

శీత్రములయం దుపయోగింపరాదు. అందువలన స్రవింపజేయు నట్టి అంజనమును రాత్రియందే ప్రయోగింపవలయును. నిర్మలమైన ఆకాశమునందు చంద్రునివోలే నిర్మలమైన శీత్రములయందు దృష్టి అడ్డులేనిదై ప్రకాశింతును. శీత్రోగములకు, మందమతి, శిరోభారము మున్నగు వ్యాధులకు అంజనముజేయుట మంచిది.

గంధూషము

కషాయములు మున్నగు ద్రవపదార్థములను నోటికి, నాలుకభాగమునకు పుక్కిలింపు చేయుటకు గంధూషము (Gargles) అగుదు. నోటిలో కరువులు లేచినపుడు, విషపుసన్నపులు తినినచో పొక్కినపుడు, కఫరోగములయందు, నోరు దుర్గంధముగా నున్నపుడు పటిక, మాచికాయ, తుమ్మచెక్క, శేరేడుచెక్క మున్నగు కషాయములను వాడవచ్చును. ఇట్లు వాడినయెడల దవుడలకు బలముకలుగును. జిహ్వోద్రియము (Tongue) రసములను బాగుగా తెలిసికొనును. ఈ ఆహారమందు రుచికలుగును. ఆహార నాళము (Alimentary canal) ఎండదు. పెదవులు (Lips) పగులవు, దంతములు క్షీణింపవు.

శిరోమర్దన

(Application to the head)

పశువు రెండుకొమ్ములమధ్యను, భాషికపు నుడివద్దను, ముచ్చిలిగుంటవద్దను తైలము పూసి చేతితో మర్దనచేయుటనే శిరోమర్దనఅందురు. శిరస్సునందు తైలమును పూసినచో పుట్టెముకల (The head and its bones) కు అధికమైన బలము కలుగును. వెండ్రుకలు దృఢమైనవగుట్లకలవిగ నుండును. ఇంకను ఇంద్రియములు నిర్మలముగ నుండును. చర్మము మంచికాంతి గలిగి ముండును. శీత్రమునకు చలువజేయును. పునులు తగ్గును. నల్లపశువులకు చమరు పూయుటవలన తోలు, శరీరము గట్టిపడి మంచి చర్మము కలదిగ నుండును. మరియు వాతమువలన బాధపొందదు. కష్టములను వ్యాయామమును (Exercise) సహించును. అన్ని పశువులకు వాతమువలన వేడిమివలన శీత్రములకు జబ్బు చేసినపుడు చిట్టాముదము గోరువెచ్చగాకాచి మెదడునకు మర్దన చేయుట మంచిది.

వేడికాపులు తీయుట

(Application of heat to the skin)

పశువునకు దెబ్బలు తగిలినపుడు, బెడికినపుడు, వాపులకు, వాతనొప్పులకు, నరముల సంబంధమైన రోగములకు, శరీరములో నుండు స్వేదనము (చెమట)ను తీయుటకు, వేడికాపులు తీయుట మంచిది.

మాదలన్నిటిలో కొమ్ముమాద ప్రమాదమైనది.

ఇనుకనుగాని రవుడునుగాని కాచి గోనెపట్టాలోగాని, మురకగుడలోగాని వేసి కాపులు తీయవచ్చును. ఎక్కువవేడిగా నుండునట్లు కాచక సమావేడిలో నున్నప్పుడే కాపులు తీయవలెను. ఇంకను నూనెనుకాచి నిమ్మకాయతో కాపులు తీయవచ్చును. ఏటిలో తురకవేపాకు, గాడిదగడపాకు వేసి సలసల కాగనిచ్చి గోరు వెచ్చనిఏటితో వారరోగములకు శరీరమంతటికి దీనమునకు రెండుమూడుపర్యాయములు పట్టించవచ్చును. ఎక్కువగా వేడికాపులు తీయరాదు. అట్లు తీసినచో శరీరములోనుండు భాగములు కనులును. అవుసరమున్నపుడు తైలములు రాచికూడ వేడికాపులు తీయవచ్చును.

చూర్ణములు (Powders)

కొన్ని మందులను చూర్ణముల రూపమున పశువునకియవలసియుండును. చూర్ణములయందు దుపయోగింపబడు మూలికలన్నియు సాధ్యమైనంతవరకు త్రొత్తవిగను, పుచ్చనివిగను, తమ స్వరూపస్వభావములు కలవిగను నుండవలెను. ఆయా చూర్ణములకు చెప్పబడిన వస్తువులను భాగముల ప్రకారము ప్రత్యేకముగాతూచి ఏకముగకలిపి రోటియందుంచి వెడల్పుయూతిగలపాత్రకు వస్త్రమును గట్టి దానిద్వారా పాత్రలోనికి పడునట్లు చూర్ణద్రవ్యములపై నాలుగు వ్రేళ్ళతో సరిగానొక్కి త్రిప్పుచు వస్త్రగాలితము చేయవలెను. వస్త్రముపైన మిగిలిన మొదలమును మరలదంచి మరల అవిధముగనే వస్త్రగాలితము చేయవచ్చును.

చూర్ణము మెత్తగానున్నకొలది శ్రేష్ఠముగానుండును. కాబట్టి వీలునుబట్టి దళసరి బట్టయందే వస్త్రగాలితము చేయవలెను. మిరియాలు, పిప్పళ్ళు మొదలగు కొన్నివస్తువులు పూర్తిగా చూర్ణముగాక మిగులును. కాన ఆయా భాగముల ప్రకారము తూచి ఏకముచేసి తరువాత చూర్ణముచేసినచో భాగములయందు వ్యత్యాసమువచ్చును. అందువలన వస్తువులను ప్రత్యేకముగా చూర్ణముచేసి భాగముల ప్రకారము తూచి ఏకముగా కలుపవలెనని కొందరందురు. కాని ఇట్లు చేసినచో ఎంతజాగుగా కలిసినను వస్తువులను ఏకముగా కలిపి పిమ్మట చూర్ణము చేయునప్పుడు కలియునట్లు సరిగా కలియనేరవు.

చూర్ణద్రవ్యములయందు పెద్దవిగా నుండు వానిని ప్రత్యేకముగా నరికి చిన్నవిగా చేయవలెను. వేళ్ళు, పట్టలు, తిప్పలిగ మొదలగు పచ్చిద్రవ్యములను ఎండించియే చేయవలెను. తైలము, ఎండుకొబ్బరి మున్నగువాటిని మెత్తగాదంచి చూర్ణముచేసి కలుపవలెను. ఏటివద్దులైనను దంచకుండ నిల్వయుంచినయెడల సంవత్సరమువరకు వాడుకొనవచ్చును. వానినే చూర్ణించినయెడల రెండుమాసములకుపై న గుణము (Virtue) తగ్గిపోవును. సిద్ధమైన చూర్ణములను సీసాలలోగాని పింగాణికూడిలలోగాని కొత్తికేస డబ్బాలలోగాని పోసియుంచవలెను. అవగాములు ఖైరములు అమరస పదార్థములు కలసిన ఔషధములు ఎటువంటివైనను లేకు డబ్బాలలో పోయరాదు. చూర్ణములన్నియు

వారములన్నిటిలో కిలామేనా వారము తగుట కద్దము.

రెండు మాసములవఱకు పైని నిర్వీర్యములగునుగాన తరువాత వాడకూడదు. పైకి చూచుటకు కొన్ని తుట్టెలుకట్టును. కొన్ని తుట్టెలు కట్టపన్నును గుణవంతములుకావనితీసివేయవలెను.

లవణములు (Salts) కలిపినచూర్ణములు వర్షాకాలము నందు చెమ్మగాలి తగిలి మెత్తబడి నల్లబడును. అట్టి సమయములందు దానిని ఎండబెట్టినచో స్వరూపమును బొందును. చూర్ణములు కొంచెము ప్రాతబడినప్పుడును, గడ్డలుకట్టినపుడును కూడ ఎండించి నలిపి వస్త్రగాలితమును జేసినచో స్వరూపమును జెందును.

మనము ముందులను కలుపుటమందు యేమే చూర్ణము యెంతెంత కావలసి యుండునో సరిగా తూచి తరువాత వానిని కలుపవలెను. వివిధచూర్ణములను కలిపిన తరువాత పశువుల కీయవలసిన మోతాదుల ప్రకారము వాటినిభాగించిశుభ్రమైన కాగితములలో పొట్లములుకట్టి ఈయవలెను. పశువునకు ఈయగా మిగిలిన చూర్ణమును నీసాలోగాని శుభ్రమైన అట్టపెట్టెలోగాని యుంచి మూతవేయవలెను. చూర్ణములలో విషసంబంధమగు చూర్ణములు కలిపినపుడు పశువునకునాడు మందుయొక్క మోతాదును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా త్రాసుతో తూచి కలుపవలెను. సాధ్యమైనంతవరకు ఆవసరమైన దానికంటె ఎక్కువ చూర్ణమునుకలిపి నిలువయుంచరాదు. అట్లు ఎక్కువ మిగిలి యుండుట తటస్థించినను దానిని పొడిప్రదేశములో జాగ్రత్త పరచవలెను.

రసములపుట్టుక

శుభ్రరసము భూమియుదకములచేతను, అమృతము భూమి, అగ్ని, వాయువుల చేతను, లవణరసము ఉదకము, అగ్నులచేతను, వగరురసము వాయువు, అగ్నులచేతను, తిక్తరసము ఆకాశము, వాయువులచేతను, కషాయరసము భూమి, వాయువులచేతను, ఈరీతిగా పంచభూతములలో రెండేసి కలియుటవలన ఒక్కొక్కరసము పుట్టుచున్నది.

గుణము(Virtue)

లోపలకుగాని, బయటకుగాని వాడినయెడల ఒకముఖ్యమగు ఫలితము కలిగించు నట్టి ఓషధియొక్క స్వతస్సిద్ధలక్షణమునకే గుణముఅని అందురు. భూమియందు గురుత్వమును, ఉదకమునందు స్నిగ్ధమును, అగ్నియందు తీక్ష్ణమును, వాయువునందు శోకమును, ఆకాశమునందు లఘుత్వమును ఈరీతిగా పంచభూతములప ఆండుగుణములు కలిగియుండుటయేగాక ఈ గుణములయందె యితరగుణ సంచయములును కలిసి యున్నవి.

శక్తి (Power)

ప్రతిపదార్థమయొక్క శక్తిని తెలిసికొనుట ముఖ్యము. ప్రపంచ మంతయును సూర్య తంద్ర వ్యాప్తమగుటచేత ద్రవ్యాక్రితమైన శక్తులు తరచుగా ఉష్ణముగ శీతల

ముగ నుండును. ఉష్ణమును కలిగించునవి శిశోభారము, మందమతి, చెమట, మంటను కలిగించును. శీతమును కలిగించునవి రక్తమును వృద్ధిజేయును. నడినణును. రక్తసంబంధ మగు వ్యాధులలో వాడవచ్చును.

రసధాతువులు చెడుట

రసధాతువు చెడినపుడు పశువునకు ఆహారమునందు ఇష్టములేకుండుట, రుచిని తెలిసికొనలేకపోవుట, శరీరము బరువుగ నుండుట, శోషులుగ నుండుట, అకాలమునలే శరీరము మడుతలు పడుట, శరీరము కృశించుట, మున్నగు లక్షణములుండును.

రక్తము చెడినపుడు దొమ్మ, గురక, జబ్బవాపు, చర్మవ్యాధులు అనగా తీట, ఏనుగజ్జి, నుసిమిగి, రక్తచెల్లి కలుగును.

మాంసము చెడినపుడు కంటలు లుములు, ముక్కు నుండి పుడు పుడు ఎముకమీదనే ఎముక పెరుగుట, పంటిమీదనే పన్ను పెరుగుట, దంతములయందును ఎముకలయందును పగులగొట్టబడుచున్నట్లు బాధ, శూల జనించుట, చర్మమునందు దోషములు జనించుట, కలుగును.

మిక్కిలి నూలముగ నున్నట్టియు, మిక్కిలికృశించి నట్టియు, శిథిలముగ నున్న మాంసము ఎముకల కలిగినట్టియు, దుర్బలముగ నున్నట్టియు స్వల్పహారమును కలిగినట్టియు, స్వల్పమగు శక్తినికలిగినట్టియు, పశుశరీరములు వ్యాధులను సహింపజాలవు. ఈలక్షణములకు విపరీతలక్షణములకల శరీరము వ్యాధులను సహింపగలుగును.

మాత్రలు (Pills)


మాత్రలను చేయుటయందు మ్రింగుటకు వీలగు పరిమాణము గలిగియుండవలెను. పదారములు గలియునటుల జగురు, బెల్లము, ఆముదము, వ్యాసులైన మొదలగు వస్తువులు ఉపయోగింపవలెను. నిమ్మ, వారింజ, వెలగకాయలంత మాత్రలను ఉపయోగించునపుడు పశువులకు శోషము తెప్పింపకుండ దానివాలకను పటుకొనవలెను. అప్పుడు మడిచేలి మూడువేళ్ళతోను మాత్రనుగట్టిగ పటుకొని తనచేతిని అంగిటి వరకు పోనిచ్చి అమాత్రను విడిచి నెమ్మదిగా చేతిని లాగుకొని, నాలుకవిడిచిపెట్టవలెను. మాత్ర లోపలికి పోయినది లేనిదనిమాచి దానితలను నదలిపెట్టవచ్చును. కొన్నికొన్ని వ్యాధులలో మాత్రను లోపలికిపోవునట్లు చేయుటకు కొంచెము నీరు గొంతుకలో పోయవచ్చును.

మనము మాత్రచేయుటకు చేతిని లోపలికి పోనిచ్చుకపుగా మన చేతిని కొరక నీయకుండ దానినోటిలో యేదైన గుండ్రని పదారము (కట్టపంటిది) పెట్టవలెను. అటు పెట్టినచో పదారము నోటిలోపల కొంతభాగము చుట్టుకొనిపోవునగాని అంతకంటె ప్రమాదము జరుగదు. మాత్రను నోటిలో చితుకనీయకుండ బాగ్రత్తగా అంగిటిలో నేయవలెను. కాని అది నోటిలోనే చితికినయెడల పశువు దానిని మ్రింగదు. ఇక ముందు కూడ అట్టి మందులను వాడినయెడల అది మ్రింగక దగి అరచును. అట్టి నేళలయందు అమాత్రలను తడిపి నీటిమాతమునగాని, ఆహారమాలమునగాని పశువునకు ఈయవలెను.

పశువులను పడగొట్టుట

పండ్లెండవభాగము

గ్రామాదులలోనుండు రైతులు తమ పశువులకు వ్యాధులు వచ్చునపుడుగాని, తదితర కారణములవలనగాని పశువులను పడగొట్టవలసియుండును. పడగొట్టుటలో సజీవ సులభమగుములు గలవు. పశువులు నోరులేని జంతువులుగాన చాల జాగ్రత్తగా త్రాళ్ళు గట్టి నెమ్మదిగా పడవేయవలెను. మానవులైనచో వారంతటవారే యే మందైనను త్రాగుదురు. పశువులు అట్లుత్రాగక గంతులునేయును. మరికొన్ని పొడుచును. మరి కొన్ని కరచును, తన్నును. కాబట్టి ఎంతచిన్న పశువునైనను నలుగురైదుగురు పట్టు కొని నూత్రముతో పడవేయవలెను. పడవేయటండు చేయు చికిత్సలు కొన్నియును, పడగొట్టిచేయు చికిత్సలు కొన్నియును గలవు గాన ఏ యే రోగములలో నేమే నూత్రములతో నుపయోగించవలెనో గ్రహించి జేయవలెను. పశువులను పడగొట్టుటను గూర్చి వాకు తెలిసినంతవరకు ఈ దిగువ సుదహరించుచున్నానుగాన చదువరులు గ్రహించుదురుగాక.




పడగొట్టుటలో గమనింపవలసిన విషయములు

వైద్యుడు దూరముగానుండవలెను. రైతుతోనే సాధ్యమైనంతవరకు పడగొట్టించవలెను. అంతకు వీలులేనిచో పడగొట్టు నూత్రములను చెప్పి నేయించవలెను. వైద్యుడు మిగుల బలిష్ఠముగ నుండి పీరికితనము లేక ఆ పశువుయొక్క గుణములను గ్రహించి

కొటివిద్యలు కొండ్రు లోపలనే.

తానే స్వయముగా పడగొట్టవచ్చును. పడగొట్టిన తరువాత కాళ్ళను కట్టవలసి వచ్చి నపుడు మిక్కిలి బాగ్రత్తగా కట్టవలెను. పశువు నిలబడు నపుడుగాని పడుకొనినపుడు గాని వెనుక కాళ్ళవగ్గర నిలుచుండరాదు. అట్టిసమయములందు పశువుచాలాకోపముగా నుండును. ఆ పశువు కోపము పట్టజాలక వెనుకకాళ్ళతో తన్నుటకు ప్రయత్నించుచుండును. అబాగ్రత్తగా నున్నయెడల అది మనుష్యుని ముఖమునీడగాని పొట్టలోగాని మూత్రకోశములోగాని తన్నును. కాబట్టి వైద్యుడుగాని తదితరులుగాని దగ్గరకు పోకుండ వెనుకకాళ్ళను నెమ్మదిగా (శాడతో) లాగుకొని నాలుగుకొమ్మ కట్టవలెను. ఆటు కట్టు నపుడు పశువు తన కాళ్ళతో కట్టుచున్న చేతులను నొవ్వును. లేక తలవంచి కట్టు నపుడు తలమీదకుడ తన్నవచ్చును.

పశువును పడవేసిన తరువాత కాళ్ళను కట్టకపూర్వమే పడినదని కొంచెము నేవున్నతరువాత వెంటనేలేచును. తలభాగముతో మనుష్యులనువీసరును. అట్టిసమయము లందు ఆపాయకములైన చెట్లు తగ్గులును, పశువు పడినచెట్టనే నోకను లోలోడు గుండాతీసికొని పట్టుకొనవలెను. దీనినే మడితోడియందురు. పశువును పడవేసిన తరు వాత తలను నొక్కిపట్టునపుడు చెవులను బాగుగా తనిఖీ చేయువలెను. తలక్రింద చెవి పడినలిగినపుడు చెవిభాగముందలి నరములన్నియు నలుగును. అందువలన కాలు కల పోవును. అందుచేతనే మనచెట్టలు పశువు పడినచే చెవిచూపమందురు.



పశువును పడవేయు నూత్రములు
[వధమనూత్రము

ఒకవన్నని మెత్తని త్రాడుగాని మోటుగాని తీసికొని ఒకచివర కొమ్ములకుగాని తలకు తగిలించు పికమారునకుగాని, మెడపట్టుపలుపునకుగాని తగిలించి మూపురముపై

మనకు ధూమి యిచ్చినట్లు ధూపకులీ యులరె.

నుంచి ముందరకాళ్ళక్రిందనుంచి పైకి చివరకొసలాగి వెన్నెముకమీదుగా మొరడు దగ్గర నుంచి వెనుక కాళ్ళమీదుగా వృషణముల దగ్గరగా త్రాటిని ఉచ్చువేసి ఇద్దరు మనుష్యులు లాగిపట్టిన వెంటనేపడును. అట్టి సమయములందు జాగ్రత్తగా అది పడి పోవునపుడు మనుష్యులు అనుకొని దెబ్బతిగులకుండ నెమ్మదిగా పరుండబెట్టవలెను. లేనిచో జబ్బుగాని ప్రక్కయెముకలుగాని విరుగవచ్చును. ఇట్టి ప్రమాదములు కరుగుచుండును.

ద్వితీయపద్ధతి

పశువును సరిగా నిలబెట్టి ముందు తలకు త్రాడుగట్టి చేతితో పట్టుకొని యుండుటగాని లేక గుంజుటగాని స్తంభముననుంచి గుచ్చుటచేపలెను. తదుపరి యిదివరకు చెప్పిన మాదిరిగనే రెండుభాగములందును ఉచ్చులువేయగ మిగిలిన త్రాటిని పడిపోవు భాగపుకాలి పిల్లడెక్కకు ఉచ్చువేసి నెమ్మదిగా చేతితో లాగుచుండినయెడల పడిపోవును. ఈ నూత్రము చాలా తేలికగా నుండును.

తృతీయపద్ధతి

పశువులను పడగొట్టుకుండ 3 గజములబాగు గజము వెడల్పుగల స్తంభములలో 10 లేక 8 కణ్ణులు రెండువైపుల రెండు బలమైనవి పాతవలెను. పశువుయొక్క తల భాగమును ముందుపాలిసి మొదటి స్తంభమునకు కట్టి కణ్ణులమధ్యగానుంచి అటునిటు కదలకుండ వెనుక కాళ్ళను పగ్గముతో వెనుకగుంజుకుట్టి తగిన చికిత్స చేయవలెను. ఇంకను పశువు కణ్ణులమధ్యనుండియుకూడ గలంతుచేసినయెడల మరొక మోతుగాని మెత్తని త్రాడుగాని ఎగుడుట్టు గట్టిగా త్రప్పిచుట్టి చికిత్స చేయవచ్చును. ఇంకను కణ్ణులు అటు నిటు కదలుననియు పశువు బయటకు పోవుననియు ఉద్దేశ్యమున్నయెడల కణ్ణులకు అడ్డముగా 2 లేక 3 చోట బలమగు గట్టిబద్దలు కట్టవచ్చును. ఈ కణ్ణులు నునువుగను బుడుపులు లేకుండగను ఉండవలెను. కణ్ణులకు తారుపూయుట మంచిది. పశువులను పడగొట్టు నూత్రములు రైతులలో చాలామందికి తెలియును. అయినప్పటికి ప్రాథమిక పశుచికిత్స చేయువారికి అవసరమని తెలిసితిని.

గేదెలను దూడలను పడగొట్టుట

ఇదివరకు చెప్పిన జంతువులను పడగొట్టుటకంటె గేదెలను దున్నలను పడగొట్టుట చాలాకష్టము. ఈజాతిని మహా క్రూరస్వభావముగలవి. అందుచేత ముందుకాళ్ళకు వెనుక కాళ్ళకు బందములువేసి ఒక స్పన్నిని మెత్తని త్రాడుతీసికొని రెండువైపుల రెండుకొసలుంచి నెమ్మదిగా యిద్దరు మనుష్యులు లాగవలెను. అట్లు లాగుటవలన పశువు క్రమేనీ ఒరిగి పడిపోవును. ఈ పద్ధతివలన పశువునకు అపాయము కలుగదు. పడిపోవుననగా

యిద్దరు మనుష్యులు పడిపోవు భాగమునకు ఆనుకొని పగుండబెట్టవలెను. తదుపరి తలను నొక్కిపెట్టవలెను. గోదెగాని, దున్నగాని చాల పొగరుగనుండి అంకప రాసప్పుడు మెగత్రాడుగాని, సికమారుగాని వేసి నొక్కిపెట్టవలెను. వాటికొమ్ములు నూచుటగా నుండుటవలనను ఒక విధమగు గోరోచన ముండుటవలనను మిక్కిలి పొగరుగలవై మనుష్యులనుకూడ చంపును. బంధములు విడిచివేయు మనుష్యులగొడవడి పొడుచును. జాగ్రత్తగా ఆలోచించి పడగొట్టవలెను.

ఎంతో ప్రమాదము వచ్చినపుడు ఆవులను గోవెలను పడవేయవలెనుగాని మాటి మాటికి పడవేయుట చాల ప్రమాదము. ఎండుచేతనన వారి ఆహారశోకములు ఎండుగా నుండును. రక్త మెల్లప్పుడు పాలుగా మారుచుండును. పొడుగు ఎల్లప్పుడు పగురుగా నుండవలెను. నోరు ఎల్లప్పుడు అడిగిచుండువలెను. కనుక యిటువంటి సుఖమారజంతువులను మాటిమాటికి పడవేయరాదు. పడవేసినను ఎక్కువకాల ముంచరాదు. పశువునకు కుడితిపెట్టిగాని కడుపునొండు నిరుత్రాగునపుడుగాని పాలుతీయనొండు నున్నపుడుగాని పశువును పడవేయరాదు. దూడలనుకూడ సాధ్యమైనంతవరకు కార్లను కట్టవలెనని కార్లు నొక్కిపట్టి చికిత్స చేయవలెను. ఎండుచేతనన పిటికార్లు చాలా సున్నితముగా నుండును. లిగించి కట్టినచో తిమ్మరియెక్కుటయో నరములు తెగుటయో ఎముకలు విరుగుటయో తటస్థమగును. పైన చెప్పిన జంతువులను పడవేసిన తరువాత తోకను మాత్రము కార్లమధ్యకాతినీ దోక్కుమీదుగా అనించి కట్టుకొనవలెను. ఇట్లు చేసినచో పశువు కడలజాలదు. దీనినే మడితోకయందురు.

మందులు త్రాగించుట


పశువులకు వెదురుగొట్టముతోగాని యిత్తడి గొట్టములతోగాని వెడల్పుగల నీసాలతోగాని పోయుట చాలామంచిది. పశువులను నిలబెట్టిపోయుట చాలామంచిది. స్తంభములకుగాని బండికిగాని పశువులకు నెత్తుగాగట్టి నోరుతెరచి నాలుక నొక్కిపెట్టి నెప్పుడిగా జారవిడువవలెను. చాలామంది గొట్టముతో పోయునపుడు దానిమూతి పొడిచియు ముక్కుగంధ్రముల గ్రుచ్చియు అంగిటి నాలుకకు పొడిచియు నానాభాధలు పెట్టుదురు. మరికొందరువానికి ఊసిరిఅడకుండగనే గొట్టములతో మంగులు పోయుదురు. అట్లు పోయుటవలన పొలమారి ఊసిరాడక ప్రాణనాపాయముకూడ కలుగును. వెదురు గొట్టములకు బుడుపులుగాని గరపగాని పేడులేదుటగాని యుండరాదు. అట్లుండిన పోయునపుడు లోపలి భాగమునందు పుండ్లుపడి పశువును బాధించును. నీసాలతో పోయునపుడు మూత కొంచెము వెడల్పుగను పొట్టలావుగను ఉండునటుల చూచి పండ్లకు తగులకుండ జాగ్రత్తగా రెండుపెదవులుకలియు భాగమందుపెట్టి నెప్పుడిగా జారవిడవవలెను.

కొందరు రైతులు గోవెలకు నున్నలకు పెదలపుమాడలకు మంగులు పోయునపుడు పెద పలుపులు గొంతుకకుపెట్టి స్తంభమునకు కట్టి బంధమువేయక దర్జాగా

పోయుదురు. ఇట్లుపోయుట వలన పలువు మెడప మట్టుకొని తుక్కును నొక్కి గ్రుడ్డు లేలవేయును. కాబట్టి జాగ్రత్తగా పోయవలెను. మందులు పోయునపుడు జాగ్రత్తగా నుండనిచో పాలమారి కొన్నిరోజులు పశువు బాధపడును. మరికొన్ని చచ్చును.

ఎనీమా చేయుట

ఎనీమా చేయుటలో వివిధరకములు గలవు. సామాన్యముగా మందుల నిచ్చియే విశేషముల గావింపవచ్చును గాని శీతలమిచ్చేసిగాని, ఆరివేడిచేసిగాని రక్తసంబంధముగు వ్యాధుల వలనగాని పాడిపశువులకు దాణావస్తువులు విస్తారముగా మేపినపుడు బల హీనత వలన మలములోపలనుండి బయటకురాక బాధపడుచున్నపుడుగాని శీతాకాల ములో దూడలు పాలు త్రాగుటలో ఎక్కువెక్కువల నుట్టగా మలము ఎట్టుమట్టును. పెద్దరోగములో 107 డిగ్రీల జ్వరమున్నపుడు మలము పోగొట్టుటకు ఎనీమా చేయవచ్చును. ఏయే వ్యాధులలో ఎనీమా చేయవలెనో వైద్యుడు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చేయవలెను.



సామాన్యముగా ఎద్దు, ఆబోరు, దున్న, గేదె మొదలగు జంతువులకు ఎనీమా చేయునపుడు నాలుగు చుక్కటికార్లను తీసికొని రెంటికి రెంటికి లంకవేసి ముందరి భాగమందు రెండు కాడులను వెనుక దొక్కలభాగమందు, రెండు కాడులను క్రిందగా పోనిచ్చి గట్టిగా నొక్కచుంచెప్పి తలకు త్రాడువేసి గుండకుట్టి పరియగు పాజిషన్ లో నుంచి పశువైద్యాచార్యుడు ఎనీమా చేయవలెను. కొన్ని పశువులను తడగొట్టి ఎనీమా చేయవలసియుండును. జాగ్రత్తగా పడగొట్టి ఎనీమా చేయవలెను.

శల్లిని సమ్మిసవాడు ధరిణి సమ్మిసవాడు చెడడు.

ఎనీమాకు ముందు పరీక్షించవలసిన విషయములు

పశువు భయపడుచున్నదియు లేనిదియు కాళ్ళకు భూమిమీద ఆనించినదియు లేనిదియు చెవుల మొదళ్ళకు పరికిలించి చల్లగానున్నవో వేడిగానున్నవో కనుగొనవలెను. పశువు అటునిటు ఒరగుచున్నది లేనిది కనుగొనవలెను. ఒకవేళ మూత్రముపోయునపుడు ఆ ధారమీద మనకాలుపెట్టి వేడిగానున్నది లేనిది కనుగొనవలెను. ముందు ధర్మా మీటరు ఆసనములోపెట్టి ఎంతజ్వరమున్నది కనుగొనవలెను. 100 డిగ్రీల జ్వరమున్న ఎనీమాచేయరాదు. బలహీనముగానున్నపుడు మలమున్నదని గ్రహించినపుడు ఎనీమా చేయరాదు. బలహీనముగానున్నపుడు మలమున్నదని గ్రహించినపుడు ఎనీమాచేయక చేతికి ఆముదమురాసి మలమును తీయవలెను.

ఎనీమాచేయుటకు నియమములు

1. ఎనీమాచేయునపుడు రోగపశువు ఉండవలసినపద్ధతి
2. ఎనీమాచేయు నీటియొక్క స్వభావము
3. అనీటియొక్క ఉష్ణధర్మము
4. ఎంతవరకు వాడవలసినది ఒకేసారి చేగులో ఉండవలసిన నీటిపరిమాణము
5. అనీటిని ఎంతబిల్డితో ఎక్కించవలసినది
6. ఎనీమా ఎంతవడిగా చేయవలసినది
7. లోనికి నీరు ఎక్కించేటప్పుడు ఆసనమును నొక్కుచున్నదాదా?
8. లోనికి ఎక్కించినతరువాతనీరు ఎంతసేపు ఉంచవలెను.

నీటియొక్క ఉష్ణము

నీటి వేడి హెచ్చుగానుండరాదు. మిక్కిలి చల్లనినీటిని వాడరాదు. మామూలు కిలోష్ణములోనే యుండవలెను. ప్రేగులయందు అప్లము, కేష్నము, గాలి ఎక్కువగా నున్నపుడు వేడినీటినే వాడవలెను. అప్పుడైనను అనీటిని ప్రేగులలో నిలువయుం చుటకు యెట్టిభాధయు నుండరాదు. జ్వరములలోను గర్భవారములోను కొంచెము గోరువెచ్చని నీటినే వాడవలెను. చూడిపశువులకు ఎనీమా చేయునపుడు వాటి ఉదర ములు సున్నితముగా నిండుగానుండును. అందువలన ఎనీమా చేసినవరకు ఎక్కువకాలము నిలువవు. కాబట్టి చూడిపశువులకు ఎనీమా చేయుటకు గోరువెచ్చని నీటినే వాడవలెను. మిగుల చల్లనినీటిని వాడరాదు. రైతులలో చాలమంది పశువులకు ఎనీమా చేయుటనిన అశ్రద్ధముతో చూచుచుండురు. కొందరు ఎనీమాచేసిన నీరు లోపలనే యుండునని భయపడుదురు. వైద్యులు అనుభవముతో ఎనీమాచేయును కాబట్టి రైతులు భయపడ నవసరములేదు.

ఎనిమిదవ పద్ధతులు

పశువులకు నాలుగు పైంటులుగాని 6 పైంటులుగాని 8 పైంటులుగాని (పైంటు అనగా అర్ధసేదనీరు) నిరుపట్టు ఎనిమిదవ బ్యాలు పయోగించవలెను. చిన్న పశువులకు 2 లేక 4 పైంటులడబ్బాలు పయోగించవలెను. ఈ డబ్బాకు 2 గజముల రబ్బరు గొట్టములు తగిలించవలెను. పశువును నిలబెట్టిగాని పరుండబెట్టిగాని డబ్బానిండ నిరుపాసి మనుష్యుని ఎత్తుగా పట్టుకొనిమనిచెప్పి పశువుకంటే గజముఎత్తు మట్టములోనుంచి ట్యూబును అసనములోనికి నెమ్మదిగా ఎక్కించవలెను. ఎక్కించిన తరువాత పశువు ముక్కుకుండను. అట్లుముక్కువలన రబ్బరుగొట్టము లోపలికిపోక బయట నేయుండును. అట్టి సమయములందు మనము ఆ చివరరబ్బరును చేతి కలిచే నెమ్మదిగా అసనములోనికి పోయిచ్చి చక్కరిగింతపెట్టి మలక్రేగువలనపోయిచ్చి గొట్టమును లేలికగా నొక్కవలెను. అప్పుడు నీరులోపలి క్రేగులన్నిటికి చిమ్మును. ఆ క్రేగులండిన తర్వాత బయటకు వెడలి గ్రహ్యము. అప్పుడు ట్యూబునుతీసివేసి దూరముగానుండి కలము ఎంతపడుచున్నది ఏకంగానున్నది దానిలో జీర్ణముకాని గింజలుగాని పురుగులుగాని జిగురుగాని రక్తము గాని యున్నదేమో పరీక్షించవలెను. ఇంకను మలినమున్నదని అనుమాన మున్నపుడు మలల నీరెక్కించవలెను. ఈరీతిగా మలినముపోవువరకు రెండుమూడుసార్లు చేయవలెను. ఎనిమిదవ పద్ధతు వైద్యుడు బట్టలమీద పడకండా జాగ్రత్తగా నుండవలెను. ఎప్పటికప్పుడే సబ్బునీటిలో చేతులను శుభ్రముచేసికొను నుండవలెను. గబ్బరు ట్యూబులో పేడ ఇరువకొనినచో కడిగి మరల యెక్కించవలెను.

వేడినీటిలో ఎనిమిదవ పద్ధతులు

రైతుల ఆకుతనుబట్టియు పశువులబాధనుబట్టియు వేళకు సరియైన వేడినీరు దొరకక పోవుటవలనను ఎనిమిదవ పద్ధతు లోటుండివచ్చును. చిన్నశ్రీ మాత్రము ఎనిమిదవ పద్ధతు. ఇట్లు చేయుటవలన కేగువలన చురుకుదనము లేక శీతలముగా నుండును. కాబట్టి అంత వేడినీరుగానుండ గోరువెచ్చని నీటిలో ఎనిమిదవ పద్ధతు.

సబ్బునీటిలో ఎనిమిదవ పద్ధతులు

సప్తరైటు సోపుతోగాని బోరాప్సైట్రాల్ సోపుతోగాని అత్తరులు కలుపని మెత్తని సోపుతోగాని ఎనిమిదవ పద్ధతు. 100 భాగముల నీటిలో 10 భాగముల సబ్బును కలిపి ఎనిమిదవ పద్ధతు. మిక్కిలి మలబద్ధకముగానుండి పేడ దుర్వాసన వేయునపుడు గోరువెచ్చని నీటిలో సబ్బుకలిపి ఎనిమిదవ పద్ధతు నుంచి.

తైలములతో ఎసిమాచేయుట

పశువునకు 107 డిగ్రీల జ్వరముండి ముడ్డితివుండి బాధపడుచున్నపుడు 50 భాగముల నీటిలో 5 భాగముల గ్లిసరైన్ గాని క్యాలెనెరుఆయిల్ గాని లేక చిట్టాముదముగాని కలిపి నెన్నుదిగా ఆసనములోనికి ఎక్కించుచు మలము కరుగనిచో తీసివేయుచు ఈనీటిని ఎక్కించవలెను. లోపలనున్న చెడుపదార్థములతోయు కదలి బయటికి ప్రోసి వేయును. శీతాకాలములో దూకులు పాలు ఎక్కువతక్కువలనుబట్టి మలబద్ధకముకలిగి వేడవేయుటకు బాధపడుచుండును. ఇంకను మలము పడుటకు రోగిగూ నోనిగూడాకు గాడిదగడప ఆముదమువగైరా పోయుదురు. అటు పోయుటవలన అతివేడిజేసి మలము పట్టుముగట్టి రక్తములో జీర్ణించి మెడవిగిడిసికొని చనిపోవును. అట్టి సమయములలో ఈ ఎసిమాచేయుట మంచిది.

మలమును చేతితోతీయుట

నీటితో ఎసిమాచేయుటకు వీలులేనప్పుడు, పశువు రోగిముచే బలహీనతజెంది లోపల వేడిలనవుడు నీటిని ఎక్కించుచుండ ఆముదముగాని గ్లిసరైన్ గాని చేతికి రాదుకొని ఆమలమును నెన్నుదిగా తీయుటమంచిది.

వాతలువేయుట

మనదేశములో ననేకులు తమపశువులకు ఏవ్యాధి వచ్చినను ఆరంభములోనే వాతలు (గత్తులు) వేయు ఆచారముకలదు. వ్యాధులు లేకుండగనే మహాకాల్పులు పితాపురంకొల్పులని కొల్చుదురు. ఇట్లుకొల్పుట చాలా పాఠపాలు. వాతలు వేయుట మహాపాతకము. పశువు వచ్చినను బ్రతీకినను వాతలు వేయరాదని చెప్పుదురు. ఇట్లు వాదించుటకూడె తిప్పనియే వాస్తవోక్త్యము. మానవవైద్యములో ఇంగ్లీషు పశువైద్యములో కూడ కొన్ని వ్యాధులకు తప్పక వాతలు వేయవలెననియున్నది. వైద్యములో ఆముదములేనివారు తిర్కించినను లాభములేదు. పశువునకు గురక, దొప్ప, పుండేటివేర్ర మున్నగు రోగములలో ఆ యా రోగలక్షణములను బట్టి వాతలు వేసి సహా మందులకంటె నెక్కువపని చేయును. కొన్ని రోగములలో ఎన్నిచికిత్సలు చేసినను లాభము కన్పట్టనప్పుడు వాతలవలన తిగుటకూడె గలదు.

సామాన్యముగా పశువులకు సంభవించు రోగములలో చాలావరకు ఏచికిత్సయు లేకుండగనే తగ్గిపోవును. ఇటువంటి వ్యాధులకుగూడ వాతలు వేయుదురు. అనవసరముగా రోగినిదాసము గ్రహించక వాతలువేయరాదు. ఈ చికిత్సయందు రెండువిధానములు గలవు. అందులో నొకటి పశువునకే కీలునకైనను, కన్నునకైనను నొప్పిచేసి నపుడు ఆ కీలునువంటి కాల్పుట, రెండవది పశువు ఏవోనొక రోగిమును పొందినపుడు

గాని లేక యేకాగ్రముచేతనైన కృశించినప్పుడుగాని దాని తత్వమున బాగుచేయు నుద్దేశముతో శరీరమంతయు కాల్చుదురు. ఈ రీతిగా కాల్చుట చాలా పొరబాటు.

నాతలనుగూర్చిన వివరములు

ఈగ్రంథములో రైతులకు విపులముగా తెలియులాగున ఆయా రోగముల వాత అను గూర్చి తెలిపితిని. వాతలు వేయుటలో అనేకమంది అనేకరకములుగా వేయుదురు. “కీలేగి వాతపెట్టమని” పెద్దలుచెప్పుదురు. కొందరు వారియిష్టప్రకారము ఎచ్చట వాతన్న అచ్చటనే కాల్చుటకూడ జరుగుచుండును. మరికొందరు జబ్బు రాగానే కాల్చుదురు. అట్లుగాక మా అనుభవ చికిత్సలు చేసి ప్రాచీన గ్రంథముల పరిశీలించి ఈ గ్రంథములో తెలిపితిమి. పశువు శరీరములోనుండు రక్తనాళములు, నగములు మున్నగునవి పరిక్షించి వాతలు పెట్టవలెనుగాని ఆజవసరముగా పెట్టిన ఆపశువు బాధపడుటయేగాక తదితర జబ్బులు రావచ్చును.



వాతలువేయు పద్ధతులు

వాతలువేయుటకు ముందు సమానమగు సలమ చూడవలెను. అచ్చటనే 10 X జముల దూరములో సిడకలతోగాని గొగ్గలతోగాని దానివేసి ఆదారిలో వాతలువేయు

కొటివిద్యలుచేసి నా కొలతవచ్చితే కొలపవలెకాదు.

పనిముట్లను నిప్పుఅంటించవలెను. అనిప్పునకు దగ్గరగా లేతలేపశువులుగాని గడ్డి మొదలగు నవిగాని యుంచరాదు. కాల్పునపుడు ఒకవిధమును దుర్వాసన నేయును. అనాసనను వీల్చరాదు. పనిముట్లు ఎట్టుగా కాలిన తరువాత గోనెగుడ్డతో పనిముట్లను పట్టుకొని గురులుపెట్టిచోట కాలివలెను.

పశువులకు వాతలుపెట్టుటకు పూర్వము పేడలోగాని నీరాలోగాని ఈ గొంధముగా చెప్పినరీతిగా గీతలుగీసి వాతలుపెట్టవలెను. పనిముట్లు సరిగా కాలివుండ వాతలు వేసి నప్పుడు అది బాగుగా కాలినచోలేనో చూడవలెను. అటుకాలినచుండ వాటిని తీసి మగల బాగుగా కాలినవాటిని తీసికొనిరావలెను. పశువు కడుపుబ్బిడ, దిగుచున్నది, ముష్కిరున్నది మొదలగువి గ్రహించవలెను.

వాతలువేయుటకు తరువాత కొడవళ్ళు గడ్డపాళ్ళు చువ్వలు వాడుదురు. ప్రత్యేకముగా వాతలువేయుటకు పనిముట్లు చేయిగుళొని యూదుట ముచిది. ఉడ్డుచే నడిపనిముట్లు ముచివి. పనిముట్లు పనుచులేనివిగను కొణములు లేకగను సమానముగు బరువుకలిగినవిగా నుండుట ముచిది.

వ్యాధిదేహము పశువునకు అగ్నిని చూపించరాదు. అట్లు చూపించిన దెహల దానికొకవిధమును భయము, కంపము కలిగి సరిగా పండుకొనజాలక గంతులువేయును. ఈ గంతులువేయుటవలన ఇంకను రోగి మెప్పువగును. కాబట్టి తటాలున తీసికొని పశువును నెమ్మదిగా పడగొట్టి కాళ్ళుగట్టి ఎట్టుగాకాలిన పనిముట్లచే వాతలువేసిన పశువున కేమియు అపాయమురాదు. వ్యాధిమదిరిన తరువాత కాలిని చనిపోవును.

వాతలువేయునుండి తదితరులతో మాటాడక పనిముట్లపీనులు గోనెగుడ్డతో పుచ్చుకొని వాతలువేయవలెను. కాలినిచోటనే కాల్యక ఎత్తుననేపు పరుండబెట్టక పశువుయొక్క మంచిచెడ్డలు అనగా వాతలువేయునపుడు పశువు ఏమిచేయుచున్నది తెలిసికొనుచు కాలివలెను. దానిదగ్గర ప్రతేక మొకరిదరు మనుష్యులనుంచి పనిముట్లు బాగుగా కాలించునది లేది తనిభీచేయుచుండవలెను. వాతలువేయు మునిషి కట్టు పంచెలు గట్టిగాకట్టుకొని చెంగులను తొడవరకు దోపవలెను. చొక్కా తొడుగుకొన రాదు. కాలుచున్నపనిముట్లు పశువుదగ్గరకు తెచ్చునపు డెవరిని ఆయా భాగములందుంచక దూరముగానుంచవలెను. వాతలువేసిన పనిముట్లను పనిఅయిన తరువాత బూదలో గాని పేడలోగాని ద్రుచ్చివలెను.

వాతలు వేయవలసిన వ్యాధులు

చర్మము మాంసము నీరలు, స్నాయువులు నాధులు వీటియందు వాతముండి మిక్కిలి తీవ్రముగురూధ కలుగజేయునపుడును, ప్రణమ ఎత్తుగానుండి కఠినముగ తిమ్మిరిగ నుండు మాంసము కలదిగా నుండునపుడును, కణుతులు, బెణువలు, చర్మము, కొమ్ములు

అచ్చిపచ్చిన భూమి అడిగడే చాలును.

తిరుగుట మొదలగువాటిలో నిరలుతెగింపును రక్తనాళములు తెగి రక్తమెక్కువగా కారునపుడు అగ్నికగ్గు అనగా రాక్షసవైద్యముచేయవలెను. వైద్యుడు గ్రంథి మున్నగు ప్రణమల పొట్టి పొడవు మున్నగు ఆకారములను పరీక్షించి చుక్కలుగాని నిలువు అడ్డ గీతలుగాగాని కొల్పవలెను. గోగపశువుయొక్క ముగ్గుములు, బలము, బలహీనత, వ్యాధి, ఋతువు బాగుగా పరీక్షించి వాతలు చేయవలెను.

శరీరపు సహజరంగు మారి ఎక్కువగా కొల్పబడి బొబ్బలుపుట్టవన్న మొదల తానిని పుష్టమందును. తీవ్రమగు బొబ్బలులేచి వీలచున్నట్లు బాధ మంద బోలు ఎంపు వాపు గతగి చాలాకాలమునకు గారి తగని మెడల గుంగ మనబడును. ఏడిన తాటి పండురంగులగి మిక్కిలి ఎత్తు లోతుగలుగక చుక్కము మాంసము నిరలుస్తాయు వులు సంధ్యసిరాహ లక్షణములతోగూడి యుండినది సమానముగా కొల్పబడినదని తెలిసికొనవలెను. మాంసము వ్రేలాడుట, శరీరము నడలుట, నీరిలు, స్నాయువులు, సంధులు, అములుమున్నగు భాగములు బాధకలుగుటయు చెడిపోవుటయు అధికజ్వరము ఎక్కువమంద, ఎక్కువ దాహము మున్నగు ప్రమాదములు సంభవించును. ఈ లక్షణములు ఎక్కువగా కొల్పబడవలసి కలుగును. ఇట్టిస్థితిలో గాయము త్వరగామాపడు. మానినప్పటికి నెరియగు రంగురాదు.

ముంతకొల్పులు

కొందరు పశువైద్యులగు లంబాడీలు తమ మ దలబోనున్న పశువులకు ముంత కొల్పులు చేయుదురు. పశువున కేరోగము వచ్చినను కొల్లినొప్పులకు బెలువలకు తగి తర వాపులకు ముంతకొల్పులు కొల్పుదురు. ముంతకొల్పులనగా చిన్నమూగిగల మట్టి పిడతనుగాని ఇటు పిడతనుగాని తెచ్చి మాతిభాగము అగ్నిలోపెట్టి తిసి వేలునే ఆభాగముతో గుండ్రముగా వాతలుచేయుదురు. ఈరీతిగా ఆయాభాగములకు తగిన పిడతలు తిసికొని కొల్పుదురు. ఈ పద్ధతి అత్యంతమైన రోగములకు కొల్పవచ్చును.

వాతలుమానుటకు మందులు

వాతలునేవిన పుండ్రునిద ఈగలు వాలకుండ వేపమానె రాయవలెను. అప్పు డప్పుడు అముదమును రాయుచుండవలెను. పుండ్రును నీరుగాని లేమగాని సోకినీయ రాదు. కామలు పొడివకుండ కావాడవలెను. నీలిమందు కొబ్బరినూనెలో కలిపి అప్పు డప్పుడు రాయవలెను. లేక వెన్నలో పోసిపొడిచిగాని కలిపిపొడిచిగాని కలిపి రాయ వలెను.

పాశ్చాత్య వైద్యపద్ధతి - ఇన్ జెక్షన్సు

ఇన్ జెక్షన్ అనుపదము సామాన్యముగా ఏ భాషలోఁబడినదో పోషకులలేరు గాని రోగముతోయు స్వస్థానాన్యముగా వాడుకయైయున్నది. ఇన్ జెక్షన్ - ఇన్

లోనికి - జెక్స్ జోనువులు. - ఇన్ జెక్స్ అనగా శరీరములోనికి యంత్రసాధనముచే జౌషధముగాని మరి యే యితరపదార్థమునుగాని బ్రవేశింపజేయు విధానమునకు ఇన్ జెక్స్ అనుచు వాడుచున్నారు. ఈ మాటకు శరీరమునపదము గానరాదు. ఆయుర్వేదములో నూచీముఖి ప్రయోగమున వృద్ధవైద్యులు తెలుపుచున్నారు. శరీరభాగములోనికి అనగా నూచీవంటి ఏ యితరపదార్థము (పీచికొరి) లోగాని చర్మములోనికి లేక మాంసములోనికి గర్భనాళములలోనికి జౌషధమును పంపుటకు ఇన్ జెక్స్ అనుచును. ఈ ఇన్ జెక్స్ ప్లాస్ రెండు గతములుగలవు. 1 చర్మమున పంపమున దీక్షకములోనికి జౌషధమును ప్రయోగించుట. 2 ఆననముద్వారా లేక చర్మసానము (చెనాచీ గ్నా) కు మూత్రద్వారముల ద్వారా జౌషధముల ప్రయోగించుట. ఈ రెండువిధముల ప్రయోగమునకు ఇన్ జెక్స్ అనుచు వాడుచున్నాడు. ప్రస్తుతము వైద్యులు ఆననముద్వారములగుండు బ్రవేశపెట్టు సాధనమునకు ఎబీమా (ఎబీస్కో) అను వాడుచున్నారు. ఈ ఇన్ జెక్స్ అనుమాట ఏ భాగములో దైహిక వైద్యశాస్త్రమున ఉపయోగించుటకు పదముగాన కలిగిన ఇన్ జెక్స్ అయియు ఆయుర్వేదమున నూచీవ్యవహారమును పోలుచు చుండును.

ఆయుర్వేదపద్ధతి - ఇన్ జెక్స్

పూర్వకాలమున చేయుచు ఇన్ జెక్స్ ను (నూచీవ్యధి) చూడక పద్ధతిగా నుండెడిది. అనగా కొంచెము మోటుపద్ధతిగా నుండెడిది. ప్రస్తుత కాలములో ప్రభుత్వమువారామోదించి ప్రతి సంవత్సరము పుట్టిన గంటిబిడ్డలకు కేయుడుకు టీకాలను (నూచీ వ్యధిసము) ప్రత్యేక్షముగా ఆ దారు జూరుచునే యున్నారు. కొన్నివిధముల పరిశీలనములకు పూర్వము ఆయుర్వేద ప్రధ్యులు కనిపెట్టి నూర్గుములనే నేటికి ప్రాక్ ప్రతీతి వైద్యసాం ప్రదాయముల రెండు తెకలకున్న మార్గదర్శకమాలే అయియున్నవి.

అంగ్లము పశువైద్యులు (రెటరీన్ డాక్టర్స్) యిప్పటికి ఈపద్ధతి ప్రకారము పశువులకుకూడ టీకాలు వేయుచున్నారు. ఇకను చూడవులకు ప్రాచీనకాలమునుండి పచ్చిబొట్టు నూచీవ్యధి యిప్పటికిని అమలుజూనున్నది. ప్రాచీనులు ఆనే పరిశోధనలచే రోగములు గుర్తించుటయు, ఆయా రోగముల నిర్మిటికి ఉపయోగమును ద్రవ్యములు, ప్రయోగ విధానములు, ప్రయోగించు పనిముట్లు (యంత్రశాస్త్రములు) మొదలగు మార్గములన్నియు శిలాకావనములవలె యనేక గ్రంథములువ్రాసి యిప్పటికిని మృతజీవులై యున్నారు.

మనుష్యులకును జంతువులకును వ్యాపించు సకలరోగములకు ప్రాధాన్యముగా త్రినోషములు (నాచి, పిత్తి, కఫ) ప్రధానములై అచో విహితముల చేతన, శరీరము ప్రకృతిభేదములచేతన వేరువేరు లక్షణములతోను వేరువేరు నామములతోను చికిత్సించబడుచున్నది. ప్రాచీనాయుర్వేద చికిత్సా విధానములన్నియు మనుష్యులకు వలనే జంతువులకు ఉపయోగింపబడును. ఇప్పుడిప్పుడే పశువులకుకూడ ఆయుర్వేద

ఇంజెక్షన్ యిచ్చు పరిశోధనలు తెనాలి పశువైద్యశాలకాలవాన ప్రయత్నించుచున్నాడు. ఈ కారణముచేతనే అంగ్లేయు వైద్యులు కొన్ని జంతువులనుండి తయారు చేసిన మాంసగ్రాహక రక్తము చీము మొదలగు పదార్థములు మనుష్యులకు టీకాల రూపమునను, ఇన్ జెక్షన్ రూపమునను నోటివ్వారా ప్రయోగించుచున్నారు.

పూర్వము అపరధస్వంతరియగు చరికొచార్యులు రోగములందు ఉపయుక్తపదమును రక్తమునందు ప్రవేశింపజేసిపయోజన జీవించునని చెప్పియుండిరి. ఆరీతిగనే పూర్వకానామే నేటికిని ఆచరణమై అంగ్లేయుల శ్లేషీయులను ప్రధానకర్తవ్యమెయ్యున్నది. అంగ్లేయులు ప్రస్తుతము చేయుచున్న ఇన్ జెక్షన్లను పూర్వము టీకాలను చగ్గుముగీచి అచ్చటి గర్భమందు జొరవడద్రవ్యమును బ్రయోగించుచు క్రమముగా పరిశోధనలచే ఆయు శ్లేషీయ నూచీముఖశస్త్రమును పనిముట్టు(సిరంజి)లో పశువులకును యితర జంతువులకును మనుష్యులకు ఇన్ జెక్షన్లు(నూచీముఖప్రయోగము)చేసిరి. ప్రాచీన చరికొచారులు జెప్పియున్నట్లుగానే జొరవడములను రక్తమునందు ప్రవేశ పెట్టుట కనుకూలించునట్లుగా ద్రవరూపముగా మార్చి పనిముట వాడుచున్నారు. ప్రస్తుతము వాడుచున్న ఇన్ జెక్షన్లు విధానముగా నుపయోగించు సీరములుగూడ ద్రవరూపముగనే తయారు చేయుచున్నారు. ఇట్టిసీరములు పశువుల కశ్యంతోపయోగమగునట్లుల శ్రించి రసాయనశాస్త్రజ్ఞులగు ప్యాస్టియరుదొర చంబరులాండుదొర రాష్ట్రదొర యన వీరుముప్పురు కొన్ని జంతువులనుండి పరిశోధనలు చేసి సీరములను కనిపెట్టియున్నారు. ఇట్టిసీరములు పశువుల రక్తమునందు ప్రవేశించగనే శరీరమంతయు వ్యాపించి త్వరలో గుణముచ్చును. ఇదరక్తవ్యాధిములలోకి ఎక్కించిన త్వరగా పనిచేయును. సీరములో కెక్కిండిన అంతకంటె అలస్యముగను కండరములలోని కెక్కించిన కొంత అలస్యముగను చర్మములోని కెక్కించిన తురికొంతఅలస్యముగను వ్యాపించును. కాబట్టి ప్రాచీన సిద్ధాంతముల ననుసరించియే నేటికిని ఆయుశ్శేధ పశు వైద్యులు వెల్లీసర్ వారిచ్చు ఇన్ జెక్షన్లు మారుగా జెనుదుపాలు మంచినానీ కలిపి పశువులకువచ్చు చీడపార్థ దొమ్ముగుణక మున్నగు అసాధ్యరోగములకు తగుపాటి వెదురు గొట్టుముతో ఆ యా రోగినిరోధక సలములందు టీకాలువేయుట ఇప్పుటికి అందరికి విశదమైయున్నది. ఇట్లే యింకను అనేకవిధములుగా ఆయుశ్శేధ తంత్రకారులు ఇన్ జెక్షన్ ప్రయోగములు వ్రాసియున్నారు.

కాబట్టి అంగ్లేయులశ్లేధ పద్ధతులు తెంటికిని ఎంతమాత్రము భేదముకొన్నించదు గాని అంగ్లేవైద్యమందు వాడు తుంపులు మాత్రము కొంచెము భేదముగ కొన్నించును. అయినను ఆసుందులన్నియు మన భారతదేశమందు ఉత్పత్తియగు మూలికలవలననే తయారుగాచుచు ప్రభుత్వాదాయముచే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత వహించుచున్నవి. మద్రాసు గవర్నమెంటువారు ఆయుశ్శేధ పశువైద్యముపైనే తెనాలి ఆంధ్రజాతీయ పశువైద్య కళాశాలపై సవరితల్లి ప్రేమజూవుడుడినందున ఆయుశ్శేధ పశువైద్యము సంపూర్ణాభివృద్ధిమొందినదనిజాలకున్నది. ఈవిషయమై తగినప్రయత్నములు జరుగుచున్నవి.

అగ్రవాపి సాంద్రవాపి గోపాష్ఠీ, బీజసంగ్రహిణాయాం ప్రాతిక్షికదర్శి ప్రభయేన సావ్యతి.

ఆయుర్వేద పశువైద్యాచార్యులు విదేశీయాశుధములు

నిరభ్యంతరముగా వాడవచ్చును.

ప్రాచీన కాలమునాటి ఆయుర్వేద పశువైద్యము నేడు సంస్కరింప బడవలసిన శోజులు వచ్చినవి. కాలముగూడ దీనికి అయ్యకాలముగానున్నది. ప్రజలుగూడ ఆయుర్వేద పశువైద్యముపట్ల సుముఖులైయున్నారు. ఇప్పుడు నూటికి తొంబది వుండికి ఆయుర్వేదపశువైద్యముపట్ల అదరణము కలుగుచున్నది. ప్రాచ్య ప్రాచీన వైద్యములలోనుండు రహస్యములన్ని విమర్శించుచున్నారు. అంగ్లవైద్య వెటరినరీ డాక్టర్లు చేయు ఇన్-జెక్షన్సు, ఆయుర్వేద భాగమగు శల్యశస్త్రము (శస్త్రచికిత్స) లోని శుభకరణములని విశాల వృద్ధులగు మా పాఠశాలకు బోధపడుచున్నది. వాడగర సుమారు 200 మంది పశువైద్యాచార్యులు తచ్చిదై. నేను చెప్పు పశువైద్య విద్యకూడ ఇంగ్లీషు, ఆయుర్వేద పశువైద్యచికిత్సలే. రైతులందరనుకూడ ఈ విశిష్టము తెలిసికొనవలెనని కోరిక. ఇంజెక్షన్సు యిచ్చుటలో కొంతమంది వైద్యులు ధనార్జన కొరకు రైతులను మోసపుచ్చుచున్నారు. ధగధగ మెరిసే డిస్కలు వాటరు ట్యూబులతో నాటకమాడే డాక్టర్లను ఎంతోమందిని చూచితిని. అందుచేత ప్రతిరైతుకూడ ఏ డాక్టరు వచ్చిన మందులపేర్లు, ఇంజెక్షన్సు పేరు అడిగి తెలిసికొనవలెను. ఏమైన మోసాలున్న తక్షణమే వారి సేవారికి తెలిసి తగినచర్య తీసికొనవలెనని వా కోరిక.

పూర్వము చరకుడు స్వదేశీయ, విదేశీయ భేదము ప్రాతమాత్రము వైద్యులుగాని వైద్యేతరులుగాని తలంచరాదనియు, మానిన నే మందని నెలవిచ్చియున్నారు. గాన ఆయుర్వేద పశువైద్యాచార్యులందరు ఏ యే సమయములలో ఏ యే బోషధములవలన రోగనివారణ కాగలదో అట్టి మందులను ఇన్-జెక్షన్సు మున్నగు వాటిని తెలిసిసంతవరకు వాడవచ్చును. తెలిసి తెలియని చికిత్సలు చేసిన శిక్షకు పాత్రులగుదురు.

ఇన్-జెక్షన్సు

పశువులకిచ్చు మందులు జీర్ణశక్తిముగండుపోయి అచ్చట జీర్ణించి క్రమముగా ఆహారసారములో కలిసి రక్తములోకి పోయి గుణవిచ్చుట ఆ దరికి తెలిసిన విషయమే. ఈ ఇన్-జెక్షన్సును జాగ్రత్తగా రోగనిదానములను గ్రహించి కారీరకాస్త్రము భాగములను గ్రహించి ఈయవలెను. ఇప్పటి నవనాగరికత పరిశుభలనుబట్టి లోపలకు మందులను యిచ్చినను యివ్వకపోయినను డాక్టరు ఇంజెక్షన్ యిచ్చి వాడంటే వ్యాధి తగ్గినదనే రైతుల నమ్మిక. మఖ్యముగా అంటువ్యాధులకు ఇంజెక్షన్సు అవసరము. శోగపశువు ఆహారము లోనికి తీసికొనలేని నీటియందున్నపుడు వ్యాధి శుద్ధికరణముగానుండి బోషధము జీర్ణించి రక్తనాడులలోనికి వచ్చి పనిచేయు సంతటి విరామములేనప్పుడు ఇంజెక్షన్ చాలాపుపయోగించును.

1. హైపోడెర్మిక్ ఇంజెక్షన్:- చర్మముక్రింద మందు విడచునది.
2. ఇంట్రామస్కులర్ ఇంజెక్షన్:- మాంసకండరములలోనికి మందుపంపుట.
3. ఇంట్రవీనస్ ఇంజెక్షన్:- రక్తనాళములలోనికి మందుపంపుట.
4. ఇంట్రవైసల్ ఇంజెక్షన్:- దండినాళములలోనికి మందుపంపుట.

ఈరీతిగా పలువిధముల ఇంజెక్షన్సు గలవు.

అంటు వ్యాధులు

పదమూడవభాగము

పశువైద్య సూత్రములు

పశువు నోరులేని జంతువుగాన మనుష్యులే వాటిని బాగుగా పరిక్షించి తగిన వైద్యాధి సదుపాయములు చేయవలయును.

పశువుశరీరమునకు ఎముకలే ఆకారమును కలుగజేయును. ఎముకలులేనిచో పశువు ఒకమంసపుముద్దగా నుండును. శరీరమునందు చాల కొమలములు, సుషూరములు నగు మెదడు, చెన్నముక, హృదయము, ఊపిరితిత్తులు మున్నగు ఆవయవములు ఎముకల గూళ్ళలో నమగ్నబడియున్నవి.

పశువునకు మంచి ఆకలివుట్టుట, సరిగా ఊపిరిపీల్చుట, బాగుగా పేడవేయుట యెడలగునవి సక్రమముగా జరుగుదున్నచో ఆ పశువు ఆరోగ్యముగా నున్నదని గ్రహించవలెను.

పశువులు సుఖినిత్యము గుండునపుడు గుంపులో కలిసిమోసి, వలసినపుడు మేత మేయుదు, కాలమెరిగి నెమరువేయుచుండును. చెవులు చూటినాటికిని ఆడించుచుండును. ముక్కు మూతి చెమ్మగలిగియుండవలెను. కన్నులు నిర్మలముగ ను, కాంతిగ నుండును. చర్మము మృదువుగ నుండును. నెట్టుకలు చర్మముమీద వ్రాలియుండును. పశువులు ఒకదాని నొకటి నాకుకొనుచు కాలాదితముగా పేడవేయును. ఆ పేడ మెత్తగా నుండును. ధారాళముగా మూత్రము పోయును. వియంగమందును వాపుగాని, టంటు గాని లేకయుండును. ఈ లక్షణములన్నియు సుఖజీవితమును తెలుపును. అట్లుండక మందవిడిచి, దూరముగాపోయి నల్లకప్పు వేసికొనియుండిన యెడల ఆ పశువు అనారోగ్యముగానున్నదని గ్రహించవలెను.

కొమ్ములు చెచ్చగాన, ముక్కునండి మూతి చెమ్మలేక వెచ్చగానుండి మూత్రము పనువురంగువలె కొంచెము కొంచెము పోయుచు, పేడగట్టిగావేసి మేతమాని మిక్కిలి దాహముగొనియుండెనేని అట్టి పశువునకు జ్వరము తగిలినదని గ్రహించవలెను.

పశువు ప్రాణమునకు గాలి ముఖ్యధారము. అదిలేనిచే ఒకనిమిషమైనను జీవింపలేదు. సర్వావస్థలయందును పశువులు గాలి వీల్చుచుండును. అట్టి గాలి పరిశుభ్రమైనదిగా నుండవలయును.

పశువు ఆహారములేకుండ కొన్నిదినములవర నుండగలదు. గాని, దాని శరీరశక్తి నశించి అవయవముల బలము క్షీణించును.

బడిలేని చదువు వెంటడిలేని నేద్యము కూడదు.

పశువు గాలి సరిగవీలకపోవుటచేతనే శరీరమందు ప్రాణక్రియ క్షీణించును. అప్పుడే పలువిధహానికల పాలగును.

నిలువయుండిన గుంటలో నీరుగాని, మరుగునీరుగాని పశువులను త్రాగనియరాదు. అట్లు త్రాగనిచ్చినచో అవి పలువిధముల సంకటముల పాలగును.

జడ్డు, రక్తము, గుండె, మూత్రము, పుంజులు, చెమట, చీమిడి, చొంగ మొదలగునవి అపరిశుద్ధములు.

పశువును కష్టపెట్టి పనిచేయించిన వెంటనే నీరు త్రాగించరాదు. అట్లు త్రాగించినయెడల ఆరోగ్యముచెడును.

పశువులను ఎండ వానలకు పాలుగానియక కాపాడుచుండవలెను. ఆహారవిహార ములయందును, పాటుకొనప్పుడను, పశువులను మిగుల బాగరూతతో చూచుచుండవలెను.

పశువులకొట్టము మొక్కల ధూమిపట్టము చుట్టుప్రక్కల కంటే నెత్తుగానుంచి ఏటవాలుగా మలమూత్రాదుల క్రిందికి బారునట్లుగా బయటకు వేయవలెను.

చలిగాలి తగు సమయమున పశువులకు తగినకొట్టములు కట్టించవలెను. కిటికీలు చాలినంత వెలుతురు వచ్చునట్లుగా నుండవలయును.

కొట్టములలోనే, ప్రసోక్కుడుగడ్డి నిలువయు చరాదు. ఆ యెరువునంతన పశువులుండని సలమునవి చాలామందిగా లోతైనగోతుల ప్రవీణి, వానిలో వేయించవలెను. ఇట్లు చేయుటచే దోగులు మొదలగునవి రావాలవు.

పశువుకొట్టముల గోడలకు సంవత్సరమున కొంసారి నున్నము కొట్టించిన యెడల విషక్రిములు చేరవాలవు.

వ్యవసాయమునకు పనికివచ్చు పశువులను తదితర పశువులలో చేసినయక ప్రత్యేక సలములందు కట్టించి చక్కగా మేపవలయును. వారముదినముల కొకసారి పశువులను బిల్లీతో శుభ్రముగా కడగుచుండవలెను.

పశువులు క్రిందిని యుంచునట్లు చేయరాదు. ప్రతి పశువునకు పరుండుటకు సలము విశాలముగా నుండవలెను. పశువులదగ్గర గోతులలో ద్రుట్లు తీసివేయుచుండవలెను.

పశువుల కొట్టములు శుభ్రముగా నుండుచుండవలెను. గొడ్డకు చిట్టు, తత్తుకు మున్నగు నాహారసాధనములు కట్టుటకు వేడబూసిన బట్టలను వయోగించవలెను.

ప్రక్కపశువు తగులవండునట్లు పలువులు మరచగా నుండవలెను. లేనిపక్షమున పశువు లాకదాని నొకటి రాచుకొని పొడుచుకొని త్రాళ్లుతెచ్చుకొని అల్లరివేయును.

గుంజుకును గుంజుకు మధ్య నాలుగడుగుల దూరముండవలెను. పలువులు కొంచెము పొడుగుగా నుడిచిగాని పశువులు పండుకొనునపుడు లేచునపుడు నీలుగా

పొరుగులో చాకిరిం పొరుగులో వ్యవసాయం తనను తినేవేగాని తానుతినేవికావు.

నుండను. గుంజల పాతుటకంటే గాడిలోపైలలో నిరుపరి గులమర్చి వానికి పలువుల తప్పులు పెట్టుట నుంచిది.

పశువులతో కలన విరువగూడదు. అంగుచే పశువులను కోపము క్రోధము కలుగును. లేనిచో అవి మొద్దుబారిపోవును.

జబ్బుగానున్న పశువులను తగినంత మేత మేపవలయును. గంజి, బావ, పచ్చి మేత మొదలగునవి పెట్టవలయును. ఇంతియేకాక ఆ పశువును నిడగలసలమునందుంచి సారవంతమైనట్టియు సులభముగా జీర్ణమగునట్టియు ఆహారమును పెట్టుచుండవలెను.

జబ్బుగానున్న పశువుల కొట్టములలోని అడుగుభాగమును పారతో గీతించి మరల త్రొత్తనున్న పోయింగి దిమ్మెసతో కొట్టించవలెను.

అంటువ్యాధులు సోకిన పశువులను ప్రత్యేకస్థలము నందుంచి చికిత్సలు చేయుచుండవలెను. కోగమతో నున్న పశువుల మలమూత్రాదులు ప్రతిదినము తీసివేసి అచ్చటి చెత్తనుకూర్చి శుభ్రము చేయవలెను.

ఆ పశువుల వేడతో పిడకలు చేయరాదు. ఉడికిన సలమందు ఫిన్వెల్ గాని, కర్పూర తైలముగాని చల్లవలెను.

అంటువ్యాధిగల పశువు చనిపోయినచో మార్గి నా ద్రచే కోయి చక మారముగా తీసివారిపోయి నున్నను, ఉప్పువేసి పాతి పెట్టించవలెను.

కోగముతో నున్న పశువులను దగ్గరగానుంచు వ్యవసాయసామగ్రిలు (గుంజలు, గాడి) మొదలగు పనిముట్లు నున్న పుటితో చక్కగా కడగవలెను.

కోపభయము త్రాగించునపుడు పశువుయొక్క తలను ఎత్తిపట్టుకొని నోయ తీరది ఒక్కొక్క స్రుక్కవంతున త్రాగించవలెను.

దగ్గునట్లు పశువుకనబడేనేని పట్టునిడిచి దగ్గుచ్చిన తర్వాత మును నోటిలో పోయవలెను. లేనియడల ఊసిరి గొట్టములలోనికి ముందుపోయి దగ్గులేక కొన్ని పశువులు మృతినొందును.

పశువుల వుండ్రు శుభ్రముగా నుంచవలెను. రోషమునకు రెండుసార్లు వేడిబట్టితో కడిగిన తర్వాత గాయములకు కట్టు కట్టవలెను.

చాలా పెద్దగాయములుగాని, కాలిపుండ్రుగాని యున్నయెడల వానికట్టును బలవంతముగా నొకేసారి తీయరాదు. అటు తీయుటచే గాలిలోనుండు నూత్నజీవులు ప్రవేశించి పురుగులు పడును. కట్టు రసితో అంటుకొనినయెడల వానిమీద వగరునిగుప్పి తడిసి మెల్లగా తీయవలెను.

పశువుల నెంతశుభ్రముగానుండిన నరికెర్రోగముగా నుండనని మన కల్లరకు

పదివినములు వుండేవానికి జరుగును ; ఒంటివానికి యనుభాధోకొని సేద్యముకాదు.

తెలిసిన విషయమే కాబట్టి ప్రతికృషీనలుడు వానిని శుభ్రముగా కడుగుచు నుంచినీతి యందుండుట అత్యంతవసరము.

వేసవికాలములో వారమునకు రెండుసార్లును శీతాకాలములో నెలకొకసారి యును పశువులను చెరువులలోనికి, గంటలలోనికి, పొరుగున్న నదులలోనికి దింపి శుభ్రముగాకడిగి శీరము ఆరునంతవరకు ఎండలో త్రిప్పువలయును.

పొడిగొడ్లను శీతాకాలమునఁ దెప్పవగా నీటితో కడుగరాదు. ఎండలు వేయుదన్న గురుములోనే కడుగవలెను. అటునెలలకు రెక్కవగానుండు దూడలను కడుగరాదు.

నుంచినశువుల శీరము బ్రష్తోతుడిచినయెడల గోమారులు, పేలు, మిణ్ణాలులు ముప్పగనవి పట్టక శుభ్రముగా నుండును. పశువులను బహిరంగ ప్రదేశములలో శీర పరిశ్రమ కలుగుటకు త్రిప్పుచుండవలయును.

దీర వ్యాధులకు తప్ప ఆకళ్ళి క వ్యాధులకు ఎక్కువగా నుండులను వాడరాదు. అట్లు వాడెనయెడల పశువునకు ప్రాణాపాయము రాగలదు.

శశువు మిక్కిలి బలహీనముగా నున్నయెడల, ఆహారము తినుటకగాని, త్రాగుటకగాని లేవదియరాదు. అది లేవలేదను నుచేతముతో శీరముపై చెబ్బలు కొట్టరాదు. పరుండనిచ్చియే నెమ్మదిగా ఆహారము పెట్టవలెను.

అన్ని వ్యాధులనుండును ముఖ్యముగా తీవ్రదశయందున్నప్పుడు కఠినపదార్థముల నాహారముగ వాడుట మానివేసి ద్రవపదార్థములను మాత్రమే వాడవలెను.

వ్యాధిగల శశువులకు ఒకేసారి ఆహార వంతగా పెట్టరాదు. కొంచెము కొంచెముగా పెట్టుచుండవలెను.

పశువును చీకటిగదిలో నుంచరాను. తీక్షణమైన వెలుతురు అవసరము. అట్టి వెలుతురు పశువుమెదడునకు అవసరమైనట్టియు, ఆత్యధికమైనట్టియు చురుకుదనము బుట్టించును.

పశువు అనారోగ్యముగ నున్నట్లు తెలిసిన వెంటనే దానికి విశ్రాంతి నీయవలయును. అట్లు విశ్రాంతి ఇచ్చినయెడల పశుశోగము త్వరగా నెమ్మదిండును.

రోగము నెమ్మదిచినతరువాత పశువును నీటితో శీర మాయనంతవరకు చక్కగా కడుగవలెను.

రోగము నెమ్మదించిన తరువాత పశువును కొట్టులలోనుండి బయటికితీసికొని తరువాత కొట్టుపుగోడలను లోషునీటితో కడుగవలెను.

ఒక గ్రామమునందు అంటువ్యాధి ప్రారంభించినపుడు శోగముసోకిన పశువులను ప్రత్యేకముగానుంచి, తగినంత చికిత్స చేయవలెను.

ఎంచిన ఎరువేదిరా అంటే ఎవమాని పాదము.

నుఖిముగా నుండు పశువులను ఉదయము సాయంకాలములందు పరీక్ష చేసి జాడ్యము సోకినట్లు అనుమానముగా నున్నవాటిని ప్రత్యేకముగా నుంచవలెను.

కల్పములు పశువుశరీరముమీద నిలిచియున్న యెడల అవయవములు సరిగా పనిచేయక గజ్జ, తామర, నసిమిరి, పాడ మున్నగు చర్మవాధ్యులు వ్రట్టును.

గేదలకు మంచి నూనెగాని, వ్యామలై నుగాని, చర్మమునకు వ్రాసి స్నానము చేయించిన చాలా ఆరోగ్యముగా నుండి పాలు బాగుగా నిచ్చును.

పాడి పశువులకు తవుకు ఎక్కువగా మేపరాదు. అట్లు మేసినచో వాతకోగములు ప్రారంభమై పశువుల కపాయము తటస్థిండును.

చనిపోయిన పశువులను కొందరు పాతివేయుదురు. కాని మనుష్యులవలెనే పశువులనుగూడ కాల్పుటయం దెట్టి ఆక్షేపణయులేదు.

పాతివేయు గోతులుమాత్రము 10,12, అడుగుల లోతునకు తవ్కువనుండరాదు. చచ్చిన జంతువులను పాతివేయు శ్మశానములు కౌపురముండుసలములకును జలాశయము లకును సాధ్యమైత దూరముగా నుండవలెను.

కశేబములను నదులలో పారవేయుటయు శిఖరములపై వదలివేయుటయు దుర్గంధమునకు మూలకారణము లగుటయేగాక ఆ నేకకోగములకు కారణములగును.

అంటువ్యాధులను రెండువిధములుగ నెంచవచ్చును.

1. ఒక పశువునుండి మరియొక పశువునకు శరీరముయొక్క అస్వస్థతాభాగస్పర్శ వలననేగాని మరియే విధముగను వ్యాప్తింపనొందదు.

2. వాయుమార్గమునగాని, జలమార్గమునగాని వ్యాప్తి నొందును.

కొన్ని అంటువ్యాధులందు ప్రత్యేకములగు నూత్నజీవులు పశువుశరీరమునందు ప్రవేశించిననేగాని లేకపోయిన యెడల వ్యాధులుకలుగనేరవు.

ప్రతివ్యాధియును కొంతనియమితకాలము పశువు శరీరము వాక్రయించి యుండును. ఈ నియమితకాలము ఆ నేక కారణములను బట్టి వ్యాధిగలపశువులయందు మార్పుగ నుండవచ్చును.

చచ్చినవాటిని కోయువారలనుగాని, అంటుసోకియుండు సలములలో దిగుకుక్కలనుగాని, కావలనుగాని మంచపశువు లున్న ప్రదేశములకు రానీయరాదు.

అంటుకోగము గ్రాహమునందంతటను వ్యాపించి యున్నపుడు అలసటను గలిగిండు పనులను పశువులచే చేయించరాదు.

రైతులు తమ మాధవిశ్వాసము చేతను, వైద్యుడు సమయమునకు దొరకక పోవుటచేతను ఆపత్కాలమందు రాబోవు ఆపదలను తెలిసికొనలేక కనబడిన ప్రతి

విత్తము మళ్ళిలే వ్యవసాయముమానరాదు.

యాకుపసరును వ్యాధి సంభవించిన పశువులకు వాడుటచే వెంటనే ఆపశువు తనప్రాణములను కోల్పోవుచున్నది.

రైతులలో కొందరు భూతవైద్యులను రప్పింతురు. మరికొందరు, దురాయి కట్టింతురు, మరికొందరు మంత్రములను పెట్టింతురు కాని పశువైద్యులలో నిటువంటి వారు పూర్వకాలముం దుండెడివారని నమ్మవచ్చునుగాని ఇప్పటికాలస్థితుల ననుసరించి నమ్ముటకు వీలుగాకున్నది.

నోరులేనిపశువు వ్యాధియొక్క ముందునడకను గుర్తించుటకు మిగులఅనుభవమును, మంచిబుద్ధి కుళలతయును గావలయును.

వ్యాధియొక్క ముందునడకను సరిగా చెప్పగలుగుటకు వైద్యుడు సహజగమనమును జక్కగా దెలిసినవాడై, ఆరోగ్యముయొక్క సహజతత్వమును ఎరిగినవాడై తానువయోగించు ఔషధములయొక్క గుణములను, శక్తులను, గ్రహించుటకుండు మిగుల అనుభవముగలవాడునై యుండవలెను.

వ్యాధియొక్క ముందునడకనుగూర్చి వైద్యుడు తనంతట తాను పశువు యజమానికి చెప్పురాదు. ఎవరైన ఆడిగినయెడల తెలిసియున్న సంగతిమాత్రమే చెప్పవలెను. అనుమానముగా నున్నసంగతి చెప్పుటయందు బహుభాగ్రతగా నుండవలెను.

వైద్యులు చెప్పుసంగతులు సాధ్యమైనంతవరకు ఆశను వుట్టించువనిగా నుండవలెను. స్పష్టముగా పశువునకు మరణము సంభవించు నీతియందు వైద్యుడు తానెరిగిన సంగతి నంతయు స్పష్టముగా యజమానునకు చెప్పవలెను.

పశువుయొక్క దేహతత్త్వము తెలియువరకు మందులు కొద్దికొద్ది మోతాదులతో వాడుట మంచిది.

చూడిపశువుల విషయమై తగినంత శ్రద్ధతీసికొని లక్షణములు గ్రహించి తగిన మందీయనలయునుగాని, ఇతర పశువులకువలె ఈపశువులకు మందు లీయకూడదు.

అన్ని మందులలోను కలియు వస్తువులు త్రొత్తవిగను, పరిశుభ్రమైనవిగను చేర్చవలెను. ప్రాతవస్తువులు, నిస్సారమైనట్టియు వుచ్చిపోయినట్టియు మూలికలను వాడరాదు.

సూక్ష్మజీవులు

పశువుల వ్యాధు లనేక విధములుగా నుండును. కొన్ని వ్యాధులు అవయవములు తమ తమ నియమిత వ్యాపారమును నెరవేర్చని కారణమున కలుగును. మరికొన్ని కీరోష్ణ స్థితి భేదములవలన కలుగును. పెద్దరోగము, దొప్ప, గురక, కురమ మున్నగు రోగములు ఒక పశువునుండి మరియొక పశువునకు అంటుకొను రోగములు. ఇవి కంటి కగుపడని సూక్ష్మజీవులవలన కలుగుచున్నవి. వృక్షములలో ఒక్కొక్క చెట్టునకు ఒక్కొక్క

దున్నేవాడు లెక్కచూస్తే నాగలికూడా మిగలదు.

జాతి బీజముండును. ఆబీజము ఏప్రదేశమున బడిన నా ప్రదేశమునందు మొలకెత్తి చాని నుండి అవృక్షమే మొలచును. అటులనే అంటువ్యాధులను ఒక్కొక్క వ్యాధి వ్యాపింపజేయుటకు సూక్ష్మజీవులు (Micro - organisms) బీజములగుచున్నవి. ఒక జంతువునుండి వేరొక జంతువునకు వ్యాప్తమగువ్యాధి అంటువ్యాధి యనబడును. ఒకటి విధమగు లక్షణములు కలిగిన రోగము ఒకటివిధమగు సూక్ష్మజీవివలన కలుగుచున్నట్లు దృఢపడినది. పెద్దరోగపు విత్తనము నాటిన శరీరమున పెద్దరోగపు లక్షణములే కనబడును గాని గుర్రకలక్షణములు కనబడవు. ఒక పశువునుండి మరియొక పశువునకు అంటువ్యాధి వ్యాపించవలె ననినచో ఈక్రింది పరిస్థితు లనుకూల పడవలెను.

1 వ్యాధిని కలుగజేయుటకు తగిన తీవ్రతగల సూక్ష్మజీవుల సమూహము.

2 వ్యాధిని కలిగించుటకు చాలినన్ని సూక్ష్మజీవులను ఒక ప్రదేశమునుండి మరొక ప్రదేశమునకు గొని పోగల సాధనము.

3 సూక్ష్మజీవులు సులభముగ ప్రవేశించుటకు అనుకూలమైన శరీరక్షేత్రము.

పై పరిస్థితు లెంతవూర్తిగా అనుకూలపడిన ఆంతర్వర్తలా తగినంత తీవ్రతతో వ్యాధి ఒక పశువు నుండి మరి యొక పశువునకు వ్యాపింపగలదు.

అంటువ్యాధుల వ్యాపకము

ఒక ప్రాంతమునుండి మరియొక ప్రాంతమునకు అంటువ్యాధులు వ్యాపించుటకు ఆ ప్రాంతములందు కలుగు మనుష్యసంచారము, జంతుసంచారమును కారణములు. పశువులు మేతకొరకు దూరదేశములకు పోవుట, చచ్చినజంతువుల మాంసమును మాదిగ వాండ్రు వేరొక ప్రదేశమునకు తీసికొని పోవుట, కాకులు, పక్కలు అంటుజాడ్యము గల జంతువుమాంసమును ఎత్తుకొని అక్కడక్కడ పారవేయుట, అంటువ్యాధులు గల పశువులను సంతలకు తీసికొనిపోవుట, చచ్చినపశువులను పాతిపెట్టక నదులలో పార వేయుట మున్నగు కారణములవలన అంటువ్యాధులు వ్యాపించుచుండును.

సూక్ష్మజీవులజాతులు

సూక్ష్మజీవులలో కొన్నిరకములు వాయుప్రసారముగల సులమునందే జీవింప గలవు. కొన్ని గాలితోని సులములందే జీవించును. కొన్ని ప్రాణములుగల భాగములనే తీసి బ్రతుకును. కొన్ని క్రిల్మినసిర్జీవ పదార్థములనే తినును.

చీమునుకలిగించు సూక్ష్మజీవులు

క్షయనుకలిగించు సూక్ష్మజీవులు


దొమ్మునుకలిగించు సూక్ష్మజీవులు

పెద్దరోగమునుకలిగించు సూక్ష్మజీవులు

ధనుర్యాతమునుకలిగించు నూత్నజీవులు.

ఇవి రెను కనుకూలమగు పరిస్థితులు కలుగువరకును నిద్రాసథలోనుండి, పరిశీలు అనుకూలించినచోటనే విజృంభించి రోగమును వ్యాపింపజేయును. నూత్నజీవి సామాన్యమగు కంటికి కనబడక పెద్దకెల్లు పెద్దదిగ గోచరింపజేయు నూత్నదర్శనిలేక భూతదర్శనము (Microscope) సహాయమున మాత్రమే కనబడును. వీని శరీరపరిమాణము అంగుళములలో $1/5570$ — $1/450$ భాగము మాత్రముండును. ఇవి వాతావరణమునందును, నీటియందును, ఆహారపదార్థములందును, నేలపై పారలలోనుండు మట్టియందును జీవిండుండును. పశువు శరీరముపైనను, జీర్ణోశమందును కూడ నూత్నజీవులుండును. ఒక్కొక్కజాతి నూత్నజీవికి ఒక్కొక్కగుణము కలదు. కొన్ని దుర్యాయువులను అనుకరించును. కొన్ని దుర్యాయువులను క్రుశ్ణులు చేయును. కొన్ని క్రుశ్ణున పదార్థములను తిని వానిని శుభ్రపరచును. కొన్ని శరీరమునందు వ్యాపించుదు రోగమును కలిగించును. కొన్ని రాము కదలకుండకము విషమును శరీరమున వ్యాపించుటకు విడుచును. మరికొన్ని పాలు పెరుగు సారాణి మొదలగువి వినియోగమును.

నూత్నజీవులు శరీరమున ప్రవేశించుట



అర్ధకణములు, కెల్లకణములు, క్షయ, గాలిపంట దొప్ప, పెద్దరోగములను కలిగించు నూత్నజీవులు.

శరీర చగ్గును పెభాగమున నున్నంతవరకు నూత్నజీవులు ఎట్టివానిని కలిగింపజాలవు. ఏదోయొకటిగా అవి శరీరములోపల ప్రవేశించినప్పుడే రోగమును కలుగ

కలిగి వలపక్షము ధరించే వలపక్షము.

జేయును. నూత్నజీవులు శరీరమున ప్రవేశించుటకు ఈ దిగువ మార్గములుగలవు.

గాయములద్వారా, నోటిద్వారా, శ్వాసకోశములద్వారా, శరీరమందలి పలు చని పొరలద్వారా.

కొన్ని నూత్నజీవులు వీనిలో నేదోయొక మార్గమునే ప్రవేశించును. మరి కొన్ని రెండు మూడు మార్గముల ప్రవేశించును.

గాయములద్వారా ప్రవేశించుట

పిచ్చిపక్క కరచుటచేతను గలుగు న్యాధికి కారణమగు నూత్నజీవి గాయము ద్వారా ప్రవేశించును. దొమ్మిరోగములను గురకరోగమును కలిగించు నూత్నజీవియును. గాయముద్వారా ప్రవేశించును. ధనుర్వాతమును కలిగించు నూత్నజీవియును గాయము ద్వారా ప్రవేశించును. ధనుర్వాతమును కలిగించు నూత్నజీవియు వరువులలో చీము పుట్టించు నూత్న జీవియు నిట్లే ప్రవేశించును. తరచును కలిగించు నూత్నజీవి దోమల వలన ప్రవేశించును.

శ్వాసకోశములద్వారా ప్రవేశించుట

నూత్నజీవులు ఊపిరిలోపాటు శ్వాసకోశములలో ప్రవేశించి వానియందలి పలుచని పొరలలో నివాసమేర్పరచుకొని రోగమును కలిగించును. గాలివలన వ్యాపించు మహూచి విషజ్వరము మున్నగువ్యాధులు వానికి కారణములగు నూత్నజీవులను ఊపిరిచే వీల్చుటవలననే కలుగును.

పలుచని పొరలద్వారా ప్రవేశించుట

పశువు నోటిలోపలను మర్నావయవములందును అసవద్వారమందునుగల మృదువైన పలుచని పొరలద్వారా గాయములేవన్నను నూత్నజీవులు లోనికి ప్రవేశించి రోగములను కలిగించును. కంటిలోని పలుచని పొరలలో నూత్నజీవులు చేరుటవలన కండ్లకలకయు, ముక్కురంధ్రములందు నూత్నజీవులు ప్రవేశమువలన వీసనరోగమును కలుగును.

నోటిద్వారా ప్రవేశించుట

అపారపానియములతో నూత్నజీవులు నోటిద్వారా జీర్ణకోశమున ప్రవేశించి వ్యాధులను కలిగించును. వీనిలో పెద్దరోగము, పారుడు, ర కవిశేచనములకు, నూత్న జీవుల సంపర్క మనేకవిధముల కలుగవచ్చును. పెద్దరోగముచే బాధపడిన పశువు మలమూత్రములలో తత్కారణములగు నూత్నజీవులు రోగమునిడిచిన కొంతకాలముపరకును విసర్జింపబడు చుండును. వీనిచే జలాధారములు సంకరము కావచ్చును. మలమూత్ర

విడవకేరి నై వ్యవసాయము.

మలనై ప్రాచీన ఈగలు దోమలు నూత్నజీవులను తోడ్కొనివచ్చి జావ, గుగ్గిళ్ళు వచ్చి గడ్డి మన్నగు ఆహారపదార్థములందును చేర్చును. క్షయవ్యాధి గల ఆవుల పాలద్వారా ఆవ్యాధి నూత్నజీవులు పాలకాహారముగా గొనుచున్న పిల్లల శరీరమున ప్రవేశించి క్షయవ్యాధిని కలుగించును.

నూత్నజీవులు శరీరమును విడుచుట

ఒక పశువు శరీరములో ప్రవేశించి వ్యాధిని కలిగించు నూత్నజీవులు తిరిగి శరీరమున నుండి వెలువడిన గాని ఇతర పశువుల శరీరములకు వ్యాపింప జాలవు. నూత్నజీవులు శరీరమును విడుచు మార్గములు:—

- 1 నోరు, కండ్లు, ముక్కు, ఊపిరితిత్తులు వీనినుండి వెలువడు ద్రవముల ద్వారా.
- 2 విరేచనముల ద్వారా. 3 మూత్రము ద్వారా. 4 కురువుల రసి ద్వారా.

మహాచికము, పెద్దరోగము వచ్చునపుడు శరీరము నందు కుండలు పొక్కులు కలుచుబడి, ఎండి, పొక్కులై వానినుండి వెలువడు పొప్పర్లు గాలిలో ఎగురును. ఈ పొప్పర్లలో సంచారశక్తులుగ నూత్నజీవులుండును. దొమ్మ, గురక సోకినపుడు వెడలు కఫముతో నూత్నజీవులు వెడలి గాలిలో జేరును. క్షయపశువుల చొంగ కఫము ఎండి గాలిలో దుమ్ముతో కలసి ఎగురునపుడు దానిలో ననేక నూత్నజీవులుండును.

ఏరీతిగానై నను రోగపశువుల శరీరమునుండి బహిర్గతములగు నూత్నజీవులు తిరిగి ఆరోగ్యవంతులగు పశువుల శరీరములందు వెంటనే ప్రవేశించవచ్చును. లేదా కొంత కాలమట్లేయుండి బయట జీవించుచుండవచ్చును. అనుకూల పరిస్థితులలో నూత్నజీవులు నిరంతరము వృద్ధిజెందుట కవకాశములు గలిగియున్నవి. పశువు మరణించినపుడు తగిన యాహారములేక నూత్నజీవులు నశించును. రోగము కుడిరినప్పుడును నూత్నజీవుల బలముతగి చాలవరకు నశించును. కొన్ని నూత్నజీవులు పరిస్థితు లనుకూలముగా లేనప్పుడు గుగ్గిళ్లుగామారి పరిస్థితు లనుకూలపడుపరకు నట్లేయుండును.

నూత్నజీవుల కనుకూలముగు సిత్రిగతులు

వేడిమి (Heat)

శీతోష్ణముల అధిశక్యము నూత్నజీవుల జీవనమున కనుకూలముకాదు. కొంచెము వెచ్చదనము నూత్నజీవుల వృద్ధికౌవశ్యకము. ఎంతవేడిమి వానికనుకూలమో అంతటి శరీరోష్ణముగల జంతువులందే అవి వృద్ధిచెందును. దొమ్మనూత్నజీవుల గ్రుడ్లు సీలుజేసిన గొట్టములలో 22 సంవత్సరములు బ్రతికియుండెనని పాస్టర్ (Pasteur) అను కాస్త్రజ్ఞునిచే కనిపెట్టబడినది. కొన్ని జాతుల నూత్నజీవులు మరికొన్ని జాతుల నూత్నజీవు

అన్ని ప్రవేశించిన కావునానికీ అన్నం కరువు.

లతో కలపినప్పుడు నశించును. నూత్నజీవులగుడ్డు 130 డిగ్రీలవరకు ఉష్ణముగల వేడి నీటిని సహించి జీవింపగలవని యజ్ఞపు పడినది. నిరుచలారిన పిదప గుడ్డు తమకవచము లను చీల్చుకొని నూత్నజీవులుగా విజృంభించును. కొంచెం నూత్నజీవుల నశింపజేయు నుద్దేశముతో నీటినిమరుగఁ జెట్టునపుడు అరగంటవరకు నను మరగించవలెను. గోరువెచ్చగా నీటిని కాచుటవలన ప్రయోజనము లేకపోగా వాని కనుకూలమగు ఉష్ణమును కలిగించి అవి వృద్ధికెందుటకు సహాయపడు చున్నాము.

చెమ్మ (Humidity)

ఏమాత్రమును చెమ్మలేక మిక్కిలి పొడిగానుండు పదార్థములందు నూత్న జీవులు పరిలజాలవు. నూత్నజీవులు తమ చట్టునున్న పొరలద్వారా ఆహారమును ద్రవ రూపమున వీల్చును. కాబట్టి నూత్నజీవులు అభివృద్ధికి వేడిమివలెనే కొంత చెమ్మయు నావశ్యకము.

వెలుతురు (Light)

సాధారణముగా నూత్నజీవులు అన్నియు చీకటిలో బాగుగా పెరుగగలవు. కొన్నిటికి కొంత వెలుతురు ఆవశ్యకము. కొంతిగల వెలుతురులో ఏకాంత నూత్న జీవియు బ్రతుకజాలదు.

ప్రాణవాయువు (Oxygen)

కొన్ని నూత్నజీవులు ప్రాణవాయువులేనిచే బ్రతుకజాలవు. మరికొన్నిటికి ప్రాణవాయువు అపాయకరము - పైవిషయములనుబట్టి అనుకూలపరిస్థితు లేర్పడనంత కాలము నూత్నజీవులు నీటియందును, భూమియందును, గాలియందును, జీవించియుండ గల వని స్పష్టమగుచున్నది. నూత్నజీవులగుడ్డు మాత్రము పరిస్థితులు ప్రతికూలించినను ఎండవాసలను, శీతోష్ణములను లెక్కచెయ్యక బ్రతికియుండి అనుకూల సిద్ధిగతు లేర్పడినవెంటనే నూత్నజీవులుగామారి విజృంభించును. తొలకరించిన వేంటనే దోహ్లులు, గురకలు వ్యాపించుట కిదియే కారణము.

అంతర్గతకాలము (Incubation Period)


ఏదైన బీజము నాటినప్పుడు అది వృద్ధిపొంది మొలకయగుటకు కొంతకాలము పట్టును. బీజమున కాహారపోషణ బాగున్నచో అది బ్రతుకును. ఆహారసమృద్ధిలేని బీజము నశించును. నూత్నజీవులు రోగపశువుల శరీరములనుండి ఏయే విధముల బహిరగతము అగునో, ఏయేస్థితిగతులలో అవి జీవింపగలవో, ఏవిధముగ నవి శరీరములో ప్రవేశించునో పైన తెలుపబడినది. వృక్ష బీజములవలె నూత్నజీవులును శరీరములో ప్రవేశించినంత కాలము వరకును శరీరములో పెరిగినపిదపనే రోగలక్షణములు కనబడును.

రోగుగింజలు కొంగులోకి వచ్చును.

నూత్నజీవుల ప్రవేశ సమయము మొదలుకొని రోగలక్షణములు కనబడువరకును గల మధ్యకాలమునకు అంతరక కాలమని పేరు. అంతరకకాలము కొంచెము హెచ్చితగ్గలతో ఒక్కొక్క నూత్నజీవి కొక విధముగ నీయమితమై యున్నది. ఈకాలము నందు శరీరమున ప్రవేశించు నూత్నజీవుల సంఖ్య ననుసరించియు రోగమును నిరోధించుటకు శరీరము నందుగల పటుత్వము ననుసరించియును స్వల్పమగు వ్యత్యాసములు కలుగుచుండును. దుర్బల శరీరము నూత్నజీవుల కనుకూలమగు క్షేత్రము. ఎక్కువ సంఖ్యగల నూత్నజీవులు దుర్బలమగు శరీరమున ప్రవేశించునపుడు త్వరలో రోగలక్షణములు కనబడును. బలమైన శరీరమున స్వల్పసంఖ్యగల నూత్నజీవులు ప్రవేశించినచో రోగము గలిగించుటకు వలయు శక్తిగలగి యుండవు. ఈ ప్రక్కనున్న పట్టిలో అంతరక కాలమును, వ్యాధిబడిన తరువాత అంటుకనము పూర్తిగా పోవువరకు రోగ పశువు నితర పశువులతో కలియకుండ బహిష్కరించవలసిన కాలపరిమితియు తెలుపబడినవి.

పశుజాతికి హానికలుగజేయు యీగలు

ఈగలు మూడు జతలకాళ్లను, ఒక జత రక్కటను కలిగియుండును. వాటి పుట్టుక అవి పెట్టే గ్రుడ్లు పొదగబడుటవల కలుగును. ఈ లార్వే ఆకారములో రోజూకారముగయుండి తిల చివర నూడిగయుండును. ఆ తలపైన చెండు కొంతపు



గోమారులు, మిన్నలులు బోటీగలు, షేలు, తుండిగలు.

మానిరి దవడకంటులను కలిగియుండును. ఈ లార్వే, అవి బాగుగ పెరిగేవరకు కొన్ని రోజులు ఆహారమును ఎక్కువగా తీసుకొని తదుపరి తిండిమానివేసి పీలవగును. నిండుగా పెరిగిన లార్వే యీ మార్పుకొరకు కొన్ని అంగుళములు భూమిక్రింద

ప్రాకును. కొన్ని రకముల యీగలలో అశుయీగలు గ్రుడ్డు పెట్టక లాల్వేసే చేయును. పూపలు (నిద్రావస్త) దశలోపున్న గూడులో లాల్వే యీగ గా మారి ఆ గూడు బ్రద్దలుచేసుకొని బయటికివచ్చును. ఆ ప్రకారము పూపలు గూడునుంచి మొగ ఆడ యీగలు యీవిధముగా బయల్పడి వాటి జీవితమును జరుపుకొనుచుండును.

ఈగలను రెండు విధములుగా విభజింపవచ్చును

1. కొన్ని యీగలు కరచి రక్తము వీల్చువని. చాలమట్టుకు యీ రకము యీగలు నీళ్ళలో వుత్పత్తియగును.

2. మరొన్ని యీగలు కరువకుండా జంతువుల కీరముమీది వుండ రసిగిగాని, ఎండిన వుండరసిగిగాని లేక కుక్కపదారములనుగాని ఆహారముగా చేసుకొనును. అవి ఎరువులో కుళ్ళిన మాంసాదులలో లేక జీవించియున్న జంతువుల కండరములలో ఉత్పత్తియగును.

1. కరచి రక్తమువీల్చు యీగలలో ముఖ్యమైనవి :—

దోమలు, జోడిగలు, తుండిగలు, ఆడవియీగలు మరియు కొన్నిరకపు నుసమలు అను నవి. దోమలు మరొన్ని నుసములు అనుకవి రక్తమువీల్చి కొంతవరకు జంతువులను హింసించినప్పటికిన్ని సాధారణముగా శత్రుసముదాయనకు హానికరమైనవికావు. అయిననూ వాటిలో కొన్నిరకముల చర్మపురుగులను, కుక్కలలో 'గుండెపురుగును' వ్యాపింపజేయును. ఒకరకపు దోమలు పాండుజ్వరమును, బోడజబ్బులను, మలేరియా జ్వరమును మనుష్యులకు కలుగజేయును.

కాల యీగ చాలామట్టుకు యింటి యీగకు పోలియుండును. అయితే దానికి చర్మమును పొడిచి రక్తమును వీల్చుటకు చాలికంత పొడవైన ముక్కుకలదు. అది చెమ్మగావుండు జీవపదార్థములో ఆనగా కుళ్ళిన పచ్చగడ్డిలోను, ఎండుగడ్డిలోను లేక కాల యెరువులోను పెరుగును. దాని గ్రుడ్డు గుంపులు గుంపులుగా వేయబడును. అవి నూత్నమైన తెల్లని పురుగులు లేక లాల్వేగా మారును. అవి యెరువు మొదలైన జీవపదార్థములను ఘూరు వారంరోజులు ఆహారముగా చేసుకొనును. తరుపరి యెండిన యెరువులోగాని లేక యెరువులకు కొంతమరములోనుండు నేలలోగాని పిల్లలగును. రమారమి వారము, పది రోజులలో నిద్రావస్థనుంచి పెద్ద మొగ, ఆడయీగలు బయల్పడును. అనుకూలమైన పరిస్థితులలో గ్రుడ్డు యీగలు అగుటకు కనీసము 12 రోజులు పట్టును.

కాల యీగలు పశువులను, గుఱ్ఱములను మరియు జంతువులనుకూడ బాధించును. అవికొన్ని సమయములందు మనుష్యులనుకూడ కరచును. వాటి కాటు దురద వుట్టించుటయేగాక దొప్ప, పాండు మరియు జబ్బుల క్రిమిలనుకూడ వ్యాపింప

చేయును. ఇవి గుట్టముల పొట్టలోనుండు పురుగులనుకలుగజేయుటకు మధ్య పెంతుడు పురుగులుగా ప్రవర్తించును.

సాధారణపు యింటి యాగలుకూడ ఆ పురుగులను పెంపుచేయుటకు పెంతుడు పురుగులుగా ప్రవర్తించును. గుట్టములు అవ్యక్తముగా యిట్టి యాగలను మ్రింగుట వలన అట్టి అంటును పొందుచున్నవి. ఈ యాగల పొట్టలో లార్వే పురుగులు క్రిములగుచున్నవి.

మరియొక యాగ కలదు. అది కాల యాగకన్న చిన్నది. అది కొమ్ముయాగ అనబడును. అది పశువుల కొమ్ముల మొదలులో గుమిగూడును. వాటికొట్టు దురదను పుట్టించును. అట్టి దురద పాడియావులలో పాలను తగించును. అవి తాళా ఆవుపేదలో పెరుగును. అవి యెట్టి జబ్బులను వ్యాపింపజేయునో తెలియుచున్నది.

గుట్టపు యాగలు అవి విలువబడి జోడిగలు పెద్దవై లావుగాయుండును. అవి కాల యాగలకన్న మూడు 4, 5 రెట్లు పెద్దవి. వాటికి సుమారుగా పెద్దతలగలదు. చాలావాటిలో వాటి జీవితములో కండ్లు పొగపెన రంగులో వుండును. అడవి, వాటి భయంకరమైన నోటిలోని కాటుభాగములతో కత్తుతో రక్తమువీల్చునవి కాని, మొగ వాటికి నోటిలో అట్టి కరచెడి భాగములులేవు. అవి కాయపదార్థ రసములపై జీవించును. ఈ యాగలు వాగులు, చెరువులు, గుంటలు లేక పైరుపంటతోపున్న పొలము మొదలైన నీళ్ళలో పెరుగును. నీళ్ళమీదకు పంగివున్న ఆకులమీద లేక చిన్న కొమ్ములమీద గ్రుడ్లు పెట్టును. ఈ గ్రుడ్లు వారం, వారముపైగా పొడగబడి వాటినుంచి లార్వే నీటి లోనికి వెలువడి నీటిలో జీవనముచేయును. అవి నీటిలోనుండు జీవులమీద అనగా దోమలు, మరి యితర లార్వేలను ఆహారముగా జేనుకొని పెంపొందును. అవి నిండుగా పెరిగిన లార్వే అగుటకు 4 మొదలు 6 నెలలు పట్టును. తదుపరి పూపెలు మూరుటకు చెప్పునెలలోనికి లేక షుభ్య ఆకుపదార్థములోనికి ప్రాప్తును. పూపెలు పొదుగుటకు 2 మొదలు 6 వారములు పట్టును. గ్రహావస్థనుంచి పెద్దయాగ అగుటకు సుమారు ఆరునెలలు పట్టును.

ఈ జాతిలో 3 రకముల ఈగలుకలవు. అవియేనవ :—

1 బుబానసు, 2 హెమటోఫోలా, 3 మరియూ కైసాపు. ఇవి అన్ని చాల నొప్పికలుగజేయు కాట్లుచేయును. అందువల జంతువులకు చాలా దురద కలుగజేయును. వాటివల్ల కలిగిన గాయములనుంచి రక్తము కారును. అందువల్లన యెక్కువ యాగలు జంతువు వానరించివయెడల గమనింపవసినంత రక్తనష్టము కలుగును. ఇట్టి యాగలు పొండు, దొమ్మ యితర అంటువ్యాధులను పశువులకు, గుట్టములతో వ్యాపింపజేయునని తెలియుచున్నది. గుట్టములలో నిల్చు నీళ్ళజ్వరము యీ యాగలవల్ల రాగలదు. జోడిగలవల్ల కలిగిన పుండ్లమీద యింటి యాగలు వ్రాలును. ఏలనన,

కీట్రు మన్నుఅయితే కాపు బ్రతుకును.

వాటికి ఆ పుండ్లనుంచి స్రవించు రక్తము ఆహారమగును. ఈ యాగలు ఆ పుండ్లను యితర చెదరగొట్టవలెనని తో ఆంటచేయును.

అడవి యాగలు లేక “గుడ్డి యాగలు” అని ఒకప్పుడు పిలువబడేవి వర్షపు మారకలిగియూ, వాటికొమ్మలభాగము తెల్ల పింగాణి మబ్బురంగుపై చుక్కలుకలిగి పున్నట్లు కనుబడును. వాటికి రెక్కలుకలవు గాని చూడగా అవి యెగురుటకు బద్దకమై చెదర గొట్టబడినప్పుడు అది వాలియున్న పశుశరీరముయొక్క ఒక భాగమునందే మరి యొక భాగమునకు మార్తము మారును.

ఈ యాగలు పూర్తిగా పెరిగిన లార్వేని పెట్టును. అవి తిరిగి తక్షణమే పొడుగు గింజలమాదిరి పూపలు అవును. పూర్తిగా పెరిగిన యాగ యీ ‘ప్యాపా’ లేక నిద్రా వస్తనుంచి 10 మొదలు 20 రోజులలో బయటకు వచ్చును. అడవి యాగకు సంబంధించిన మరి ఒకమాదిరి “కడ్” అని “మెలోపేగన్” అని పిలువబడే యాగ గొర్రెలమీద చూడబడును. “కడ్” అనువాటికి రెక్కలులేవు. ఈ కడ్లు లార్వేని పెట్టును. అవి గొర్రె శిష్టిమీద పూపలు అగును. అడవి యాగలు రక్తము వీల్చును గాని సాధారణముగా పశువులకు జబ్బు వ్యాపింపజేయవు. అయిప్పటికి అవి జంతువులకు చాల రొష్టు కలుగజేయును. “కడ్” అనేవి మార్తము పున్నికీ నష్టముచేయును. మరియు జబ్బు కలుగజేయని రక్తపు క్రిమిని గొర్రెలయందు వ్యాపింపజేయును.

2. కరువుని యాగల సమదాయములో చేరినవి “మాగెట్” యాగలని పిలువబడును. ఈ యాగల జీవితచరిత్ర ముఖ్యముగా అన్నివిషయములలో నొకటే. మరి యెట్టి తేడాలువున్నా అవి యీ దిగువ నుదహరింపబడును. ఈ యాగల లార్వేలు జంతువులకు నష్టము కలుగజేయుటలో తోడ్పడును. అవి “ఫ్లెబ్బా మాగెట్” లేక “మియాసిస్” అని వాడుకతో పిలువబడినీతిని కలుగజేయును. “మాగెట్” యాగలను 2 భాగములుగ విభజింపవచ్చును. అనగా అవి ఆహారము కైకొనుటకు నోళ్లను కలిగియున్నవి, మరియు అట్టి నోళ్లను కలిగియుండనివి. మొదటిరకములో పచ్చనిబుడ్డి యాగ, పూదాబుడ్డి లేక మామూలు పూదెడు యాగ, కండ యాగ మరియు మర వురుగు యాగ అనునవి చూడబడును.

రెండవ రకములో “బాట్” యాగలు అనగా గొర్రె ముక్కురంధ్రపు యాగ “నార్బులు” యాగ మరియు “బాటు” యాగ అనునవి జేరియున్నవి. “టెసీలియా సెక్రికేలా” అనే ఆకుపచ్చని బుడ్డిమాదిరి గొర్రెలమీద యాగయొక్క శరీరము చాల యెక్కువ సాగైన కౌంతికలిగిన ఆకుపచ్చ, యెరుపురంగుగలదై యున్నది. ఈ యాగ ముడితొయ్యన పున్నిలో తోక క్రిందిభాగము మొదలైనచోట్ల పెంపొంది చాలా దేశములలో గొర్రెలకు నష్టముకలుగజేయుచున్నది. ఒక్కొక్క యాగ 40, 50 గుంపుల వరుసన 500 గ్రుడ్లు పెట్టును. ఆ గ్రుడ్లు గోధుమరంగుకలవై తెల్లని లార్వేగా మారును. అందు ప్రతివాటికి నూని మొనపంటి తల చివరన రెండు నల్లని కొంకెలు దవడకంటలు

చున్నగలిగే మన్ను ముట్టవలెను.

కలవు ఈ లాశ్యలు చాల చురుకుగాయుండి గొర్రెలయొక్క చర్మపు పుండలోమారి అందువల కలిగే రసములు, రసిపదార్థములమీద జీవించును. అవి యీ రసపదార్థములతో కడుపు నింపుకొని నుమారు ఆరు శోణలలో నిండుగా పెరిగి క్రిందపడి నేరలబాట్టికి ప్రాకి పూపలుగా మారును. ఎదిగిన యీగలు నుమారు 2 వారములు, ఆలోపుగా పూపలునుంచి వెలికివచ్చి వాటి జీవితచక్రమును జరుపుకొనును.

అటుతర్వాత ముఖ్యమైనది “ఊదాబుడ్డి” లేక మామూలు “ఊదాబుడ్డి” అయివున్నది. అది మొదలైన ఊదారంగు దేహముమకలిగి “పచ్చబుడ్డి” యీగకంటె పెద్దదైయున్నది. ఈ యీగ మాంసపు అంగ శ్లేషమును, వంటయిశ్లేషమునూ “జుం” అని మోతపెట్టుట తరుచు వినుచున్నాము. ఇదికూడ గొర్రెలయందు పురుగులను పుట్టించును. దీని ఆడ యీగ మలుగులపైన లేక యితరచోట మలమూత్రములవల్ల మరికొకబడిన ఉన్నిపై గ్రుడ్డుపెట్టును. మాంసపుయీగ “సాక్కిపేగా” అనునది ప్లో యీగయంతగాక దానికి కొద్దిగా మించినదైయుండును. అది సీసపురంగునబోలి దాని పొట్టభాగమున నలని బూడిదరంగు గీతలతోను రొమ్ముభాగమున అడగీరలుకలదై యున్నది. ఈ యీగలు గ్రుడ్డుప బడులు ప్రాముతోవున్న లాశ్యను లేక పురుగులను పెట్టును. అదికూడ గొర్రెలయందు పురుగులను పెట్టుటలో ఊదాబుడ్డవలె ప్రవర్తించును. “బ్లాబాటిల్” లేక కండయీగయొక్క పురుగులు గొర్రెలకు బడులు వక్కు మాంసమును లేక రొడ్చును కొరును. ఆ రెండు రకముల యీగల లాశ్యలు పైభాగములమీద జీవించునవై, ఎంతమాత్రము చర్మముక్రిందికి దూరపు కాని, మరియు అట్టగట్టుకొన్న పున్నిక్రిందకుప్రాకి అచ్చటనుండు మరికొనిదజీవించును. మామూలుగా అది నేలలో పూపెలుఅగుటకు రాలిపోయిననూ చాలమట్టుకు అవి పున్నిలోనే పూపెలు అవును.

వాటి జీవితచక్ర ముగించుటకు దాదాపు “పచ్చబుడ్డి” తీసికొను కాలము తీసికొనును.

మరపుచుగు యీగ ఈ విషయములో సాధారణముగా పుండమీద పురుగులను పెట్టును. మరియు కొన్ని సమయములయందు జంతువులయొక్క శోష్యమగును అవయములకు పట్టును. చాలమట్టుకు యీ యీగలకు చెడిన మాంసములయందు వుద్భవించుటకు ప్రీతికలదు. కాని కొన్ని ఆధారభూతములైన జీవజంతువుల పూడ్డపై వుద్భవించును. ఈ దేశములో ఆ రెండవ రకము “క్రమోజోం బెజ్జమానా” అనునది ముఖ్యకదాహరణము. ఈ యీగ మొట్టి రకము జంతువునైననూ పట్టుకొని చర్మముమీద పురుగు పెట్టును. గాయములోకాని, చర్మముమీదగాని పురుగులు చాల దురదకలుగజేయును. అందుచేత అవిధముగ వీడించబడిన పశువులకు తగినంత విక్రాంతియూ లేదు. మరి సరిగా మేతమేయవు. ఈ ప్రకారము కార్లకండరములలో నష్టముకలుక చేసి వీడించబడి

పండని నేల పండుము దున్నేదానికంటె పండేనేల కొదము చాలును.

సందువల్ల కొన్ని పశువులు ఒకటి లేక చాలా కాళ్లుకుంటును. జంతువులు పురుగులువపై భాగమును ఒక గుంజపగాని, తడికగాని రుద్దుకొనును. అందువల్ల రక్తమువచ్చును. గొర్రెలలో సత్తువతగును. మరియు ఉన్ని తగును. ఇతర జంతువులుకూడా చిక్కిపోవును. ఇట్టి పురుగు పట్టుటవెంటనే సప్తకారి కాకపోయిననూ, ఆరికమాగ చాల సప్తము. అందుచేత ఇట్టి సప్తముకలుగకుండ చేసికొనుట అవసరము.

సాధారణముగా యిట్టి యీగలవల్ల నష్టముకలుగకుండచేయు పద్ధతులు యిట్టివి

1. ఇట్టి యీగలు పొట్టచేగులు, కశీబరములమీద నుద్ధరించకుండ అట్టి పదార్థములను పొతివేయవలయును.

2. ఈగలు అందు పెంపొందకుండా వళ్లు ఎరువులను చేరనియ్యవద్దు. ఇట్టి ఎరువును ఏ రోజుది ఆ రోజు వెంటనే పాలములలో పల్చగా విరజల్లవచ్చును. ఇందువల్ల ఆది ఎండిపోవును. అందుచేత యీగలు అందుపై చచ్చులేనందున ఉద్ధరించబాలవు. ఈ ఎరువును గుంటలలో పోగుచేసేయెడల దాని నెరలలో యీగలు పెంపొందకుండా దానిని గట్టిగా అదిమివేయవలెను. ఈ ఎరువుమీద ఒక వరుసనుట్టి, యీగలు వాలకుండా జల్లవలెను. బాగా అదిమివేసిన ఎరువు వళ్లిపోవునపుడు వచ్చే నడి అవిరికి యీగలు పెంపొందజాలవు.

3. ఈగలను వలవేసి పట్టుకొని చంపవలెను. ఈ పనికొరకు అనేక రకముల వలలు కలవు. వాటిని కొద్దిఖరీదుతో చేయవచ్చును.

4. ఈగలను రాబుకుండా చేసే కొన్ని మందులను గొర్రెల శరీరమమీద మరి యితర జంతువులమీద పూసిన యీగలను రాయవలెనని చెప్పును. వేపనూనె హరితికర్పూరము కలిపిన నూనె, తారుకలిపిన నూనె మొదలైనవి యీగలు రాకుండ తిర్చి పూయవచ్చును. ఒక భాగము పాపాణమునకు 400 భాగములు నీళ్లు చొప్పున కలిపిన లోపనులో గొర్రెలను ముంచుట చాల మంచిది. అట్లు తయారుచేయుటకు అనుకూలముగా పొడిగా మందులు బజారులో దొరకును. వాటిని ఎల్లుపయోగింపవలెనో వాటిపై వ్రాసియుండును.

ఆహారము తినుటకు నోటిభాగములేని యీగలను 'బాట్' యీగలని అందురు. అవి ఆధారభూతములైన పురుగులను త్రుట్టించును. అవి జీవజంతువుల శండరములు మొదలైనవాటిలో పెంపొందును. ఇందులో మాడు ముఖ్యమైనవి. ఒకటి గొర్రె ముక్కురంధ్రపు యీగ. అది మామూలుగా గొర్రెలకు పట్టును. రెండు "వార్బులు" యీగ "హై పాడెర్నాలినియేటివ" అనునది పశువులకు పట్టును. "హైపాడెర్నా

క్రాస్" అనునది మేకలప పట్టును. మూడవది "బాట్ ప్లే" అనునది గుర్రములప పట్టును.

గొర్రె ముక్కరంధ్రపు యొగ హిందూదేశములో చాలాచోట్లలో యున్నది. ఇది మామూలుగా యింటి యొగకన్న చాల పెద్దది. పనుపురంగు రేల, యిటికరంగు, రొమ్ముభాగము బూడిదరంగు, పనుపు, నలుపురంగు చుక్కలుకలిగిన పొట్టభాగము కలిగి యున్నది. చూచుటవలన అది వెంట్రుకలుకలిగి వెల్లిన పనుపురంగుగా యుండును. అడయొగ మొగయొగను కలిపిన తర్వాత దాని పొట్టలో గుంపులుగుంపులుగా గ్రుడ్డను పెట్టి పిల్లలనుజేయును. అది తర్వాత గొర్రెలమందలపై వ్రాలి వాటి ముక్కరంధ్రములలో లాక్సే పిల్లలను వుంచును. ఈ పద్ధతిలో ఒక గొర్రెనుంచి మరియొక గొర్రె మీదికి ఎగిరినపుడెల్ల దాని ముక్కరంధ్రములో ఒక లాక్సే పిల్లను వదలును. ఈ యొగల జింహావాడమును గొర్రెలు గుర్తించి భయముచెంది తుమ్ముచూ, చీదుచూ అటు నిటు పిచ్చియై తివట్లు పరుగిడును. అవి ఆహ్లాదస్వరము నేలవ వాటి ముందుకాళ్లప ముక్కను రుద్దుకొనును. ఈ యొగల బాధప అవి తలలను గురిపెగురుకొని వాటి ముక్క ద్వారములను దాచుకొనును. ముక్కరంధ్రములో పెట్టబడిన పురుగులు వృక్షవైన కండుముద్వారా ప్రైకిప్రాకి తలయొక్క రంధ్రభాగములలో చేరియుండును. ఇచ్చట అవి 8, 10 మాసములు ఆహారము తినుచూ పెరుగుచుండును. ప్రతి పురుగు ధాని శరీరముమీద ములసరుసలను ఒక జత బరువైన దవడశంఖలను కలిగివున్నది. అది పుట్టించే దుదముటలవల్ల కలిగే రసములమీద జీవిండును. ఒక గొర్రె దాని తల రంధ్రములలో పెద్ద పురుగులని నీలువబడే వాటిని రెండు లేక యెక్కువగా కలిగియుండ వచ్చును. అట్టి సందర్భములో గొర్రెలు చూపించే గుణములు పురుగుల సమాహారమును బట్టి వుండును. కొద్ది పురుగులున్నపుడు ఒక లేక రెండు ముక్కరంధ్రములలోనుంచి కొంచెము చీమిడికారటము ఆహ్లాదస్వరము గట్టి తుమ్ము రావడముగా యుండును. పురుగులు చాలాయెన్నయెడల తలపూపు, ముట్టెతో ముందుకాళ్లు రుద్దుకొనుట, ఎక్కువగా ముక్కనుంచి చీమిడికారట, ముఖమువాముట మరి ఒకప్పుడు ముక్కలనుంచి రక్తము కలిపిన చీమిడివచ్చు గుణములు కనిపించును. అటువంటిప్పుడు గొర్రెలు గుండ్రముగా తిరుగును. మరియూ నడచుప్పుడు ముందుకాళ్ల అడుగులను మామూలుకన్న ఎత్తుగా వేయును. వాటిని బెడరగొట్టినపుడు క్రింద పడిపోవును. ఇట్టి తీవ్రమైన గూములవల్ల గొర్రెలు చిక్కిపోవును. మరికొన్ని చచ్చియూ పోవును. లేనియెడల కొంతకాలము యీ విధముగా జబ్బుగావుండి తదుపరి గుణములుతగ్గి తిరిగి ఆరోగ్యస్థితికి మరలుట ప్రారంభించును. దీనికి కారణము ఆ పురుగులు పెద్దవై పట్టువదలినప్పుడు బయటికి వదలివేయబడును. నిండుగా పెరిగిన పురుగులు క్రిందపడి కొన్ని అంగుళములు దూరము మట్టిలో ప్రాకి అచ్చట పూకేలు అవును. 5, 6 వారములలో పెద్ద యొగలు పూకేలు స్థితినుంచి వెడలి తిరిగి వాటి జీవితము ప్రారంభించును.

కొత్తువాని చీదరికము వానిపై చేపుతుంది.

ఈ యీగలు ముక్కురంధ్రములో లార్వేని పెట్టకుండచేయుటకు ప్రతి గొర్రె ముక్కురంధ్రములపై కొంచెము తారునుతూయుట చాలా మంచిపద్ధతి. గొర్రెమందలు బాన్సీగావున్నపుడు వాటి ఆహారగోళములు (ట్రొఫైలు) లో అవి తేయునపుడు తారు ముట్టెలకు అంటులాగున మార్గములు పూపింపవలెను.

“వార్బులు” యీగలు సామాన్యమైన పెద్దవిగను, నిండుగను రోమములు కలిగినవై వుండును. వీటి పాట్లభాగము లేత పసుపురంగు రోమముతోను, వెనుకభాగము నారింజ, పసుపురంగు రోమముతోను వాటిమధ్య నల్లని వెంట్రుకలచారతో కప్పబడి వుండును. రొమ్ముభాగము వెలసిన పసుపు లేక ఆకుపచ్చ మిళితమైన పసుపురంగుగా వుండును. పశువులు గొర్రెలవలె ఈ యీగల జంహానడము విని వాటిబాధ తప్పించు కొనుటకు లేదరి పరుగిడును. ఇట్లు పరుగిడునప్పుడు వాటిలో వాటికి చెబ్బలుకూడ తగులుట తటస్థించును. ఈగలు ఆడేమాదిరిగా విడువకుండ పశువులను వీడించును. మరికొన్ని సమయములందు గుర్రములకుపట్టి వాటి కాళ్లగుత్తులమీద వెంట్రుకలపై గ్రుడ్లను అంటించును. ఒక ఆడయీగ 4, 5 వరుసలుగా ఒక్కొక్క వెంట్రుకమీద దాదాపు నూరు గ్రుడ్లను పెట్టును. ఆ గ్రుడ్లనుండి 3 రోజులలో లార్వే అనునవి బయల్పడి వెంట్రుకలమీదుగా క్రింది చర్మములోనికిడిగి ప్రాకి దానిలో బొరబడును. అవి తమపరి చర్మముక్రిందుగా తిరిగితిరిగి చివరకు వీపుచర్మము క్రిందిభాగము చేరును. ఇచ్చట ఒక్కొక్క లార్వే చిన్న “వార్బుల్” అనే కాయగా మారును. అట్టి కాయపై చర్మమును తొల్పుకొని తన వెనుకభాగమును చొరజేసుకొని గాలిని వీల్చుకొనును. ఈ లార్వే వాటి దవడశంకులచేతను వాటి దేహముపై వెంట్రుకలచేతనూ కలుగజేయు దురద వల కలిగి దేహరసములను ఆహారముగా జేసికొనును. కాళ్లగుత్తులపై వెంట్రుకలమీద నుంచి వెడలిన 8, 9 మాసములలో యీ లార్వే నిండుగ పెరుగును. పెరిగిన లార్వే కాయల బెజ్జములగుండా బయల్పడి నేలమీద పడును. అవి తర్వాత కొన్ని అంగుళములు నేలక్రింద ప్రాకి నిద్రావస్థలోనుండు పూర్వము ఆవును. ఒకటి, రెండు మాసములకు యీ నిద్రావస్థనుంచి నిండుగా పెరిగిన యీగ బయల్పడి పై జెప్పబడిన పాడు పనులను జరుపును. గూడలు, లేతపశువులు, మేకలు తర్చు వీడింపబడును. ఆవులలో ఊరినీలి, పాలుతగ్గుల తప్ప మరి ప్రాణనష్టము యీ లార్వేవల్ల కలుగదు. కాని చర్మములలో బెజ్జములుపడుటవల చర్మములకు చాల నష్టము కలుగుచున్నది. వాటినుంచి యీగ లుద్భవించకుండ జేయుటకు యీ లార్వేలను జంతువుల వీపులనుంచి తప్పించి నకింపచేయుటకు చికిత్సలనేకములు కలవు. అందరు రైతులు సమాహమమీద ఏకీభవించి పురుగులనుంచి పెద్దవి బయటకు రాకముందు పురుగులను క్రిందపడకపూర్వమే చంపుటవలన అట్టి మార్గము లుపయోగకరములగును. ఇట్లు పట్టుదలతో చేసిన యెడల ‘వార్బుల్’ నేని చాలమట్టున రాకుండ తగ్గింపబడును, అందువల్ల చాల నష్టము తొలగింపబడును. ఇట్టి అంటుఆయిన పశువుల వీపులను కడుగుటకు చాల రకముల మందులు

చెప్పబడివున్నది. ప్రపంచములో కొన్ని ప్రాంతములలో చర్మముక్రింది లాశ్వేని సబ్బు, డెట్రైనువేరు, కషాయము కలిపిన మంచుపూతలవల్ల జనుప్రదముగ చంపగలిగినారు. దక్షిణ హిందూదేశమున “వార్బులు” యీగలు ఇంతవరకు వున్నట్లు కనుపడలేదు. గాని ఉత్తర హిందూదేశములో చాల ఎక్కువగా వున్నది.

“బాట్” అనే యీగ గుర్రములు, గాడిదలు మొదలైనవాటికి పట్టును. దాని పురుగులు గుర్రపు పొట్టకు, ఒక్కొక్కప్పుడు కేగులకు పట్టును. ప్రతి యీగ ఇటుక రంగు మిక్రితమైన పసుపువన్నెకలిగి వెంట్రుకలతో వుండును. అడదాని పొట్టవెనుక భాగము దానిపై లోనికి వంగియుండును. ఈ యీగలు కొంతమట్టుకు తేనెటీగలను పోలియుండును. గర్భిణి అడయీగ గుర్రములమీద వాలుచూ తడుచు కాలేగు తిమిడికి, భుజగూడు మీడికి ఎగిరి అచ్చట వెండ్రుకలమీద ఒక గ్రుడ్డును వదలును. ఇట్టి సమయమున గుర్రము బెడిరి అటునిటుపోవును. అవి కాలలో యున్నయెడల జారిపడి గాయము పొందవచ్చును లేక పచ్చికబయల్లమీదవున్నయెడల వీచెక్కినమాదిరి పరుగిడవచ్చును. జంతువు నావకొనినప్పుడు లేక కాలలో ఎవన్నపుడునో తన కరీరమును రద్దుకొనినపుడు ఆ గ్రుడ్డు పొడుగును. లాశ్వేలు చర్మమునకు దురద పుట్టించుటవలన నాకివేయబడును. అవి మ్రింగివేయబడును. లేక నోటిలోని మృదువైన కండరములొనికి చొరబడి తిరుగుచూ చివరకు పొట్టలోనికి చేరును. ఈ “బాట్సు” అని పిలువబడే లాశ్వేలు ఒక జత దవడశంకులను కలిగివుండి వాటితో పొట్టలోని మృదుకండరమును పట్టుకొని వుండును. మరియు అవి వాటి దేహముమీద మళ్ళివెంట్రుకలను కలిగి యున్నవి. పొట్టలో అవి మామూలుగా గుంపులుగుంపులుగా పట్టియుండును. అవి దురదపుట్టించే రసవదాగములమీద ఆహారమున కాధారపడి దాదాపు 7, 9 మాసములు పెరుగును. అటుపిమ్మట వాటి పట్టునువదిలి లద్దెతో బయటబడును. అవి కేలమీదపడిన వెంటనే కొన్ని అంగుళములు మట్టిలోమారి అచ్చట నిద్రావస్థచెందును. అనగా పూజేలు అవును. పెరిగిన యీగలు యీ నిద్రావస్థనుంచి 6, 8 వారములలో బయల్పడి జీవితచక్రతన తిరిగి జరుపును. ఈ లాశ్వేలు పొట్టలో ఎక్కువగా వున్నప్పుడు జీర్ణశక్తిని భంగపర్చవచ్చును. ఇట్టిది జంతువుల బలహీనతకు కారణముగావచ్చును. కొన్ని లాశ్వేలు కేగులలోనుంచి పోవువపుడు తిరిగి ముడ్డిభాగమునకు పట్టుకొని దురద కలుగజేయును. ఈ పురుగులను జంతువుకు రూఢియైన ఒక ఔషధము “కార్బన్ డిసల్ఫైడ్”ను తగు మోతాదుతో చిన్న మాత్రలుగా వాడుటయైయున్నది. లద్దెలో లాశ్వేపడినపుడు వాటిని కాల్చివేయవలెను. గుర్రమును తర్చు మాలిన్ చేసినయెడల లాశ్వేలను నోటిలోనికి చేరనివ్వవు.

ఉత్తర హిందూదేశములో ఒంటెలను ముక్కురంధ్రపు యీగ పట్టును. ఈ యీగ గొర్రె ముక్కురంధ్రపు యీగను పోలియుండును. ఈ దేశములో ఎనుగులకు తరుదు వాటి పొట్టలో “బాట్సు” పట్టును. దీనికి సంబంధించిన యీగ “కబ్బా

లియా యెలిపెంటస్" అనే సల్లయిగ. ఇది దంతముల కోరలు మొదలలో గ్రుడ్లు పెట్టును. ఈ "బాట్స్" గుర్రములలో మాదిరి ప్రసరించును.

చివరకు అన్ని "బాట్స్" యిగల లార్వేలు మనుష్యులకుకూడ పట్టి చగ్గము క్రింద ప్రాకుడు పురుగులను కలుగజేయును అను విషయము తెలుసుకొనుట ముఖ్యమై యున్నది. ముక్కుపురుగు యిగ మనుష్యులలో తర్చు పురుగులు పుట్టించును. మరి యొక రకపు మాంసపు యిగయొక్క లార్వే కేగులకు పురుగులు పుట్టించును. అందుచే యీ యిగలను తగ్గించుటకు అవి పెంపొంది పాడుచేయకుండు ప్రతికూల మార్గముల సవలంబించి అందువల్ల ఆరిక నష్టమును లోలగించుట అవసరమైయున్నది.

హిందూ దేశమునందు వ్యాప్తిలోనున్న పరాశ్రయ జీవులను నశింపజేయు క్రమ విధానములు.

ఇతర జంతువుల శరీరాంతరములందు నివసించు జీవులను పరాశ్రయ జీవులు (Entozoa parasites) అని యందురు. ఆట్టి జంతువులను గృహస్థులు (hosts) అని పిలుతురు. ఈ పరాశ్రయ జీవులు ఆ గృహస్థునామ జంతువులకుండి ఆహారమును ఆశ్రయమును పొందుచున్నవి. ఈ పరాశ్రయ జీవులుగూడ జంతుకోటికి జెందినవే. ఇవి తామవలంబించిన జీవిత విధానమునను అనువగు ప్రత్యేక శారీరక వికారముల నొందినవి. ఈ జీవులు ఏకకణయుతములుగా నుండిన నుండవచ్చును. అప్పుడు వానికి ప్రోటోజో (ఆదిజీవులు protozoa) అని పేరు. లేదా అవి అనేక కణ సంయుతములుగాకూడ నుండవచ్చును. అప్పుడు దానికి మెటాజోవా (బహుకణ జీవి Metazoa) అని పేరు. పరాశ్రయ జీవుల మిథున జీవిత దశలు (Sexual stages) మాత్రము. విజంతు శరీరమున గోచరించునో దానిని అంత్య గృహస్థ (Final host) అనియు ఏజంతు శరీరమున వాని క్రిని జీవిత దశలు గోచరించునో వానిని మధ్య గృహస్థులు (Intermediate hosts) అనియు పిలుతురు. ఆరోగ్య ముగనున్న జంతువులకు పరాశ్రయ జీవన వ్యాప్తి ఎకాయుక్తిగాని మధ్యపర్చులగు జంతువులద్వారాగాని జరుగవచ్చును. అంత్యగృహస్థ నందు గోచరించు రోగలక్షణములు పరాశ్రయ జీవులసంఖ్య వాని లక్షణములు శరీరమునందలి వ్యాపించురీతి, గృహస్థున కను ఆజీవులకును కలిగిన కలయిక మొదలగువాని మీద ఆధారపడియుండును. కావున వానిని నిరోధించుటకు సరియగు మార్గము సవలంబింపవలెననినచో ఆయాజీవుల జీవిత దశాచరిత్రలను అలవాటును తెలిసికొనుట చాల సవసరమైయున్నది. క్రమ్యాకార పరాశ్రయ జీవుల (Helminth parasites) జీవిత చరిత్రలో అండ్సేతికిని అంటుగా వ్యాపింపగల క్రిమినితికిని మధ్యగల కాలము మిక్కిలి విషమమైనది. ఆకాలమున దాని జీవిత దశాచరిత్రామజ్జానము వానిని నిరోధించుట కవసరముగు మార్గమును నూచించును.

చేతిలోలేనిది చేలోకి ఏలగువస్తుంది.

(ఎ) ఏకకణజీవులు (protozoa.)

ఈ ఏకకణజీవులు జంతువుల రక్తమునందును కణజాలమునందును నివసించును. మనము పెంచెడి జంతువులను అందు ముఖ్యముగ పశువులను పీడించునవి. యందు ముఖ్యముగ మూడు రకములున్నవి.

1. ఫిరోప్లాజ్మా జీవులు యెర్రని మూత్రపు జ్వరము (Red fever) లేక గోమారి జ్వరము (Tick fever) ను కలిగించును. రక్తమునందు శిథిలములైన ఆహార కణములలోని జీవులు గోచరించును. ఈ రోగము వచ్చిన జంతువునకు జ్వరము కామెరలు ఎర్రని మూత్రము మొదలగు లక్షణములు గోచరించి ఏను మొదలు పది రోజులలో చనిపోవును. ఇట్టి జంతువునకు ట్రైఫ్లావ్ బ్లూ (Trypanblue) అను చొక్కరకపు మందు చికిత్సార్థముపయోగపడును.

ఈ ఓషధియొక్క ద్రావణమును రోగమువచ్చిన జంతు శరీరములోనికి నూది ద్వారా ఎక్కించవలెను. వీనికి సంబంధించిన మధ్యమ గృహములు గోమారులు (Ticks) గోమారులు:—అందు ముఖ్యముగ ఆరు గోమారులు. జంతువుల శరీరమునకు అంటిపెట్టుకొని రక్తమును పీల్చుచు రెండు మొదలు నాలుగు రోజులవరకు నుండును. అవి సంతృప్తిగా రక్తపానముచేసిన యనంతరము జంతువులను వీడి క్రింద పడి భూమిలోను పాకలలోనుగల నెరదలలోనికి ప్రాకిపోయి యచట గ్రుడ్లనును. ఆ గ్రుడ్లు పగిలి క్రిములగును. ఈ క్రిములకు గోమారి అంకురములు (seed ticks) అని పేరు. ఇవి మరల జంతువుల నాశ్రయించి రక్తపానముచేసి పడిపోవును. ఆపుడు చర్మ విసర్జనముచేసి కీటకముగా (Nymph) మారును. ఇటుల నేకసార్లుచేసి అసలు గోమారుగా మారును. ఈ యవస్థానంతర కాలమున నివి పరాశ్రయ జీవులను సంగ్రహించి పశువుకు వానిని వ్యాపింపజేయును. కావున జంతువుల శరీరముమీద నున్నపుడును నేలమీద నెరదలలో నున్నపుడును ఈగోమారులను హతమార్చవలెను. అందుకు గాను నూటికి 25 చొప్పున నోడియాపాపాణముగల ద్రావణమును ఆ జంతువుల శరీరముపై పిచిగారి చేయవలెను, లేదా అట్టి ద్రావణముగల తొట్టెలలో జంతువులను దింపి స్నానమాడించవలెను. జంతువులుండెడు పాకలయొక్క గోడలను నేలను గీకి ప్రోవుచేసి తగులబెట్టవలెను. వాని నెరదలను గానుగ నున్నమతో పూడ్చివేయవలెను. పచ్చిక బయళ్లలో గోమారులు ప్రబలితచో ఒక సంవత్సరమువరకును పశువులనందులోనికి పోనీయవచ్చుచో ఆ గోమారులు తిండిలేక చచ్చును. అట్టి నేలపై నున్నమునుగాని ఉప్పునుగాని చల్లవలెను. లేదా ఆ గడ్డిని తగులపెట్టవలెను. చేయవలసిన వృద్ధతి గోమారులు వ్యాపించిన నేలయొక్క గుణమునుబట్టియుండును. ఒక యకరమునకు ఒక టన్ను సున్నముగాని అరటన్ను ఉప్పుగాని సాధారణముగ కావలెను. ఒక సంవత్సరము ఒక చోటను మరియొక సంవత్సరము మఱియొక

నూటికి గింజలులేక కొరముట్టులేక నేద్యముచేసేది చెడ్డరోత.

చోటను పచ్చికను పెంచుట మంచి పద్ధతి యిందువలన గోమూఠలు తిండి లేక చనిపోవును.

2. ప్రిపానోజోములు వికళగజంతువులు. రోగబాధిత జంతువుల శోషరసము నందివి గోచరించును.

హిందూదేశమునందలి పెంపుడు జంతువులకు(Surra)అనురోగమును కలిగించును. ఈ రోగబాధితములగు జంతువులు—అందు ముఖ్యముగ గుర్రములు—పెద్ద జ్వరమును కలిగియుండి పాలిపోయి, వ్రేలాడు భాగములు వాచి, నాలుగు మొదలు ఆరు వారములలో చనిపోవును. కొన్ని పశువులు రోగలక్షణము లేనియు లేవండగనే హఠాత్తుగ చనిపోవును. ఈ పరాక్రమ జీవియొక్క జీవితచరిత్ర సరిగా తెలిసికొనబడి యుండలేదు. కాని జోటీగ (Tebanus) దీనికి వాహికమనియు రోగమువచ్చి చచ్చిన జంతువునుండి ఆరోగ్యముగానున్న జంతువులకు ఆ జీవులను చేర్చుననియు తలపబడుచున్నది. ఈ యీగలు సాధారణముగ ఉదయమునను సాయంత్రమునను చురుగుగ పనిచేయును. కావున సరాలోగవీడితమగు ప్రదేశములందలి జంతువులు—ముఖ్యముగ గుర్రములు—నూర్వ్యాస్తమయానంతరమును నూర్వ్యాదయ పూర్వమునకు తిరుగుచుండవలెను. ఈ యీగలు మఱికి గుంటలలోను నీటిలోను గ్రుడ్లు పెట్టును. కావున గుంటలను ఎండవిచ్చి నీటిలో పెరిగిడి మొక్కలకు పెరిగినచో అందివి గ్రుడ్డు పెట్టు. బేయరు కంపెనీలో 205 లేక నాగ నాల్ అనుమందున్నది. ఇది రోగనిరోధకమును రోగనివారకమునుగూడనైయున్నది. దీనిని పశు చికిత్సా పట్టభద్రుడు (Veterinary graduate)సిరలలోనికి ఇక్షాక్ష ను చేయవలెను.

3. కాక్సిడియా అనునవిగూడ వికళగజంతువులు. ఇవి జంతువుల ప్రేవులలో గల పొరలలో జేరియుండును. ఇవి జంతువులయొక్క—ముఖ్యముగ లేగదూడలయొక్క—ప్రేవులకు హాని కలిగించి అజీర్తి విరేచనములనుగాని శిశువు విరేచనము అనుగాని గలుగజేయును. ఈ రోగబాధితములగు జంతువుల మలములో రోగజీవుల సోపలుండును. గాన ఆమలమును తగులబెట్టినచో రోగవ్యాపన మరికట్టబడును. రోగబాధితములగు జంతువులు మేసెడి పచ్చిక బయళ్ళను దున్నుటవలన రోగనివారకమగుటయే గాక పచ్చికగూడ బాగుగాపట్టును. ఈ రోగమునకు తగిన చికిత్స యంతవరకు కనుగొనబడలేదు.

(2) బహుకణజీవులు (Metazoa)

అంతర పరాక్రమములగు ఈబహుకణజీవులను రెండులేకలుగ విభజింపవచ్చును.


(1) బల్లపరువుగనున్న పురుగులు. (2) గుండ్రని పురుగులు. బల్లపరువువానిలో (Flukes), ఎలుకపాము (Tape worms).

1. Flukes.

కాలేయమునందలి పైకీర్మరస వాహికయందుగాని కాలేయమునందును ప్రేవుల లోను గల శిరాలలోగాని ముక్కునందలి శ్లేష్మపు పొరలోగాని ప్రేవులలోని కణపద్య రంధ్రములలోగాని ఇవి నివసించవచ్చును. ఇవి మామూలు liver fluke అంతయుండి పైకీర్మ రసవాహికలో అడ్డుపడి కాలేయముయొక్క పనిని క్రమ రహితముచేయును, లేదా యిని చిన్నవిగానుండిన నుండవచ్చును. నెత్తురులోనున్న యీ పురుగుల గ్రుడ్లు శరీరమునుండి పైకివచ్చునపుడు అవి చొచ్చుకొనిపోవు కణజాలములకు చాల నష్టమును కలిగించి రోగ కారకములగును. రోగి వీడితములగు జంతువులకు ఆవరమునుబట్టి టార్టారు ఎమి టికు ఆన్టిమోనల్, మగ ఫెర్న (Fern) యొక్క రసము కార్బున్ టెట్రాక్లోరైడు మొదలగు ఔషధముల నీయుదురు. ఈ ప్లావల జీవితచరిత్రలు ఒకేతీరుననుండును. వీని వ్యాపకమునకు మధ్య గృహముగా మంచినీటి సత్తలనుండవలెను. మలమునుండిగాని చీమిడి మొదలగు నానీకా పదార్థములనుండిగాని బహిర్గతములగు వీని గ్రుడ్లు మంచినీటిని తేరి పగిలి పిల్లలై తమ కనుపగు సత్తలను జేరును. వానిలోనివి ఆరు వారములలో కోశావస్థనొంది నీటిలో పడిపోవును. ఒక పురుగునుండి వలకొలది కోశము (larvae) లుద్భవించును. వీనిచే నావరింపబడిన సత్త ఒకటి రెండు వారములవరకు అనుదిన మును ఈ కోశములను విస్తరించుచుండును. ఈ కోశములు బాగుగ నీడగలవు. యివి నీటిలోగల మొక్కల నంటి పెట్టుకొని చిరకాలము నిలుచును. పశువులు ఆ మొక్కలను తినినపుడు వానిలోనికిపోవును. మరికొన్నిరకముల కోశములు చేపలు, పీకలు మొదలగు జలచిరములను తేరి నిలిచి వానిని తినినవారిలోనికి ప్రవేశించును. మరికొన్ని రకముల కోశములు నీటియందుండి అందుజొచ్చిన జంతు శరీరములోనికి జొచ్చుకొనిపోవును. లేదా అదిత్రాగు నీటివెంట కడుపునానికిపోవును. కావున వీనివ్యాప్తి సరికట్టుటకు వీనిజీవిత దశలలో నేదే నొకదానికి భంగము వాటిల్లజేయును. త్రాగుటకు పయోగించెడి నీటిలో సంచరించు సత్తలను నశింపజేయుటే ఇందుకు ఉత్తమోత్తమ మార్గము. మంచినీటిలో నివసించు సత్తలు అందున్న మొక్కలను తిని జీవించును. కావున ఆనీటిలోని మొక్కలను తీసివేసినచో సత్తలు మాడిచచ్చును. మొలతుత్తము మిక్కిలి హాస్యముగ నున్నచు సత్తలకు ప్రాణహాని చేయును. జంతువులకు బలకరమగును. కావున ఒక గుప్పెడు మొల తుత్తమును పొడిగాగొట్టి నీటియందులందు చల్లివో సత్తలు చచ్చును. మరొకవిధముగా గూడ చేయవచ్చును. నీటిలో నున్నమును కలుపవచ్చును, లేదా త్రాగుటకుపయోగించు నీటిని వేరుగా పాత్రలలో 48 గంటలకాలము నిలుపచేయవచ్చును. ఈ రెండు విధానములవలననుగూడ కోశములు చనిపోవును. కావున ఆనీటిని త్రాగినచో రోగములురావు.

2. ఏలుగు పాములు (Tape worms)

ఈ పురుగుల శరీరము తేవునలై పొడవుగనుండును. ప్రతి పురుగుకమును ఒక కలయును దానికి కొక్కెమును వీట్లుటకనువగు గొట్టములుండును. మిగిలిన శరీర భాగమున ఉంగరములవంటి భాగములు కలవు. సాధారణముగ ఈ పరాశ్రయ జీవుల జీవితచరిత్ర సంపూర్ణమగుటకు మధ్య గృహస్థాకటి అవసరము. ఈ పురుగులపొడవు



కొన్ని మిలీమీటరు మొదలు కొన్ని మీటరులవరకు నుండును. ప్రతిభాగము నొక ప్రత్యేక జీవి, ద్వితీయసంయుతము (అనగా మగదియును ఆడుదియునుగూడ). అది బీజ భరితమైనపుడు పక్వమైన దందురు. పక్వమైన యనంతరము యాభాగములు విడిపోయి మలముగుండ విసర్జితములగును. ఆచట యాభాగములు ఖలమగును. ఆచట గడ్డియున్నచో వానియందు బీజములు గడికి అంటును. వీరున్నచో వీటిలోకలిసి మలినముచేయును. ఈ బీజములను జంతువులులోనికి గ్రహించినపుడు యచట పగిలి క్రిమిరై ప్రేవులగోడలకు రంధ్రముచేసి కాలేయము, ఊసిరిలిక్కులూ, మొదలు మొదలగు అవయవములకేరి యచట చిన్నవో పెద్దవో పురుగులుగానై వానియందలి కణజాలమును నాశనము చేయును. అట్టి యవయవములు సక్రమకార్య నిర్వహణములేనివై జంతు వునకు హానిచేయును. మానవులకుగూడ ఈ బాదరపురుగుల బాధకలుగుచుండును. ప్రతి బాదర పురుగులోను ఒకటిగాని రెండుగాని ఎలుగుపాము తలలుండును. ఈ పురు గులున్న మాంసమును భుజించునపుడు బాదర అరిగిపోవును. తలలు విడిగానుండి ఆంత్రముల ప్రక్కలట అంటుకొని పెద్దపురుగుగా పెరుగును. ఇట్టి పురుగులలో చాల

వెలిపాలమును వెధవపిల్లను విడవకూడదు.

రకములకు వక్కు అంత్యగృహస్థు తెలిసికొనుట చిత్రమిగు విషయము. వీనిలో చాల వరకు పురుగుల వ్యాపనమునకు పశువులమధ్య గృహస్థులవలె నుపకరించుచున్నవి. అంత్య గృహస్థకార్యమున కలుగు బాధకంటె మధ్య గృహస్థ కార్యమున కలుగుబాధ హెచ్చు. ఒక ఉదాహరణమును చూడుము. వక్కులలో గోచరించు మల్లినెత్తు యనబడు నోకరకపు ఏలుగుపాము బ్లాడరుపురుగు దశను గొర్రెలలో గడుపును. ఆ బ్లాడరు పురుగు గొర్రెయొక్క మెడడులో నుండవచ్చును. దానివలన తల దిమ్మ (Gid) కలుగవచ్చును, లేదా మరణముకూడ రావచ్చును. కాని గొర్రెల ప్రేవులలో గోచరించు మొనిజయా యనబడు పెద్ద పురుగులవలన యిట్టి బాధకలుగుటలేదు. అంతేకాక జంతువుల ప్రేవులయందున్న ఏలుగు పాములకు చికిత్సజేసి విముక్తికొందింప వచ్చును. కాని అవయవముల కణజాలముననున్న బ్లాడరుపురుగులను పోగొట్టుటకు తగిన చికిత్సావిధానము లేనేలేదు. కావున వీనికి విరుగుడు నిరోధకమునమాత్రము కలదు. వక్కులను పచ్చిక బయల్లోనికి రానీయకున్నచో గడ్డిగాని నీరుగాని యాయాపురుగుల బీజములతో మలినముగాక యుండును. అట్టి చోటులందుండెడి పెంపుడు వక్కులకు అప్పుడప్పుడు ఏలుగుపాములు వచ్చుటకు మంచిదప్పుడు వానిమల మను తగులబెట్టుచు నుండవలెను. పెరిగి పెద్దవగు ఏలుగుపాములను విసర్జింప జేయుటకు మగ పెంకొయొక్క రసము పోకకాయ పొడుము, దానిమ్మచేరు మొదలగునవి పనికివచ్చును. ఈ పురుగుల బీజములతో మలినమైన పచ్చికబయల్లను దున్నుట పలపు సలములలో గడిని మేయకుండ జేయుటయునుగూడ ముఖ్యము. కాసాయ గృహములందు పారవేసిన మాంసాదులను తినుటవలన వక్కులకు యీ పురుగులంటును, కావున ఆ మాంసాదులను బాగుగా ఉడికించి అందలి పురుగులను చంపిన తరువాతనే వక్కులకు పెట్టవలయును.

3. గుండ్రని పురుగులు (Round worms).

జంతువుల శరీరమున జేరి జీవించెడి గుండ్రని పురుగులలో అనేక రకములున్నవి. యిందు కొన్ని జంతువులకు యకాయకిని సంభవించును. చిట్టుచున్న గుడ్లను మ్రింగుట వలనకాని భూమిపైనున్న కోశములు చర్మముగుండనో కఫపుపారలగుండనో శరీరమున బ్రవేశించుటచేతగాని యీ జీవులు జంతువుల శరీరమున జేరును. యిందుకు ఉదాహరణముగ ఆస్కారిస్ యనబడు పొడవై గుండ్రగనుండు పురుగులను కొడికిపురుగులను (Hook-worms) హెమోస్థామ్ యనబడు తీగపురుగులను (wire-worms) కలవు. ఇవి పశువులను గొర్రెలను బాధించును. ప్రేవులలోనుండెడి సమస్త పురుగుల బీజములను మలముతో బహిర్గతమగును. ఆస్కారిస్ పురుగుల ప్రతి బీజమునుండియు పది కోజాలలో గాని అంతకుమించిన కాలమునగాని ఒక ధ్రువాము తమారగును, కాని గుడ్లు పగులవు. ఈ ధ్రువాణితియందు బీజములు కొన్ని నెలలవరకును లేదా సంవత్సరముల వరకును వుండగలదు. ఈ లోపుగ నూర్యశక్తిగాని తగిలినచోమాత్రము చనిపోవును.

ఇట్టి ధూణాండములచే మరీసముగు నీటినిగాని యాహారముగాని స్వీకరించునపుడని ప్రేవులలోజేరి పగలి కోశములుగానై యాంత్రపద్యములను జొచ్చి కాలేయము పుచ్చిరితిత్తులద్వారా పైకిపోవును. అనంతరమని ప్రేవులను మరలజేరి పెద్ద పురుగులుగా నగును. పైన పేర్కొనబడిన అంతర్గమనమువలన కోశములోజొచ్చిన యవయవములకు మిక్కిలి హాని వాటిలుచున్నది. తీగ పురుగులవంటి వానిలో గ్రుడ్లు బాహ్యముననే పగులును. పాలములలో తగు లేమయిన్నచో యాకోశములు నాలుగు కోజాలలో వ్యాపనశక్తిమంతములగును. ఈ కోశములు తడిగడ్డిపై నెగబ్రాకుచుండును. అపుడా గడ్డితో వీనినిగూడ జంతువులు మ్రింగును. ఒక పక్షము దినములలో నివి ప్రేవులందు పెద్ద పురుగులుగానగును. కొత్తగా పురుగులచే నాక్రమింపబడిన జంతువుల మలములో వీని బీజములు మూడు వారములలోపున గోచరించును. కావున ధూణాండములుగాని కోశములుగాని జీవంప సమర్థములుగా నుండవలెననిచో లేమ యవసరమని తెలియుచున్నది. ఇట్టి లేమ పల్లపు నేలలలోను, బురద నేలలలోను, నీటిగుంటల అంచు అందు నుండును. కావున గుంటలు యెంచునట్లుచేసి అందలి మొక్కలను పెరకివేయవలయును. అపుడందలి కోశములు జంతువుల నంటుకొనుటకు వీలుండదు. మరికొన్ని గుండ్రని పురుగులు జీవితచరిత్రను సంతృప్తి ముగావించుకొనుటకు మధ్యగృహను అవసరముచున్నవి. ఈ మధ్య గృహమునకివి సుంభించుటకు మూడు మార్గములన్నట్లు తోచుచున్నది.

(a) వీని గ్రుడ్లను మధ్య గృహను తినవచ్చును. ఉదా: టక్కుల కంఠములందుండెడి ప్రణములలో గోచరించు ఎత్తిపురుగుల గ్రుడ్లు వానిమలముతో విసర్జితములగును. ఆమలమును పేడ పురుగులును బొద్దింకలును తినును. అపుడా గ్రుడ్లు వానిలో పొడగపడి కోశముగానగును. ఆ బొద్దింకను టక్కు తినునప్పుడు యా కోశములు టక్కునపట్టి వీడించును.

(b) మలముతో విసర్జితములగు గ్రుడ్లు పొడగబడును. ఆ కోశములు మధ్యగృహను నొకదానిని పొందును. గుడ్లను కడుపునో హత్రాసెమా యనబడు పరాశ్రమ జీవులగలవు. వాని గ్రుడ్లు గుర్రపులదెంతో విసర్జితములై పెంటప్రేవులను జేరును. అచట నవికోశములుగా మారును. ఈ పెంట పురుగులలోనే ఈగలను జోడిగలనుగూడ గ్రుడ్లు పెట్టును. ఈగ గ్రుడ్లు బెట్టినపుడు వచ్చుపురుగులను (Maggots) హత్రాసెమాయొక్క కోశములు యావరించును. అనంతరము ఈగ పురుగులు చరిణామమునంది ఈగలుగ మారును. ఈ యీగల శరీరమునందును నోటిలోను హత్రాసెమాయొక్క కోశములుండును. ఈ యీగల నోటినుండి కోశములు గుర్రముయొక్క శరీరమునజేరును; ఆభాగమును అది నావనొనినచో ఆకోశములు ఆశ్మగర్భములుచేరును; లేదా ఆ యీగలను గుర్రము తినినచో వానితోగూడి కోశములను దానిగర్భమునజేరును. అప్పుడవి గుర్రమునుపట్టి వీడించును.

తండ్రి సేద్యం కొడుకు వైద్యం కూడు మధ్యం.

(c) కొన్ని పురుగులు (Filaria) బోదకాలు పురుగులు గ్రుడ్లకు బదులు కోశములను జంతువుల కణజాలములో నిడును. అవి రక్తమునుజేరి వానితోబాటు శరీరమున ప్రసరించుచుండును. నెత్తురు, ద్రావెడు దోమవంటి మధ్యగృహస్థుల నెత్తురుతో గూడ వానిని గ్రహించును. ఈ కోశము దోమశరీరమున వృద్ధినింది దాదాపు మూడు వారములలో దానితోండమును జేరును. దోమ కరచినపుడు జంతు శరీరోష్ణముచే వాకర్నింపబడి తోండమునుండి బహిర్గతమై జంతు శరీరమునజొచ్చి తమవృద్ధి కనువగు యవయవమును జేరును.

తీగపురుగుల (Nematodes) వ్యాప్తి సరికట్టుట కవలంబించవలసిన మార్గములు వేరువేరుగా నున్నవి. వాని నీక్రింద వివరించుచున్నాను :—

1. అంత్యగృహస్థు శరీరముననుండగ నే పెద్దపురుగులను సక్రియగు మందుల సహాయమున హరిమార్చవలయును. అందుకుగాను జంతువుయొక్క మలము మొదలగు వానిని పరీక్షించి దానిని పొందియున్న పురుగు ఏ జాతిదో నిర్ణయించి తగుచికిత్స జేయవలయును. యీ కార్యము ఒకప్పుగా (Dry) నుండెడు కాలమున చేయుట మంచిది.


కొల్చిన సోడియం, సాల్టోనైట్, నెను కౌల్స్సులులు మొదలగు ఔషధములను సాధారణముగా నిందుకు వాడెదరు.

2. గ్రుడ్లను కోశములనుగూడ అంత్యగృహస్థునందున్నపుడే నశింపజేయవలయును. బోదకాలు మొదలగువానికి టార్టారు ఎమిటిక్ అట్టమంజూను మొదలగు వానిని నెత్తురులోనికి ఇక్జెక్ట్ చేయుదురు.

3. వ్యాప్తిగాంచెడు కోశములను ధ్రువాండములను శరీరమున జారకుండజేయవలయును. గుండ్రని పురుగు వ్యాపించుచున్నదకు అనుమానమున్నచో పచ్చికసలమున నున్నమునచల్లి దున్నవలెను. అప్పుడు ధ్రువాండములు నశించును. కోశములు గడ్డిపెనున్న పనుకొనినచో గడ్డిపొడ మందు ఎండిపోవునపుడు పశువులను యీ గడ్డిని మేయనియరాదు. పల్లపు ప్రదేశములందును బురదనేలలలోను గుంటల అందునందును పశువులు మేయకుండ చూచుటమంచిది.

ఒక సంవత్సరము ఒక పొలమును మరుసటి సంవత్సరము మరియొక పొలముకు మేతకోరకు వేరుచేయుట మంచిపద్ధతి. పశువులసంఖ్య తగినచో అవి మేసెడు సలము వికాసముగానుండును గనుక కోగవ్యాప్తి తగ్గును. మధ్య గృహస్థులను నశింపజేయవలెను లేదా వానికి కోగబీజవ్యాప్తి లేకుండ చూడవలెను. ఎరువులను సరిగా తొలగింపవలెను. వర్షము తక్కువగానుండెనుచోట్ల ఎరువును ఎండిచ్చి ప్రోవుచేయవచ్చును. లేదా ఒకచోట దగ్గరగా ప్రోవుచేయవలెను. అందువలన దానితో జనించు ఉష్ణమువలన అందలి గ్రుడ్లను కోశములును చనిపోవును. ప్రోవుమీద క్రొత్తగా ఎరు

పును బేసికత్తుడెల్ల కొంత మట్టినిగూడ చల్లవలెను. అందువలన ఈగలు గ్రుడ్లు పెట్టవు. వానపాము, లద్దిపురుగులు, జోడిగలు మొదలగు మధ్య గృహస్థులసంఖ్యను తగ్గించు యత్నములు చేయుచుండవలెను. ఈ జంతువులకును వాని పరిసరములకునుగల సంబంధమునుగూర్చి పరిశోధనచేసి వానిసంఖ్యలను తగ్గించు సేర్పాటు చేయుచుండవలెను.



క్షయ, న్యూమోనియా, గాలిపంటు, పాలజ్వరము, నోటి గాలి, పెద్దకోగము మున్నగు వ్యాధుల లక్షణములు చూపించు ఫోటో.

పదుమల సేద్యం పయిటికి రాదు.

అంటువ్యాధు లెంతకాల ముండునది తెలియజేయు పట్టిక.


వ్యాధి పేరు	అంతర్గతకాలము	వ్యాధి నిర్ధారణయగు దినము	పశువును బహిష్కరింపవలసిన కాలము
పెద్దరోగము	2 దినములు మొదలు 8, 12 వరకు	జ్వరమువచ్చినతరువాత మేత తీయబడుట	పొరుడు సాంతముగా కట్టిన వారము దినములవరకు
చొమ్మ	2 మొదలు 3 దినములు	నోటివెంట చొంగ పడుట	పశువు మేత తీసువరకు
గురక	24 గంటలు	గురకపెట్టుట	సామాన్యముగా చికిత్స పు లొంగదు
జబ్బనాపు	2 దినములు	జ్వరముతగిలి నాపుకనబడుట	పశువు మేతతీసువరకు
వరమ	2 మొదలు 5 దినములవరకు	ఆతిత్రివమైన జ్వరము కలిగి కాళ్ళుపట్టుపట్టుట	పశువు మేత తీసువరకు
గాలిగుంటు	24 గంటల నుండి 7 దినములవరకు	తీవ్రమైనజ్వరము, పుండ్లుపడుట	పుండ్లు మాని మేత తీసువరకు
క్షయ	10 దినముల నుండి కొన్ని వారముల వరకు	దగ్గు, కళ్ళిపడును	దగ్గుకట్టువరకు
మకూచి	3 నుండి 5 దినముల వరకు.	తీవ్రమైనజ్వరము, రసి పండులుపోయుట	పొక్కలన్నియు తుడిపోయిన తరువాత ఒకవారము వరకు
కల్లనాపు	3 నుండి 18 దినములవరకు	నాపులు నాకును.	నాపులు తగ్గి మేత తీసువరకు

మంచి మేత్రుగల జంతువులు పరాస్రయజీవుల బాధలేకుండునట్లు పరిశోధనలవలన తెలియుచున్నది. అందును కొన్ని ఖనిజలవణము లవసరము. వీరైన యీపచ్చిక బయలులలో నట్టిలవణములు తక్కువయున్నచో ఆయా లవణములను ఆయా పశువులకు ప్రత్యేకముగా యివ్వవలయును. నెలలో కొరవడిన లవణమందు జంతువులచే నాకింతుట కుందిపద్ధతి. ఎదిగిన పశువులకన్న లేగదూడలకు పురుగులబాధ హెచ్చునను సంగతి అందరికును తెలియును. కావున వానికి ఆ బాధలేకుండుటకుగాను సరియగు నవరమిడుట చాల అవసరము. పాకలలోకట్టి మేపబడుజంతువులకు గడ్డి మొదలగువానిని ఎత్తుగానున్న సలములందుంచి మేపవలెను. గడ్డిగాని నీరుగాని క్రిందుగానున్నచో వానిమలముతోగలిసి మలినమై రోగ కారణమగును.

షరా:—వెటరినరీ డిపార్టుమెంటువారు ప్రకటించిన కరపత్రములనుండి తీసి కొనబడెను.

పెద్దరోగము (Rinderpest)

వీనినే పెద్దరోగము, కింక, చీడపారుడు, సరకు, కలకా, అమ్మపారు, గొట్టాలమ్మ, విషజ్వరమని ఆయా దేశభాషలను, వాడుక పేర్లనుబట్టి పేర్కొను చుందురు.




పెద్దరోగము



ఆ! వె! కాకతగిలి మేత కడుపార గోరక
కన్నులందు పుసియు గప్పువడును
క్రమ్మర కడుసొక్కి గజగజలాడంగ
రీతిచెడియు బశువు రిత్తవడును॥



శ్రీ వట్టికూటి నాగయ్యగారి
సాంప్రదాయముగల గొప్పజాతి గిత్తలు (బండలాగుటలో మొనగాళ్లు)
మండూరు (తెనాలి తాలూకా)



శ్రీ యెర్రా వెంకటసుబ్బయ్యగారి పాడిగేదె (తెనాలి)



శ్రీ కోగంటి శివయ్యచౌదరిగారి పాలదూడలు
అందములో చాల బహుమతులు పొందినవి — తెనాలి.

ఉ॥ ఎంతయు కింక గోవులకు నేర్పడ వెంటనె వానికన్నులన్
సంతత తోయమున్నుపియు చాలగనుండుయు దంతపీడనం
బెంతయుచేయుచున్ రవళి యేపగు బయని దగ్గుతోడ న
త్యంతము నాసికంబునను యాత్రను సల్పుచు చిమిడెప్పుడున్॥

చ॥ పసికిని దాహ మెక్కునగు బాయక కాయముమీద దద్దురున్
రసియునుగల్గి పుంకునన్ రోత జనించగ జీర్ణోశమున్
మసలక వాసనుండు మరి మాంసపుకండలతోను బారి నీ
రసిలగ డొక్క-అంటుక నిరంతర కష్టములంద నయ్యెడిన్॥

ఆ॥ వె॥ కాకయుడిగి చల్లగా నగుమేనుతో
బసువు నీరిసింది ఎగుగుగల్లు
కన్నుగుంట నడయు కదలుచు నుండగ
మందుపట్టకుండ మరియునీల్లు॥

రక్తిసంబంధముగ రోగములలో పెద్దరోగము ప్రస్తావనల పరిస్థితులలో చిట్టి విచిత్రముగ సోచుచున్నది. దేశముయొక్క శీతోష్ణస్థితి గతులబట్టి కొండప్రాంతము లందు ఒక విధముగను, నదులప్రాంతములందు ఒక మాదిరిగను, అగడ్తప్రాంతములందు ఒకమాదిరిగను, తదితర ప్రాంతములందు ఒకమాదిరిగను పశువులకు ఈ వ్యాధి సంభవిండుచున్నది. ఈ వ్యాధి రోగినిదానముల మాన్యుటకు ఆ యా పశువుల తత్వములను బట్టియు ఆవారమాన్యులను బట్టియు మార్పుచేయవలెనైతే మల స్పృశద్వారము నిరుత్సాహ పడుచున్నారు. పూర్వము ఈ వ్యాధి విచ్చి కొన్ని నమలతో అగడ్తలో లేలివోయెడిది. ఇప్పుడు సెలకోజాలవలన కొన్ని నమలలు బాధపడుచుండుట నా ఆచక్షిణము మీద చూచుచున్నాను. ముఖ్యముగా ప్రత్యేకము ఈ దిగువ చూపించిన పక్షయములను గ్రహించి జాగ్రత్తగా చికిత్స చేసిన ప్రదేశములలో నీ నష్టనిరంప జేయవచ్చును. గ్రామములో ఈ వ్యాధి లేకుండ గూతముగా నీ పశువులకొకతొకరు జంతువుల వలన సోకినప్పుడు రోగినిదానము గ్రహించి చాలాకష్టము. ఆంధ్రులన వ్యాధి లక్షణములు జాగ్రత్తగా పరిశీలించి తెగిననీవ చేయుదురుగాక. అగ్లగు వైద్య సిద్ధాంతమునందు ఈ వ్యాధికి టీకాలులేవు మరులులేమి లేతవిక. నానిగళములలో సరియగు చికిత్సలు లేవేమిగాని మనదేశములో చక్కని మూలికా ప్రభావముల వలన వ్యాధిని నెమ్మదింప జేయవచ్చునని నాయభిప్రాయము.

వ్యభావము-వ్యాపకము

మానవజాతికి కలరా యెటువంటిదో పశుజాతికి ఈ పెద్దకోగమటువంటిది. పశువులకు సంభవించు వ్యాధులలో నిది ప్రమాదకరమైనది. ఈ వ్యాధి ఒకవిధముగ నూత్నుజీవుల వలన కలుగుచున్నది. ఈ నూత్నుజీవులు సాధారణముగా గాలి మూలమున పశువు శరీరములో ప్రవేశించును. దోమ్మ గురక జబ్బువాపు మున్నగు వ్యాధులను కలిగించు నూత్నుజీవులవలెగాక ఇవి మరొక విధముగానుండును. ఈ వ్యాధిని కలిగించు నూత్నుజీవులను నీడలోనుంచిన రెండు దినముల వరకు బ్రతుకును. ఈ జీవులకు నూశ్మోష్ణత సోకినపుడు 12 గంటలలోపుగా చనిపోవును. ఈ నూత్నుజీవులు వ్యాధి తగిలిన పశువునుంచి రెండు ఫర్లాంగులదూరము వరకు వ్యాపించును. వ్యాధి తగిలిన పశువు రక్తమందును, మాంస కండరములందును, పేగులయందును, ఎముకలయందును ఈ జీవులొక్రమించుకొనును. కనుక జబ్బుతోనున్న పశువుల మలమూత్రములు విసర్జించిన ప్రదేశములందెల్లడలను ఈవ్యాధి వ్యాపించును. అందువలన జబ్బుగానుండు పశువులను మంచిపశువులనుంచి విడదీయవలెను. రైతులలో చాలామంది ఈ వ్యాధి వీరిటిగా కలుగుచున్నది? తగిన చికిత్సలేమి? పూర్వమునుంచి ఈ వ్యాధి గ్రామము లోనికి రాగానే జాతరలందుకు చెయుదురు? అను పలువిషయములు త్కరించుచుందురు.

18 వ శతాబ్దములో అవీయాలో ఈ వ్యాధిని కలిగించు నూత్నుజీవులను కనుగొనిరి. తరువాత టర్కీ, సెవీరియా, ఆఫ్రికా, ఉంగాడ, ఈజిప్టు, యూరప్ వరకు వ్యాపించెను. 1711 లో ఈ వ్యాధి పరిష్కారానికి సోకి కొన్నికొట్ల పశువులు చచ్చినవి. 1714 లో ఫ్రాన్సుదేశమంతట వ్యాపించెను. 1870 లో జర్మనీయుద్ధము జరిగినపుడు నాత్తయూరపునకు వ్యాపించెను. 1865 నుంచి 1866 వరకు గ్రేట్ బ్రిటన్ లోనున్న కసాయి దుకాణములద్వారా ఎక్కువగా వ్యాపించెను. ఆ సమయములో నూటికి 10 వరకు మరణించెను. హిందూదేశమునకు ఆ పై ప్రదేశములనుంచి వచ్చినటుల తెలియుచున్నది.

ఈ వ్యాధి నెమరువేయు జుతువులకే తరచుగాసోకుండును. ఇంకను కోళ్లకు, కుక్కలకు, పందులకు, దుప్పలకు, పక్షులకు సోకును. ఈ వ్యాధినిగూర్చి 18 సంవత్సరములనుండి నాకు మిగుల అనుభవముగలదు. ఈ వ్యాధినిగూర్చి నేను సావించిన పశువుల ఆస్పత్రి, ఆంధ్రజాతీయ పశువైద్య కళాశాలతరపున నేను నా శిష్యులతోటి తగిన పరిశోధనలు జరుపుచు నేయున్నాము. కాని పదిసంవత్సరములనాటికి ఇప్పటికి వైద్యములో కొన్ని వ్యత్యాసములు వచ్చినవి. పూర్వము చనిపోయినవన్ని పశువులు తచ్చుట లేదు. అంతట ఎక్కువగా చచ్చినవనిన రైతుల అశ్రద్ధయేగాని మరొకటిగాదు. నేను రచించిన పశువైద్యగ్రంథాలమూలమున ఆంధ్రదేశములోనున్న రైతులలో చాలామంది శాస్త్రసమ్మతముగా చేయుటవలనను, నా శిష్యుల ఆపత్తుల సహాయములవలన

ఈ వ్యాధినిగూర్చి ప్రచారముసాగినది. అప్పువారికి బలులు ఘటవుపండ, ఊరేగింపులు మా ప్రచారమువలననే తగ్గినవి. ఏ గ్రామములలోనోతప్ప ఇప్పటి కాలపరిస్థితులలో బలులు చాలావరకుఆగిపోయి పూజాపీఠులతో మ్రొక్కుబడులు చెల్లించుకొనుచున్నారు. ఇంకను యిప్పటి కాలపరిస్థితులలో ఈ వ్యాధికి గ్రామజాతరలుచేసి జంతువులను బలులునిచ్చుచున్నారనిన అంగీకరించుకొనలేము. కాబట్టి రైతునామవలెంతా ఈ వ్యాధి గ్రామమునకు రాగానే ఈ దిగువ చూపించు విషయములను గ్రహించి తగిన సేవ చేయుదురుగాక.

వ్యాధిసోక విధానము

ఈ రోగముతోనుండు పశువులను మంచిపశువులు నాపటచేతను, రోగపశువు యొక్క మలమూత్రములు, చొంగపడిని మేతవగైరాలు మంచిపశువులు తినుటచేతను, తగిలిన పశువులకు కుపయోగించు తోట్లు, మట్టిపాత్రలు మున్నగునవి మంచిపశువులకు నాడుటచేతను, మానిగవాండ్రు తమ బంధువులకు ఈ వ్యాధితగిలిన పశువుల మాంస మును పంపించుటచేతను, ఈ వ్యాధి తగిలిన గ్రామములద్వారా మంచిపశువులను సంతలమగాని బంధువుల యిండ్లకుగాని తోలుకొని వెళ్లుటచేతను, గ్రద్దలు కొళ్ళు కుక్కలు కాకులు మొదలగు అల్లుజంతువులు ఈ వ్యాధిచే చనిపోయిన పశుమాంసము నచ్చుటచ్చుట తినుచు విడచుట చేతను, వ్యాధిగల పశువులను స్త్రీమర్దలోనుంచి తదితర ప్రాంతములకు పంపుటచేతను, చచ్చిన పశువులను పాతి పెట్టకపోవుటచేతను, ఈ వ్యాధి సోకిన ఆవు, గేదె మున్నగు పశువులను మగ పశువులు దాటుటచేతను ఈ వ్యాధిసోకును.

ఈ వ్యాధి గేదెలను దున్నులను ఎక్కువగా బాధించును. ఒక్కొక్క సమయములో రైతునకున్న సల్లపశువులన్నియు చని పోవుటయుగలదు. ఎద్దలు ఆవులకు ఈ వ్యాధి సోకిన ఆరంభములో తగిన సలహా తీసికొని చికిత్సచేసిన నిరభ్యంతరముగా తగ్గును. ఈ వ్యాధితగిలిన పశువుల చర్మముపైన దద్దురు దద్దురుగా ఒకవిధమగు పూతపూనినట్లుండిన ఆ పశువులకంత ప్రమాదము రాజాలదు.

లక్షణములు

ఈ వ్యాధిసోకిన పిమ్మట బయటకు కనపడుటకు 3 నుంచి 8 దినముల వరకు పట్టును. కొన్ని జంతువులకు 10, 15, 30 దినములవరకు పట్టును. రైతులలో చాలామంది పొరుగుదొడ్డికి తరువాత నైద్యులకు చూపించుదురు. ఈ పొరుగు పనులపచ్చగానుండి, రక్తకండలు పనుచు ముడ్డితీపుగానుండి పడేపది విశేషములగు గబ్బిలపురాసన కొట్టుచున్నపుడు అట్టిపశువు బ్రతుకుట చాల కష్టమని గ్రహించవలెను. మిగుల అనుభవముగల నైద్యుడిన్నగాని ఇట్టి ప్రమాదస్థితిలో సరియగు చికిత్స చేయజాలదు. మన రైతులలో అధిక చాడస్తయగువారన్నారు. ఏ వొకయ్యో ములగచెక్కరసం ఉప్పు

కలిపిపెట్టగా తగ్గినదని చెప్పగానే అదే మామిగా అందరు నమ్మి చేసేవారు, ఇప్పటి కాలపరిస్థితులలోకూడ నున్నారు. ఇట్లుచేయుట చాలా పొడపాలు. అపశువునకు జ్వరమున్నదా? లేక ఎక్కువ విరేచనములగుట వలన శీతలమునకు వచ్చినదా? ఏమైన ముక్కుడున్నదా? ఏ యే వస్తువులు పెట్టిన వేడివచ్చును? ఏ మందులు పెట్టిన విరేచనములు కట్టును? ముక్కుగుండుములు గ్రహించి ఓషధుల గుణములు తెలిసికొని చికిత్స చేయవలెను. అందరు చెప్పిన వైద్యసలహాలతో పోవద్దని నా యభిప్రాయము.

మొదటి-అవసర:— ఈ వ్యాధి సోకినవెంటనే 105, 106, డిగ్రీలజ్వరముండును. మనుష్యులకు పెట్టు ధర్మామీటరునే పశువుల ముడ్డిలో పెట్టిన తెలియును, అరమేత మేయుచుండును. ముఖ్యముగా దగ్గుండును, కొన్నిటికి యుండదు. చెవులనుండి రసం కారును. తలనిటునటు కొట్టుకొనుచుండును. కనుకొలువలు నూత్నముగా చిట్టివునులు కట్టును. కొన్ని కండనుండి నీరుగారును. మలము గట్టిగా వేయును. గుండె తీవ్రముగా కొట్టుకొనుచుండును. పొడిపశువులైన వెంటనే పాలుఎండిపోవును. కొన్నికండు కనురెప్పలు ఎర్రబడును. ఈ ప్రథమావస్థలోనే రోష్ణపుట్టిన ఆ పశువు బ్రతుకుట కష్టము. కావున జాగ్రత్తగా పరిశీలించి రోష్ణులు పోగొట్టు సమపాయములు చేయవలెను.

రెండవ అవసర:— పశువు నోటిలోపల ఎరువుగా కంది పొక్కులుపొక్కులుగా నుండును. ఈ అవస్థనుంచి మేత నీరు మానును. చెవులను క్రేలాడవేయును. క్రమేపి జ్వరము తగ్గును. ముక్కులగుండ చిక్కించీమిడి నోటిగుండ చొంగపడుచుండును. ముక్కులను శుభ్రముగా కడుగనిచో పుకగులు పడును నోటిలోపలనుంచి ఒక విధమగు దుర్వాసన వేయుచుండును. ప్రథమావస్థలో నేనుక్కిలెరుచు బండిపనిగాని నాగలి పనిగాని చేయించిన అపశువులకుకూడ ప్రమాదము కలుగును. నా అనుభవముమీద ఇట్టి పశువులకు ఏ లో అనుభవచికిత్స చేసగాని తగ్గవు శరీరమండేభాగమందైన ఈ రెండవ అవస్థలో ఒకవిధమగు వాపులుపుట్టును. ఈ వాపులు మెత్తగాగాని, గట్టిగాగాని యుండును. క్రమేపి కనుకొలువలు ఒకటి పుకకపడును. ఆపశువులైనయెడల శరీరము మీద పుడ్డుపడి ఎరువురంగుగానుండును. దీనినే మహాచిహ్నాత్ యందురు. కండనుండి కారు నీరు వగరుగ కారముగ నుండును. దాహమెక్కువగును. ఆకలి నిలిచిపోవును. నాడి తీవ్రముగాకొట్టుకొనుచుండును. పక్షిచిరుగు పులుచువానకక కొద్ది పసుపురంగుగానుండి దిశమునకు రెండూమాను పర్యాయములు పారు నుండును.

మూడవ అవసర:— ఈ అవస్థలో పశువు చాలాసక్కించి చాలా విచారకరముగా నుండును. వ్యాధి మిదిగిరి కొలది విరేచనముల రంగుచూరి దుర్వాసనగానుండును. ముడ్డిలోపల క్రేండ్రపుట్టి ముక్కునుండుగు. జ్వరము క్రమేపితగ్గునుండును. ఈ సమయములో జ్వరము తగ్గునుండి విరేచనములును కట్టించు సమపాయములు చేయవలెను. ఉచ్చాస్యనిశ్శ్వాసుల పాటంకపరదను నిశింపజేయును. పసుపురంగు నీరువలె పడేపడే

పారుచుండును. ఎత్తుటికిప్పుడు పశువుపారిస భాగమందు సున్నపునీటిని చిక్కగా కొట్టవలెను. ఆ సలమును పరిశుద్ధము చేయవలెను.

నాలుగవ అవస్థ:—పశువుకరీరము, కాళ్లు, ముఖములరంగుమారి ముడతలు పడును. కరీర వేడితగ్గి శీతలములోనికి వచ్చును. మూత్రకోశముచెడును. నాలుక తెలుపు-పసుపుకలిపి రంగుగానుండును. నోరంతయు, అరిపోయి, దాహ మెక్కువగును, కొన్ని దాహమును తోరవు. ప్రేగులు అరచుచుండును. కాళ్లనరములు లాగుచుండును. పశువు నిలబడుచు లేచుచు బాధపడుచుండును. దేహమంతయు శీతలములోనికివచ్చును. కను గుంటలు విడచును. పెట్టిన మందులు మలముగుండా పోవుచుండును. కండలు కండలుగా కొడిగా పారుచు బరిఎముకలు బయటపడి ఏర్పడి చివరణించును. కొన్ని పశువుల తత్వమునుబట్టి పైలక్షణములలో మార్పులుండుటయు గలదు. కొబ్బటి జాగ్రత్తగా చికిత్స చేయుటమంచిది.

సంరక్షణ

ఈ వ్యాధికి బోషకములకన్న సంరక్షణ చేయుటయే ముఖ్యము. రైతులలో చాలామంది పశువులను నలిగాలిలోనుంచుదురు. మరికొందరు ఎండలో కట్టుకును. ఇంక కొందరు వెంటబట్టలించును, గాలి వెలుగురులేని చోటులందుకట్టుదురు. ఈవ్యాధి వరాకాలమునం దెక్కువగను, వేసవికాలమునందు తక్కువగను ప్రబలుచుండును. వర్షమునకు తడియనకు ఆ కాకాలపరిస్థితులనుబట్టి జాగ్రత్తగా కాపాడవలెను. ప్రతి గంటకు ముక్కులను నోటిని పటికనీటితోగాని, తడితరి వగరుపదారములతోను కడుగుచు ఈగలు వాలకుండ కాపాడుచు దాహము తాపత్రాని తోరికయున్న అరగా కాచిననీరు పెట్టుచు అప్పుడప్పుడు ముక్కురంధ్రములకు మంచినీరు రాముచు మలమూత్రములను తీసివేయుచు, కండలు పరిశుద్ధముచేయుచు, దుక్కులను కాపలను మంచిపశువులను దగ్గరకు రావలయుండ కాపాడుచు, విశేషములగుచున్నపుడు తీసికేసి నేలను పాటి మట్టితోగాని సుక్కుముతోగాని జల్లి శుభ్రముచేయుచు, కాపాడుచున్న యెడల తగిలించును.

ఆయుర్వేద చికిత్స

ఈ వ్యాధిసోకిన వెంటనే కనుగొనుట కష్టము. ఎంతో ఆయుధవమున్నగాని కను గొనజాలము. జబ్బురాగానే కండకొలుపలు ఒరిగినవా? పశువు అప్పుడప్పుడు నల్లకప్పుకాయుచున్నదా? పశువు పనిచేసి వచ్చినదా? బాధవలన పండ్లుకొరుకు చున్నదా? చూడిపశువైననో లోల పిండములిరుగుచున్నదా? దగ్గ అప్పు డప్పుడు వచ్చుచున్నదా? తీవ్రముగానున్నదా? చెవుల మెదట మన చేతిగుప్పిల్లతో పట్టుకొని వేడిగానున్నదా? సమశీతలముగానున్నదా? చల్లగానున్నదా? అదివరకా పశువునకు యేయేపదార్థములు పెట్టినారు? వాడిపశువులైన పాలన్నియూ ఎండిపోయి

నవా? దూడయున్న పాలు కుడిసినారా? గ్రాతుములో ఎన్నిచోట్ల ఈ వ్యాధి గలదు. మన్నగు ప్రశ్నలన్నిటికి సమాధానము తెచ్చుకొని చికిత్సచేసికొనుట మంచిది.

అరంభములోనే వ్యాధిసోకిన అనుమానమున్నపుడు తేలికగా సబ్బునీటితో ఏబిమా చేయుటమంచిది. ఈ ఏబిమావలన లోపలి మలమంతపోవును. కాని జ్వరము లేక పోయిన ఏబిమాచేయరాదు. ఏబిమాచేయుటకు నీట అవకాశములేనియెడల ఈ దిగువ చికిత్సలలో నేదో నొకదానిని చేయుము. చూడిపశువులకు ఏబిమాచేయరాదు. మంచులను కూడ ఎక్కువగా వాడరాదు. చింతపండుపులునుసేరు, ఉప్పు 6 టులములు కలిపి తగిలిన వెంటనే ఒక్కపర్యాయమే పెట్టుము. లేక సొంటి 1కు, వామ అరగుప్పెకు మోదుగ పువ్వు 1½ కు, ఉప్పు 3 కు, బియ్యపునీరు సేరుకలిపి ఒకపర్యాయమే త్రాగించవలెను.

లేక ఉడయముపూట 100 న్ను సాయంకాలము 100 న్ను తమలపాపలకు మంచినూనెరాసి తినిపించవలెను.

లేక వెల్లులిపాయలు 2 కు, వామ 4 కు, పువ్వు 4 కు, చింతపండుపులును అరసేరు కలిపి నూరి త్రాగించవలెను.

లేక వెదురాకు అరగుప్పెడు, నేలవేము 1 కు, నల్లర్రువ్రేళ్లు 1 కు, తెల్లఅవాలు 1 కు, బియ్యపునీరుసేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

లేక నేలవేము 2 కు, మోదుగపువ్వు 6 కు, నువ్వులనూనె అరసేరు కలిపి త్రాగించుము.

లేక నల్లర్రుకొడల రసము 3 కు, వెల్లులిరసము 4 కు, నువ్వులనూనె అరసేరు కలిపి త్రాగించుము.

లేక ముండనుతీసివేసిన నాగజెముడును త్రొక్కి ముండనుతీసివేసి దానిలో సొంటి మిరియాలు, కరక్కాయలు, తాడికాయలు, ఉసరికపప్పు ఒక్కొక్కటి 2 టులములు తీసికొని చూర్ణముచేసి మెత్తగాత్రొక్కి ఈ ముందునే మూడు భాగములుచేసి ఉదయ, మధ్యాహ్న, సాయంకాలములందు అరసేరు కలిపిటితో పెట్టవలెను. పై ముందు లన్నియు వ్యాధిసోకిన ప్రధమ ద్వితీయ అవస్థలలో ఒకటి రెండు మోతాదులకంటె పెట్టరాదు.

ఈ వ్యాధియందు పశువులకు శీతలము రానియవండ కాపాడవలెను. చాలామంది సారాయిని వ్యాధి ప్రారంభించిన లగాయుట వాడుదురు. ఇది చాల పారపాలు. ఏ వెంకయ్యో మాపిర్దుకను నాలుగు డ్రాముల సారాయి వాడిరినిగాన మీ పశువులకు కూడ వాడమని సలహాయుచ్చును. ఇట్టి సమయములో పశువులన్నిటికి సారాయి వాడే వారుకూడనున్నారు. అవసర ఖర్చుతప్ప అంతమాత్రమునకే తగ్గదు. ఏ నేళ్లలో సారాయి పెట్టవలెనే ముందు తెలుపబడును.

పారుచున్న పశువులకు చికిత్స

పశువు వ్యాధిసోకిన తరువాత పేదమందిరిగా పారుచున్నదా? లేక పశువురంగుగా గాని, రకజీరతోగాని, పారుచున్నదా? రోజూకు ఎన్నిసార్లు పారుచున్నది? పారుచున్నపుడు ముక్కుడు, ముడ్డి తీపుయున్నదా? దాహమున కన్నీపర్యాయములు లాగుచున్నది? మున్నగు విషయములు పరీక్షించవలెను.

దిసమునకు రెడుమాడు పర్యాయములు పారుచున్నయెడల పచ్చితుమ్మచెక్క, పచ్చిశేరేడుచెక్కను తెచ్చి నీరుపోసిత్రొక్కి నేరు చిక్కనిరసము వచ్చునట్లుగా త్రొక్కి దానిలో నేరు లేక అర్ధనేరు కలిపి (ఆనగా బియ్యముకడిగిన నీరు) కలిపి ఈమోతాదునే రెండువేళల పెట్టవలెను. ఈ చికిత్సకుగూడ పారుడు కట్టించో మరొక మోతాదు ఈయవచ్చును.

లేక దానిమ్మ చిగుళ్లను 15 తులములుతెచ్చి మెత్తగానూరి అరనేరు పెరుగుతో పెట్టవలెను. లేక పైప్రత్తి ఆవరసము నేరు, మజ్జిగ అరనేరు కలిపి కాచిపెట్టవలెను. లేక నేలతంగేడావను కచ్చుపచ్చగాదంచి నేరుమజ్జిగలో కలిపి త్రాగించవలెను. ఈ చికిత్సలన్నియు విరేచనములు తీరముగానగుచు లోపల జ్వరము తగ్గవండ నున్నపుడు విరేచనములుకట్టువరకు మాడునాలుగు పర్యాయములువరకు పెట్టవచ్చును. ఈ మందులు పెట్టునపుడు విరేచనములు కట్టినచో వెంటనే ఆపవలెను. లేనిచో మలబంధము కలిగి పశువునకు వగర్చు పుట్టును. ఇంకను కేహమంతయు మిగుల వడిగానూడి విరేచనము లగుచున్నపుడు అరటిమూపను మానెను నీటిలోవేసి దంచిరసముతీసి దానిలో తవ్వెకు జొన్నపిండికలిపి కాచి చల్లార్చి పెట్టవలెను. లేక తంగేడావ పసురు నేరు, పెరుగు అరనేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

ఎన్నిమందులు పెట్టినను పారుడు కట్టనపుడు పరిపిండి సోలెడు, హరితికర్పూరము $\frac{1}{2}$ తులము, పాలునేరు, కవిరి 2 తు, కలిపి త్రాగించవలెను.

లేక సీమనున్నం 4 తు, కవిరి 2 తు, మాచికాయలు 1 తు, నల్లమందు $\frac{1}{2}$ తు, గంజాయిపత్రి $\frac{1}{2}$ తు, పరినాకలజావ నేరు కలిపి పారుడు తగ్గవరకు ఒకటిరెండు మోతాదులు ఈయవలెను.

వేడిమిని కలిగించు మోతాదులు

కొంతమంది రైతులలో చెడుఅలవాట్లుగలవు. తమకు శోగవిషయము తెలియకు. ఏమైన మందు ఖర్చుఅగు నేమోయని దొరకీసమందులెల్ల పెట్టించుదురు. వివిధరకముల వైద్యులను పిలిపించుదురు. వారుచెప్పే నమ్మకములన్నటిని విని తప్పొ ఒప్పొ చేయుచుందురు. మరికొందరు గ్రంథములో చూచితిమి. వ్యాధి వుదరలేదు. ఏమి గ్రంథములని చప్పరించుదురు. ఈరీతిగా అనేకవిధముల రైతులున్నారు. ఇట్టి రైతులకు చెప్పవలసిన

గడ్డగడ్డకు పుట్టెడు నీళ్ళు త్రాగి అయినా రెడ్డే నేద్యము చెయ్యవలయును.

సలహాలేమన మీకు అనుభవమున్న చేసికొనుటయే. అనుభవము లేకపోయినా వ్యాధి ప్రారంభమగుచున్నవైద్యునితో చికిత్స చేయించుకొని చివరవరకు ఆవైద్యునితోనే చికిత్స చేయుటయే. అదిగని ఆ వైద్యుని రప్పించాము తగలేదు మరొకవైద్యునిని పిలిపించాలి, ఇంకొక వైద్యుని పిలిపించాలి అనే ఆతురత పనులు చేయక జాగ్రత్తగా నోరులేని పశువులకు చికిత్స చేయించమని నా అభిప్రాయము. గ్రంథములు వ్రాసిన పశువైద్య గ్రంథకర్తలమీద కూడ దుడ్రకు వారున్నారు. ఆ గ్రంథము లెంతవరకు పనిచేయును? ఆ గ్రంథములలోని సారాంశము తెలిసికొని ఇంకను అనుభవముమీద తదితర మందులు కలుపుకొని పని చేసికొనవచ్చునా? గ్రంథములలోని మందులే ఉపయోగపడునా? అను విషయములను గ్రహించి మీకు తెలియకపోయిన దగ్గర వైద్యులను, అనుభవముగల వారిని సంప్రదించి చేయుటయే. పశువు కఠినమంతా చల్లబడి ఎక్కువగా విరచనము లగుచున్నప్పుడు ఆ పశువు బ్రతుకుట చాలాకష్టము. కాని సారాయి కి ద్రాములు, ముద్ద కర్పూరము క్షీ కు కలిపి ఒక మోతాగు యిచ్చుటవలన వేడిరావచ్చును. లేదా పిప్పర్ మెంటు ఆయిల్ అరవెడుకొలను నేరు గోరువెచ్చని నీటిలోకలిపి ఒక్క మోతాదే త్రాగించవలెను. లేదా స్వచ్ఛమగు నువ్వులనూనె మూడు గొట్టములు త్రాగించుము లేదా కాడకొముడు ఆమరగమును పొగించి అరగొట్టము త్రాగించుము. ఈ మోతాదులకు వేడిరానిచో ఆ పశువు బ్రతుకుటకష్టము.

కల్లవాపులకు, పుండ్లకు చికిత్స

కొన్ని పశువుల కఠినమైన యేభాగ మందయినను గట్టిగాని, మెత్తగాని వాపులుపుట్టును. ఈ వాపులు నెలరోజుల వరకుకూడ యుండవచ్చును. ఒక్కొక్క సమయములో ఎన్ని మందులరానినను తగ్గక రక్తమపటివ తరువాత తగుటయుగలదు. ఆ వాపులమీద చవుడు నున్నముకలిపి చుక్కలు పెట్టవలెను. లేక చేదుజీలకర్ర అరతులము ఆవపిండి అరతులము దుఘ్ఘపామగాని గాడినగడిపామ పసుగుని 10 తులములుకలిపి అప్పుడప్పుడురానిన తగ్గును. లేక హరితికర్పూరము పావుతులం, కొబ్బరినూనె 6 తులములు తీసికొని గోరువెచ్చగాకాచి వాపులకు పట్టించి వేడినీటికాపులు కాయవలెను.

రాచిచెక్క, తుమ్మచెక్కవేసి కాచిన పగరునీటిలో నోటిని అప్పుడప్పుడు కడుగుచుండవలెను. లేక నేరు గోరువెచ్చని నీటిలో అరతులము పటికవేసి కలిపి అప్పుడప్పుడు నోరును కడుగుచుండవలెను. ద్రవ్యజ్ఞానములో చెప్పిన ఓషధులను మీ అనుభవముమీద వాడవచ్చును.

చూడిపశువులకు చికిత్స

సామాన్యముగా చూడిపశువులకు ఈ వ్యాధి లేలిక గా తగిలినతప్ప బాగుగా తగిలిన బ్రతుకుటకష్టము. లేలిక గాతగిలి బ్రతికినను తప్పుక ఈమరణిపోవును. కాబట్టి పైన చెప్పిన చికిత్సలనే చేయుచు జాగ్రత్తగా సంరక్షణచేయుచుండవలెను. ఈ వ్యాధిచే

పశువులు కాచేవాడు పాటుకు అక్కరకు రాదు.

మానములు వచ్చిగాని రాకగాని పిండమునకు పశువునకు అపాయమువచ్చిన ఈ దిగువ లక్షణములుండును. పశువు సామ్యునిలును. శరీరమంత జిగటవంటి దుర్గంధముపుట్టును. గర్భమునుండి రక్తమువంటి ద్రవము స్రవించుచుండును. మాత్రము మైల ఎక్కువగా పడుచూ, ఆయాస పడుచుండును. ఈ సమయములో అనుభవముగల వారిని రప్పించి పిండమును లాగించవలెను. తరువాత వెన్నెముకకు, లొంటిభాగమునకు పుట్టనున్న వాని లాకు పసరుకలిపి ఉడికించి పట్టువేయవలెను. మానమును చగరుబిత్తోకడుగుచుండవలెను వెంటనే లోపలికి కి డ్రాముల సారాయినిగాని, సేరుపాలలో 4 తులముల మంచి యింగువ, అర్ధసేరు తుమ్మకు ఉండికలిపి గోరువెచ్చగా కాచిపెట్టవలెను. చలి గాలిలోను, వర్షములోను యుంచరాదు. నూతికావతము రాకుండ కాపాడవలెను. ఎక్కువ మైలపడుచున్నపుడు కరివేపాకు ఉండ నిమ్మకాయంత అంగిటిలో ఒక మోతాదువంటున రెండుమూడురోజులు పెట్టుము. రోగలక్షణములు తగుచుండిన కాలిన నీరు అర్ధగాపెట్టుము. లేతపచ్చగడ్డిని కొద్దికొద్దిగా పెట్టుము. మామ దినములకొక పర్యాయము ఒక కొబ్బరికాయను సేరుబిత్తో త్రొక్కి పాలుతీసి వానిలో కి తులముల వేయించి విసరిన మెత్తిసిడి, కి తులముల ఉప్పుకలిపి పెట్టుము. తెలికపిండి కొద్దికొద్దిగా ప్రతిరోజుపెట్టుటమంచిది.

పథ్యము

రైతులలో చాలమంది వ్యాధిరగిలిన పశువులకు నీరు, మేత పెట్టరాదని చెప్పుదురు. మరికొందరు నీరు పెట్టుట బో తిగా మనివేయటవలన ఆహారనాశము ఎండి మరణించుచున్నది. ఇప్పటి కొలపరినీతులలో “ పశువునాతే బ్రతుకుపోవురా ” యను సిద్ధాంతముతో ఎట్టి చిన్నపశువున కింకనను తగు జాగ్రత్తగా చికిత్సలు చేయుచున్నారు. ఈ పదిసంవత్సరములలోపల ఇట్టి శ్రద్ధపశువులకు అంతగాలేదు. ఇప్పుడిప్పుడే ప్రతిరైతు పశుసంబంధమైన విషయములను గ్రహించవలెనను ఆసక్తితోనున్నాడు. నేను ఈ చింతామణిని 1933 లో ప్రకటించినప్పటికి ఈ గ్రంథముచూచి అనుభవముతో చికిత్సలుచేసి రైతుల గౌరవమును పొందిన వారెందరో మహాద్రక్షములొ నున్నారు. వారునన్ను అడుగు సలహాలు చికిత్సలు చూచిన నాకు అత్యంతానందము కలుగుచున్నది. కొంతమంది రైతులు గ్రంథమున్ను ఎశువైద్యము వచ్చునాయని ప్రశ్నలు వేసి వారున్నారు. వీరికి శాస్త్రజ్ఞానముతో నున్న గ్రంథములో కొన్ని కాకపోయిన మరి కొన్ని ప్రాథమిక చికిత్సకైన ఉపయోగ పడునని తెలియదు. నేను ఎన్నో గ్రామములు తిరిగితిని. వివిధరకముల రైతులను చూచితినిగాని ఇంకను అచ్చటచ్చట అనూయూ పరులు, తెలిసి తెలియని ప్రశ్నలువేయుట, పెద్దగర్వముతో నుండుట, రైతునకు మించిన జ్ఞానము పశుసేవలో నున్నదని గర్విండుట, మున్నగు విషయములెన్నో గలవు. గాన మీరుమాడ జాగ్రత్తగా పశుసేవ చేసి కాపాడుదురుగాక.

మడుంవారముడి అయినా కావలెను, మాటకారి మొగుడు అయినా కావలెను.

పెద్దరోగముగల పశువులను నూకలజాన పెట్టిన ఆహారోగము శీతలములోని వచ్చునని భయపడుదురు. గాని పక్షపక్ష విశేషములగును శరీరమంతా శుష్కించి నీటి కొరకు ఆహారముకొరకు ఎదురు చూచునప్పుడు సేరుజానలో రెండు లేక మూడు ద్రాముల సారాయి కలిపి అప్పుడప్పుడు యిచ్చుటమంచిది. ఆహారవిషయములో మొదటి దశ రెండవదశ సగములో ఆరమేత మేయునుగాన ఆహారము పెట్టనవసరములేదు. నూకలజానలో గాని జొన్నజానలో గాని తేలికగా జీర్ణమగు గుణముకలను. ఈ జాన పెట్టుటవలన పశువు నిస్త్రిగకెందదు. లోపల దండిగానుండును. అతిఎక్కువగాను పెట్టరాదు. నిలువయున్నజానను త్రాగించరాదు. ఈ వ్యాధిగల పశువులకు ద్రవ పదార్థములుతప్ప గట్టిగానుండు పదార్థములను పెట్టరాదు. నీటివిషయములో వ్యాధి సోకినది లగాయతు నెప్పుడి యగువరకు తుమ్మచెక్కగాని, రాచిచెక్కగాని, వేసి సలసల కాగిన తేలికకషాయమును చల్లార్చి పెట్టుటమంచిది. ఈ కషాయమును పెట్టుటవలన నీరు ఆరగా త్రాగును. పేగులు నొరు గారపటును. పొరుడుకూడ గట్టిపడును. కా అనుభవము మీద ఈ కషాయమే బాగుగా పనిచేయుదున్నదని తెలుపుచున్నాను. ఇంకను వడిజేసి చల్లార్చిన నీటిలో కొద్దిగా పసుపువేసి పెట్టవచ్చును. వ్యాధి తిరిగిన తరువాత కూడ జాన, వగరు కషాయములు తేలికగా తయారు చేసి పెట్టవలెను. రోగమునుండి లేలిన పశువులను పక్షము దిశములవరకు మందలో కలుపరాదు.

ఈ వ్యాధిని ఆపుటకు మార్గములు

గ్రామములో ఈ రోగము రాగానే జాడ్యము తగిలిన వాటిని తక్షణమే మరొక చోట కట్టవలెను. కొంతమంది రైతులు దేవుడుంటే ఎచ్చట కట్టివేసినా ఫరవాలేదని తీగలు తీయుచు పశువుమీద ప్రేమలేక మాట్లాడుదురు. మనిషికి కలరారాగానే అమ్మో నాయనోయి గుండెలు బాదుకొనుచుండురు. అంత తాపత్రయమే నొరులేని పశువులకుకూడ యుండునని పాపము వీరికి తెలియదు. చూడండి మంచిపశువును జబ్బు పశువుతోనుంచండి, అది యెంతబాధపడునో జాగ్రత్తగా చూచిన తెలియును. కొట్టి తప్పుక జబ్బుపశువులను విడదీయవలెను. జబ్బుపశువులున్న సలమునకు సంబంధించిన కొట్టుగోడలు, గోలనీటి తొట్టెలు శుభ్రముగానుంచవలెను. రోగపశువులకు చికిత్స చేయువారుగాని, అంటుసోకియుండు సలములలో తిరుగు వుక్కులు కావలనుగాని మంచి పశువులున్నచోటుకు రానీయరాదు. చచ్చిన పశువులనుమాత్రము కొయించక పది పండ్లెండగుల లోతున పాతి పూడ్చుటమంచిది.

ఆంగ్లేయ చికిత్సలు

కొంతమంది రైతులు మననాటుచికిత్సలు చాలాయుండగా ఈ ఇంగ్లీషుమందులు ముంకెందుకయ్యా ? అని ప్రశ్నించేవారున్నారు. ఇప్పటి కాలపరిస్థితులనుబట్టి అన్ని రకముల వైద్యసేవను గ్రహించి ఏది యుపయోగకరముగానుండునో దానినే స్వీకరించ

మని నా ముఖ్యసలహా. నేను ఎంతోమంది గవర్నమెంటు పశువైద్య డాక్టర్లను, వారి పై ఆఫీసర్లను పరిశోధన ప్రాధాన్యతను స్వయముగా చూచితిని. వారి వైద్యము కూడ మా చికిత్సాలయమునందు ఆచరణలోపెట్టి చేయుచున్నాను. ఈ వైద్యమువలన ఎంతవరకు పయోగము రైతులకు పశువులకు యున్నదో ఈ గ్రంథములో తెలుపుచున్నాను. గవర్నమెంటు పశువైద్యులు గ్రామములోనికి వచ్చి యిచ్చు సలహాలనుకూడ గ్రహించండి. విడిమిద ఉపయోగముగానున్న దానినే మీరు సందేహములేకుండా వారిని అడుగుట మంచిది.

ఈ వ్యాధిసోకిన వెంటనే క్రిసాల్ 1 కులము తీసికొని సేరు నూకలజావలో పెట్టవలెను. లేక పొటాషియం పర్మాంగనేట్ అను పొడి నీటిలో చిక్కగా కలిపి రెండు మూడు దినములు నరుసగా యిచ్చిన లోపలక్రిమి నశించి వ్యాధితగ్గును.

లేక కార్బాలిట ఆసిడ్ ను 60 చుక్కలు తీసికొని సేరు నూకలజావలో కలిపి పెట్టవలెను. ఈ రీతిగా మరికొన్ని చికిత్సలుగలవు.

పారుదెక్కువగానున్నయెడల క్వెంఫర్ డైన్ నుగాని, క్లోరైడ్ నుగాని అరబ్బెస్సు వరకు నీటిలో కలిపి రెండుమూడు పర్యాయములీయవలెను.

లేక కాచు 2 డ్రాములు, ఛాప్రెషేటా బ్లీరు, నీసనున్ 2 డ్రాములు, జింజర్ 2 డ్రాములు సేరు గంజిలో కలిపి ఒకటి రెండు పర్యాయములీయవలెను.


లేక గాల్సపొడర్ 3 డ్రాములు, ఓపియం 2 డ్రాములు, అనిసీడ్ 2 బౌస్సులు గంజిసేరు కలిపి ఈయవలెను.

నోటిప్రండ్లు:— పొటాష్ క్లోరైడ్ $\frac{1}{2}$ బౌస్సు లేనిగాని, బెల్లముగాని తగినంత నోటికి రాయవలెను. లేక పొటాషియం పర్మాంగనేట్ లోషనుగాని అలంలోషన్ గాని అప్పుడప్పుడు నోటికి కడుగుచుండవలెను.

పెద్దరోగమునకు టీకాలు

గవర్నమెంటు వారిచే ఈ వ్యాధికి కనిపెట్టబడిన టీకాలను ఈ వ్యాధి మంచి పశువులకు రావండి టీకాలు వేయించుట మంచిదని నా ముఖ్యసలహా. కాని అన్ని ప్రాంతములందును ఒకేపర్యాయము ఈ వ్యాధి వచ్చినపుడు మఱు తాత్కాలికముగా దొరకక ఏ నెలకో వచ్చువలన రైతులకు పశువులకు కష్టముగానున్నది. గాన గవర్నమెంటువారు అన్ని ప్రాంతములకు అందుబాటుగా నుండునట్లు ఆయుర్వేద పశువైద్య డాక్టర్లకూడ ఛాన్సుయిప్పించి ఈ రోగనివారణకు వూనుకొందురుగాక.

దొమ్మరోగము (Anthrax)



దొమ్మ

సీ॥ పసరంబు గజగజన్ వణకి పోవుచునుండు
 కన్నీరుగార్చుచు కానుపించు
 నల్లకప్పనుగప్పి యుల్లాసము దొలంగి
 చెవులకు నిసుమంత చేవదప్పు
 ముక్కురంధ్రములలో నక్కిన చెమ్మంత
 మంట తగిలినట్టు మాయమాను
 కఫము బైటకుతన్న కడుపుబ్బరమునొంది
 నాల్కజాతివిడచి నగిలిపారు
 కంఠమందువాపు కడువేగ మొందంగ
 నాసనంబునుండి యమితగతిని
 నెత్తురెల్లవిడచి నుత్తలపడిచాన
 దొమ్మరోగమండ్రు దొడ్డవారు ॥

స్వభావము - వ్యాపకము

రైతులలో చాలామంది ఈ వ్యాధిగ్రస్తయమై సరిగా తెలిసికొనజాలరు. దొమ్మ రోగమునుగూర్చి అనేకమంది అనేకోరులుగా పేల్లుపెట్టి పశువులను వివిధ చిట్నాలు చేయుదురు. పశువులకు సుభవిందు రోగములన్నిటిలో దొమ్మ మిగుల హానికరమైనది. ఇది ఒక జంతువునుండి మరొక జంతువునకుసోప రోగమైయున్నది. ఎంతో ఆశుభవ

ఇనుక నేలను బాగుపడినవాడు బంక నేలను చెడినవాడు లేడు.

మున్నగాని ఈ వ్యాధిని కనిపెట్టజాలదు. పెద్దోగము తగిలిన పశువువలె ఎక్కువ కాలముండక గంటలప్రకారము చనిపోవును. అందుచేత రైతులు ఆకుగతపకుచుందురు. పెద్దోగమంత తీవ్రముగా అన్ని పశువులకు సోకదు. ఈ వ్యాధిని కలిగించు నూక్కు జీవులు మట్టిలోకలిసి పదిసంవత్సరములవరకు జీవిించియుండును. ఈ నూక్కుజీవుల గ్రుడ్లను సీలుచేసిన గొట్టములోపెట్టి కాపాడగా 22 సంవత్సరములవరకు బ్రతికినవని లూయిస్ ఫాస్టర్ దొరగారు తెలిపిరి. పల్లపునేలలోనుండు గడ్డివేళ్లను ఈ నూక్కుజీవుల అంటుకొనియుండి పశువు మేయునపుడు ఆగడ్డితోగూడ శరీరములోనికి ప్రవేశించిన తరువాత ఈ వ్యాధిసోకను. ఎట్టలు విశేషముగానుండు నేలలో ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా నుండును. ఈ బాధ్యపు విషాంకురములు మనుష్యులకుండు గాయములగుండ ప్రవేశించిన రాచపుండ్లు, చెడుప్రణాములు కలిగించును. ఈ వ్యాధిగల పశువును చికిత్సించు వైద్యుడు చాలా పరిశుద్ధముగానుండి జాగ్రత్తగా చికిత్స చేయవలెను.


చచ్చిన జంతువులను కాల్చక, పాతిపెట్టకపోవుటచేతను, ప్రవహించు కాలువల లోను, నదులలోను కళేబరములకు పారవేయుటచేతను, ఈ వ్యాధిచే బాధపడు పశువు దగ్గరనున్న మలమాత్రాదులు మున్నగునవి బాగుచేయక అచ్చటనే యుంచుటచేతను, ఈ రోగపశువు నెత్తురుమీదను, తదితర సానములందును ఈగలువ్రాలి అవి మంచి పశువుల పుండ్లమీదను గాయములమీదను ప్రాలుటచేతను ఈ వ్యాధి ఎక్కువగును. చూడి పశువులకు ఈ వ్యాధి తగిలినను, లోపలిసిండుమునకు మాత్రము తగలదనియు, అచ్చట విషజీవులను చంపు పదార్థముగట్టిగలదని పశుశాస్త్రజ్ఞులు తెలిసియుండిరి. ఈ వ్యాధి పశువులకు, గుట్టములకు, గాడిదలకు, మేకలకు, పంజులకు సోకదు. దొమ్మిరోగముచే చనిపోయిన పశువు చర్మములద్వారా, కంబళ్లద్వారా, ఎరువులద్వారా ఈ వ్యాధి రావచ్చును. వికోనా, ఇండియా, సౌత్ ఆఫ్రికా, ఆర్జంటయినా దేశములలో ఈ వ్యాధి తగిలి చాలా పశువులు మరణించినవి. ఈ వ్యాధి తగిలిన పశువులలో నూటికి 90 వరకు చనిపోవును. 1845 లో అయివెర్బుదొర ఈ వ్యాధిని కనుగొనెను. ఈ నూక్కుజీవి 1.5 నుంచి 4.0 పాడవు, 1.0 నుంచి 1.5 చెడల్పుగలిగి గొలుసు ఆకారముగా నుండును.

లక్షణములు

పశువు ఆరోగ్యముగ నుండినట్లేముండి ఆకస్మాత్తుగా చనిపోవుటయు గలదు. అటుగాక లక్షణములు కనపడినయెడల జంతువునకు తీవ్రమైన జ్వరము (103, 107 డిగ్రీల వేడిమి) యుండును. పశువు గజగజమానును. కన్నులనుండి నీరు గాగ్గురు దీనముగా చూపుచుండును. కన్ను ముక్కు నోరు మున్నగువానిలోపలి చర్మపు పొరలు ఎక్కువగా కందియుండును. నాడి తీవ్రముగా కొట్టుకొనుచుండును. కన్నులు, ముక్కు, కొమ్ములు, పాదములు చల్లగానుండును. నలకప్పువేయును. కాళ్లు గునులుపట్టి నిలువ లేక తూలుచుండును. చెవులను వ్రేలాడవేయును. ముక్కుల నుండు చెవులుముండును.

కనుచేసి చెడలేదు ; చెడ్డచేసి బ్రతుకలేదు.

అయాసమెక్కువగానుండును. నోటినుండి నీరు కొద్దికొద్దిగా పడుచుండును. లోప లీకభయ బైటకు తన్నుచుండుట చేత నాలుకను బారవిడచును. కడుపుబ్బను, నెత్తురు విరేచనములు కొద్దికొద్దిగా నగును. క్రమేపి తూలుచు కండ్లలో నిస్సక్తువ యేర్పడి క్రింద బడి మరణించును. ఈ వ్యాధి 24 గంటలనుంచి 48 గంటల వరకు యుండవచ్చును. లేక ఈ లోపుగానే చచ్చుటయుగలదు.



ఈరీతిగా మూతివూద మూడుగీతలు, ముచ్చినగుంటలో ఒకచుక్క,
తోకమట్టక్రింద ఒకగీత పెట్టవలెను.

ఆయుర్వేద చికిత్స

ఆరంభములోనే ఈ వ్యాధిని కనగొనిన మాడు ద్రాముల సారాయని పెట్ట వలెను. లేక సేరుపిటిలో రెండుగుప్పెళ్ళు ఎండుమిరెపకాయలువేసి సలసల కాగనిచ్చి పిసికి, వడపాసి కాఫీ త్రాగునంత వేడితో నున్నపుడు త్రాగించవలెను.

లేక మద్దకర్పూరం అరతులం, మంచిబెల్లం 10 తులములు, కొట్టుపసుపు 1 తులము మెత్తగానూరి మద్దచేసి ములగచెక్కరసముతో పరుచుచేసి పెట్టుము.

లేక సాంటి 3 తులములు, పిప్పళ్ళు మిరియములు 6 తులములు, కరక్కాయలు 3 తులములు, ఉసరికపప్పు 2 తులములు, కొట్టుపసుపు 3 తులములు, కలిపి మెత్తగా నూరి సేరు చింతపండు పులుసుతోగాని, సేరున్నరబియ్యపు కలితోగాని ఒక్కమోతాదే ఈయవలెను. లేక వెల్లలిపాయలు 10 తులములు, పసుపు 3 తు, ఉప్పు 10 తు, తెల్ల తున్నచెక్కరసము సేరు, మేఃమూత్రము అరసేరు కలిపి, కాచి పెట్టవలెను. ఈ రీతిగా 6 గంటల కొక పర్యాయము చేయవలెను.

బుడిదున్ని మహారాజైనవాడు చేసుదున్ని చెడినవాడు లేడు.

లేక సాంటి, పిప్పర్లు, మిరియాలు ఒక్కొక్కటి 4 తులములున్న, దిరిసెనాకు పసరు నీరు, మేక పంచితము అర్థ నీరు, కలిసి రెండుగొట్టముల వంతున మూడుసార్లు ఈయవలెను.

లేక నల్లఉలవలను వేయించి నరమూత్రముతో పెట్టిన తగ్గును.

పథ్యము:— వ్యాధితగ్గువరకు నీరు ఆహారముపెట్టరాదు. వ్యాధితగ్గిన నాలుగు దినముల వరకు కాచిననీరు, కొర్రజావ, వగైరా పెట్టవచ్చును.

మిడిదొమ్మ

దీనినే గుండెదొమ్మ, తరుగుడుదొమ్మయని చెప్పుదురు.

స్వభావము - వ్యాపకము

గ్రామములలో పశువైద్యము చేయువారు ఈ దొమ్మలను వివిధ రకములుగా చేరు పెట్టి చికిత్సచేయుదురు. ఇప్పటి కాలపరిస్థితులనుబట్టి సాధారణముగావచ్చు దొమ్మలనే ఈ చింతామణిలో ప్రకటించితిని. ప్రతిలక్షణమునకు వివిధదొమ్మలచేరు పెట్టుట పొర పాటు. మన ఆయుర్వేద పశువైద్యములో దశరథ మహారాజుకాలములో “శశుపాల కాప్య” యను ఘన పశువైద్యుడొకడు గలడు. ఆతని వైద్యములోనూడ దొమ్మలనుగూర్చి కొద్దిగా పరిణించెను. ఈ చింతామణిలో తెలిసిన రోగలక్షణములలో నున్నవేగాక పశు వులయొక్క తత్వములనుబట్టి, ఆయా కాలపరిస్థితులనుబట్టి ఇంకను కొద్దిగా మార్పులు కలుగవచ్చునుగాన వైద్యుడు పశువుయొక్క తత్వమునుబట్టి రోగనిదానము గ్రహించి చికిత్సచేయుట మంచిదిగాని ఈ చింతామణిలో లక్షణాలన్ని లేవేయని అనుమానించ రాదు.

జీర్ణకోశము తగినంత పనిచేయకపోవుటచేతను, రక్తహీనతవలనను, ఆజీర్ణవలనను, ఎక్కువగా ఎండలో పనిచేయుచుండుటవలనను, గుండె ఆదురుటవలనను ఈవ్యాధి వచ్చును. లేదా ఒకటి రెండు దినములకు తరువాత తీక్షణముగు గుణములుపుట్టి మృతి నొందును. చక్కగా కండబట్టి బలిసియుండు గిత్తలకు, కొండెమాడలకు తరచుగా ఈ వ్యాధిసోకును. ఈవ్యాధి తగిలిన పశువు బ్రతుకుట చాలాకష్టము. అందువలననే మిడి దొమ్మయని పేరువచ్చినది.

లక్షణములు

ఆరంభములో మందమతిగానుండుచు అరమేత చేయుచుండును. ముఖ్యముగా నల్లకప్పవేయును. జ్వరమునూడ తీవ్రముగానుండును. గుండె చెడిపోవును. ముక్కు రంధ్రముల పైభాగమున వాపుపుట్టి క్రమముగా పెద్దదగును. మెడటిలోనికి నెత్తురు విశేషించి పోవుచుండును. వాపు పెద్దదయినకొలది ఊపిరిపీల్చుట కష్టముగానుండును.

తలకట్టు అంటావుంటే ఎలాటి కొద్దైనా పెట్టవచ్చును.

చొంగ ముక్కులనుండి నోటినుండి ఎక్కువగా పడుచుండును. ఒక విధమగు గురక పుట్టును. కండ్లవారును. పశువు దీనముగాచూచుచు కన్నీరు కార్చుచుండును. చనిపోవు ముందు వెట్టిచూపు చూచును. నడుముమీద నొక్కిన త్రుంగును. కొన్ని రక్తమూత్రము పోయును. మరికొన్ని పారుకొనును. వాపుగురక ఎక్కువై మరణించును.

చచ్చిపోయినతరువాత లక్షణములు

నోరు దుర్వాసనగానుండును. నాలుక లావుపారును. వాపు బురబురలాడు చుండును. కండ్లనుండి నీరుగారుచుండును. మూతిమీద వాపుకొని చూడగా పసుపురంగు గల ద్రవము కనపడును. ఈ ద్రవము విషపురుగులతో కూడుకొని యుండును. గుండె ఎరుపుగా కందియుండును. పేగులను చీల్చిచూడగా నీలిరంగుగా నుండును.

చికిత్స

అంగ్లయవైద్యులు దొమ్మిలోగమననది ఒక్కటియేతప్ప తదితర దొమ్మలులేవని వారి యభిప్రాయము. మన ఆయుర్వేద సిద్ధాంతరీతిగా వివిధరకములగులవని మన గ్రంథ కర్తలు తెలుపుచున్నారు. చాలమంది వైద్యులు రక్తసంబంధమగు వ్యాధులన్నిటిని దొమ్మని చెప్పుదురు. ఏయే దొమ్మ ఏయే లక్షణములతో నుండునో లోగనిదానము గ్రహించి చికిత్సలు చేయుదురుగాక. ఏనొకవ్యాధి తగ్గకనే అన్ని దొమ్మలను తగ్గించ గలవని డాంబిక వైద్యములు చేయునా రచ్చటచ్చట నున్నారు. ఇట్టివారిమీద తగు చర్య తీసికొనెదరుగాక.

ఈ మిడిదొమ్మకు ముఖ్యమగుగుర్తు మూతిమీద వాపే యైయున్నది. తరువాత ఈ వ్యాధి ముసలి పశువునకు వచ్చినదా? లేక యుక్తవయస్సులో నున్నదానికి వచ్చినదా? ఆలక్షణములెట్లున్నవి? ఎంతకాలములో మరణించును? ఏయే మందులు ఆలక్షణములకు వాడవలెను? ఏమైనా ఆవాపుమీదగాని తదితర అవయవముల మీద గాని కాలివలెనా? కాల్చేపొముట్టు? ఎంతకాలముపట్టును? ఈ వ్యాధి ఎంతకాల ముండును? దగ్గరలో ఈవ్యాధికి సంబంధించిన మందులేమియున్నవి. మున్నగు విష యములన్నియు పరీక్షించి చికిత్స చేయవలెను. పశువ్యాధి ముదిరిపోయి చివరలక్షణము లున్నపుడు కాలివద్దు. ఏ చికిత్సయు చేయబండుటమంచిది. ఈ వ్యాధిలో వాతలు వేయుట అవసరమని తోచిన, దొమ్మవ్యాధుల ఫోటోలో చూపించిన రీతిగా కీరెరిగి వాతలు పెట్టుటమంచిది.

వాపుపుట్టకపూర్వమే నాలుగుద్రాముల సారాయిలో 1 తులము ముద్దకర్పూ రము, 2½ తులముల పిప్పళ్ల చూర్ణము కలిపి ఒక్క మోతాదే యియవలెను.

లేక వెల్లులిసాయలు 10 తులములు, పసుపు 3 తు, ఉప్పు చేరెడు, కరిఘాపము 2 తు, ములగచెక్క రసము అరళేరు మేకపంచితము నేరు కలిపి ఒక్కపర్యాయమే త్రాగించవలెను.

లేక నేరు ఆవుపాలలోగాని, నేరు గోమూత్రములోగాని 4 తులముల వసపాడి కలిపి 'కాచి కాఫీ'త్రాగునంత వేడితో నున్నపుడు త్రాగించవలెను. గుటకవేయ నపుడు లాభములేదని గ్రహించవలెను.

లేక సాంటి 2 తు, మిరియాలు 1 తు, పిప్పర్లు 1 తు, ఆవాలు 1 తు, వెలులి రసము 3 తు, మలగచెక్కరసం పావునేరు, పసుపు 2 తు, ఎఱుమిర్చిపాడి 2 తు, తీసికొని మెత్తగానూరి నేరున్నర గోరువెచ్చని టిటిలో కలిపి ఒక్కమోతాదే ఈయ వలెను.

లేక మూడు గుప్పెట్లు ఎండుమిరెప కాయలు, గుప్పెడు వరంజీవాము లేక వాము, తులముసాంటి మెత్తగానూరి రెండున్నెల్ల టిటిలోకలిపి కాచి గోరువెచ్చగా నున్నపుడు త్రాగించవలెను.

షరా:— ఒక్కొక్కవ్యాధికి ఇన్ని చికిత్స లెందులకాయని అనుమానపడు వారున్నార. పల్లెగ్రామములో అన్ని వ్యాధుల వస్తువులు అందుబాటులో నుండుటకవ్వను. అందుచేత మీకు ఏవస్తువు దొరపనో దానినే తెచ్చి చికిత్స చేయుదురుగాక. ఈ వ్యాధి తగ్గిన తరువాత రెండులేక వాలుగుదిసములవరకు కాచిననీరు, కొర్రగంజ పెట్టినతరువాత అనుభవముమీద అనుపానములు వాడవలెను. మూతిమీద వాపునవ మాత్రము నూరే కారము 2 తు, అముతము 10 తు, కర్పూరం 1 తు, పుగావపాడి 1 తు. నూరి పట్టుచేయ వచ్చును.

నెరడు దొమ్మ

ఈ వ్యాధి పాటుపడు పశువులకు తరచుగా వచ్చుచుండును. పశువు జేహములో నెరడుగుండె గలదని శరీరశాస్త్రములో తెలుపబడెను. పశువునకు మత్తు పదార్థములను పెట్టుటచేతను, ఎదయనక వానయనక పశువుకు విరామములేక పనిచేయించుటచేతను, ప్రతిదినము చలిగాలిలో, వర్షములో కట్టుటచేతను, మలపదార్థములు జేగులలో చిక్కుకొనుట చేతను, పశువు ఎల్లప్పుడు దీర్ఘశ్వాసను తీసికొనుటచేతను, చాలాకాలమునుంచి నిలువయున్న గడ్డి, దాణాదినులు తినుటచేతను ఈ వ్యాధి వచ్చును. ఈ వ్యాధి 24 గంటలనుంచి 7, 10, 30 దినములపొడుగును.

లక్షణములు

పశువు శరీరము ఒక విధమగు మెరుపురంగుగానుండును. ఆప్పుడప్పుడు నల్లకప్పు వేయును. నెరడుగుండెలో చెనునీరుజేరి వాపుగానుండును. వ్యాధి మదిరినకొలది అరమేతమేయును. నీరు తృప్తికరముగా త్రాగరు. దగ్గుకూడయుండును. నెరడు వాపు హెచ్చినకొలది పశువు శుష్కించును. బరిమిముకలుబ్బును. ఎదరములు సరిగా కొట్టుకొనవు. కడుపులో ఒకవిధమగు నొప్పియుండి ఆప్పుడప్పుడు మూలుచుండును. ఇంకను

అప్పుడప్పుడు వెళ్తు విరిచుచుండును. నోటివెంట చొంగపడుచుండును. క్రతుముగా పశువు రొమ్మున కడ్డముగా ఈ వాపు విస్తరించి ఊపిరాడక చనిపోవును.

చికిత్స

ఈ వ్యాధిగల పశువును అనుభవముగల వైద్యునకు చూపించవలెను. ఈ వ్యాధికి ఆరంభమునుంచి చికిత్స చేయవలెను. జీర్ణము కలుగజేయు ఆహారమును పెట్టవలెను. చురుకుదనము, రక్తవృద్ధియును నుండులను పెట్టవలెను. చలిలోను, ఎండిలోను పశువును యుంచరాదు. బరిఎముకల నుండునను, ఎడరాలలోను కట్టుతోగాని చిరుతతోగాని కొట్టుటనుంచిది. వ్యాధి ప్రారంభమునుంచి మోడుగవువ్వు 2 తు, ఉప్పు 3 తు, జొన్న కడుగు నేరు కలిపి మెత్తగారుబ్బి దినమున కొక మోతాదువంతున పక్షము దినములు పెట్టవలెను. లేక దిరిసెనెక్కొరసము నేరు, నేలవేముపాడి 3 తు, తుకవేపాకు గుప్పెడు, బ్రహ్మాదండివేల్ల గుప్పెడు కలిపి మెత్తగా త్రొక్కి మోడు దినములకొక మోతాదు ఇచ్చుచుండవలెను.

లేక వెదురాకు 2 గుప్పెళ్లు, నేలవేము 2 తు, సొంటి 2 తు, పిప్పలిమోడి 2 తు, దిరిసెనెక్కొరపాడి 2 తు, పిప్పళ్లు 2 తు, మిరియాలు 2 తు, వాయంటచెట్టు సమూలం తెచ్చి శుభ్రపరచి పొడిచేసి కలిపి ఒకబండలోవేసి 6 నేర్లు వీరుకలిపి సలగల కాచి వడపోసి పూటకు మూడుగొట్టుముల వంతున వారము దినములు పెట్టవలెను.

లేక దిరిసెనెక్కొరసము నేరు, ఆవుపాలు పావునేరు, మోడుగవువ్వు 2 తులములు కలిపి దినమున కొక మోతాదువంతున వారము దినములు త్రాగించవలెను.

లేక నల్లఉప్పివేరుపాట్లు, నున్నము, ఉడకబెట్టి నిమ్మకాయంతచేసి నాలుగు దినములు పెట్టవలెను. ఇంకను వివిధరకముల చికిత్సలు గలవుగాని అనుభవములోనున్న పైవాటినే వాడుడు. ఏరుకాచి దాహముగా నియవలెను. తెలికిసిండిని పెట్టవచ్చును. వాతముచేయు దాణాలను పెట్టరాదు.

నీటిదొమ్మ

ఈవ్యాధిహూడ ప్రమాదము కలిగించును. చలిగాలి ఎక్కువగా సోపటవలనను, రక్తములో జలభాగమెక్కువగా నుండుటవలనను, ప్రత్యేకముగా రక్తములోనే ఈ విషసంబంధమైన పురుగులుండుటవలనను, చాలినంత నూర్యరక్తి లేకపోవుటవలనను, పశువును ఎక్కువగా పనిచేయించుటవలనను, ఎల్లప్పుడు పశువును బాధించుటచే కలుగు మనో విచారమువలనను ఈ వ్యాధికలుగును.

లక్షణములు

ఆరంభములో పశువుకీరము సమకీతోష్ణముగానుండును. మలబద్ధకమేగ్గుడును. కీరకాంతిగ్గి పశువు నల్లకప్పు వేయును. మూత్రపురంగు తెలుపుగా నుండును. వేడి

తగ్గుచుండును. ఉచ్చాస్వసంస్కాసములయందు ఆయాస మేర్పడును. అన్ని లక్షణముల కంటే ఘృఖిముగా ఈ వ్యాధి ప్రారంభించినది లగాయతు నోటినుండి చొంగ ఎక్కువగా పడుచుండును. రక్తమంతయు పాదయి నీటిరూపముగా వెడలుటవలన నీటి దొమ్మయను పేరువచ్చినది. ఈ సమయమునందు చెవులు నేలొడవేయును. కనుగ్రంథులు బయటపడవును. ముఖకాంతి తగ్గును. స్పృశకముతప్పి వెంటనే చనిపోవును.

చికిత్స

ఈ వ్యాధి ప్రారంభమైనవెంటనే మూడు లేక నాలుగు డ్రాములసారాయిలో ఆరసేరు దుష్టుపాకు పసరుకలిపి త్రాగించుము.

లేక వెల్లలి 8 తులములు, వరంజీవాము 5 తు, కొట్టుపసుపు 2½ తు, వస 1 తు కలిపి నేరు కారపునీటిలో కలిపి త్రాగించుము.

లేక చేదుజీలకఱ్ఱ 4 తు, వేపాకు గుప్పెడు, మిరియాలు 4 తు, మప్పింటాకు 4 తులములు, పసుపు 2 తు కలిపి ఉండచేసి మలగ చెక్క రసముతో తడిసిపెట్టుము.

లేక ఇంగువ 4 తులములు తీసికొని ఆరసేరు నీటిలో నానవేసి దానిలో మేక పాలనుగాని, ఆవుపాలనుగాని కలిపి కాచి కాఫీత్రాగునంత వేడిమిలోనున్నపుడు త్రాగించుము.

లేక ఉప్పు చేరెడు, వావిలి-కుసుమ సేరు, మిరియాలు 2 తు, కలిపి త్రాగించుము. లేక తమలపాకులు రెండువందలు, ఇంగువ 3 తు, ముద్దకర్పూరము పావుతులము, తాటి ఔల్లం 8 తులములు మెత్తగాదంచి ఉండచేసి పెట్టవలెను.

లేక వాము 10 తు, కరిఘాపము 3 తు, అముదపువేళ్లరసం ఆరసేరు, కారపు పాలు నేరు కలిపి త్రాగించుము.

ఇంకను వైద్యునియొక్క అనుభవమువీడ వస్తుగుణములు తెలిసికొని రోగలక్షణములను బట్టి మార్పుకొనవచ్చును. వ్యాధి తగ్గినతరువాత కాచిన నీరు పెట్టవలెను.

చలిదొమ్మ

ఈ వ్యాధి లోలకరి వస్త్రములు ధరిసిన తరువాత పట్టినేలల యందును, బుగడ నేలయ గురు ప్రభలును. దోమలు మిక్కుటముగా కలచుట చేతను, మరికీ నీరు పులిసి వాసనకొట్టు చాణాలు, కుడితిత్రాగుటచేతను, విషసంబంధముగు గాలిపీల్చుట చేతను, ఏకాగ్రము చేతనైన జీవసత్వము తగ్గుటచేతను వ్యాధిరావచ్చును.

లక్షణములు

పశువునకు ఆరంభములో 103, 107 డిగ్రీలజ్వరముండును. చలిచే వణకుచుండును. నల్లకప్పువేయును. వెన్న కాళ్లు అస్వస్థత నొందును. నాలుక తెలుపుగా

నుండును. ఎదరములు త్వరితముగా కొట్టుకొనును. చలివలన పండ్లు కొరుకునుండును. మూత్రము లిగబట్టి పోయును. కడుపుబ్బరముగా నుండును. వ్యాధిముదిరిన కొలది నోటివెంట చొంగపడుచుండును. నాలుక జారవిడచును. కఫము పెరుగును. పలుచగా పారును. క్రమేపి పశువు శుష్కించి చనిపోవును.

చి కి త్వు

మాడుద్రాముల సారాయిలో ఆర్తశేరు దుష్టుపాత పసరు త్రాగించుము.

లేక కొంటి, పిప్పళ్లు, మిరియాలు సమాన భాగాములు తీసికొని నేరు కారపు పాతలోకలిపి త్రాగించుము.

లేక గోమూత్రము ఆర్తశేరు, నరమూత్రము ఆర్తశేరు కలిపి త్రాగించుము.

లేక ఇంగువ 3 తులములు, ఆవాలు 2 తు, వెల్లులి 4 తు, పసుపు 2 తు, దుష్టు పాత గుప్పెడు, తాటిబెల్లం 8 తు, కలిపి ఉండచేసి పెట్టుము.

లేక తురాసాని వాము గుప్పెడు, నల్లశుప్ప 3 తులములు, వెల్లులి 8 తు, నేల శేమ 3 తు, త్రిఫలములు 6 తు, ఎడుమిర్చి గుప్పెడు కలిపిత్రొక్కి 2 నేర్ల నీటిలో తేసి కాచి వడపోసి గోరువెచ్చువి త్రాగించుము.

లేక కరక్కాయలు, ఉసరికపప్పు, సాంటి, పిప్పళ్లు, మిరియాలు ఒక్కొక్కటి 4 తులముల వంతున పొడిచేసి గోదే శేడ రసములో కలిపి కాచి వడపోసి త్రాగించుము.

ఈ రీతిగా అనుభవముచూడ ద్రవ్యజ్ఞానమును గ్రహించి దగిన ఆచుపానములతో ఈ రువచ్చును.

నాలిదొమ్మ

ఈ వ్యాధి కూడ ప్రమాదకరమైనది. పశువు బాగుగా నున్నట్లేముండి చివర దశలో దుష్టుములుపుట్టి ప్రమాదము కలిగించును. పశువు నాలిగానుండుటవలన నే నాలిదొమ్మయి పేరువచ్చింది. ఇది పది, పదునైదు శోబితవరకు యుండును. పశువు నవ చలిగాలి తరచుగా తిగులుట వలనను, విపరీతముగా తేవును కృత్రిమ పదార్థములు మేసి పరిచేయించుపోవుట వలనను, మలబద్ధకముండుట వలనను ఈ వ్యాధి కలుగును.

లక్షణములు

ప్రారంభములో తీవ్రముగా జ్వరముండును. దగు తక్కువగానుండును. మూత్రము పసుపురంగుగా పోయును. నల్లకప్పువేయును. నోరు వాసవగానుండును. నోటినుండి ముక్కులనుండి చీమిడివంటి పదార్థము పడుచుండును. పశువు మందముతిగా నుండి వ్యాధి ముదిరినకొలది తలనూపుచుండును. పొట్ట పుబ్బరముగానుండును. క్రమేపి మేత నీరు తగ్గించును. కనుగుంటలు విడచును. వ్యాధి ముదిరినకొలది మలము దుర్వాస

కథా మదిదాని కటారి పోటుకంటే మెదటి మడివాని ఏనుపోటు మేలు.

నగానుండి రంగుమారును. పండ్లకొరుపుచుండును. అపానవాయువులు విడచుచుండును. కన్నులు ఎరువురంగుగానుండును. పశువు క్రమేపి శుష్కించి మరణించును.

చికిత్స

ఆరంభములోనే రోగనివాసమును గుర్తించి తాడికాయలు 3 తు, ఉసరికపప్పు 2 తు, కరిక్కాయలు 1 తు, పిప్పళ్లు 2 తు, సొంటి 2 తు, మిరియాలు 1 తు. చింతపండు నిమ్మకాయంత మెత్తగానూరి రెండు నేర్లు గేదెపేడరసములో కలిపి కాచి వడపోసి త్రాగించుము.

లేక వెల్లలి 10 తు, మునగచుక్కరసం అన్నసేరు, త్రికటుకములు 4 తు, అవాలు 4 తు, ఎండుమిర్చిపాడి 3 తు, మెత్తగానూరి నేరుకారపుపాలతో కలిపి త్రాగించుము.

లేక మోడుగవువ్వు 4 తు, జొన్నకలి నేరు కలిపి త్రాగించుము.

లేక ధనియాలు సోలెడు కుగంజీవాము గుప్పెడు, జీలకర్ర 2 తు నేలచేము 3 తు. ఉప్పుచేరెడు కలిపినూరి నేరు జొన్నకలితో పెట్టుము.

లేక మూడు ద్రాముల సారాయిని త్రాగించుము.

ఇంకను అనుభవముమీద వస్తు గుణములుమార్చిపెట్టవలెను.

దొమ్మలకు ఆంగ్లేయ చికిత్స

దొమ్మలన్నిటికి కార్బాలిస్ ఆసిడ్ $\frac{1}{4}$ తు, నూకలజావ గాని, బియ్యపుగంజిగాని నేరు కలిపి ఒక్కమోతాదే త్రాగించుము.


లేక క్రియోసోట్ $\frac{1}{2}$ తు, నూకలజావ నేరు కలిపి త్రాగించుము.

లేక ఫిసెల్ $\frac{1}{2}$ తు, వరిగంజి నేరు కలిపి త్రాగించుము.

ముఖ్యమగు సలహా

దొమ్మ రోగములను అనుపానము విషయమై జాగ్రత్తగానుండవలెను. అకస్మిక దొమ్మలను నీటిని పెట్టక లంకణములు చేయించుచు కొర్రజాప పెట్టుచుండవలెను. తదితర దొమ్మలను కాచిననీరు అర్ధగాపెట్టును క్రమేపి ఎక్కువ పెట్టుచుండవలెను. ఈ దొమ్మల విషయమై అనేకమంది అనేక రీతులుగా చికిత్సలు చేయుదురు. రోగనివాసము, వస్తు గుణములు గ్రహించి తన అనుభవముమీద వాడవచ్చును. సహజేవ పశువైద్యములోని చికిత్సలుతూడ మంచివియేగాని దానిలోనున్న మూలికలపేర్లు మోతాదులు, రోగముల పేర్లు తెలియక చాలామంది బాధపడుచున్నారు. కాబట్టి విశిష్టతరగు తెలియునో అంతవరకే చికిత్స చేయవలెను. గాని అయినదానికి కాని దానికి చికిత్సచేసి నోరులేని పశువులను చంపవద్దు.

గాలికుంటు (Foot and Mouth Disease)



దీనినే కాలుకుంటు, గాలిగాళ్లు, నోటిగాళ్లు, కాలినోటిగాళ్లు వివిధరకములుగా పిలుచుచుందురు.

అ॥ వె॥ కాలిగాళ్లొదవగ కడు బొబ్బలుండగా
కాకతగ్గి పశువు కప్పవడును
గిట్టిలిందు వుండు గట్టివై పెరగుచు
పురుగులుండ మరియు ఖరములూడు

కం॥ నోటికి గాళ్లు పసికిని
నోటిని ముక్కునను నాలుగునుడును బబ్బల్
చీటికి మాటికి నట్టల
బీటులు వారియు మరింత వెతగలిగించున్॥

గీ॥ తమిద సంకటిలో తిలతైలమునిచి
గొట్టములు మూడుపూటకు బెట్టుచున్న
పుండ్రకును నుల్లతైలమ్ము బూసిరేని
గాలికుంటులు మాను నిక్కముగ॥

కం॥ నీరులియు జొన్నన్నము
సారంబగు పెసరపప్పు త్వాతలిపసుపున్
కూరిమి పిసికి బెట్టిన
ఘోరంబగు గాలికుంటు గుదరగజేయున్॥

స్వభావము-వ్యాపకము

ఇది తీవ్రమైన అంటువ్యాధి. ఈ రోగము దేశమునందంతట ఆప్పుడప్పుడు కీతోష్ణసితి గతులనుబట్టి వ్యాపించుచుండును. రైతులకు మంచిపనుల కాలములో ఈ వ్యాధి వచ్చినపుడు వారు పడు ఆతురత ఇంతయుని చెప్పనలవికాదు. ఈ వ్యాధి పండులకు గొట్టెలకు మేకలకుకూడ వచ్చును. ఇది బహువేగముగా వ్యాపించెడిరోగము. 1764 వ సంవత్సరములో నార్వేజీలోను 1887 నుంచి 1897 వరకు యూరప్ లోను, ఆచ్చటనుంచి రష్యాకు వ్యాపించెను. 1919 లో అన్ని ప్రాంతములందును వ్యాపించెను. మన హిందూదేశమునకంటె విదేశములో ఈ వ్యాధి సోకిన పశువులనుగూర్చి తగిన చికిత్సల కొరకు ఆతురతపడుచుండురు. ఆచ్చట కీతోష్ణసితిగతుల ననుగరించి చాలా పశువులు మరణించును. ఈ మధ్య బెంగళూరు కంటోన్మెంటును మిగుల ఖరీదుగల ఆవులను విదేశమునుంచి తెప్పించుచుండగా గాలిపంటు తగిలి వెంటనే మరణించినవి. మన కీతోష్ణసితిగతులు సరిపడక అతి ఉష్ణము వలన మరణించినవని ఒక వెటరినరీ ప్రతీక తెలిపినది. అందుచేతనే ఇంగ్లీషువారి పశువైద్యమునకు మనదేశములోని పశువైద్యము నకు వ్యత్యాసములు చాలాగలవని నాయభిప్రాయము. మన మూలికలంతవని ఇంగ్లీషు మందులు సరిగాచేయును. తాత్కాలికచికిత్సను మాత్రము పనిచేయును.

ఈ గాలిపంటును కలిగించు నూత్నజీవులు పశువు రక్తములోను బొబ్బలయందును ఉండును. ముఖ్యముగా ఒక జంతువు నుండి మరొక జంతువునకు సోకును. ఈజాడ్య సంబంధముగు విషము, మేత, నీరు, గాలిమూలమున దేహములో ప్రవేశించి నాలుగు దినములు దాగియుండి ఆయిదు లేక ఆరవనాడు బయట పులుకును. ఒకసారి రోగము దగిలిన తరువాత లొమ్మిదిసెలవరకు ఈ వ్యాధి రాజాలదు. ఒకవేళ వచ్చినను తేలికగా తగులును. ఈ వ్యాధి కొన్నిటికి నోటికిని, మరికొన్నిటికి పాదములకును రావచ్చును.

లేదా నోటికి ముందుసోకి పాదములకు తరువాత రావచ్చును. ఈ వ్యాధి పశువును చంపకపోయినను రైతుయొక్క పనికి అడ్డువచ్చును. కొండప్రదేశములలోనుండు పశువులకు ఎక్కువగా సోకును. ఇంకను పశువులకొట్టములు, రైలువాగులు, గాడి తోట్లు మున్నగునవికూడ ఈ వ్యాధి వ్యాపింపజేయుటకు ఆధారములైయున్నవి. గొట్టె పిల్లలకు, కుక్కలకు, పండులకు, దూడలకు కూడ తమతల్లల పాలనుంచి వచ్చును. కోళ్ళకు, గుడ్డములకు, దుప్పలకు, ఒంటెలకు సోకును. మేత నీరు గాలిమూలము నను, రోగపశువుదగర పనిచేయు పరిచారముల మూలమునను, పాలుపితికెడు వారి మూలమునను, కుక్కలు, పిల్లలు, ఎలుకలు, పక్షులు ఈ పశువులను మూలము నను, రోగపశువులను సంతలకు, కిసాయిశుకాణములకు తోలుకొని వచ్చుట మూలము నను ఈ వ్యాధి వ్యాపించుచున్నది. ఈ వ్యాధిని కలిగించు నూత్నజీవి 15 మైళ్ల విస్తీర్ణమువరకు పోగలదని శాస్త్రజ్ఞులు తెలుపుచున్నారు.

తొలకరిని చెరువునండినా తొలిమారి కొడుకువుట్టి నా లాభం.

లక్షణములు

పశువునకు ఆరంభములో 106, 107 డిగ్రీలజ్వరముండును. నల్లకప్పువేయును. మూతి చెమ్మలేకయుండును. నోటినుండి చిక్కని చొంగపడుచుండును. కాళ్ళు చెవులు వేడిగానుండును. ఆరమేతమేయును. కొద్ది మలబద్ధకముండును. పెదవులతో చప్పరించును. నోటిలోని చర్మము పొర ఎరుపుగా కనియుండును. నాలుకమీదను నోటిలోపలను, పేగులలోను, నాలుగ పొట్టలోను, దవ్వుడలలోపలిభాగమందును గిట్టల సందునను, కండ్లలోను, కొమ్ములలోను, పొడిపశువు పొడుగుమీదను చిన్నచిన్న బొబ్బలు కనపడును. ఇవి కదిగిజలంత పరిమాణముగలవై చిలికి రసికొడును. కాళ్ళదెక్కానుభ్య ఈవుండు రెండుమూడు కలిసి అల్లకట్టుకొనును. వీటినిశుభ్రముచేయ నిచోపురుగులుపడిదుర్వాసనవేసి దెక్కాలాడిపోవును. ఈవ్యాధితగిలిన పశువును ఎండలో నుంచిన కనిమిరి తగులును. కొమ్ములను శుభ్రము చేయనిచో కొమ్ములాడిపోవును. పొడిపశువులకు ఈ వుండ్లు లేదుటవలన పాలు తగ్గును. కండ్లను నోటిని తదితర ఆవయవములమీద లేచెడి వుండ్ల విషయమై సరిగాచూడనిచో ఆచ్చట పురుగులుపడి పశువును బాధించును.

చికిత్స

బాధ్యమును తగిలిన పశువును ఎండలోనుంచరాదు. ఈవ్యాధికికూడ సంరక్షణలేమముఖ్యమగు చికిత్స. ఈవ్యాధిసోకిన పశువులను, వాని కుట్టుప్రక్కలనుండు ప్రదేశములను శుభ్రపరచవలయును. పశువులకొట్టములు పరిశుభ్రముగా నుండుటకు పేడకలిపిన నీటినిగాని మన్నపునీటినిగాని జలుచుండవలయును. పాలిచ్చుపశువులను, లేగచూడలను బలహీనమగు పశువులను బాగ్రత్తగాచూచి తగిన సంరక్షణ చికిత్స చేయుచుండవలెను. పొడి పశువులకు తగిలినతరువాత చూడలను పాలుబడుపరాదు. అటుకుడిసిన అవి మరణమునకు సంప్రాప్తమగును. ఈ వ్యాధి తగిలిన పశువును బురదలో దింపరాదు. వుండ్లకు మట్టిని చప్పుడను కొట్టరాదు. ఇట్లుచేయుట వలన దెక్కలు కాటుకవేసి చాలాకాలము కుంటుగా నేర్పడి పశువును బాధించును.

ఆరంభములోనే నూరేకారము 2 తులములు, వేడిబిరు నేరు కలిపి త్రాగించిన జ్వరముతగ్గి వుండ్లు లేలికపడి బాధతగ్గును.

లేక యూకలిప్టస్ ఆయిల్ $\frac{1}{2}$ తు, వేడిబిరు నేరు కలిపి త్రాగించుము.

లేక ఉప్పుకీతు, నేలవేము 2 $\frac{1}{2}$ తు, మంచిబెల్ల సవాసేరు కలిపి నూరి నాకించుము.

లేక పెసరుపప్పు అర్థకేరు, పేలసిగిడిసోలెడు, మంచినూనె సవాసేరు కలిపి పెట్టుము.

లేక తమిదేబావ అర్థకేరు, మంచినూనె సవాసేరు కలిపి త్రాగించుము.

నక్కరి మరవలుపారిలే కుక్కలు కూడుపల్లవు.

లేక నీరుల్లిపాములు 10 తులములు, జోన్న అన్నము కేరు, పెనరపప్పు అరసోలెడు, పసుపు 2 తు. కలిపి పెట్టును.

ఇంకను రైతు అనుభవములోనున్న వాటిని వాడవచ్చును.

పుండ్లకు చికిత్స

కవిరిపొడినిగాని మాచికాయ పొడినిగాని పటికపొడినిగాని తుమ్మచెక్క లేక వేపచెక్కవేసి కాచిన చిక్కని కషాయమునుగాని తీసికొని రెండుమూడు నేర్ల ఓటిలో కలిపి నోటిపుండ్లకు అప్పుడప్పుడు పుక్కిలింపు జేయించిన గారపట్టును. ఇంతియే గావండ తుమ్మచెక్క కషాయమును ప్రతిరోజు కాలిపుండ్లు, తదితరపుండ్లు కడుగుట కపయోగించుట మంచిది. కాళ్ళకు గాలిగుంటు తగిలిన వెంటనే మిగడలో తగినంత పసుపు కలిపి అప్పుడప్పుడు డెక్కెల భాగములకు రాసివచో పుండ్లు అంతగా పడక త్వరగా మానును. లేక ఓలిమందును కొబ్బరినూనెలో కలిపిగాని, నవాసాగరమును ఓటిలో కలిపిగాని, గానుగనూనెగాని రాసిన తగును. ఈ రీతిగా వస్తుగుణములను తెలిసికొని అనుభవముమీద వాడవచ్చును.

పురుగులుపడి పశువు బాళపడుచున్నపుడు మాత్రము ఫిన్వెల్ ను కొన్ని చుక్కలు వేసి కట్టుకట్టిన పురుగులు చచ్చును. సాధారణముగా రైతులలో చాలమంది పురుగులు లేని పుండ్లవలెగాడ గాయముమానునని ఓస్తారముగా పోయిదురు. అటుపోయుట వలన పశువునకు జ్వరము ఎక్కువై పుండుపెద్దదై పశువు శుష్కించును గాన జాగ్రత్తగా వాడవలెను. లేక సీతాఫలపులవ, మన్నము, పుగాకుపొడి మెత్తగానూరి పురుగులున్న పుండుకు పట్టించిన పురుగులుచచ్చును. లేక బారిజపాకు పగరు గుప్పెడు, ఉప్పు 2 తు, మిరియాలు 1 తు మెత్తగా పాలతోనూరి పట్టించును. లేక పొగాకు, కరిఘాపము, పొట్టాకు, రాతినున్నము, సారాకు తగినంత తీసికొని మెత్తగానూరి పట్టించును. లేక వనపొడిని పట్టించును.

అంగ్లేయ చికిత్స

పొటాష్ నైట్రేట్ 2 తు, కామన్ సాల్టు 2 తు, చెర్రీటా 1 తు, కలిపి నూకల గంజిలోగాని మంచిబెల్లపు నీటిలోగాని ఒకటిరెండు మోతాదు లీయుము.

లేక యూకలిప్టస్ ఆయిల్ $\frac{1}{2}$ తు, వేడినీరు సేరు కలిపిత్రాగించవలెను.

లేక పొటాష్ నైట్రేట్ 2 తు, మాగ్నెషియం $\frac{1}{4}$ పాసు వేడినీరు సేరు కలిపి త్రాగించును.

అలంలోషనుగాని పొటాషియం పర్మాంగనేట్ లోషనుగాని నోటిపుండ్లకు కాళ్ళపుండ్లకు అప్పుడప్పుడు కడుగుచుండవలెను.

పెద్ద యింటి బోట్ట అయినా కావలెను, పెద్ద చెరువు నీరు అయినా కావలెను.

శక పాటాన్‌కోరెస్‌ను తగినంత తేనెతోగాని బెల్లముతోగాని నోటిపుండ్లకు రాయవలెను. కాలిపుండ్లకు కాపర్ సల్ఫేటు లోషనునుగాని ఫిన్‌లో లోషనునుగాని జింక్‌కోరీడ్ లోషనునుగాని రాయవలెను. ఈగలబాధ ఎక్కువగానున్న వేపనూనెను గాని కిరసనాయిల్ కొబ్బరినూనె కలిపిగాని రాయవలెను.

పుండ్లకు జింక్‌ఆక్సైడ్ 2భాగములు, బోరిక్ ఆసిడ్ 1భాగము, అయిడోఫారం 2½ భాగము కొబ్బరినూనెగాని వ్యానులైనుగాని 8 భాగములు కలిపి పట్టించవలెను. ఇంకను పుండ్లకు టింక్చర్ ఆయోడిన్ గాని టింక్చర్ బెంజాయిన్‌నుగాని కార్బాలిక్ ఆయిల్‌నుగాని వాడవచ్చును.

పథ్యము—హెచ్చరిక

పాలిచ్చెడి పశువులు ఎండిపోవును. చూడి పశువులు ఈడకొనిపోవును. దుక్కి బెద్దులు డెక్కలు పాడగును. పగర్పు పుట్టును గాన ఆరంభములోనే జాగ్రత్తగా చికిత్స పోషణ చేయవలెను. మనుష్యుల శరీరముమీద నుండు గాయములకు ఈపశువు చొంగ తగిలినను, ఈ వ్యాధి తగిలిన పాడిపశువుల పాలు త్రాగినను, చంటిస్థిలలకు త్రాగించినను, ఈ వ్యాధి కలుగునుగాన జాగ్రత్తగా నుండవలెను. అప్పుడ్పైదు పశువుల కాలలో సాంబ్రాణిపాక వేయుటమంచిది.

అవుమజ్జిగ నేరు, మంచినూనె సవటాకు, అరిగి అన్నముగాని పరిబియ్యపుఅన్నము గాని అర్ధశీద కలిపి మంచినపశువులకు త్రాగించిన వ్యాధిసోకదు. జబ్బు పెన్నుదించిన రేరువారజొన్నలను వండి మంచినూనెలోకలిపి ప్రతిరోజు పెట్టిన మంచిది. దీనినే మడ్డికూడందురు.

గురక (Hemorrhagic Septicamia)

దీనినే కంఠమాద, వత్తుకవాపు, గురక గొంతుకోగము, ఎఱ్ఱదొమ్మ, దున్నెమ్మగొంతు అందురు.

ఆ॥ వె॥ మేత నీరుమాని చైతన్యముడిగియు
కన్ను ముక్కు నోరు కందియుండి
పొరలు ఎరుపులెక్కి జ్వరము సోకుచునుండు
కొన్ని పశువులందు గన్న తెలియు ॥

ఆ॥ వె॥ గంగడోలువాచి గట్టిగానుండియు
జగురు చొంగకారి చెడుగనుండు

మందుంవారమడి అయినా కౌవలెను, మాటకొరి మొగుడు అయినా కౌవలెను.

గుటక వేయలేక గురకలు నొందుచు
నాలుకానసాచి తూలిచచ్చు ||



గురక

65.

స్వభావము—వ్యాపకము

ఇది రక్తసంబంధమైంది. పశువులకు సంభవించు రోగములన్నిటిలో నీ వ్యాధి తుపాకుగుండు పంటిది. ఈ వ్యాధి కలిగిన కొన్ని గంటలలోనే మరణించును. ఈ వ్యాధి గ్రామములో వ్యాపించినదనగానే రైతులకు గుండెలు దడదడకొట్టుకొనును. గ్రామము లోనికి రాకపూర్వమే ఈ వ్యాధికి రైతుపశువు ఆహారనాళిము దగర మూడగీతలు వాతగా కౌల్పుచురు. 1886 వ సంవత్సరములో ఇటలీలో ఒరెన్టీ, ఆర్లన్ని అను పరి శోధపలు ఈ వ్యాధిని కనుగొనిరి. ఈ వ్యాధిచే నూటికి 90 వరకు మరణించును. ఇదిపూడ అంటురోగమైయున్నది. ఈ వ్యాధి దుప్పలకు పక్షులకు దున్నలకు తదితర పశువులకు సోకును. ఈ వ్యాధిని కలిగించు నూక్కుజీవి పల్లముగను, అనారోగ్యముగను లేమగను యుండునట్టి పట్టి నేలలగుండును. అట్టి నేలలో మొలచు గడిలో గాని త్రాగునీటిలో గాని యుండి తొలకరి రాగానే వ్యాపించి దున్నలకు నేడెలకు తగులును. అందుచేతనే దున్నల ప్లేగందురు. ప్రారంభములో నేడె, చున్ననూడలకువచ్చి చచ్చిపోవుచుండును. క్రమేపీ వ్యాధి వ్యాపించి నేడె, చున్న, ఎడ్లపూడ వచ్చును. ఈ వ్యాధి లోపల దాని యుండి బయటకు కనపడు అంతర్గతకాలము ఒకటి రెండు దినములని గ్రహించవలెను. నూటికి 98 దున్నల పంప ఈ వ్యాధిచే మరణించును.

లక్షణములు


పశువునకు తీవ్రముగు జ్వరము 106, 108 డిగ్రీల వరకు వచ్చును. మేతమానును. మందమతిగానుండును. కన్ను, ముక్కు, నోరు ముప్పగు కరీరావచుములలోనుండు పొరలు ఎరుపుగా కందియుండును. మూతిపొడవుగ విస్తరించును. నోటినుండి చొంగకారు

చేనుకు గట్టు ఊరికి కట్టు వుండవలెను.

కుండును. గొంతును పట్టి చూచిన వాపుగలిగి చలదనముగానుండును. ఈ వాపు క్రమేపి గొంతుక, దవునలు, గంగడోలు, మెడముందరి కొళ్లు మున్నగు భాగములందు వుట్టును. ఇంకను తలమీదను, కంటిరెప్పలమీదను, ముక్కురంధ్రములమీదను, నోటిలోపలను ఈ వాపు కనబడును. ఈ వాపులు కనబడిన ఆ యా భాగముల చర్మములోపల ఎరుపుగా కంది రక్తపు మచ్చలు కనబడును. నాలుకవారి ఎఱ్ఱబడి జిగురువంటి పదార్థము వడుచుండును. నరములు లాగుచుండును. నోరు నలుపుగానుండును. దగ్గుకూడయుండును. వాపు త్వరలోనే హెచ్చును. ఈ వాపు ముదిరినకొలది చల్లగానుండును. పశువు లేచుచు పడుకొనుచుండును. పశువునకు ఊపిరి సలుపక కఠము తిన్నుచుండును. కన్ను గుంటలు విడచును. చూచేమనిషి కే విచారకరముగానుండును. పశువులకుకూడా యిట్టి జబ్బులు భగవంతుడు సంప్రప్తిందివాడాయని రైతులు పదేపదే విచారపడుచుందురు. ఈ వాపు గొంతుకవద్ద కనబడుట వలన కంఠమాయనియు, ఊపిరాడకపోవుట వలన గురక యనియు చెప్పుదురు. ఆ గురక చాలాదూరమువరకు విసబడును. పశువు తనవీపును బాధవలన ముడుచుకొనుచుండును. పశువు పేగులు వారి కందును. నొప్పిగల దగుండును. క్యాసకోశములు చిన్నవగును. క్రమేపి వ్యాధిముదిరి అకస్మాత్తుగా మరణించును.

చికిత్స

ఈ వ్యాధి సామాన్యముగా చికిత్సకు లొంగదు. మంచి పశువులను వీనితో కలుపక శ్రుత్యేకము నుంచవలెను. నాలుక జారవిడిచి గోండ్లు పెట్టుదున్నపుడు ఆ పశువు బ్రతుకదని గ్రహించవలెను. ఏమందయిన పోసిన గుటక వేయక వెంటనే మరణించును.



ఈ రీతిగా కంఠముదగ్గర మూడు గీతలు, మచ్చిలి గుంటలో ఒక చుక్క వాతవేయవలెను.

ఆరంభములోనే నాలుగు ద్రాముల సారాయితో అర్ధసేరు దుష్టుపాకుపసురు కలిపి త్రాగించి వాతలు చూపించిన ఫోటోలోనున్నట్లు రక్షలు వేయుటమంచిది.

ఊట కొవలసిన మడి వాతలువేసిన పశువు అక్కరకు వచ్చును.

లేక నేరున్నర పాలలో 4 కులములు వసపాడి కలిపి కాచి కాఫీ త్రాగునంత వేడిగానున్నప్పుడు నాలుగుగంటల కొకపర్యాయము త్రాగించుము.

లేక పసుపు 2 కు, సాంటి 2 కు, పిప్పళ్లు 2 కు, మిరియాలు 2 కు, నెలులి 10 కు, ఎండుమిర్చి 6 కు, మెత్తగానూరి అర నేరు మునగచెక్క రసముతో పెట్టుము.

లేక అండ్లయ చికిత్సలో కార్బాలిట అసిడ్ $\frac{1}{4}$ కు, గంజి నేరు కలిపి త్రాగించుము.


లేక పొటాషియం పర్మాంగనేట్ $\frac{1}{2}$ కు, నీరు రెండున్నెరు కలిపి త్రాగించుము.

లేక సిస్టెరిన్ $1\frac{1}{2}$ కు వరిగంజి నేరున్నర కలిపి త్రాగించుము.

ఈ వ్యాధికి గవర్న మెంటు పశువైద్య డిపార్టుమెంటువారు టీకాలు వేయుదురు. గాన ఆరంభములోనే మీ పశువులన్నిటికి వేయించును. మా ఆయుర్వేద పశువైద్య పరిశోధనల ప్రకారము చీడపారుడును జెముడుపాల టీకాలనుగూర్చి పరిశోధింప బడుచున్నవి.

షరా:- ఈ వ్యాధి పాలవలన మనుష్యులన చంటిబిడ్డలకు వ్యాపించును.

జబ్బువాపు (Black Quarter)



డివి నే గూడవాపు లేక జబ్బువాపు అందురు

మ॥ ధరణిన్ వాపున జబ్బుతో బనియు బాధనొందు భాగంబు మీ
దరయన్ కొద్దిగ నుద్యవంబున నాయంగంబు నందంతటన్

మడివిబడ్డ నీరు పైవిబడ్డ తెబ్బ పోనేరవు.

సరగన్వాపు జనించనీరు వడికంపు నైంక కుళ్ళిండగా
బరగన్వేగమె కాలధర్మమున దాబాయున్ స్వకీయానువుల్.

స్వభావము—వ్యాపకము

ఇదికూడ విచిత్రమైన వ్యాధియే. ఈ వ్యాధి కొండప్రదేశములందు, అరణ్య ప్రాంతములందు, రాతిశీలప్రాంతములందు పశువులకు తరచుగా కఠినముగా సోకు చుండును. ఈ వ్యాధిని కలిగించు నూత్నజీవులు గాలి రూపమున, నీటిరూపమున, ఆహార మాలమున పశువునందు ప్రవేశించును. లేతవయస్సులోనుండు పశువులు అనగా 4 నెలల నుండి 7 సంవత్సరములలోపునానికి విస్తారముగా సోకును. తక్కినవానికి తక్కువగ సోకును. ఈ వ్యాధి కొన్ని పశువులకు పై పుబ్బకి లోపలదాగియుండును. కండబట్టి మిగుల బలవీయున్న గిత్తలకు తరచుగా 5 వ్యాధి సోకును. వేసవికాలములో సరియగు మేతలేక తొలకరించగనే మిక్కిలి ఆకురతతో పచ్చికను తిను పశువులకు గూడ ఈ వ్యాధిసోకును. ఈ వ్యాధి ఒంటెలకు, గుట్టములకు, గేదలకు, ఎద్దులకు కూడ తగులును. భూమిలో పెరుగుచుండెడి ఒకవిధమగు నూత్నజీవులు ఈ వ్యాధిని కలుగజేయును. ఈ నూత్నజీవులు రోగము తగిలిన పశువుయొక్క రక్తప్రవాహములో సాధారణముగా కనపించవు. వాపు కనిపించినచోట మాంసములో అవి తప్పక కనపించును. ఈ నూత్న జీవులు సులభముగా చావవు. ఈ వ్యాధి పశువునకు సోకిన రెండు మూడు దినములకు గాని బయటకు కనపడదు. తీవ్రముగావచ్చిన కొన్ని గంటలలోనే చనిపోవును.

లక్షణములు

ఈ వ్యాధి తగిలిన పశువు మిగిలిన వానితో నూడక ప్రత్యేక సలమనకుండును. పశువు మందమతిగానుండును. పంటటకూడ నూడును. కొత్తగా పగిలించినచో ముందుజబ్బుమీదనో, వెనుకతొడలమీదనో, లేక మెడ, పిట్టల, రొమ్ము, వీపు, నడుము మీదనో, వాపు కనడును. ఆవాపునపట్టి చూచిన ఎక్కువవేడిగానుండును. ఆవాపు చుట్టును వృద్ధిపొంది పశువును కదలకుండునట్లు చేయును. మరికొంతసేపటికి ఆవాపు పైకి పొంగినట్లుండును. అప్పుడు ఆ వాపుమీద చేతితో తట్టినమెడల బురబుగలాడును. వాచిన ప్రదేశముయొక్క చర్మము క్రిందిభాగమును చీల్చిన ఆ మాంసము త్రుళ్ళి యుండును. త్రులిన నురుగునంటి ద్రవము కారును. ఈ వాపుకు నొక్కిన కరకరమున శబ్దముకూడ యుండును. ఈ వాపుచుట్టియే జబ్బువాపు, గూడవాపుఅని పేరువచ్చినది. ఇంక నీవాపు శీఘ్రముగా పెరిగి 2 నుంచి 24 గంటలలోగాని, రెండుమూడు దినము లలోగాని పశువునుచంపును. వ్యాధిను దీనికొలది శరీరము శీతలములోనికి వచ్చును. వాడి బలహీనముగా నుండును. తలకుండును. ఊసిరి కష్టముగా విడచును. పశువు మూలుగు చుండును. క్రమేపి మత్తువచ్చి చనిపోవును. ఈ రీతిగా నూటికి 95 వరకు చనిపోవును.

మేనాజాడ్యము తోట సేద్యం.

చి కి త్న

వాపును కత్తితోకోసి క్రుశ్మి మంసమును తీసివైచి కర్పూరచైతమును గాని లేక జిల్లేడాకు దుప్తుపాకు పసురు సమానభాగములును రాతి తడిసున్నం 1 భాగమును కలిపిపట్టించవలెను.

లోపలికి మూడు ద్రాముల సారాయిని త్రాగించుము.

లేక నాగజెముడు మట్టను ఉడికించి దానిలో సన్నావాలు కొద్దిగావేసి త్రొక్కిన జిగురుగా వచ్చును. దానిని వాపునకు పట్టించవలెను. అంతకువాపు అగనప్పుడు వాపు చుట్టు రక్షణ వేయుటమంచిది.

లేక బాలింతబోలు 1 తు, గండఫెరోహ 2 తు, మసాంబ్రము 1 తు. మెత్తగా నూరి సారాయితో వాపుమీద పట్టించవలెను.

ఆంగ్లేయచికిత్స

ఒకముప్పాతిక సేరు లివ్ సీడ్ ఆయిల్ లో 60 చుక్కలు కార్బాలిక్ ఆసిడును కలిపి ఆరంభములోనే త్రాగించవలెను. వ్యాధితగ్గిన తరువాత టింక్చర్ ఫెర్రిఫర్ కోడ్ 120 చుక్కలు స్లిపరీన్ 1½ తు, ఏరు 20 ఔన్సులు కలిపి రోజూనొక మోతాదు ఈయవలెను. ఈ వ్యాధికి కూడ పశువైద్య డిపార్టుమెంటువారు వ్యాధి రాకుండ టీకాలు వేయుదురుగాన తప్పరపడవచ్చును.

కురమ (Sympathetic Fever)


దీనినేకురమ, చలికురమ, ఒకవిధమగు విషజ్వరము అని చెప్పుదురు.

గీ॥ మొదట వశువు వణకును ముక్కునుండి
చీమిడిగార్చి మోకాళ్ళు చిక్కబెట్టు
కడుపునుబ్బును మలబద్ధకముగ నుండు
పాదములు నిలువలేకను బాధపడును
చెవులు నిక్కించి యాలించి చింతతోడ
గురకబెట్టంగ నిది చలికురమ యగును॥

ఆ॥ వె॥ పసియు మొదట మెండువణకుతో దగ్గు నొం
ద చెవులు నిలుపుచు దుఃఖపడును

కడుపు నుబ్బరమున గాసి జెందగ ముక్కు-
నుండినీరు వడిగ నూటవాటు||

అ|| వె|| వ్యాధి ముదర గురక యాడుచు బాధతో
పాదములు నిలువక బాధనుండు
లివయు లేక లేవలేక లేచుచునుండ
చలికురమ యనగను చాలనొప్ప||



స్వభావము—వ్యాపకము

ఈ జాడ్యము వర్షాకాలము అగాయతు శీతాకాలమువరకు వ్యాపించియుండును. రైతులలోను వాటువైద్యులలోను కొంతమంది ప్రతిజన్మనకు కురమముని పేరుపెట్టుదురు. ఈ వ్యాధి కలిగించు నూత్నజీవులు ఒకరకగతి శోమలయందు నివాస మేర్పరచుకొనును. పశువు రక్తములోనుండు ఎట్ట కణములలో నివి జేరియుండును. ఈ నూత్న జీవులు పల్లపుధూమలందును, గొప్పనదులు సముద్రములో కలియుచోటులందును, అడవి ప్రదేశములందును బురద నేలలందును, క్రుళ్ళుచుండు పెంటపోగు లందును చాగియుండును. ఎండలు తీవ్రముగా నున్నపుడు ఈ నూత్నజీవులు పైకివచ్చును. పశువును ఎండలో పని చేయించుట వలన లోపలి నెత్తురు ఉడుకెత్తు నపుడు ఈ వ్యాధి రావచ్చును. ఇంకను చక్కని కోడెలకు, ఆవులకు, మధ్యవయస్కుల జంతువులకు, పెద్దవయస్సులో నున్న వానికి తక్కువగను ఈ వ్యాధిసోకును.

విత్తుకన్న క్షేత్రం మెరుగు.

లక్షణములు

ఆరంభములో పశువునాడను. మలబద్ధకముండును. ముఖ్యముగా దగ్గుఉండును. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన లక్షణము చెవులు క్రోడాడక నిక్కబొడుగునాను చుండును. నల్లకప్పు వేయును. కాళ్ళు ఒకటి రెండు గాని అన్ని గాని పట్టుపట్టును. వెన్ను చర్మము బిగిసియుండును. మాత్రము పసిమిరంగుగా పోయును. మేతనెరుగు మానును. మరి కొన్ని కాళ్ళు పట్టు బాధనహించలేక వెలికిలగా పరుండి గోండ్లుపెట్టును. మరికొన్ని మందిబలమునిడవండి గుర్రకోగములో వలె గోండ్లుపెట్టును. మరికొన్నిటికి నోటివంట చొంగ పడుచుండును. వ్యాధి తీవ్రముగా నున్నపుడు నాడి తీవ్రముగా నుండును. 106, 107 డిగ్రీలజ్వరముండును. కాళ్ళు, చెవులచివరభాగములు, చల్లగా నుండునపుడు చలిపరమ యందురు. కడుపుబ్బరముగా నుండి మునగదీసికొనును. పశువు యొక్క తత్వమునుబట్టి పైలక్షణములలో తదితర లక్షణములు కూడ యుండవచ్చును.

చికిత్స

ఈ వ్యాధినిగూర్చి ప్రతి రైతుకడు తెలియును. ఈ వ్యాధి వలన ప్రమాదము రాదు కాని కొన్ని పశువులకు ప్రమాదమువచ్చుచున్నది. పశువు బలహీనమై నాలుగు కాళ్ళును కదల్చలేక కరుగునట్లు బయటకువచ్చిన ఆదీర్ఘవ్యాపకలిగినపుడు మాత్రము ప్రమాదము రావచ్చును. ముఖ్యముగా ప్రతి రైతు ఈ వ్యాధిని చూడగానే గుర్తించ వలసిన విషయములేవనగా:— పశువు చెవులు నిక్కబొడిచినవా లేదా? దగ్గు అప్పు డప్పుడు ఉన్నదా లేదా? కాళ్ళలో ఒకకాలు లేక నాలుగుకాళ్ళను సులుచున్నదా? దొక్కలభాగము ఉబ్బుముగా నున్నదా? ఈ కొరసులో గుఱికిపుట్టి చెవులు నిక్కబొడుచుకొని యున్నవా? వాలియున్నవా? మున్నగు విషయములను మనస్సులో ఆలోచించుకొని తగినచికిత్స చేయవలెను. కొంతమందివైద్యులు డబ్బునకొనింది పలు విధములుగా చెప్పుదురు. మరికొందరు అమ్మ ఇంతప్రమాదమైన వ్యాధి ఎచ్చటా చూడలేదని చెప్పుదురు. ఈ వ్యాధి విషయమై గాఢరావణపరిసనంత కాంగణములు కప్పట్టవు. వివిధరకముల తెలిసి తెలియని చికిత్సలు చేసినచో తప్పుక ప్రమాదము కలిగించును. మందిఖరీదుగలిగి బలముగలకోడెలప వచ్చినపుడు ఆకోడెబాధనుబట్టి ఎంతో ఆకురత పడుదురు. ఈ ఆకురతనుబట్టి వైద్యులలో కొంతమంది డబ్బుకొరకు నాటకచూడుదురు. నోరులేనిపశువుల విషయమై ఎవరువైద్యముచేయుదురో! వారుతప్పుక భూతదయ కలిగి యుండుటవసరము. ఈ వ్యాధితగిలిన నాలుగు లేక వారును రోజులలో తగిపోవును. చికిత్సజాగ్రత్తగాచేసిన ఆకురత పడవసరములేదు. రైతులలో కొంతమందికి మాఎద్దుకు ఇంకెక్సన్ యిచ్చిన తగ్గుతుంది. ఎంతిఖరీదైననరే యిచ్చెదనని ఉవ్విళ్ళూరుచుండురు. ఇదికూడ పొరపాటే కొంతమంది వైద్యులు చూట్లాడితే ఇంకెక్సన్ యిస్తానని, లేకపోతే తగ్గదని ఈ వ్యాధివిషయమై చెప్పుదురు. అన్ని విషయములు తెలిసిన రైతులకు ఈ వ్యాధి విష

“సుక్ష్మత్రము బీజము నొకచో సమకూరు ధిగిన్” — భాగవతము.

యమై మన ఆయుర్వేద చికిత్సయే మంచిదని తెలియజేయుచున్నాను. నేను ఎన్నోవేల పశువులకు చికిత్సలుచేసి రైతుల మెప్పువడసితిమి గాన ముఖ్యముగా జెప్పవలసియున్నది. ఆరంభములోనే ఈ వ్యాధి సోకిన పశువునకు మూడు ద్రాముల సారాయి త్రాగించిన కార్లపట్టులు, నొప్పులు తగ్గును. చురుకదనమువుట్టును. సారాయికూడ కొనలేని బీద రైతులున్న మేకపాలు అర్ధసేరు, పసుపు 2తు, కలిపి త్రాగించుము.

లేక తిప్పతీగెరసము సేరు మంచినూనె అర్ధసేరు కలిపి ఒకసారి త్రాగించుము.

లేక దుస్తుపాకుపసరు అర్ధసేరు, సారాయి 2 ద్రాములు త్రాగించుము.

లేక దుస్తుపాకు అరగుప్పెడు, తురకవేపాకు అరగుప్పెడు, వానిలాకు అరగుప్పెడు, వాము 4 తు, వెల్లులి 4 తు, పసుపు 1 తు, ఏరు రెండుసేర్లు కలిపి కాచివడపొసి పూటకు రెండు గొట్టముల వంతున తగ్గవరకు పెట్టుము.

కార్లపట్టు వారతీగెరసం $\frac{1}{2}$ తు, కొబ్బరినూనె 10 తు, కలిపి గోరువెచ్చగా కాచి రాసి వేడిబిడి కాపులుగాని, చప్పటిలో గుడ్డను తడిసి ఆ భాగములకు కొట్టి గాని చికిత్స చేయవలెను. ఇంకను కార్లపట్టు తిప్పతీగెరసముగాని దూసరాకు, ఉమ్మెల్రాకు పసరుగాని దుస్తుపాకురసమును కలిపి తగినంత వెన్నలో కలిపి మర్దనచేయ వలెను. లేక పిడక బూడిదనుగాని, విభూతినిగాని కార్లపట్టులకు, మొత్తలకు రుద్దిన మంచిది.

ఈ వ్యాధితగిలినఆరంభములోనే దుస్తుపు తీగెను గాని దూసరతీగెను గాని తిప్ప తీగెనుగాని పశువులువలెనుట్టి మెడలో వేసిన తాత్కాలిక జ్వరము, నొప్పులు ఆ ఘాటు వలన తగ్గును గాన తప్పుక ప్రతిరైతు ఆచరించవలెను.

పథ్యము:—జ్వరము తీవ్రముగానున్న ఎండుఘిర్జూర కొయలు 8 టిలి కొట్టి సేరు ఏటిలోవేసి త్రాగించవలెను. నూకలజావను, బియ్యపునీటిని, కాచిన వేడినీటిని ఆపు డప్పుడు త్రాగించవలెను.

అంగ్లేయ చికిత్స

సోడాసాలిసైలన్ 1 బౌన్సు సేరు ఏటిలో కలిపి త్రాగించుము.

లేక క్యాంఫర్ $\frac{1}{4}$ తు, మంచిబెల్లం 10 తు, కలిపి నాకించవలెను.

మశూచి (Cowpox)

ఈ వ్యాధి నే స్ఫోటకమందురు. పశువునకు మేకలకు గుఱుములకు గొట్టెలకు పండులకు ఒంటెలకు కుక్కలకు సోకును. ఈ వ్యాధినుండియే మానవులకు సోకును. ఇదిఅంటునుబంధమైనట్టియు, పొక్కులులేకునట్టియు, జీవితమునందు సామాన్యముగా


నొకపర్యాయమే కలుగునట్టి జ్వరమైయున్నది. ఈ వ్యాధి ప్రారంభించినది అగా యతు నెమ్మదియగు వరకు ఈధిలో అస్వస్థతయుండినను, మాలిన్యమేర్పడినను, చర్మము నుండి పూర్తిగా పొక్కులు పోవువరకు విశేష అంటుగుణము వహించియుండును. చీడ, పొరుడు మీద వచ్చు పొక్కులనే కొందరు మళాచియుందురు. అట్లగుట పొరబాటు. ఈ రోగముగల పశువులతో మంచిపశువులు కలియుటవలనను, పశువులకావరలు, పాలుపితువవారు, జబ్బుపశువులను తాకి మంచిపశువులను తాకుట చేతను ఈ వ్యాధి కలుగును. పట్టణములలో నుండు వాటికే ఈ వ్యాధి ఎక్కువగావచ్చును. కొన్ని పశువులు గుఱ్ఱపు లద్దెలు ఒంటెలద్దెలు దినుటవలనకూడ రావచ్చును.

లక్షణములు

ఆరంభములో జ్వరముండును. కండ్లనుండి నోటినుండి నీరుగారును. మేతలినదు. పాలిచ్చు పశువుల పొడుగుమీదను చచ్చులమీదను, దూడలకు నూలిమీదను, ఎద్దులకు తొడలమధ్యను, వెండ్రుకలు లేని చోటను బతాణిగింజలంత పొక్కులై పక్కమై పలుచ బారి పగిలి ఒకవిధమగు రసీకాయను. వీటినే రసిమండలందురు. మనుష్యులకు వేయు టీకాలరసము ఈ రసిమండలనుండియే తయారు చేయుదురు. ఈ వ్యాధి మనదేశములో చాలతక్కువ. పాడిపశువుకు ఈ వ్యాధితగలగ నే పాలుతగ్గును. రెండుమూడు దినములైన తర్వాత యెరని చుక్కలు పశువు శరీరముపైన కనపడును. తర్వాత పొక్కులుగా మారును. నాలుదిసములైన పొక్కులు శరీరమునందంతట వ్యాపించి నీరుపట్టి ఎఱుపుగా నుండి మలినమేర్పడి మహిచి వాసన స్పష్టముగ కనబడును. ఈ వ్యాధి ఉద్రుతగతిని వహించినచో ముఖము వాడిపోయి కన్నులు మూసికొనిపోవును. పొక్కులు ఎండి గోధుమరంగుగా మచ్చలుపడి పక్షములేక ఆరమండలము రోజాలవరకు గానినెమ్మదికాదు.

చికిత్స

జబ్బు పశువును ప్రత్యేకముగా నుంచి బాగ్రత్తగా పోషణచేయవలెను. విశేష నము గావించు పదారములను పెట్టుచు పుండ్రు దగిన చికిత్సలు, తగిన సంరక్షణ చేయ వలెను. చురుకుదనముకలిగించు ఆహార పానీయముల నిచ్చుచు అప్పుడప్పుడు ఘాటుగల ధూపములను వేయుదురనవలెను.




అనున పదురు కనిపెట్టి చలవలెను.

జీర్ణరోగములు

పదునాలుగువభాగము

అజీర్ణవ్యాధి (Indigestion)

ఆ॥ వె॥ అర్ధమేతమేసి యతివిష్ణుతతోడ
పేడవేయలేదు వేడిచేత
పాడి పశియునైన పాలురుచియు దప్ప
వ్యాధిముదరగ బ్రాణ చయము నశించు॥



తే॥ గీ॥ పేడ బాగుగ బెట్టదు వేడిచేత
మండుచుండు శరీరము దండిగాను
పశువుమేయదు మరియు నపానవాయు
పులను విడచును పాడిపశులవియైన
పాలునించవు యిటులైన వ్యాధిముదిరి
చికి- చనిపోవు దీని నజీర్ణియందు॥

కొండాళ్ళ వ్యవసాయ, యిద్దరు భాగ్యులు చెరువు.

పశువుయొక్క జీర్ణరోగము చెడుటయే అజీర్ణయనబడును. నెరురువేయు ప్రతి జంతువుయొక్క పొట్టున నాలుగు భాగములుగ విభజింపవచ్చును. కాబట్టి అజీర్ణ కలిగి నపుడు నాలుగు పొట్టలలోను అజీర్ణి యేర్పడవచ్చును. వ్యాధిలక్షణములను బట్టి నాలుగు రోగములలో ఏ రోగము చెడినది పరీక్షించవచ్చును. ముఖ్యముగా ఈ వ్యాధి పొడిపశువులనువహించుచున్నదిగావచ్చును. వేసవికాలమందు మేతతక్కువగను, వర్షాకాలమందు మేతవిక్కువగా తినుటచేతను, మామూలు ఆహారము తినుట జొన్నపించి, ఉలవ పిండి తదితర దాణాలు గొంతుక వరకు పెట్టుటచేతను, పశువును పనిచేయించక సోమరి తనముగా నుంచుటచేతను, పశువు ఆహారరోగములలో పురుగులు, మున్నము, జీర్ణముకాని కఠిన పదార్థములు యుండుటచేతను ఈ వ్యాధి కలుగును.

లక్షణములు

ఆకలితగును. ఆరమేతమేయును. చక్కగా రెక్కప్రకారము 36 నెరురు వేయదు. మలబద్ధకముండును. అప్పుడప్పుడు ఆహారవాయువులు వదలుచుండును. పేగులు అరచుచుండును. కడుపు వెన్నెనంటి యుండును. నల్లకప్పువేయును. అప్పు డప్పుడు కడుపులో గాలి కూడ యుండును. పొడిపశువైన యెడల పాలరుచి తగును. వ్యాధిముదిరినకొలది పశువు కృశించి ఆకలితగి రక్తము క్షీణించి మరణించును. ఇట్టి వ్యాధులను చికిత్స చేయుటకు చాలాకాలముపట్టుచుగాన రోగనిదానము గ్రహించుట మంచిది.

చి కి త్న

సోడాఉప్పు 2 తు, కుర్రజీవాము 4తు, ఇంగువ 1 తు, నేలకేసెలు 1 తు, ఉప్పు 4 తు. కలిపి నేరు గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి దినమునకొక మోతాదు పెనున పక్షము దినములు పెట్టుము.

తేక సొంటి 2 తు, మిరియాలు 1 తు, పిప్పళ్లు 1 తు, ఇంగువ 2 తు, వాము గిద్దెడు, ఉప్పు 3 తు, కలిపి నేరు గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి వై మాదిరిగనే పెట్టుము.

తేక ధనియాలు చేరెడు, పిప్పళ్లు 2 తు, చేనుజీలకర్ర 2 తు, వరంజీవాము 4 తు, ఉప్పు 4 తు. కలిపి పెట్టుము.

తేక మిరపఆవరసము అరసేడు, మిరియాలు 1 తు, ఉప్పు 2½ తులములు కలిపి పెట్టుము.

తేక మహిసాక్షి 2 తు, కటకరోహిణి 1 తు, సొంటి 1 తు, ఉప్పు 4 తు, కలిపి పెట్టుము.

లేక అవంగాలు 1 తు, సొంటి 2 తు, నేలవేము 1½ తు, నోదాశిష్టు 2 తు కలిపిపెట్టుము.

లేక చింతపండువులును, కారము, ఉప్పు, అపసిండి కలిపి రోజుకొక మూడు గొట్టములు పెట్టుము. పై చికిత్సలను పరుసగా కొంతకాలము వాడుము.

మరొక సలహా

వరికప్పులు, అపరధాన్యములను నూర్చునవుడు పశువులు ఆతురతతో తినుటవలన జీర్ణముకాక పేగులలో చిక్కుకొని బాధపడును. ఇట్టిసమయములలో కొందరు వంకాయలను, దోసకాయలను, ఉప్పును కొబ్బరియానెను పోయుదురు. ఇట్టి చికిత్సలను అనుభవ పరుల సలహాతీసికొని చేయుట మిగులమంచిది. కాని చేరెడు గాని, రెండుచేరలు ఉప్పును మెత్తగా నలుగగొట్టి దానిలో 4 తులముల సొంటి పొడిని కలిపి కాఫీత్రాగుసంత వేడినీటిలో కలిపిపెట్టిన తగ్గును.

లేక కొబ్బరిని నేననీటిలో వేసి తొక్కి 10 తులముల ఉప్పును కలిపి పెట్టుము.

లేక కొడిచెంటను 6 తులములు తీసికొని నేరున్నర గోరువెచ్చని నీటితో ఈయుము.

లేక మూడు ద్రాముల సారాయిని త్రాగించుము.

లేక మూడుగుప్పెళ్ళి ఎండు మిరపకాయలను రెండుస్లేర్ల నీటిలో కలిపి కాచి పినికి వడపోసి త్రాగించవలెను.

కడుపుబ్బు (Tympanitis)

గీ॥ పశువు జీర్ణమొందనిమేత మెనవి మెనవి
కడుపు నుబ్బరింపగనుండు గాలితోను
చూడి పశువుకుండు నేర్పుతోడ మందు
వాడవలయు నేర్పును లేకను వాడరాదు॥


జీర్ణముకొని పదార్థములు నెమరు పోటలో నిలువయుండుట వలన అవి పులియుట వలనగాని దూరప్రయాణమైనవెంటనే నేదైన మేతనినతరువాత వడితి మున్నగు పదార్థములు త్రాగుటవలనగాని తొలకరి వర్షములు వుండిన తరువాత మొత్తము గడ్డిని ఎక్కువగా తినుటవలన గాని, విషవంతములగు పొదలు మొక్కలు తినుటవలన గాని, పచ్చిజనుము, వరిపీలక మున్నగు వాతపదార్థము రుచిగానున్నవని ఎక్కువగా తినుట వలనగాని ఈ ఉబ్బుకలుగును. ఇంకను ఇతరరోగములలో కూడ ఇదికలుగవచ్చును.

పాలు అంబారంబు పరగ భూపతిపాలు దుక్కిటి పశువులు ధూళిపాలు.

లక్షణములు

కడుపు విస్తారముగా పొంగుటయే ముఖ్యమగు గుర్తు. ఎడమదొక్క భాగములోనే అవార కోళముండును. ఎడమదొక్కయే ఉబ్బును. ఆ ఉబ్బుమీద ప్రేళ్లతో రట్టిన యెడల గాలితిత్తివలె మ్రోగును. సకాలములో తగుచికిత్స చేయనిచో, నెత్తురుతలకెక్కును. అప్పుడు ముఖముమీద రక్తనాళములు ఉబ్బును. కన్నులు కపటవపు. ఊపిరిపీల్చుట కష్టముగానుండును. పశువు మూలుచుండును. వ్యాధి ముదిరినకొలది మరణముకూడ సిద్ధమగును.

“కడుపువ్వుబ్బు”



చికిత్స

ఆరంభములో అరసోలేడు ఉప్పును మెత్తగానూరి నేరున్నర గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి త్రాగించుము. లేక నాలుగు గుప్పిళ్ల ఎండుగురిచ్చిని మెత్తగా నలుగగొట్టి మూడుసేల్ల నీటిలోకలిపి కాచి వడపోసి త్రాగించుము.

లేక కడుపులో గాలి జేరియున్న గాలి తీసేపద్ధతి చెయుము.

లేక మామూలుగా తిండి ఎక్కువై ముక్కుచున్న పశువునకు మూడు ద్రాముల సాఠాయిలో 2 తులముల ఇంగువ కలిపిపెట్టుము.

లేక ముఖముమీద రక్తనాళములుల్పి శ్వాస కష్టముగా వీల్చుచున్న ఉతితో ఆ రక్తనాళములను తెగగొట్టుము.

లేక కొడిరెట్టును 10 తులములు తీసికొని నేరున్నర గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి త్రాగించుము.

లేక జొన్నదంటుగాని, వంగడ్డినిగాని కాల్చిచునిచేసి మూడుగొట్టములు పెట్టుము.

లేక దిరిసెన ఆకుపసరు నేరు, కారం 4 తు, ఉప్పుచేరెడు, కలిపి నేరు, కలిపి త్రాగించుము.

నానతో కరువులేడు, పెనిమిటితో దారిద్ర్యములేడు.

లేక సోపు 2 తు, ఏలకులు 2 తు, జీలకర్ర 2 తు, సొంటి 2 తు, కలిసి నేరు గోరువెచ్చని నీటితో త్రాగించుము.

ఆకస్మిక కడుపుబ్బు

పశువు కడుపులో విషపదార్థములు చిక్కుకొనుట వలన గాని, తాటిపండ్లు తదితర వస్తువులు గొంతుఁజూపు అడ్డుపడుటవలన గాని, జీర్ణముకాక తినిన పదార్థములు పులిసి ఆహారశోశములో నిలువయుండి ఒక విధమగు గ్యాసుగా ఏర్పడుటవలన గాని, తదితర కారణముల వలనగాని ఆకస్మికముగా కడుపుఉబ్బును.

ఇట్టి సమయములో పశువు తత్తగపడును. దేహము ముడుచుకొనును. ఎడమ దొక్క గ్యాసుతోనున్న బాగుగావుబ్బును. శ్రేణిలో నొక్కిన గుంటపడక డండం అనుభవించును. మలబద్ధకముండును. వెంటనే తగు చికిత్స చేయనిచో చనిపోవును.

చి కి త్స

కడుపు విస్తారముగా పొంగి శ్వాస ఆడనపుడు ఎడమద్రక్కనగుము ఎముక, కడ పటిప్రక్క ఎముక తొంటిఎముక ఈ మూడు ఎముకలకు మధ్యగానుండు భాగములో ఆవగా రమారమి గుంటగానుండు ఎడమద్రక్కనకు మధ్యభాగమున పీరాలోగాని, పేడలోగాని గుర్తుపెట్టిన పశువును పడవేసి అగుర్తినాడ దొక్కలో ఒక చిన్న చాకుతో గాని, ట్రోకిరు అను పనిముట్టుతోగాని పొడిచి గాయముగుండ గొట్టుమును తగిలించిన లోపలనున్న గ్యాసు అంత బుస్సుముని దుర్గంధముతో పైకివచ్చి ఉబ్బిగముతగును. మరు నాడుకూడ ఈ రీతిగా గ్యాసుతీసి అనిసెయినగాని, అముదమునుగాని నేరున్ను, అల్లము 6 తులములును నూరి కలిపి ఒకమోతాదు ఈయవలెను. లేక గ్యాసును పోగొట్టు వస్తువు అను ఈయవలెను. గొంతుకలో తాటిపండ్లు, ఎముకలు అడ్డుపడిన ఒక నున్నని తిన్నని కర్రను గొంతుకలోనికి పోనిచ్చి కొద్దిగా అముదమునుపోయును బైటలో, లోప లిలో నెట్టవలెను. ఇంకను వీలైన చిన్నవస్తువులు చిక్కుకొన్న కొద్దిగుడ్డ తెల్లసానతో అముదము కలిపి గొంతులోనికి జారివిడువ వలెను.

ఉదయ సాయంకాలపు ఉబ్బు

కొన్ని పశువులకు ఆజీర్ణవలన గాని తదితర కారణముల వలన గాని ఆహారశోశ ములో గాలి జేరుచుపోవుచుండును. కొన్నిటికి ఉదయపుపూటను, మరికొన్నిటికి సాయంకాలమునను, ఇంకా కొన్నిటికి అన్ని కేళలందును దొక్కభాగములో ఉబ్బు కన బడుచుండును. ఈ వాపున్నంతసేపు పశువును బాధగానుండును. మేత సరిగా తినదు. కొన్నిటికి దగ్గుండును. చికిత్స చేయకపోయిన పీరశోగముగా ఏర్పడి ఆహారశోశము చెడి మలబద్ధకమేర్పడి పశువు మృత్యువున కొనెనుమగును. గాన ఆరంభములోనే చికిత్స చేయవలెను.

వడ్లరాసి మదపొయినా వానితో కరువులేదు.

చి కి త్న

ఆరంభములోనే అడసరపావులు కిగుప్పెరును, ఉప్పు చేరెను, ఇంగువ 2తు, కలిపి త్రొక్కి దివమున కొక మోతాదువంతున నేరు గోరువెచ్చని నీటితోగాని, కారపు పాలతోగాని నాలుగు దివములు వరుసగా యిచ్చిన తగును.


లేక అవిసెనూనె సవాసేరు, కర్పూరతైలం 2 $\frac{1}{2}$ తు, నవాసాగరం 1తు కలిపి ఒకమోతాదు మాత్రమే యిచ్చిన తగును.

లేక మసిగొగుపాడి 6తు, కారపుపాడి 4తు, మన్నపులేటసేరు కలిపి త్రాగిందుము.

లేక వావిలూప పసరు నేరు, పొంటి 2తు, సిన్నగు 1తు, మిరియాలు 1తు, చేదు జీలకర్ర 2తు, ముసాంబ్రము $\frac{1}{2}$ తు, మహిసాక్షి 1తు, కారపుపాలు నేరు కలిపి త్రాగిందుము.

కడుపునొప్పి (Colic)

అ॥ వె॥ పశువుమేత మాన బరగ కాల్లుముడిచి
 మూలుచుండు తనను కాళ్ళనుంచి
 మేతజీర్ణింపక చెడువాతమగును
 కడుపునొప్పి వచ్చి గానిజెందు॥



కడుపునొప్పి ౪౮

పశువు ఎండుగడ్డిని, పచ్చిగడ్డిని వెంటవెంటనే మెయిటచేతను ఆతురతతో అంగిన ముండచెట్టు, కంప జాతులను తినుట చేతను, ఎల్లప్పుడు చల్లనినీటిని త్రాగుట చేతను, కేసులలో జీర్ణముకొని పదార్థములు నిలువయుండుటచేతను, వాయుపూరితముగా కడుపుబ్బరముగా నుండునపుడు పనిచేయిండుటచేతను, మత్తుపదార్థములు కేసులలో

చిక్కనొనిపోయి బాధ కలుగుటవలనను, తవుకు, జొన్నలు, వడ్లు, మున్నగు గట్టి పదార్థములు మిక్కుటముగా తిని జీరణము కాకపోవుటవలనను, ఈ వ్యాధికలుగును.

లక్షణములు

పశువు మేతమేయుట మానును. ఏమియు తోచక పరుండును. ముఖ్యముగా పశువు తలను ఎడమ దొడ్కుదగ్గరి ఆనించి మూలుకు వెనుక కాళ్ళతో తన్నుకొనుచు, వెన్నును విరచుచు, పడుకొనుచు, తేచుచు, తోకనుఎత్తుచు, మాటిమాటికి మాత్రమును పోయుచు, పేడపలుచగ గాని గట్టిగాగాని అసలు వేయకుండగ గాని యుండుచు, అప్పుడప్పుడు పండు కొరుపిచు బాధపడుచుండును.

చికిత్స

ఈ వ్యాధి ఏకారణము వలన వచ్చినదో, ఏదరిసితిలో నున్నదో, వెంటనేతగ్గునా? ఎంతకాలము పట్టును? అప్పుడప్పుడు వచ్చిన ఏ లక్షణములతో నుండును? ఎరిమా అవునరమా? మున్నగు విషయములను పరీక్షించి తగిన చికిత్స చేయవలెను.

ఆరంభములో ఉప్పుచేరెడు, వాము అరసోరెడు, ఇంగువ 4 తు, కలిపి నేరు న్నర గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి ఒక మోతాదునీయవలెను.

పేడ వేయక మలబద్ధకముగానున్నపుడు సబ్బునీటితో ఎరిమా చేయుట మంచిది.

తేక గచ్చావరసము అర్థసేరు, ఇంగువ 4 తు, కలిపి త్రాగించవలెను.

తేక దీర్ఘకాలపు నొప్పిగానున్న సొంటి 1 తు, మిరియాలు 2 తు, కురంజీవాము 2 తు, సోడాఉప్పు 1 తు, వాయులవంగాలు 1 తు, నీరు నేరున్నర కలిపి రెండుదినముల కొక మోతాదునీయవలెను.

తేక నొప్పిచే తన్నుకొనుచుండిన గాడిదగడపాకు పసరుగాని, వామువాటరుగాని యియవలెను.

మలబద్ధకము (Constipation)

పశువులయొక్క తత్వములనుబట్టి అప్పుడప్పుడుగాని, ప్రతిదినముగాని మలబద్ధక మేర్పడును. ఈ వ్యాధికూడ అనేక కారణములవలన రావచ్చును. పేగులు సరిగా పని చేయక పోవుటవలనను, అనారోగ్యముగు మన్యప్రదేశములలో నుండుటవలనను, మేత, నీరు సరిగా పెట్టక ఎల్లప్పుడు ఎండలోనుంచి పనిచేయుటవలనను, పేగులు అరిపోవుట వలనను మలబద్ధకము కలుగును. పశువు అనారోగ్యముగా నున్నపుడెల్ల యీ వ్యాధి కలుగును.

లక్షణములు

పశువు నాలుకపై ఒకవిధమగు పొరగ్రమ్మును. మలము గట్టిగా వేయుచుండును. అకలి తగ్గును. మందమతిగా నుండును. నెమరు సరిగా వేయదు. తోక నప్పుడప్పుడు ఎత్తుచు ముక్కుచుండును. జ్వరముకూడ యుండును. అపాననాయువులు విడచు చుండును.

చి కి త్వు

ఆరంభములో చింతపడుచువులును సేరు, ఉప్పు చేరెను, గోరువెచ్చని నీరు సేరు కలిపి త్రాగించుము.

లేక ఆరసేరు ఆముదములో 40 చుక్కల నేపాళనూనె కలిపి ఈయవలెను.

లేక నల్లబీడిగింజలు కొట్టినవి 15న్ను, పాలు సేరున్న కలిపి కాచి వడపోసి త్రాగించవలెను.

లేక ముసాంబ్రము 1 తులము, నేలవేము 2 తులములు, ఉప్పు 6 తులములు, సోంఠి 2 తులములు కలిపి సేరు వేడినీటిలో కలిపి ఈయును.

లేక ఆముదము సేరు, ఎండుమిర్చి గుప్పెడు, అల్లము 2 తులములు కలిపి కాచి వడపోసి త్రాగించవలెను.

ఈతీగా అనుభవచికిత్సలు చేయవలెను. విశేషములైనతరువాత బలముగల తేలికపదార్థములను, పచ్చిగడ్డిని పెట్టవలెను.

విరేచనములు (Diarrhea)

అ॥ వె॥ కడుపునొప్పికల్గి కలతజెందుచునుండ

వలుచు వేడవేయు బాధతోడ

మేల నెమరుమాని మిగుల మందలనుండు

వారమైన భువిని బాధలేదు.

ఈవ్యాధి మేలలోపమువలనను, అహారకోశములోను, కేగులలోను ఒకవిధమగు పురుగులుండుటవలనను, పచ్చిక మేయుచు వెంటనే ఎండగడ్డి మేయుటవలనను, వర్షము పడినతరువాత పచ్చిగడ్డి తినుటవలనను, ముక్కిపోయిన గడ్డి, కాడలు, పురుగులుపడిన తవుడు, నిలువయున్న దుడితి వగైరాలు తినుటవలనను కలుగును. ఇంకను పెద్దరోగము మున్నగు తదితర రోగములలోకూడ ఈవ్యాధి రావచ్చును.

బీటికి కురిసిన వర్షము అడివిగాడిన వెన్నెల.

లక్షణములు

పలుచగా పేడవేయుటయే జాని ముఖ్యలక్షణము. కడుపునొప్పి, ఆకలిలేకుండుట కలుగును. వేడిజేసి పొరుడు ముడ్డితీపుతో ముక్కుచుండును. వాతముజేసి పొరుచుండిన ముడ్డితీపుయుండదు. దుర్వాసన బంకతోగూడిన శ్లేత్తురుకూడ యుండును. విశేచనములగుకొలది మలవదారము తగ్గును. చెవులను వ్రేలాడవేయును. నల్లకప్పువేయును. దినమునకు 10 లేక 15 వరకు విశేచనములగును. నెమరు మానును. మూల్యుచుండును. డొక్కలు దించుకొనిపోవును. అంటుకోగములలో వచ్చు విశేచనముల లక్షణములు మరొకవిధముగా నుండును.

చి కి త్వు

ఆరింభములోనే నేరు అముదమును యిచ్చి పిల్వలి మలమంత కదలిపడిపోయి వ్యాధి తగ్గును.

లేక పచ్చితుమ్మచెక్క రసము, పచ్చి నేకేడుచెక్కరసము, పచ్చివేపచెక్కరసము మూడు అరసేర రసము తీసి నిమ్మకాయంత వెన్న కలిపి ఒకటి రెండు మోతాదులు యిచ్చి తగ్గును.

లేక కవిరి 2 తులములు, మాచికాయలు 2 తులములు, సీమనున్నము 4 తులములు, గంజాయి 1 తులము, నలమందు పావుతులం, కలిసి నేరున్నర కలిపి పొరుడు తగ్గువరకు రెండు మూడు మోతాదులిచ్చి తగ్గును.

లేక మారేడుగజ్జ 10 తులములు, కవిరి 2 తులములు కలిపి నూరి నేరు ఏటిలో కలిపి ఈయవలెను.

లేక కర్పూరము పావుతులము, ఇ గువ 1 తులము, సొంటి 1 తులము కలిపి నేరు జొన్నకలితో పెట్టుము.

లేక కాసినిగొజలను ఏటిలో నావవేసి పిసిగి త్రాగించిన ముడ్డితీపుతో విశేచనములు కట్టును.

లేక పయిడిప్ర త్రిఅతురసము నేరు, ముగ్గ నేరు కలిపి కాచియిచ్చి తగ్గును.

వరా:—ఈ వ్యాధి కాకవలన పొరుచున్నది, లేక వాతమువలన పొరుచున్నది, లేక తదితరవ్యాధులవలన పొరుచున్నది బాగుగా పరీక్షించి అనుభవముతో చికిత్స చేయవలెను. కాకవలన పొరిన అంత ప్రమాదములేదుగాని వాతమువలన పొరిన శీతలములోనికి వచ్చి ప్రమాదము కలిగించును. విశేచనములగుచోట ఎప్పటికప్పుడు పరిశుద్రము చేయుచుండవలెను. యెక్కువగానై నిరసించిన, జొన్నజాపలో సారాయి,

పన్నెండు నెలలలో రెండుపూలే పాడుపాడు.

సాంటిపాడి కలిపి పెట్టవలెను. అంగ్లయి చికిత్సలో కోరోడెన్సుగాని క్యాంఫర్ డెన్సుగాని తడవకు ఆరజొన్న వరకు సేరు నీటిలో కలిపి తీయవచ్చును.

రక్త విరేచనములు (Dysentery)

ఈ వ్యాధి శీతోష్ణసితిగతులు మారునప్పుడు తరచుగా వచ్చుచుండును. పశువులు క్రొత్తగడ్డి తినుటవలనను, కాల్వలలోని క్రొత్తపీరు త్రాగుటవలనను, కొన్ని సమయములలో అతికడితేయుటవలనను, జీర్ణముకాని పదార్థములు జీర్ణకోశములో నిలువయుండుట వలనను, ఒక విధముగు పురుగులు పేగులలో నుండుటవలనను ఈ వ్యాధి కలుగును.

లక్షణములు

ఈ రోగము ఆకస్మికముగా కలుగును. పశువునకు చలిసోపను. మలమువెంట చీము నెత్తురు పడుచుండును. గుడసానమున బాధయుండును. కడుపుకొప్పిచే పండ్లు కొరుకుచుండును. పచ్చిహంసపు ముక్కలవలె నుండు చిన్నచిన్న నెత్తురుకండలు విరేచనములతో పడుచు దుర్వాసన గా నుండును. పేగులపై ఒత్తిన బాధగానుండును. పగలుకంటె రాత్రులందు వాతమువలన పశువు బాధపడుచుండును. పేగులు ఆకచుచుండును. వ్యాధి ముదిరినకొలది శుష్కించును. గుర్వాసనగల చెనుట శరీరముపై వబును. తగిన చికిత్స చేయనిచో ననిపోవును.

చికిత్స

ఈ వ్యాధికి జాగ్రత్తగా సంరక్షణ చేయవలెను. వగరు పదార్థములను, కాచిన నీటి నిచ్చుచుండవలెను.

ఆరంభములో పెసరగుగిళ్లు తవ్వెడు లేక మానెడు, పేరి నీయి సోలెడు, ఉప్పు 4 తు. కలిపి పెట్టవలెను.

లేక అరటిపువ్వులరసము ఆ సోలెడు, పెరుగు అరసేగు, వెన్న 5 తు, కలిపి ఒకటి రెండు మోతాయలు తీయవలెను.

లేక ఆవుపాలు అరసేగు, హరితికదుప్పరము $\frac{1}{2}$ తు, కవిరి 1 తు, పరిపిండి సోలెడు కలిపి పెట్టుము.

లేక ఎఱ్ఱకలువ దుంపలు త్రొక్కి అరపీ నెడు రసముతీసి, సేరు బొన్నకలితో కలిపి కాచి విరేచనములు తగువరకు నాలుగుగంటల కొక మోతాగు తీయవలెను.

లేక నీరులిపాయలు 25 తు, పెరుగు అరసేగు, మెంతిపాడి 2 తు, వెన్న నిమ్మ కాయంత కలిపి పెట్టుము.

లేక ఉడకబెట్టిన నీరులిపాయలు 15 తు, పిచ్చిబెండాకు గుప్పెడు, నల్లమందు $\frac{1}{4}$ తు. కలిపి మెత్తగానూరి పెట్టును.

లేక క్యూఫర్ డైస్ గాని క్లోరో డైస్ గాని ఒక బొంబు, నేరు నీటిలోకలిపి ఒకటి రెండు మోతాదులు ఈయవలెను.

హెచ్చరిక

కోకను, అసనమును వేడినీటితో శుభ్రపరుచుండవలెను. ఆహారము జీర్ణము కలుగ జేయునదిగా పెట్టవలెను. నీరు కాచి పెట్టవలెను. దుర్వాసవయున్న సాంబ్రాణిపాక వేయుము.

పాండురోగము

పశువునకు తగినంత ఆహారము పెట్టకపోవుటచేతను, చీకటికొట్టములలో ఎల్లప్పుడు నుంచుటచేతను, తగినంత గాలి లేకపోవుట చేతను, సోమరితనముగా ఎల్లప్పుడు నీడను పశువులచావడిలో నుంచుటచేతను, రక్తమునందుండు ఎఱుపు కణములు తగ్గుటచేతను ఈ వ్యాధి కలుగును. రక్తమునందలి చౌగ్గుల్యమే దీనికి ముఖ్య కారణము.

లక్షణములు

పశువు కఠిరకాంతి పాలిపోవును. సామాన్య జ్వరముండును. కండ్లరెప్పలు చూచిన రక్తములేక తెలుపుకొనుచుండును. నాలుక, పెదవులు, కనురెప్పలు, చర్మము మున్నగు భాగములన్నియు పాలిపోవును. వ్యాధిముదిరినకొలది బరువుతగ్గును. ముఖమువాదును. రక్తము క్షీణించినకొలది అవయవములు అస్వస్థకొందును. క్రమేపి పక్షివారముకూడ రావచ్చును. క్రమక్రమముగా కృశించి కొన్నాళ్ళకు మరణించును.

చికిత్స

బలము, రక్తవృద్ధి కలుగజేయు పదార్థములను పెట్టుచుండవలెను. గాలి ధారాళముగా వచ్చు ప్రదేశమునందుంచవలెను.

అన్నభేది 1 తు, విషముష్టిగింజలపాడి 2 తు, సోడాశుష్క 1 తు, మరంజీవాము 1 తు, శుష్క 2 $\frac{1}{2}$ తు, పసుపు $\frac{1}{2}$ తు, కలిపి ఉదయసాయంకాలములందు గోరునెచ్చరి నీటితోగాని, బెల్లముతోగాని పెట్టవలెను.

లేక జిల్లేడుమెగలపాడి $\frac{1}{2}$ తు, వాము 4 తు, మిరియాలు 1 తు, సొంటి 1 తు, ఇంగువ $\frac{1}{2}$ తు, కలిపి వై మాదిరిగనే పెట్టవలెను.

లేక విషముష్టిగింజలపాడి 2 తు, నేలవేము 1 తు, అన్నభేది 1 $\frac{1}{2}$ తు, పసుపు $\frac{1}{2}$ తు, కలిపి వై మాదిరిగనే పెట్టవలెను.

లేక మహిసాక్షి 1 కు, కటకరోహిణి 1 కు, సాంటి 1 కు, ఉప్పు 3 కు, కలిపి దాణాలోగాని, వేడినీటితోగాని పెట్టవలెను.

జలోదరము

రోగము పశువులకు దుర్బలత్వమువలన కలుగును. ఇంకను వేసవికాలమందు మేత సరిగా దొరకక తొలకిరించగ నే మిమ్మటముగా తినుటచేతను, వర్షాకాలమందు నూతనముగా చిగిర్చి నీటిముడుమై యుండెడు పచ్చికతినుటచేతను, ఎల్లప్పుడు చలిగాలిలో నుండుటచేతను, శ్వాసకోశములలో అస్వస్థత యేర్పడుటచేతను, రక్తహీనతచేతను, కలుగును. ఈ బాధ్యము పశువు రొమ్మనకు, కడుపునకు మాత్రము ముఖ్యముగాసోపను. ఇదే గుండెను సోకిన గుండెనంజు యుదురు.

లక్షణములు

ఆరంభములో పశువు రక్తనాళములలోని రక్తము సరిగా ప్రసరించకపోవుటవలన ఆయా భాగములు ఉబ్బును. ఆ ఉబ్బిన భాగములను వ్రేల్చితో నొక్కినయెడల గుంటలు పడును. జ్వరము తక్కువగా నుండును. నోటినుండి చొంగ అప్పుడప్పుడు పడుచుండును. నోరు దుర్వాసనగా నాలుక తెలుపుగానుండును. పశువు పనిచేసినపుడుగాని, ఎండలో నున్నపుడుగాని, వేడిజేసినప్పుడుగాని రొప్పుచుండును. వ్యాధి ముదిరినకొలది ఎండలో పనిచేయించిన రొప్పుచు నోటినుండి చిక్కిని చొంగవంటి పదార్థము పడుచుండును. చిన్నదూడలకు కడుపుద్గరగా నీరుచేరి ఒత్తిన మేతగానుండును. పశువు అరమేత మేయును. కాళ్ళుగాని, ముఖముగాని, రొమ్మగాని, దవుడక్రిందగాని లేక భాగము లన్నియుగాని నీరున్నట్లు కనపడుచుండును. వ్యాధి ముదిరినకొలది పశువు క్షీణించు చుండును. కనురెప్పలు, చీలమండలు, మూతి మున్నగు భాగములలో వాపుయేర్పడును. ఈ వ్యాధి కొన్ని నెలలవరకు యుండి పశువును బాధించును.

చికిత్స

నూదితో లాపలి నీటిని తీసివేయవచ్చునుగాని అనుభవముగల వైద్యులచే చేయించవలెను. ఆరంభములో సాంటి 1 కు, అన్నధాన్ 1 కు, విషమష్టిగింజలపాడి 1 కు, నేలనేము 1 కు, ఉప్పు 2 కు, కలిపి చూర్ణముచేసి ప్రతిదినము ఈ మోతాదు వంతున వారము దినములు పెట్టుచు జీర్ణశక్తిగలుగు పదార్థముల పెట్టుచుండవలెను.

లేక ఆరెదొండకు పసురు అర్థసేరు, మిరియాలపాడి 1 కు, సాంటి 1 కు, వెల్లులిపాయలు 1 కు, పసుపు 1 కు కలిపి మై నూదిగ నే నాలుగు దినములు పెట్టవలెను.

లేక ఆవుపాలుగాని, గేదెపాలుగాని నేరు, తెలికపిండి సవాసేరు కలిపి ఒక పూట నాననిచ్చి పెట్టవలెను.

లేక కర్పూరము $\frac{1}{4}$ తు, యష్టిరుధుకము 1 తు, ఇంగువ 1 తు, బెల్లం 1 తు, కలిసి అప్పుడప్పుడు వాకించుచుండవలెను.

గర్భశూల

ఈ వ్యాధి చిన్న పశువులకు వచ్చును. వాణా దినుసులు, కందులు, ఉలవలు, మినుములు మున్నగునవి ఎక్కువగాతిని మరల పచ్చిగడ్డి తదితర పొట్టుధాన్యములు తినుట వలనను, క్రొత్తగడ్డి, కాడ తినుటవలనను, వాతరోగము వలనను, అజీర్ణవలనను జీర్ణము కాకుండగనే ఆహారము మరల తినుటవలనను, నెమరు సరిగా వేయకపోవుటవలనను, చలికాలిలోను, వర్షములోను ఉండుటవలనను రావచ్చును. ఈ వ్యాధి కొన్నిరోజులు గాని ఒకటి రెండు మాసములుగాని ఉండును.

లక్షణములు

ముఖ్యముగా ఈ వ్యాధిలో విరేచన మవ్వక జిగురుతో కొద్దిగా పడుచుండును. శూలనొప్పి వచ్చినపుడు కాలేజుకాపి తన తలను పొత్తికడుపునకు ఆనించి మూలుగుచు దీనముగా చూచుచుండును. నెమరుపొట్ట కిబ్బరముగా నుండును. అప్పుడప్పుడు నోటి నుండి చొంగపడుచుండును. ఎన్నిపర్యాయములు ఎనిమాచేసినను విరేచనముకాదు. పశువు లేచుట, పండకొనుట, మూలుట, వెన్నువిరుచుకొనుట, అపానవాయువులు విడచుట, క్రమేపి వ్యాధిమదిరి మరణమునకు సిగ్గుపగును.

చికిత్స

ఈ చింత మణిలో చెప్పిన రోగనిదానములలో పశువుయొక్క తత్వమునుబట్టి కొన్నిలక్షణములు లేకపోవచ్చును. మరొకరీతిగా మారవచ్చును. అంతమాత్రమునకే ఈ గ్రంథమును విమర్శించరాదు. మీ అనుభవమునుబట్టికూడ చికిత్స చేసికొనుట మంచిది.

గర్భశూల గల పశువునకు ముందువిరేచనమయ్యే నూత్రమును చూడవలెను. ఈ విరేచనమగుటకు ఆతురతతో రైతులు వివిధచికిత్సలు అనగా కొబ్బరినూనె, పంకాయలు, నల్లరే, పందిపెంటు, జెముడుకాడలరసము మున్నగు వస్తువులు పెట్టుటవలన మలము గట్టిపడి దీర్ఘవ్యాధిగా నై మరణమునకు సిగ్గుపగును.

ఆరంభములోనే నల్లజీడివత్తులు 15 మెత్తగాకొట్టి పేరు నేదెపాలలో కలిపి కాచి ఒక్కపర్యాయమే ఈయవలెను.

లేక రెండుగిద్దల ఉప్పును, కారపుపాలతో కలిపి గోరువెచ్చగా నుండునట్లు ఒక్కపర్యాయమే త్రాగించవలెను.

ఉప్పుతో తొమ్మిది ఇంటనుండిన, శనివారపు జడి శవ్వము పెలుకదు.

లేక నేపాలగింజలనూనే 60 రుక్కలున్ను, ఆమెదము నేడున్న కలిపి ఈయన వలెను. ఈ రీతిగా గాఢవిశేషముగుంటు ఒక మోతాగు యుద్ధించి లోపలనున్న చెకు మలనుంచి పడిపోయిన తరువాత ఏ వాయురసమో, ఏ నోటి రసమో, ఏ ఇగురపాలో, దినమున కొక మోతాదును యుద్ధును జీర్ణముగు లేలిక పదార్థములను పెట్టుచుండవలెను. కాచిన నీటిని దాహముగా నీయవలెను.

కారిజవ్యాధి

స్వభావము

పశువు కరీరమునందలి ప్రధానావయవములలో కారిజము ముగిసినయొప్పుది. ఈ అవయవముయొక్క భాగులై పశువుయొక్క సౌఖ్య మాధారపడి యున్నది. జీని తము నందలి సౌఖ్యపదవి నిర్మాణము నొందుచున్నది. ఈ అవయవముయొక్క స్వస్థత జేడినయెడల పశువు ముఖముగ నుండవచ్చును. ఆరోగ్యస్థితియ గుహిత దీని పరిమాణము మారుచుండును. ఈ అవయవముయొక్క ముఖ్య వ్యాపారము పశువు తిను క్రొవ్వు పదార్థములను రక్తమునందు గలియునట్లు జేయుటను నుపయోగించు ప్రైక్ర్యద్రవమును స్రవించజేయుటయై యున్నది. ఈ ప్రైక్ర్యద్రవము స్వాభావికమగు విశేషకారికను, ఆహారము ప్రశ్నపడడ జేయునట్టిదిగను పరిమించుచున్నది ఈ కారిజవ్యాధి పశువులకు అప్పుడప్పుడు సోపమమగును. ఈ వ్యాధి పల్లవు ప్రశ్నములలోను, పట్టినేలలోను మేయు జంతువులకు ముఖ్యముగా కలుగును. జంతువుయొక్క కాడములో నొక నిధనుగు పురుగు లుండుటచేత ఈ వ్యాధి యేర్పగును ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా చిన్న జంతువులకు వచ్చుచుండును. పశువులకు క్రిక్కిరిసి కట్టుటచేతను, శ్లేష్మముకొని గాఢా మోదలగు వస్తువులు మేపుటవలనను ఈ వ్యాధి కలుగును.

లక్షణములు

ఇది మిక్కిలి చెడువ్యాధియైయున్నది. దీనిని ఆంధ్రములో కనిపెట్టుట కష్టము. జబ్బుపడిన జంతువు నడుముపైన చెయ్యిపెట్టి నొక్కినయెడల చచ్చుముక్తి ద పెట్టెట నును కష్టము కలుగును. కన్ను, ముక్కు, నోరు మొదలగువానిలో నుండు మృగువగు పారలు పాలిపోవును. పశువు కరీరముపైనున్న రోమము రాలిపోయి కండ్లదృష్టి తగ్గి వచ్చును. గొంతుకలో నీరుపట్టి శబ్దము కనబడవచ్చును. పెద్దపాట్ల విస్తరించును. విశేషములు ప్రారంభమగును. నాలుక బడిపోపోవును. విశేషములచే పశువు దిగర పడి మృతినొందుచును.

చికిత్స

అన్నాభిది 1 కులము, సోడిటి 2 కులములు, నేలనేము 3 కులములు, వడినీరు అగ్గ నేరు కలిపి 4 దినములు త్రాగించవలెను.

(ప్రాద్దున్నేవచ్చిన దుట్టా ప్రాద్దున్నే వచ్చినవాని నిలువగా.

లేక నచాసాగరము 1 కులము, నాము 10 కులములు, ఏడ అర్థసేరు కలిపి 4 దినములు త్రాగించవలెను.

లేక కృష్ణకులసింహురసము పావుసేరు, ఒకపర్యాయము త్రాగించవలెను.

షరా:—చాలినంత ఎండుమేతతో ఉప్పుచేర్చి పెట్టవలెను.

మలమూత్రబంధ రోగము

ఈ వ్యాధి అతివేడిజేసిగాని, వాత రోగమువలనగాని, తదితర వ్యాధులలో యేదైన సందిగుణములు వుట్టినపుడుగాని ఈ వ్యాధి కలుగుచుండును. కడుపు బాగుగా ఉబ్బును. ఊపిరి ధారాళముగా విడువలేదు. మలమూత్రముల రెంటిని బంధించును. పశువు ఆననము ఉబ్బును. పశువు మూత్రకోశము వాగును. పశువు చెప్పరాని బాధ పడును. కండ్లను తేలవేయును. ముక్కుచుండును. అతివేడి యుండును. ఈ వ్యాధి సాధారణముగా చికిత్సకు లొంగదు.

చి కి ర్న

వెంటనే విరేచనమునకు ముఁదీయవలెను.

సొంటి అర్థసేరువలెటాసు, ఉప్పు చేరెడు కలిపి పొడిచేసి శేరు ఏటిలో కలిపి త్రాగించవలెను.

లేక అవిసెనూనె అరవీసేడు త్రాగించవలెను.

లేక మేడిమిరుడు పావుసేరు తెచ్చి పశువు ముక్కుగంధ్రములలో పోయును.

లేక ఆనాలు, నబ్బు మెత్తగా నూరి గుడ్డకు పట్టించి మూత్రద్వారములోనికి పోయవలెను.

లేక నారింజకాయంత ఆవు వెన్న నేరు నీటిలో బాగుగా కాచి త్రాగించవలెను.

షరా:—పై మందులు దినమునకు రెండుమూడుసార్లు ఉపయోగించవలెను.

గుండని పురుగులు

ఇవి తెలుపురంగుగానుండి శరీరముయొక్క లోపలి భాగమున ఏరుగి లిగియుండును. ఈ పురుగులు పశువుయొక్క కాలేయములోను ఊపిరితిత్తులలోను ఉండును. ఈ పురుగులుంటుంటేత శరీరావయవము లంతగా పనిచేయజాలవు. ఒకతర వానిలో పెదదిగా నుండు పురుగు చితికినసుడల దానియందలి విషద్రవము పశువుయొక్క కడుపుభాగ మందైన, రొమ్ముభాగమందైన పడుటవలన పశువు మరణించును. ఈ పురుగులు రెక్క

ప్రాగున వచ్చిన వన్నం ప్రాద్దుగూకి వచ్చిన కుట్టం పోరు.

తక్కువగా నుండు నేగాని జంతువునకు వ్యాధిని కలుగజేయునంత గొప్పదిగా నుండుట లేదు. మాదిగలు మాంసముకొరకై జంతువును కొనివెళ్తును లోపల విపురుగులు ఆనేకము చేరియుండును. ఈ పురుగులుండు జంతువుల మాంసము హానికరము. ఈ పురుగులు కనబడిన భాగము కొని వక్కలవ నేయరాదు.

చికిత్స

ఈ పురుగులు హానికరములు గాకపోవుటచేత ఈ వ్యాధి విషయమై సరిగా గుర్తించుట చాల కష్టము. పశువునుకొని పరీక్షించినప్పుడే ఈ వ్యాధి విషయమై తెలిసి కొనవచ్చును. ఈ పురుగు లుండిన కారిజముగాని, నురుగుదబ్బలుగాని కాల్చినేయుట మంచిది.

పశువు కఠీరములో పైన చెప్పిన పురుగులు పట్టకుండ నుండుటకు శుష్కగాని గంధకపుపొడిగాని పెట్టుటమంచిది. ప్రతి రైతు కూడ దినమునకు చేరెడు శుష్క దాణా దినుసులలో పెట్టినయెడల యేవిధమైన పురుగులు పట్టవు. ఈ బాధ్యముచే బాధపడు దుర్బలమగు జంతువులకు ఆమ్లభేది, నేలవేము, సొంటి, శుష్క ఈ వస్తువులు ఔషధ ప్రమాణముగా బలము వచ్చువరకు ప్రతి దినము పెట్టుచుండవలెను.

కర్పూరలైలము ఆరుదము సమభాగములు కలిపి త్రాగించవలెను.

శేపాపసరు శుష్క కలిపి త్రాగించవలెను.

ఆహారకోశములో నుండు పురుగులు

ఇవి పశువు ఆహారాన్ని తిని ప్రవేశించి ఒక విధమైన రోగము కలిగించును. ఈ పురుగులు జలగ ఆకారముగా నుండును. ఈ వ్యాధి పల్లవు ప్రదేశముగావుండు పశువులకు తరచుగా వచ్చుచుండును. మొదట పశువు బాగుగా బలియును. తరువాత దుర్బలపడి పారుడులై రక్తహీనమై కృశించి చనిపోవును.

చికిత్స

ఈ వ్యాధిగల పశువునకు లెల్లప్పు పానకము ఆమ్లద్రవ్యము త్రాగించుట మంచిది. లేక దానిమ్మచెక్క కషాయము త్రాగించవలెను. లేక దుమ్మపాకు రసము త్రాగించవలెను.

రోమ్ము నొప్పి

దీనినే రొమ్ముపట్టు, రొమ్ముగడిశలబడుట యందురు. పశువులను వినుగు విరామములేక ఎక్కువ బరువులు వేసి బండ్లు తోలుటచేతను, చలిగాలి సోకుటచేతను, శీతగాలి సోకుటచేతను, వివాహములకు గుడిసెబండు కట్టి ఎద్దులను సర్దాగా కన్నుమిన్నుగానక తోలుటచేతను, ఇనుపనాగళ్లతో దున్నుటచేతను, కిరాయిబండ్లవారు ఎక్కువ

ధాన్యపుటస్తాలవేసి బురదగానుండు బహారులలోనూడ లోలుటచేతను, మాటిమాటికి బరియెముకలపైక రైతులు తమ చెండు కర్రలతో కొట్టుటచేతను ఈవ్యాధి కలుగును.

లక్షణములు

ఈ నొప్పి ప్రారంభమైనవెంటనే జ్వరము సోపను. దగ్గుచుండును. దగ్గునపుడు బుసకొట్టుచుండును. పశువు ఎల్లప్పుడు పంతుకొనుటకు ఇష్టపడుచుగాని, నిలుచుండుటకు ఇష్టమును నూచింపను. క్వాసోత్పత్తియగు అంగములపై పలువిధములైన వాపు సంకటములు సంభవించుచుండును. రొమ్ముభాగము చాల బాధగా నుండును. రొమ్మెముక చాల పచ్చిగానుండి అప్పుడప్పుడు నోటివెంట నురుగుగాని, తెనుడగాని పడుచుండును. వ్యాధిని గ్రహించలేక పశువుతో పనిచేయించివయెడల రక్తప్రచారమున కొటంకము కలిగి ఊపిరాడక పశువు చనిపోవును.

చికిత్స

తాటిబెల్లము అపిసి, జల్లేడునూనెపాట్లు అర్ధసేరుకవటూకు కలిపి త్రొక్కి నెమ్మదియగునరకు పెట్టుము.

లేక ఉలపపిండి అసోలెకు, తాటిబెల్లము అపిసి, తెలికపిండి సవానేరు, ఉప్పు చేరెకు, కొడిపెట్ట త్రొవ్వ సవానేరు కలిపి త్రొక్కి ప్రతిదినము ఉదయ సాయంత్రములందు కొడిగ్రుడ్డగి వ్రేతుక పైనుండు పచ్చపసు పెట్టుము.

లేక ఉప్పిచెక్క 8 తులములు, పసుపు 1 తులము, ఉలపపిండి సోలెకు, కలిపి దలది గెండు నిసములు పెట్టవలెను.

లేక తక్కడువేరుపాట్లు 8 తులములు, జల్లేడుపప్పులు 2 తులములు, తాటి బెల్లము సవానేరు కలిపి పెట్టవలెను.

హెచ్చరిక

రోగముగల పశువును త్రొత్తపాకలో నూచి వేడికాపులు రొమ్మున కిడ ప్రక్కల కాచవలెను. పశువు ఎడరాలదగ్గరనూడ బాగుగా కాపులు తీయుట మంచిది. కాపులు తీయునపుడు తడిలేమండ పొడిగుడ్డలో వేయించి యిముకగాని, ఉప్పుగాని వేసి తీయవలెను. ఆవసరమున్నయెడల ఆవాల పట్టుగాని, లేక గురివిందాను పసరులో నన్న కలిపిగాని, లేక నల్లు నున్నము సమానభాగములుగా నూరి పట్టువేయుము.

రక్షణము

ఈ రోగము పశువు మెదడు చెనుటవలనను, ఎండలోను, వడగాడ్పులలోను పశువును పనిచేయించుట వలనను, వేడిని గలిగించు దాణాదినములను మేపుటవలనను, పశువులకు కలుగును.

లక్షణములు

పశువునకు జ్వరము తగులును. గొంతునాళములు చాల వేడిగా నుండును. దేహము కృశించును. ముష్కలనుండి, నోటినుండి, అననమునుండి నెత్తురు పడుచుండును. పశువు మేత మేయను. ఒకవిధమైన కూల కలిగి పశువు చాల బాధపడుచుండును. మూలును. పండ్లు కొరుకును. రక్తము ప్రవించినకొలది పశువు నీరసించును. నోరు దుర్వాసన చేయును. కాళ్లు పట్టివేయును. వ్యాధి ముదిరినకొలది పశువు నడువజాలదు. సరియైన చికిత్స చేయనిచో వెంటనే చనిపోవును.

చికిత్స

ఈర గుంజ-అరవీసి, పంచదార-అర్ధసేరునవటాట కలిపి ఒకసారిపెట్టుము.

లేక నేరేడుచెక్కరపము-అర్ధసేరు, ఆవుపాలు-అర్ధసేరు ఈ మోతాదు వంతున కలిపి రెండునాళ్లు త్రాగించవలెను.

లేక ఆముదపువేళ్లు-2 గుప్పెళ్లు, పల్లెకువేళ్లు - 2 గుప్పెళ్లు, దప్పవేళ్లు - 1½ గుప్పెళ్లు, కల్లువేళ్లు-3 గుప్పెళ్లు, నూరి కషాయము కాచి అర్ధసేరు ఆవుపాలుతో కలిపి ఒకసారి త్రాగించవలెను.

లేక అర్ధసేరు గోదే మూత్రము రెండుపూటలు త్రాగించుము.

లేక ఆడగుట్టపు లదై గడ్డలోవేసి కింకగా వచ్చిన రసముతో చేయి విస యింగువ తులము కలిపి ఒకసారి త్రాగించవలెను.

లేక ఉత్తలేటి ఆవుపసరు-గిరెడు, ఆవుపాలు-అంసోలెడు కలిపి అప్పుడప్పుడు పోయిదుండవలెను.


హెచ్చరిక

ఈ వ్యాధిగల పశువును ప్రత్యేక స్థలమునం దుంచవలెను. రక్తముకారు శరీర భాగములను పటిక లోషణతోగాని, మెలతుత్త్ర లోషణతోగాని కడుగవలెను. ఈగలను మూగవీయరాదు. అర్ధసేరు పెరగుగిల్లిలో అరిసోలెడు పేరునెయ్యి కలిపి తినిపించవలెను. లేక అర్ధసేరు నూకలజావ త్రాగించవలెను.

వాత రోగములు

పదునైదవ భాగము

చ॥ నసియగు వన్నెతగ్గి జగిచార నశించియు కప్పవేయగా
పనయునశించి దేహమును బాధచే సంపచితంబు చేసెడిన్
పసరముజిక్కి పాదములు పట్టుచు వేయుచు బాధబొందెడిన్
మెనవుట తగ్గు కొన్నిటికి మేనుజిగుల్ మఱిహెచ్చియుండెడిన్॥



గీ॥ వ్యాధి ముదిరినకొలది వాయుగీర్ణు
పాడి పశువుల కయినను పాలుతగ్గు
వేడవాసన జగరుగా బెట్టుచుండు
వాతమందురు దీనిని నేరలెందు॥

రైతులలో చాలామంది మా పశువులకు వారము చేసినది, యేమియు తినుట లేదని మామూలుగా తదితరులతో చెప్పుచుందురు. వారమును వ్యాధి దేనివలన వచ్చుచున్నదో, అలక్షణము లేటుండునో ఈ వారములలో ఎన్నిరకములున్నవో, ఏయే వారములలో పశువు లక్షణము లేటుండునో, ఏ ఆహార పదార్థములు తినినందువలన ఈ వ్యాధి వచ్చినదో మున్నగు విషయములు తెలిసికొనవలెను. వార పీత కథములు (ప్రిథాతువులు) పశువులకు కూడ గలవు గాన ఈ విషయము ఇదివరకే తెలుపబడినది గాన వివరముగా చూచుడు.

పశువులు తిను మామూలుఆహారముగాక అదనముగా బలముగలిగించు తొండంగి, పిల్లిపెసర, మినుము, కందిపొట్టు, శనగపొట్టు, తేవుడు మున్నగునవి మితిలేకుండ మేపుట వలనను, వేసవికాలములో పిల్లిపెసర పొలములలో పశువులనుతోలి మిక్కుటముగా తినుపించుటవలనను, ప్రత్తిగింజలు, మొక్కజొన్న పాలకండెలు, జొన్ననీడి, పాలు, మినపండి ఇంకా ఎన్నోన్నో రకరకాల పదార్థములు అల్లుళ్లకు పెట్టినట్లుగా ఈ పశువులకు పెట్టుటవలనను తప్పక వారము కలుగుచున్నది. ఈ రీతిగా మేసిన పశువులకు తగినంత వ్యాయామము ఈయకపోవుట వలనను, చలికాలిలో, ఎండలో నుంచుటవలనను ఈ వారము వచ్చును. గాన పశుప్రదర్శనములకు వెళ్లాలని ఆసన్నము, గుగ్గిలు, గారెలు బూరెలు, నెయ్యి మినపండి వగైరా మనవివరే పశువులకుకూడ గారాబముగా పెట్టే వారున్నారు. ఇటువంటివన్నియు పెట్టి ఆరే! మాగి తప్ప కాళ్లుపట్టినదిరా! వారము చేసినదిరా! అని చెప్పగానే 74వస్త్రులు ఏ కొండలమీదనో, ఎవరు చెప్పినదో తినికొని వచ్చి ముద్దకొట్టి నోటిలో పెట్టుచును. ఇట్లు పెట్టుటవలన వస్త్రుల గుర్రముల ననుసరించి లోపల జీర్ణింపుకొరకే నోరులేని ఆ పశువు పడే బాధ భగవంతుచక్కెరుక. కాబట్టి ఇట్టి పశువులకు బాగ్రతగా చికిత్స చేయించవలెను. ఇవన్నియు నా అనుభవములొన మాటలు గాన చెప్పవలసి వచ్చినది. ప్రదర్శనములకు వెళ్లవద్దనిగాని వాటిని మేడవద్దనిగాని చెప్పుటకాదు. నేను స్వయముగా పై పదార్థములు పెట్టువారిని చూచితిని గాన తెలుపడమైనది. నేనుకూడ రైతుల మహిళలలో ఈ విషయములకుబోధకపఱచుచుంటిని గాన బాగ్రతగా మేపుచురుగాక.

లక్షణములు

వారమునది పశువు దేహములో జీర్ణించిన రెండుమాడు సూక్ష్మరములకుకూడ రావచ్చును. ఆరింధికలో నెలకొట్టు వేయును. ముఖ్యముగా నెన్ను, దొక్కల భాగము ముడుచుకొనును. అగమేత మేయును. కాళ్లు పట్టినేయును. శరీరంకు మెరుపుగా నుండును. పేడ పలుచగాగాని, గట్టిగాగాని యుండి పులుసువాసన కొట్టుచుండును. మలబద్ధకముండును. జ్వరము హెచ్చును, తిగ్గుచుండును. క్రమేపి పశువు క్షీణించుచుండును. కండ్లనుండి కొన్నిటికి పుసిరుకొనును. అప్పుడప్పుడు పండ్లు కొరుకుచుండును. పశువు

ఏరునుందా ఏర్పాకవున్నను నుందా.

తన తలను కడుతున్నగర పెట్టుకొని విచారకర్మముగా నుండును. కొన్ని వెన్ను విగ్రహుండును. అపానవాయువులుకూడ విడదునుండును. క్రమేపి పశువు విరసించి చనిపోవును.

చికిత్స

ఆరంభములోనే ఎరిమాచేయుట మంచిది.

ఏరు పెసరాకు (పేరునుగానుండును. ఇది మొక గుబురుతీగః సముద్రపు ప్రాంతములందును కొండల ప్రాంతములందును.) రిపిసెలు, మంచినానె 4 పీసెలు, సొంట్రి, పిప్పళ్లు, మిరియాలు 15 గులములు, తాటితెల్లం 2 పీసెలు, ఉప్పు సోలెడు, తురంజివాము సవాసేరు కలిపి త్రొక్కి ఒకమండలవేసి పక్షముదినములు భూమిలో పాతిపెట్టి తీసి ప్రతిరోజు సవాసేరుమందును తినిపించి చాలా బాగుగా పుచ్చెయును. ఇది నా స్వామి భవము.

లేక తమలపాము 50, ఇంగువ 2 తు, వెల్లులి 4 తు. మెత్తగానూరి ఒకగొట్టను నువ్వులనూనెలోకలిపి రెండుదినముల కొకమోతాదువంతున వారము దినములు యిచ్చిన తగును.

లేక చేకొడితాడు (నేగుర్తాడు) పసరుసేరు, పసుపు 1 తు, ఇంగువ 2 తు, వెల్లులి 8 తు, తురాసానివాము గుప్పెడు కలిపి రెండు దినములకొకసారి వంతున 10 దినములు పెట్టుము. లేక లేలికగా తగిలిన పశువుకను ప్రతిరోజు ఒక కొబ్బరి కాయను బటిలోత్రొక్కి చాలుతీసి ఒకసేరున్ను, సొంక్రి, పిప్పళ్లు, మిరియాలు, ఇంగువ ఒక్కొక్కటి ఒక్క తులమువంతున కలిపి నాలుగురోజులు పెట్టిన తగును.

లేక పచ్చి అల్లము 4 తులములు, ఉప్పు 5 తు, కొబ్బరిపాలుసేరు కలిపిపెట్టుము

లేక దుబ్బపాపపసగు అన్నసేరు, కడుగు సేరు, ఉప్పు 4 తు, కలిపి పెట్టుము. నాలుగు మోతాదులీయుము. దినమున కొకసారి మాత్రమే.

లేక వెంపలివేళ్ల రసము అన్నసేరు, కలిపిరు సేరువంతుక పదిరోజులు పెట్టుము.

లేక నల్లేరు నిమ్మకాయంత, ఇంగువ 1 తు, వెల్లులి 4 తు, ఆముదపుపప్పు నిమ్మ కాయంత నూరి సేరు కలిపిపెట్టుము.

కొళ్ళు పట్టుపట్టిమెడల ఒకబిందె బటిలో తురక వేపాకునుగాని, వావిలాకును గానివేసి కాచి కొక్కిత్రాగువంత వేడిబటిలో గుడ్డముంచి అప్పుడప్పుడు కొట్టుదు కొబ్బరి నూనెలో హారతికర్పూరబిల్లలువేసి కలిపి మర్దన చేయవలెను.

లేక మంచినూనెలో మండపసుపుకొమ్ము అరగదీసి పట్టించుము.

లేక కర్పూరతైలమునుగాని, వెన్న, పసుపు కలిపిగాని రాసి మద్దనచేసి తడి కాపులు వేయవచ్చును.

ఈరీతిగా ఇంకను అనుభవముమీద చికిత్స లెన్నోగలవుగానఁ చేసికొనవచ్చును.

ఈ రోగముగల పశువులపై లేలికగా జీర్ణమున పద్ధాంతములను పెట్టవలెను. ఎండలోను చలిలోను యుంచరాదు.

ఆంగ్లేయ చికిత్స

సోడా సాలిసైల్ 2 1/2 గ్రాములు, పర్మీస్ బింజర్ 1 గ్రాము, మంచిబెల్లము 10 గ్రాములు, కలిపి దినుము కొకపర్యాయము వంతుఁ నాలుగురోజులు ఇచ్చిన తర్వాత.

కీళ్లవారము (Arthritis)

పశువులు చలికాలిలో నుండుటవలనను, మురికిగానుండు ప్రదేశములో నిట్టుట వలనను, వారము జీర్ణించిపోవుటవలనను ఈ వ్యాధి వచ్చును.

ఈ వ్యాధిలో జ్వరము తీవ్రముగానుండును. అన్ని అవయవములు నేడిగానుండును. ఆకలి దురుహదనము తగ్గును. నడచుట కంతమాత్రము యిష్టముండక పశుకొని మూలు ముండును. ఈ వ్యాధికి పశువు కొంపలదగ్గర వాడును. ఆ వాపు ఒక కాలవఱకుగాని నాలుగు కాలవఱకుగాని రావచ్చును. ఇట్టి సమయములో పశువును కడలించురాదు. వాపు భాగము నేడిగను గట్టిగను ఉండును. ఈ వ్యాధి దీర్ఘకాలమున్నచో పశువునకు జ్వరముండదు. ఈ వ్యాధి ఆవులకు ఆబోతులకు యున్న మూడవరకూడ వచ్చును.

చికిత్స

నల్ల ఉమ్మెలైవ పసుపు అర్ధపేరు, నల్లమిను 1/4 గ్రాము, పసు 1 గ్రాము. కలిపి వాపులకు పట్టవేయవలెను. లోపలికి దురుహదనము పుట్టించు అహరియునుగాని, మందునుగాని ఈయవలెను.

లేక అన్నభేది 1 గ్రాము, విషముష్టిగింజలపాడి 1 గ్రాము, వాము 4 గ్రాము, నేలవేము 2 గ్రాములు, కలిపి, పేరు దిటిలోగాని, ముద్దగా వచ్చువంత తాటిబెల్లముతోగాని దినుమును కొక మోతాదువఱకును పక్షము దినములు పెట్టుదు వాపులకు కీళ్లపట్టులకు కర్పూరతైలము 6 గ్రాములు, సబ్బు 1/2 గ్రాము, కొబ్బరినూనె 12 గ్రాములు కలిపి మద్దనచేసిన తర్వాత.

లేక తాటిబెల్లము 2 నీసెలు, వెల్లులి 6 గ్రాములు, కొట్టుపసుపు 4 గ్రాములు, పరంజీవాము 10 గ్రాములు, ఇగురు 4 గ్రాములు, ముసగ చక్కపాడి 10 గ్రాములు, సన్నావాలు 4 గ్రాములు, కలిపి మెత్తగా నూరి దినుమును కొక పర్యాయము రెండునెమ్మకాయలంత ఉండను మందు వచ్చువరకు పెట్టవలెను. మలబద్ధకము లేకుండ చూడవలెను. నవ్వులనూనెలో చిత్రమాలమువేరు

కర్పూరకపు పర్ణమును కొడిమోసు రేడియదు.

అరగదీసి కీళ్లవాపులకు పట్టించుము. లేక జిల్లేకుసాలు 1 భాగము, వెన్న 6 భాగములు, పసుపు అర్ధభాగము కలిపి వాపులకు రుద్దవచ్చును.

లేక వానిలాట గుప్పెడు, నేలకేము ఆట అరగపెట్టు, వేసాట గుప్పెడు తెచ్చి మెత్తగానూరి దానిలో అరకులము పసుపు కలిపి కాఫీ త్రాగునంత వేడిపిటితో దినమున కొక మోతాడువంతున వ్యాధి తగ్గువరకు పెట్టవలెను.

ఈ వ్యాధి దీర్ఘముగా నున్నచో ఎక్కువకాలము పై మందులను వాడవచ్చును. వాత సంబంధమగు ఆహారములు పెట్టరాదు. మందులకు తగ్గినచో రక్షలు వేయవలెను.

ఎండువాతము

చం॥ మలములో మార్పుగన్నడును మత్తుగామేయును మందగించు నా
కలియును కొన్ని యాకటనుగ్రాలుచు మేయుచు చిక్కిపోయెడిన్
పలుచగకొన్ని బారెడిని వాసన దుర్భరమై చెలంగెడిన్
పొలముకు బండిగట్టినను బోరునబారిననట్టి దీనినే
ఎలమిని యెండువాతమని యేర్పడజెప్పిరి పెద్దలెంతయున్ ॥

ఈ రోగ మెల్లప్పుడు శరీరము వేడిగానుండు పశువులకును, అజీర్ణివలనను, మూత్రము జారీయగుటవలనను, నరములలో పటుత్వము లేకపోవుటవలనను, దాణాలు, ఇన్నమువచ్చిన మందులు బలము కలుగజేయునను యుద్దేశ్యముతో పెట్టుటవలనను, ఎంత మేలినను విస్మత్తువగా నూడి బరి ఎముకలు కనబడుటవలనను, మేత, నీరు పెట్టి వెంటనే బాడి కట్టుటవలనను, ఈ వ్యాధి రాగలగు. దీనినే పెంటికకలు, అజీర్ణవాత మందురు.

లక్షణములు

పశువునకు లోపల మామూలు వేడికంట ఎక్కువగా నుండును. వేడను కొన్ని రోజులు గట్టిగను, మరికొన్ని రోజులు పలుచగను వేయుచుండును. ఈ రోగముగల పశువులను నేను చాల పరీక్షించితినిగాని వ్యాధి ముదిరిన లాభము కన్పట్టదు. కాళ్ళు, శరీరము శుష్కించుచు బండి కట్టినపుడు పారుచుండును. మరికొన్ని వ్యాధి ముదిరిన కొలది శరీర పటుత్వము ఎడతెగక పారుచుండును. ఈ పారుడు వెనుకకాళ్ళ కొంటులకు తోకకు, ముడ్డికి అంటియుండును. పారుడులో బురిగలుండి నలుపురంగుగా నుండును. మలము పులుసువాసన కొట్టును. రైతు కొన్నియో చికిత్సలు చేయుదురు. పారుడుపుట్టిన తరువాత లాభముండదు. కృత్రిమి నెమ్మదిగా చనిపోవును.

కత్కాటకము బిందిస్తే పర్పాటకము పండును.

చికిత్స

ఈ వ్యాధికి అనేకమంది అనేక చికిత్సలు చేయుదురు. తాత్కాలికముగా ఏతుష్ట చెక్కయో ఏ సేరేడు చెక్కయో నీటితో త్రొక్కి చిక్కినిరసము నాలుగైదు పర్యాయములించిన క్లగ్గునుగాని మరల యధాప్రకారముగా పారుచునే యుండును. నైతులప మాడ వినుగుపుట్టును. అందుచేత ఆరంభములోనే జాగ్రత్తగా చికిత్స చేయవలెను.

ఆరంభములో వేయించిన ఉలవపిండి వుంచెడు, తాటిజెలం 4 వీసెలు, ఆలం 8 తు, మాశేడు పండ్లపాడి 20తులములు, ఇంగువ 10 తు, వెల్లుల్లి 8 తు కలిపి త్రొక్కి కలిపి ప్రతిరోజు కొబ్బరికాయంత పరిమాణము పెట్టవలెను.

లేక నేరు ఆవుపాలలోగాని, మేకపాలలోగాని సవాసేరు తెలికపిండికలిపి ఒక పూట నానించి తులమున్నర పసుపుకలిపి దినమున కొక మోతాదువంతున పక్షము రోజులు పెట్టుము.

లేక తమలపావలు 100, ఇంగువ 1 ను, పసుపు 1 తు, మాశేడుపండ్లగుఱ్ఱ 2 తు. కలిపి నూరి దినమునకొక మోతాదువంతున 10 దినములు పెట్టవలెను.

లేక చేరొడి ఆమరసము అర్ధనేరు, పాలు అర్ధనేరు, పసుపు 1 ను, ఇంగువ 1 తు కలిపి దినమున కొక మోతాదువంతున వారము దినములు పెట్టుము.

ఇంకను అనుభవముమీద ఎన్నో చికిత్సలు చేయవచ్చును. పై యంగులను వాడునపుడు కొంత కాలము పశువులప విశ్రాంతి నీయవలెను.

ఆ మ వా త ము

దీనినే శీతవాతముందురు. పశువు కార్మము మూత్రగ్రంధులు సరిగా పనిచేయక పోవుటవలనను, ఉలవలు నానపోసి రుబ్బి మోతాదుకంటె వుడితితో కలిపి పెట్టుట వలనను, తివుడును మితిమీరి పెట్టుటవలనను, అజీర్తిలో దాణాదినును జమ్మవగా పెట్టుటవలనను, విషసంబంధమగు పదార్థములు పెట్టుటవలనను, ఈవ్యాధి రాగలదు.

లక్షణములు

జ్వర మెక్కువగానుండును. చిన్నకీళ్ళు అస్వస్థత నొంది బాధగా నుండును. పశువు మందమతిగా నుండును. విశేషములు తెలుపు పసుపు రంగుగా నుండును. కడుపునొప్పిమాడ కొన్నిటికి యుండును. ఈవ్యాధి రాత్రులయం బెక్కువగానుండును. మూత్రముతో వీర్యముకలసిమాడ పడుచుండును. అప్పుడప్పుడు కడుపుబ్బరముండును. ఈ వ్యాధి ముదిరినకొలది పారుచు పులుసువాసనగా నుండును. దొక్కలు దిండుకొని నీరసము జెంది చనిపోవును.

చి కి త్వు

విశేష బద్ధకముగానున్నయెడల అముదము నేరు, అలం 4 తులములు కలిపి ఈయుము. తరువాత కరిక్కాయలెగుడు 10 తులములు, తాటిబెలము వీసె, పసుపు 6 తులములు, ముద్దకర్పూరము పావుతులము కలిపి త్రొక్కి వెలగొకాయంత వంతున ప్రతిరోజు పెట్టుము.

లేక అల్లము 2 తులములు, పసుపు 2 తులములు, మెంతిసిండి 4 తులములు, త్రులిన మజ్జిగలో కలిపి దినమునకొకసారివంతున వాఁముదినములు త్రాగించుము.

లేక వామ గుప్పెడు, పచ్చిపసుపు 4 తులములు, సొంటి 3 తులములు, వెల్లులి 3 తులములు కలిపి త్రొక్కి నేరు గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి త్రాగించుము.

లేక ఉదయమున అరసేరు పాలలో 2 తులముల సొంటిని కలిపి నాలుగు దినములు త్రాగించుము.

శి రో వా త ము

ఈ వ్యాధి జలుబువలనగాని, పర్రాకాలములో మాగాని పాలములలో దమ్ము చేయుటవలనగాని, పచ్చిగడ్డి నొరకనపుడు తవును, చిట్ట మన్నగు దాణాలు ఎక్కువగా పెట్టుటవలనగాని, ఈ వ్యాధి రావచ్చును. లేకపశువుల కష్టవగా సోకును. ఈ వ్యాధి కిరెన్నులో వుట్టుటవలన కిరోవాతసుని చేరువచ్చినది.

లక్షణములు

అరంధిములో పశువునకు వేడి తక్కువగా నుండును. చెవుల మొదటిభాగమును వేడిగను, చివరిభాగముందు చల్లగను ఉండును. ముక్కులనుండి ద్రవమువంటి పదార్థము కారుచుండును. అప్పుడిప్పుడు కండ్లనుండి నీరుగార్చును. నల్లకప్పువేయును. కాళ్ళు పటివేయును. వ్యాధి ముదిరినకొలది శుష్కించి ముక్కులనుండి వచ్చు ద్రవము చిక్కిగా నుండును. అగమేత మేయును. నాలుకతో ముక్కులనుండి వచ్చు ద్రవమును నాకుచుండును. నీరుపూడ సరిగా త్రాగదు. నాలుక తెలుపుగా నుండును. ఈ వ్యాధి నెలరోజులువరికూడె యుండును. క్రమేపి కొమ్ము దొల్లలుగాగాని కొమ్ము మాడగాగాని చేరవచ్చును.

చి కి త్వు

అరంధిములో ముక్కులనుండి వచ్చు ద్రవమును పరీక్షింపవలెను. ఏయే అహారము పెట్టినది? ఎంతకాలమునుంచీయున్నది? పరీక్షించవలెను. తరువాత అవుపాలుగాని మేకపాలుగాని నేరు, వడపాడి 1 తులము, సొంటిపాడి 1 తులము కలిపి దినమున

కొక మోతాదువంటున పక్షముదినములవగవ పెట్టిన తప్పుక తగ్గును. వారవస్తువులను మాత్రము పెట్టరాదు. అప్పుడప్పుడు ముక్కురంధ్రములవ సాంబ్రాణిపొగను పట్టించుట నుంచిది.

లేక వసు 1 తులము, వెలులి 1 తులము, వుప్పింటాకుపసురు 6 తులములు కలిపి తొడు చెవులలో పోసి కొమ్ములకు చెవులవ కట్టవలెను. ఈరీతిగా నాలుగుదినముల కొక పర్యాయము చేయుచు బలముగల ఆహారపదార్థములను పెట్టుచుండవలెను.

లేక వామింటాకు సిడికెడు నలిసి నీరుసిండి బిళ్ళగాచేసి తలకొమ్ములవ కట్టవలెను. ఈరీతిగా వారమురోజులు చేయవలెను

శిలవగుగిల్లు, మడ్డికూడు, వగైరా ఎక్కువగా పెట్టవలెను. ఇంకను విపరీతముగా ముక్కులనుండి నీరు కారుచున్నపుడు ముచ్చెనగుబలో ఒకచుక్కగా కాల్చుట మంచిది.

గర్భవారము

పశువును మితిమీరి మేపుటవలనను, కందులు, శవగలు వడ్లు వగైరా పొట్టుతో నున్నపుడు ఆతురతతో తినుటవలనను, పరిశీలక, తొండంగి, పిల్లిపెసర ఎక్కువగా తినుటవలనను ఈ రోగమువచ్చును.

పశువు నల్లకప్పు వేయును. పులబడకముగానుండి పేడ గట్టిగానుండును. జ్వరము కూడ నుండును. దగ్గ కొద్దిగానుండును. ముఖ్యముగా నొడు మైలాగుకొని పోవును. నీరుడుకూడ ధారాళముగా పోయను. మేత నీరు క్రమేపి మానును. దొక్కలక్రింది భాగము వెన్నెముక భాగము ఉబ్బుముగా నుండును. కొన్ని పశువులు కాలేనుకూడ పట్టిచేయును. ఈవ్యాధి 10, 20, 30 దినములవరుండును. తగిన చికిత్సచేసిన వెంటనే తగ్గును.

చి కి త్త

గర్భకోశములో వారముండుటవలన గర్భవారమును పేయవచ్చినది. ఆరంభములో కటకరోహిణి 1 తు, ఉప్పు 6 తు, సొటి 1 తు, మిరియాలు 1 తు, సారాయి 2 బ్రాములు, నూకలజాప పేరు కలిపి త్రాగించిన తగ్గును.

లేక వెట్టిపుచ్చకాయలు 40 ని కొనిన తరువాత పసుపు 10 తు, వరంజీవాము 10 తు, నల్లకప్పు 4 తు, వేసి త్రొక్కి ఒక వుండలోవేసి నాలుగు దినములుంచి ప్రతి రోజు ఒక వెలగకాయంత ముద్దనుపెట్టిన తగ్గును.

లేక వెలులి 15 తు, ఇంగువ 10 తు, సొటి 4 తు, వరాసానివాము గుప్పెడు, పచ్చిపసుపు 10 తు, అయిదవుపప్పు సోలెడు కలిపి త్రొక్కి నిమ్మకాయంత ఉండలు చేసి రేపుమాపు పెట్టిన తగ్గును.

లేక అల్లము 15 తు, నాము 10 తు, ఇంగువ 4 తు, ఉప్పు 15 తు, సోడాఉప్పు 10 తు కలిపినూరి దినమునకు 4 తులములవంతున నేరు వేడినీటిలో కలిసియిచ్చిన తగ్గును.

మలబద్ధకము గానన్న ఆగంభములో విశేషములను ఈ మందులను. వ్యాధితగ్గువరకు లేరిక ఆహారపదార్థములను యిచ్చుదుండువలెను.

న క్క వా త ము

దీనినే నక్కోగు, జంబుకవాతము, కసిమిరి యందురు.

ఆ॥ వె॥ పసికిని దగ్గుతగ్గి పాడుపడుటకే త
నిచ్చగింప బొగునీడజూచు
నోరు చొంగ నెంది నూత్నరూపంబందు
కసిమిరనగబరగు కాంచ ధరణి.

గీ॥ కోడ్రిగుడ్డంత సున్నము గుళికలొనగ
జేసి పూటకు నొక్కటి శీఘ్రముగను
యుక్తిచే పశుచయమ్ముల కొదవిలేని
నక్కవాతాదికమ్ముల సృక్కజేయు.

గీ॥ నీరుల్లి తాటిబెల్లము
నేరువునను ద్రొక్కి పసికి నియతి బెట్టన్
లేరడచు నక్కవాతము
ఘోరపురోమాళి యొక్కసారిని దూలున్.

గాలివంటుకగిలి పశువు ఎండలో ఉండుటవలనను, రక్తవృద్ధి తగ్గుటవలనను, జబ్బులో నీరసత్వ మెక్కువగా వుండుటవలనను, పేగులలో పురుగులుండుటవలనను, ఊపిరితిత్తులలో వేడి గాలి శరీయుండుటవలనను ఈ వ్యాధి వచ్చును.

ల ట్ట ణ ము లు

పశువు శరీరమంతా నలుపుగంగుగనో, బూకినగంగుగనో యుండును. కొన్నిటికి నక్క వెండ్రుకలవలె పొడుగు రోమములు వుట్టి నిక్కబొడుగుకొని యుండును. ఎండలో నెంతమాత్రము నిలువలేక నీడకొరకు ఎదురు చూచుచుండును. పగర్పు

ఎక్కువగా నుండును. కొన్ని పశువుల దీనముగా నుండి కృశించును. ఇట్టి పశువులను జాగ్రత్తగా కాపాడవలెను.

చికిత్స

తండ్రిడుచిగుళ్ళు నాలుగు గుప్పెళ్ళు, ఏరుల్లిపాయలు 10 తులములు, గోంగూర సవాసేరు, పయిడిప్రత్తిఅకు గుప్పెడు త్రొక్కి దినమువఱక మోతాడువంతున పక్షము దినములు పెట్టుము.

లేక నీరుల్లిపాయలు 25 తులములు, సచ్చిపసుపు 6 తులములు, తాటిబెల్లము 15 తులములు, కలిపి త్రొక్కి రోజువిడచి రోజువంతున పక్షముదినములు పెట్టుము.

లేక నాగులాడు 2 పీసెలు, తక్కుడాడు 1 పీసె, గోంగూర 2 పీసెలు, మంచి నూనె 1 పీసె కలిపి ముద్దజేసి దినమువిడిచి దినము పెట్టుము.

లేక కలబందగుజ్జ 15 తులములు, ఉలవసిండి ఆరసోలడు, ఏరుల్లిపాయలు సవాసేరు, కలిపి త్రొక్కి దినమువఱక మోతాడువంతున వారుము దినములు పెట్టుము.

లేక పూటకు కోడిగుడ్డంత నున్నము పెట్టుము.

లేక పసుపు 6 తులములు, తామగసుంపలు 1 పీసె, చెండవేళ్ళు 2 గుప్పెళ్ళు, పంచదార ఆరపీసె కలిపి 2 కేళి పండివేలితోపండి వెలగకాయంత తీసికొని ఆరశేరు గొర్రెపాలతో కలిపి పెట్టుము.

లేక పచ్చిగోంగూర 1 మ.పసు, సొంటి 15 తులములు, మిరియాలు 10 తులములు, ఉసిరికపప్పు సవాసేరు, కలిపి ఒక బాసలో వేసి ధూమిలో 10 దినములు పాలి పెట్టి దినమువఱక కొబ్బరికాయంత పెట్టుము.

తిమురువాలము

పశువుల శరీరముయొక్క నరముల వాపుదలవలన యీ వ్యాధి వచ్చును. ఈవ్యాధి ఉష్ణప్రాంతము లందుండు పశువులకు తరచుగా కలుగుచుండును. ఇంకను రక్తహీనత వలనను, చలిదోష్టువలనను, శీతవాలేమువలనను, చెమ్మతగులుటవలనను, సరిగా మేతమేపని పశువులకును యీ రోగము వచ్చును.

లక్షణములు

కొళ్లు పట్టుపట్టి వంగుచుండును. నడకలో తంటుచుండును. మన చేతితో ఆయా భాగములను తాకిన బండబారినట్లుండును. కీళ్ళనొప్పులుండును. వ్యాధి ముదిరినకొలది శరీరము ఉబ్బును. ఇదియే చివరకు ఎడమవ్యాధిలోనికి దిలును. నాడి నీరసముగా

తులాయాం జాయతేహిమం వృశ్చికాంతభింగతే ధనుషీధనురాకారం మకరే
మండలాకృతి : మండేశీతమశీతంవామీనశీత నివారణం.

నుండును. ప్రతి అవయవమునకు తిమ్మిరి అనగా బండబారిపట్టు నొప్పిలేక యుండును. వ్యాధి ముదిరినకొలది విశేషము తెప్పవై, అచ్చటచ్చట శరీరముపైన దద్దుర్లుత్పత్తి చేసిపోవును.

చి కి త్న

చేకొనితాకు అరవీసె, చేనుబీరాకు 4 గుప్పెళ్ళు, చేదుపొట్లాకు 3 గుప్పెళ్ళు, కురంజీవాము సోలెడు, ఇంగువ 6 తు కలిపిత్రిక్కి తుండలుచేసి ముసగచెక్కిరసముతో తడిసి నిమ్మకాయంత మోతాదు శ్రేయమాపుపెట్టుము. కాళ్ళవాపులకు నీరులిపాయరసము, పచ్చిపనుపునూరి రాయుము. లేక మంచిహానె చూడపనుపుకొమ్ము అరగదీసి రాయుము.

లేక అన్న భేది 2 తు, నేలచేము 1 తు, విషముష్టిగిజలపాడి 2½ తు, పసుపు 1 తు కలిపి నేరు బియ్యపునీటిలో కలిపి దినమున కొక మోతాదు త్రాగించుము. వాత్రులకు నల్లేరుచిగుళ్ళతో పసుపు, హారతికర్పూరం కలిపి నూరి రాయుము.

ధనుర్వాతము (Tetnus)

దీనినే తోడుత్రురోగమనియు, ధనుర్వాయువనియు నందురు. ఈవ్యాధి చలి గాలి సోకుటవలనగాని, గాయపుసంధివలనగాని, పశువున కేమైన ఆపాయమైన దెబ్బ తగిలినపుడు ఏ అవయవమైన విరిగినపుడుగాని, ఇదివరికు ఏమైన శరీరముమీద వుండు, ప్రణములు, గాయములు, మున్నగునవి యున్నపుడుగాని ఈ వ్యాధి సోకును. గాయము లొనికి ఏమాత్రము దుమ్ము లేక మట్టి చేరినను వెంటనే ఒకవిధమగు నూత్నజీవులు అందులో ప్రవేశించి పశువునకు ప్రాణాపాయము కలిగించును. కాబట్టి పశువున కేమైన దెబ్బతగులుట, విరుగుట, చలిగాలిలో, వర్షములో నుంచుట మున్నగునవి కలిగినపుడు వెంటనే ఆ గాయమునకు దుమ్ము, మట్టి వగైరాలు కలుగకుండ కాపాడవలెను. అట్లు దుమ్ము వగైరాలు దూరినచో వెంటనే ఎత్త్రొక్కివ్రేలిగవలె రక్తములో నున్న సరముల సముదాయముల కేగినవెంటనే ప్రాణాపాయము కలుగును. పాడిపశువులకు, లేతపశువులకు, దూడలకు తరచుగా వచ్చుచుండును. దూడలకు మిన్నెల్లులు పట్టుటవలన కాకులు పొడిచి పెద్దవుండు చేయుటవలనకూడ ఈ వ్యాధి రావచ్చును. శత్రుచికిత్స చేసినపుడుకూడ ఈవ్యాధి రావచ్చును.

లక్షణములు

పశువున కదలించినచో చాలా కష్టముగా కదలును. లోపల జ్వరముండును. నోటివెంట చొంగపడుచుండును. మనము తలను లేపినయెడల వెంటనే పశువునకు మాకుమట్టి తొమ్ములు (తొలుకులు) గలుగును. వ్యాధి ముదిరినకొలది మెడ, దపుడలు, బిగిసికొనిపోవును. క్రమేపి వ్యాధి ముదిరినకొలది కాళ్ళు వగైరా బిగిసికొనిపోయి

పశువు విలువలె వంగిపోయి ముఖము ముడుచుకొనిపోయి నిక్కశాకాగ్రముగా పెగును. ఈ క్షుణ్ణు అన్ని అవయవములకు సోకి ఆయాసమెక్కువై పశువు మరణించును.

చి కి త్న

రక్తదలు దిగిసికొనిపోయి గుండకవేమనిచో లాభములేదని గ్రహించవలెను.

కర్పూరము 2 తు, పరిగంజిసేరు, ఇంగువ 4 తు కలిపి త్రాగించి అన్ని అవయవములకు తవుడుతో గాని ఉప్పుతో గాని వేడికాపులు వేయుము.

లేక మూడుద్రాముల సారాయిలో అరకులం కర్పూరం కలిపి త్రాగించును.

లేక నవాసాగరము 3 తులములు తీసికొని సేరు వేడినీటిలో కలిపి త్రాగించును.

లేక పుగాకురసము అరసేరు, సల్లేరుగలము సావుసేరు కలిపి త్రాగించును.

లేక 10 కొడిగ్రుడ్లకొని తెలుపునీలము, నీరునున్నపుడేట కలిపి త్రాగించును.

లేక కుంకుమకాయనురుగునీ. కలిపినచి సేరు త్రాగించును.

లేక మీ సవిగపములో ఇంజెక్సున్న యిచ్చేదాట్లన్న గుర్రాతపు ఇంజెక్సున్న యిచ్చించును.

అండవాతము

మూత్రగ్రంథు అస్వస్థతవలనగాని, పశువునకు మిగుల వాతము చేయుటవలనగాని పక్షవాతమువలనగాని, బుడ్డకొట్టి తగువాత స్థరిగా నలుగకపోవుటవలనగాని ఈ వ్యాధి వృషణములకువచ్చును.

లక్షణములు

పశువునట్టలు రెండును ఎగుడుదిగుడుగాను డి వాపునలజెంది యుండును. ఈ వాపునే అండవాత మందురు. మూత్రముతో అప్పుడప్పుడు వీర్యము పగుడుండును. వేచ్చుమీద మనము చేతితో తట్టినచెడల పశువునకు చాలా బాధగానుండును. వ్యాధి ముదిరినకొలది వట్టలువాచి బాధగానుండును. మూత్రము ఎక్కువగ నే పోయుచుండును. వాపు వేడిగా క్రాంతిగానుండును. వాపు మునిగినకొలది ఒకనిదమగు చెడునీరుజేరి నరములులాగి కనుగుంటలు విడిచి మరణమునకు సిద్ధుగును.

చి కి త్న


ఆరంభములో 'ఆముదము సేరు, ఎండుమిర్చిపొడి 6 తు, ఉప్పు చేరెడుకలిపి కాచి గోరువెచ్చగానున్నపుడు త్రాగించవలెను. ఆముదవాడు కలుబెలము $\frac{1}{2}$ వీసి, ఎండుమిర్చి 10 తు, వెల్లులి 10 తు, కురంజీవాము 4 తు కలిపి త్రొక్కి రేవుమాపు వెలగకాయంత పెట్టుచు, వాపునకు కర్పూరతైలమునుగాని, కొబ్బరినూనెలో హరితి

కర్పూరము కలిపి గోరువెచ్చగాచేసిగాని అప్పుడప్పుడు రాయుడు వేడిబటి కావులు తీయవలెను.

లేక విషమష్టి గింజలపాడి 2 తు, అన్నభేది 1 తు, సోడాఉప్పు 1 తు, తురా సానివాము 4 తు, ఇంగువ 2 తు కలిపినూరి నేరు వేడినీటిలోఁలిపి త్రాగించుచు కావులకు కవిరి 1 తు, వస 1 తు, నల్బు 2 తు, పసుపు 2 తు మెత్తగానూరి 10 తులముల మంచి నూనెలోఁలిపి రాయుము.

పక్షవాతము (Paralysis)

చం॥ పశువుల పృథ్వభాగమున బాధజనింపగ వాతమొందియున్
ససియగు వన్నెతగ్గి జిగిచాల నశించియు తూలుచుండగా
నిశితపు జూవులం బటవ నేర్చిన వైద్యులు కాల్చిరంతటన్
మనలక మూత్రకోశమును మ్రగ్గగ వాతముజెంది నీల్లడిన్॥



స్వభావము - వ్యాపకము

మెదడు యొక్క అస్వస్థతవలనను, మెదడునకు నరముల సముదాయమునకు బెబ్బితగిలినపుడు, చెవిసరములకు ఒత్తిడి కలిగినపుడు, వెన్నెముకకు హానికలిగినపుడు, విషవస్త్రువులు తినినపుడు, ఎండలోను వర్షములోను పనిచేయించినపుడు, విపరీతమైన వాతముచేసినపుడు, చలిగాలిలోను మంచులోను ఎక్కువగా పనిచేయించునపుడు, తడితర

కారణములవలన ఈరోగము వచ్చును. ముఖ్యముగా ఈరోగము శీతాకాలములో మంచి ఎద్దులకు, చూడి ఆవులకువచ్చును.

లక్షణములు

పశువుశరీరపు సగభాగముగాని, పశువు వెనుకభాగమునకుగాని, ముందు కాళ్ళకుగాని, ఒకచెవికిగాని, ఒకకన్నునకుగాని, తలకుగాని, శరీరమంతటికిగాని, నాలుకకుగాని ఈవ్యాధి రావచ్చును. ఒకరైతు దొడ్డిలో ఈరోగముచేరనే ఒక్కపర్యాయమే పది పశువులకు సోకినది. వీరికన్నిటికి నెనుక తొడలు, కాళ్ళు, ముడ్డిపూసక్రిందిభాగము సోకి నాలుగుదినములు కొన్ని, వారముదినములుకొన్ని పక్షముదినములుకొన్నియుండి చికిత్సల వలన తగినవి. కాబట్టి ఈవ్యాధి తేలికగా తగిలిన పిట్టవాలినదని వాతలు, యంత్ర మాలు నేయుదురు. ఈ యంత్రములవలననే తగ్గినదనుకొందురు. మరికొన్నిటికి తాత్కాలిక చికిత్సలవలన, వాటిరత్నములవలన కొన్నిటికి తగ్గును. కాబట్టి జాగ్రత్తగా పశువును పరీక్షించి ఏ ఏ భాగములకు, ఏ ఏ లక్షణములతో సోకి బాధపడుచున్నదో చికిత్స చేయవలెను.

చి కి త్న

ఏ అవయవమునకు ఈ వ్యాధిసోకినదో కనుగొనుటకు ముందుగా ఒక నూదితో ఆ అవయవమును తేలికగా పొడువవలెను. అట్లుపొడిచినపుడు పశువునకు నొప్పి యున్నట్లు అలుకుచున్నదా లేక తిమ్మిరియైక్కినట్లున్నదా? ఆ తిమ్మిరి ఏ అవయవము వరకున్నది? ఎంతకాలమునుంచి పశువునిలుచుండుటలేదు? ఏ కారణమువలన సోకినది? తేలికగా తగిలినదా? ఎక్కువగా తగిలినదా? మేతతినదు వెనుక భాగము లేవ లేకుండుచున్నదా? మున్నగు లక్షణములు గ్రహించి చికిత్సకు ప్రారంభించవలెను.

ఈ వ్యాధితగిలిన వారము రోజులలో పశువు లేవలేకపోయినచో ఆపశువు బ్రతుకుటే కష్టమని గ్రహించవలెను. వారమునుంచి నెలదినములవరకు బాధపడి, అవయవములు, మాత్రకోశమువ్రుల్చి బాధపడి చనిపోయినవికూడగలవుగాన జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చికిత్స చేయవలెను. ఒకదొడ్డిలోనే పదిపశువులు పడుకొనినవి. అదికూడ అంటుసంబంధమైన వ్యాధియని నేను గ్రహించి చికిత్సచేయగా తగినది.

ఆరంభములో విశేషన చగుటకు ముందీయవలెను. తరువాత నేలవేము 1 తు, కరంజీవాము 2 తు, సోడాఉప్పు 1 తు, మంచిగంధపుపొడి $\frac{1}{2}$ తు, నల్లకప్పు 1 తు కలిపి మెత్తగానూరి ఉదయమున నేరుబిటిలో కలిపి త్రాగించవలెను. సాయంకాలము 7 గంటలకుఆవుపాలుగాని గేదెపాలుగాని నేరు, రావిచెక్కపచ్చిరసము అరసేరు, కస్తూరి, పసుపు 1 తు కలిపి త్రాగించవలెను. అప్పుడప్పుడు తేలికపిండిని నేరు మజ్జిగలో నాన చేసి పెట్టవలెను.

కాస్తీకశెలతో వర్షము, కర్జునితో యుద్ధము సరి.

లేక నుగిలము 15 కు, పొంగించిన వెలిగారము 10 కు, కన్నూరి పసుపు 15 కు, కలిపిత్రాక్కి నేరున్నర ముసగ చెక్కరసముపోసి నిమ్మకాయంత ముద్దలు చేసి రేవుమాపు మందు వచ్చువరకు పెట్టవలెను.

పిట్ట వానినదని అనుమానముతో నున్నపుడు గరుత్సంతుని పొదపు ఆకారముగా వెనుక భాగముమీద పసుపుతో యంత్రము వేయవచ్చును. కాల్యుదురు. యంత్రము వేసిన రెండు దినములలో పశువు లేవలేకపోయిన ఆ పశువునకు నెమ్మదియగుట చాలా కష్టము. కొన్ని చూడిపశువులకు ఈవ్యాధి వచ్చిన తరువాత ఈనిన వెంటనే తగ్గుటయు గలదు.

స్వర్ణలేని అవయవములకు మంచినూనె సవాసేరు, జిల్లేడాపలరసము పావుసేరు, జిల్లేడు ప్రోల్లరసము పావుసేరు, జిల్లేడు పువ్వులరసము పావుసేరు కలిపినూరి తడియగురు వరకు కాగబెట్టి దింపి చల్లార్చి ప్రతిరోజు మర్దన చేయుచు రేవుకు వేయించిగాని, యనుక వేయించిగాని అప్పుడప్పుడు వేడికాళ్ళులు కాయవలెను.

ఈవ్యాధికి వాతలు వేయుటవలన లాభము లేకపోగా పశువు మరణమునకు సిద్ధ మగును. ఇంకను లేనెట్టిగల మైనము 20 కు, మంచినూనె 20 కు, కలిసి గోరువెచ్చగా కాచి అందులో అరకులము నల్లమందు, 4 కులముల హారతికర్పూరం కలిపి చలనము లేని భాగములకు మర్దన చేయవలెను. ఈరీతిగా అనుభవముమీద చికిత్సలు చేసికొన వచ్చును.



కార్తికం తల్లవేసి కాపాడవలయును.

పశునేత్రచికిత్స

పదిత్రవ భాగము

నేత్రములలో యే మందైన వేయవలసివచ్చినపుడు మోతాదులు ఎక్కువ తక్కువలు గావించి నీ పశువైద్యులను కనిగొని జాగ్రత్తగా చికిత్స చేయవలెను.

నేత్రవ్యాధిలోనున్న పశువును చలి గాలిలో నుంచరాదు. కంటిమీద ఈగలను వ్రాలవలెను.

నీ పశువుకంటికి చికిత్స చేయుచుటకు ఆరంభములో యే వైద్యునిచే చికిత్స చేయించుచున్నావో, ఆతనిచేతనే చికిత్స చేయించవలెనుగాని అందరి సలహాలడిగి అన్ని మందులు తీసుకొనివచ్చి పశువుకంటిలో పెట్టరాదు. ఏకంతట పెట్టవలెనని కొరికయున్నచో ఆంభమునుండి చికిత్సచేయు వైద్యునిసలహా నడిగి చేయును.

పశువు దేహమునకు వ్యాధి కలిగినపుడు సామాన్యముగా పల్లెతలులలో పది మందిచెప్పిన చికిత్సలు చేయుదురు. కాని కంటిజబ్బులనియమమై అట్లు చికిత్సలుచేసిన తప్పుక ముప్పు నాటిల్లును.

నేత్రవ్యాధికల పశువునకు పెట్టుచేత నులభ్యముగ జీర్ణమగునదిగను, సారవంతమగు నదిగను, శుభ్రపలయునుగాని నిశ్చయమైనదిగను, తుక్కుగడ్డి, మక్కునగడ్డి మొదలగు నవి యేమాత్రము మేపరాదు.

కంటిమీదను, లోపలనుండు పుండ్లను శుభ్రముగ నుంచవలెను. ప్రతిదినము ఉదయసాయంకాలములు పటికలోషణతోగాని, మైలతుత్తుము లోషణతోగాని శుభ్రముగా కడుగు చుండవలెను.

నేత్రములకు శస్త్రచికిత్సచేసినపుడు కట్టిపకట్టులను లోపలకు గాలి దూరకుండ గట్టిగా కట్టుకట్టవలెను. అకట్టుకు రసి అంటుకొనినయెడల నేడిసిటితో శుభ్రముగాకడిగి తర్వాత తగిన చికిత్స చేసి జాగ్రత్తతో కట్టుకట్టవలెను. గాలిమాత్రము సోకినయెడల.

నేత్రము (The eye)

పశువుయొక్క జ్ఞానేంద్రియములన్నిటిలోను నేత్రములును శ్రోత్రములును మిక్కిలి ముఖ్యమైనవి. సమస్తేంద్రియములలో కన్ను ప్రధానమైనది. కన్ను పశువు యొక్క శరీరమున కుపయోగకరముగనుండు ముందుభాగమందు అనగా శరీరము యొక్క ముందరి భాగమునకు దుంచబడినది. పశువుయొక్క పరిమాణ రూపమును,

మార్గశిరమాసము నువతె నవలి.

రంగును, సానమును తెలిసికొనుట వుపయోగించు యింద్రియ మిదియే. ఇది మృదువైన యింద్రియమగుటచే పశువు అజాగ్రత్త నున్నయెడల దీనికి భంగముకలుగును. ఇది ఒకసారి చెడిపోయిన యెడల దీనిని బాగుచేయుట దుర్లభము. కావున దీనిని కాపాడుటకు సృష్టియందే భగవంతుడు కొన్ని యేర్పాటులు చేసియున్నాడు. కంటియొక్క నిర్మాణము బహు ఆశ్చర్యకరమైనది. పూర్వకాలమందుండిన ఒకవైద్యుడు దానిని పరీక్షించి చూచి సృష్టికర్తయగు దేవునిస్తుతించుచు నొకకీర్తన వ్రాసెనట. పశువు తనకంటి నన్నిదిట్టముల త్రిపుగలుగుటకు భగవంతుడు రెండుకన్నుల నేర్పరచియున్నాడు. దురదృష్టవశుల ఒక కన్నుపోయినను రెండవనేత్రము సహాయమగును. పశువుమూతి కిరు ప్రక్కలను కనుగుంటు అనబడు ఎముకలగుడులలో నేత్రగోళము అమర్చబడియున్నవి. ఎదుటిభాగమే గాక నేత్రముయొక్క మిగిలినభాగములన్నియు కనుగుంటలయందుండు ఎముకలచేత సంరక్షింపబడును. నేత్రగోళమునకు నేడిమి కలిగించుటవను, అయరు దెబ్బల వలన దానికి భంగము కలుగవండునట్లు చేయుటవను దీనివట్టును శ్రావ్యులతో చేయబడిన మెత్తని పదార్థముండును. ఇంకను దీనియందు రక్తనాళములును, నీటి కాలునలును పోషణనిమిత్తము ప్రవహించుచుండును. కనుబొమలు కనురెప్పల చివరినందు వెండ్రుకలు నేత్రముయొక్క మూడుభాగమును రక్షించును.

కనుబొమలు, కనురెప్పలు (Eyebrows and Eyelids)

పశువు కంటిని కాపాడుటకు రెండుమూతలుకూడ నున్నవి. వానిపేరు కనురెప్పలు. నూర్చుని వెలుతురు తీర్చుముగా నున్నప్పుడు కనురెప్పలు కన్నులను కాపాడును. నిద్రించువేళ నవి మూసికొనును. ఈ రెప్పలకొనలయందుండు వెండ్రుకలు నేత్రములకు నిద్రను, అందము నిచ్చుటయేగాక గాలిలో ఎగురుచుండు ముప్పు, పురుగులు, పదార్థములయొక్క చిన్న చిన్న నలుచులు మొదలగుచవి కండ్లలోనికి జూసిననుకూడ కండ్లను కాపాడును. కండ్లను బాగుగా కాపాడునవి కనురెప్పలు. ఇవి కంటికి ప్రైభాగమందొకటియు, క్రిందిభాగమునందొకటియు నమర్చబడి యుండును. కంటియొక్క పైరెప్ప క్రిందిదానికంటె పెద్దదిగానుండి నుభిముగా కదల్చుటకు వీలుగానుండును. కంటిని మూయుట లేక తెరచుటయు నుభిముగా పైరెప్పచేతనే కలుగుచుండును. కంటి దుట్టు నుండు గుండ్రని కండరసహాయముచే ఈ రెప్పలు మూరబడుచుండును. ఈ రెప్పల పైవైపున చర్మముతో కప్పబడి అడుగుభాగమున తడిచర్మముతో కూడియుండును. ఈ తడిచర్మము పశువు కనురెప్పలయొక్క అడుగుభాగమందుమంత్రమే యుండక వెనుకకు తిరిగి కనగ్రుడ్డనుకూడ కప్పియుండును. కాబట్టి రెప్పల అడుగుభాగమునందును, కనగ్రుడ్డయొక్క- ప్రైభాగమందును, ఈ తడిచర్మమే యుండును. ఇంకను కంటిలో నిల్చితిత్తి యొకటిగలదు. దానిలోనుండి కన్నీళ్ళువచ్చి కంటి ప్రైభాగమును తడిసి కంటిలో నేనన్నవైనను బడియున్నయెడల దానిని కడిగివేయును. కనురెప్పలమూలముగా కన్నీళ్ళు కంటిమీద వ్యాపించుచుండును. కనుబొమ్మ అనునది కంటిమీద విల్లువంపులాగున

దండి అమావాస్యకు వాని తాడు తెంపుకొనిపోతుంది.

వెంట్రుకలు నిండియుండుభాగము. కనుబొమ్మలు పశువుయొక్క నొసలునకు త్రిండుగను కంటికి పైవై పువను ఏర్పడియున్న వెంట్రుకలవరుసలు. ఇవి పశువుముఖమునకు అందము నిచ్చుటయేగాక నొసలునందు పుట్టు చెనుటను కండ్లలోనికి రావండజేసి కండ్లను కాపాడుచుండును. కనురెప్ప ప్రక్కనుండు వెండ్రుకలు మిక్కిలి నూత్నుమైనవస్తువులు కంటిలో బడకుండ తప్పించుటయేగాక కంటికి నీడను అందమును ఇచ్చుచున్నవి.

కనుగ్రుడ్డు (Eye ball)

పశువు కనుగ్రుడ్డు గుండ్రముగానుండును. ఇది కనుగుంట యనబడెడు ఎముక గూటిలో సమర్పబడియున్నది. అందువలన సాధారణముగా దీనికి చెబ్బితగులనేరదు. ఇది మిక్కిలి కొమలముగా చుండును. కావున దీనిని కాపాడుటకై కనుగుంటయందు ఒక విధమైన క్రొవ్వురదార్థముండును. అది దిండువలె నేర్పడి గ్రుడ్డునకు అదరుచెబ్బితగులకుండజేయుటయే గాక ఎముకలలో రాపిడికలుగకుండగను, గ్రుడ్డు నానావిధములు తిరుగుటకు, దానికి వేడిని కలిగించుటకు నుపయోగపడుచున్నది. కొన్ని పశువుల కను గ్రుడ్డు గుంటయందు లోతుగా సమర్పబడియుండక మెరకగానుండును. అందువలన కన్నులు పెద్దవిగా కనబడును. కనుగ్రుడ్డు సర్వదా కడిగపడుచుండుటకు కొన్ని విచిత్రమైన ఏర్పాట్లు గలవు. కనుగ్రుడ్డు బంతివలెనుండి చుట్టును ఆవరణపు పొరలను కలిగియున్నది. దీనిలో ప్రైభాగమునందుండునది పైపొర; దీనినే మనము తెల్లగ్రుడ్డుని చెప్పుచున్నాము. దీనికి వెనుకనుండునది మధ్య పొర; ఇదిసల్లగానుండుటవలన దీనిని సల్లగ్రుడ్డుని చెప్పుచున్నాము. పశువు కనుగ్రుడ్డుయొక్క పైపొర తెలుపుగంగులిగి మిక్కిలి దృఢమైన నారవంటి పదార్థముతో చేయబడియున్నది. ఇది లోపలనుండు మృదువైన భాగములను కాపాడుచుండును. అన్ని పొరలలోను యిది గట్టిదగుటవలన ఇది సాధారణముగా బద్దలు కానేరదు. ముందరిభాగము కొంచెము గుండ్రము మేరకప్పు ఈ పొర కనుగ్రుడ్డునంతను కప్పియున్నది. ఇంకను ముందరిభాగమున ఉత్పేత్తుగా కనబడును. పశువు కనురెప్పలెప్పుడును ఆడుచుండుటచేత నీ తెల్లగ్రుడ్డుయొక్క నునుపును దానిగుండ వెలుతురు పోనిచ్చు కక్తియు కాపాడబడు చుండును. కనురెప్ప లాడుచుండుటచేత తెల్లగ్రుడ్డు ఎప్పుడును లేచుగానుండి శుభ్రము చేయుచుండును.

సల్లగ్రుడ్డు పశువుకంటిలోనుండు పైపొరకును లోపలి పొరకును నడుమ నుండును. దీనియందు సల్లిని రంగుపదార్థముండుటచేత ఇది సల్లగానుండును. దీనినే సల్లగ్రుడ్డు అందురు. ఈ గ్రుడ్డు కంటికి రుగునిచ్చును. గవ్వకండ్లు, తేనెకండ్లు మొదలగునవి దీని వలననే కలుగుచుండును.

కంటిలోని పువ్వులు (Ulcers)

స్వభావము (Causes)

పశువు మెదడునుండి కంటిలోనికి ఒకనరము (opticonerve) గలదు. అమితమైన నేడిజేసి ఈ నరము చెడుటయుగలదు. అందువలన కంటిలో తెలుపుదనము కూడ ఏర్పడును. కంటిలో పువ్వుజేసిసమైదల నల్లగుడ్డునందు ఒక తెలుపునుచ్చ యుండును. దీనినే పువ్వుందురు. ఇంకను కంటికి దెబ్బతగులుట వలనను, చిన్నచిన్న నలుసులు కంటిలో పడుటవలనను, వాతరోగముండుటవలన అవి వెలుపలికి రాజాలక అక్కడనే యుండుటవలనను, వాతరోగమువలనను ఈవ్యాధి జనిండును.

లక్షణములు (Symptoms)

సహజముగ దీర్ఘచతురస్రాకారముగ నుండు కన్ను పువ్వువేడునట్లున గుండ్రని యాకారమునుపొంది కదలబడును. ఏ వస్తువైనను దాటవలసివచ్చినచో కంటిలోపువ్వు గల పశువు అక్కడక్కడ నాగిపోవుచుండును. నడచునపుడు కాళ్ళను పైకి లేపుచుండును. మిట్టిమిట్టి చూచుచుండును. కొన్ని కేళలలో పువ్వు అద్దమును పోలియుండును. అట్టిచో నేత్రములకు వనము సామాన్యముగా గాజుకన్ను వాడుచును. వెలుతురు చూచుట కష్టముగానుండి కండ్లవెంబడి నీరు గార్చుచుండును. దీనికి సకాలములో తగిన చికిత్స చేయనియెడల ఈవ్యాధి వృద్ధియై క్రమముగా చూపు తగ్గిపోయి అంధత్వముకూడ తోర్పును. మూడు లేక ఆరుమాసమువరకుయున్న కంటిపువ్వు తగ్గిదరి గ్రహించవలెను.

ఆయుర్వేదచికిత్స (Ayurvedic treatment)

పటికనీటితో కన్ను శుభ్రముగా కడిగి మిరియాలు $\frac{1}{4}$ తు, పిప్పళ్లు $\frac{1}{4}$ తు తెచ్చి కాటుకవలె చూర్ణముచేసి వ్యాధిమై నులోగాని వెన్నలోగాని కలిపి నాలుగైదుదినములు ఉడయపుపూట కందిగింజంత పెట్టుచుండిన తగును.

లేక వారము లేక నెలదినములు వరున్సుగల పనీబాలుని మూత్రముగాని, మలముగాని కంటిలో పెట్టుము.

లేక మూడునాలుగు ఇందుపుగింజలుకొల్పి పొడిచేసి అందులో సగభాగము పంచదారకలిపి దినమునకు మూడు నాలుగు పర్యాయములు కంటిలో పెట్టవలెను.

లేక దిరిసెనచెక్కరసము 2తు, ఉప్పు $\frac{1}{4}$ తు, మిరియాలు $\frac{1}{4}$ తు తెచ్చి నూరి రెండు దినములు కుడికంటిలో పువ్వుయిన యెడల ఎడమచేవిలోను, ఎడమకంటిలో పువ్వుయిన కుడి చేవిలోను పోయవలెను.

లేక పండుగారకాయలోని గజ్జన్ను, పాతిచిల్లి పెంపన్ను వాడితేసి చింతినిత్రులు నిన్నుకాయరిసము మెత్తగా నూరి మైపాడి వీరిలోకలిసి కొడితకతో నేత్రములకు పట్టించుము.

లేక జల్లేడుపాలు ఒకచుక్క కంటిలో వేయుము.

లేక మూర్క్కండాకు పసరు, దొండాకు పసరు కలిసి ఎఱ్ఱగాజుపెంప మెత్తగా నూరి వస్త్రకాళితము వట్టగా వచ్చిన పొడిని ఆ పసరులో కలిపి కన్నులకు కట్టవలెను.

లేక సీసము, కర్పూరరహిజిచ్చి సమపాళ్ళు తెచ్చి వాడిచేసి మెత్తగా నూరి వస్త్రకాళితము వట్టగా వచ్చిన మూర్క్యమును, పురువి వపు మూర్క్యమును కలిపి కంటిలో వేయుచుండుము.

లేక 2 తులముల సీసముగా 10 దానిన్నుపండ్ల గనము పోసి కాటుకగా తేసి కన్నులకు పెట్టుము.

లేక సాలామిక్రి $\frac{1}{4}$ తులము, శుభ్రాంకాయలు $\frac{1}{4}$ తు, గారకాయ $\frac{1}{4}$ తు, చిల్లి గింజలు $\frac{1}{4}$ తు, మైలసుత్తము $\frac{1}{4}$ తులము కలిపి యెఘంట కాపుంట నొపడవలె గంధము తీసి నేత్రములకు పెట్టుము.

లేక పొంగించిన పటిక $\frac{1}{4}$ తు. మైలసుత్తము $\frac{1}{4}$ తు. వెన్న 1 తులము కలిపి కన్నులకు పెట్టుము.

లేక దిరిసినపు విత్తుల పలుకులున్ను, కందిపప్పు పలుకులున్ను నిన్నుకాయ గనముతో అరగదీసిన గంధము మాడికి పట్టించి కంటిలో పెట్టుచుండవలెను.

లేక కొద్ది దొండాకు పసరున్ను, రెండు మిరియములు తెచ్చి నూరి కండ్లలో పెట్టవలెను.

లేక మండపనుపుకొమ్ము, శుభ్రగిల్లు, మిరియము తెచ్చి కాకరాకు పసరుతో గాని, అవిసెలకు పసరుతోగాని కంటిలో పెట్టవలెను.

లేక పొగాకు, ఉప్పు రోటిలోవేసి మెత్తగా నూరి కెల్లనిగుడ్డలో వేసి కంటిలో పిండవలెను.

లేక దిరి సెవక్కరసము, మిరియాలు తగినంత తెచ్చి నూరి రెండుదినములు వడికంటిలో పువ్వుయవచో ఎడమచేయి, ఎడమకంటిలో పువ్వున్నమెడల వడిచేయి లోను పోయవలెను.

లేక గబ్బు, చీనాపంచదార మెత్తగానూరి కంటిలో పెట్టుము.

ఆంగ్లేయ చికిత్స (Allopathic Treatment)

ఏ, బి, సి లోషయ్య వాడుము.

అనగా ఆలంలోషన్ గాని, బోంబలోషన్ గాని, సిల్వర్ సైక్లేట్ లోషన్ గాని వాడుము.

కంటిలోని పొరలు (Cataracts)

స్వభావము (Causes)

ఈ వ్యాధి పశువుయొక్క కంటికి ఒక దానికిగాని, రెండుకండ్లకుగాని రావచ్చును. చింబమగుండ వెలుతురు పోను. కనుక చూపు కనపడదు. అసగా కౌంతిహీనమైన పొర గన్పియుండును. చింబమంతయు పొరగప్పియున్నపుడు కొన్ని కిరణములు లోపలికి పోవుటచేత కొంచెము చూడగలిగియుండును. ఈ వ్యాధి చశువులకు మధ్య వయస్సులోగాని, ముదిమివయస్సులోగాని లేక తదితర వ్యాధులవలనగాని రావచ్చును.

లక్షణములు (Symptoms)

పశువునకు మొదటిదినము కనుగ్రుడ్డుమీద సన్నముగా మైలపొర క్రమియియుండి మరుసటిదినమున ఈ పొరమీద మరియొక పొర క్రమ్యుకొని దళసరిగా కౌన్పించును. ఈవిధముగా వారము దినములవరకు దినమున కొక పొరవంతున క్రమ్యుకొని గుడ్డంతయు తెల్లపడి తరువాత సన్నని పురుగులు ఆ గ్రుడ్డు పొరలలో ప్రవేశించి అటునిటు తిరుగుచుండును.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

సబ్బు 1 కు, కలకండ 1 కు. తెచ్చి మెత్తగానూరి కంటిలో వారముదినములు పెట్టుము.

లేక పాలతుత్తము $\frac{1}{2}$ కు. అమరకలగంధకము $\frac{1}{4}$ కు. కంకుడుపప్పు $\frac{1}{2}$ కులము తెచ్చి ఒక్కొక్కటి నూరి తరువాత నిమ్మకాయ పులుసు కలిపి కనగింజంత కంటిలో పెట్టుచుండవలెను.

లేక వామదామ పనరులో కలకండ మెత్తనిది కలిపి కంటిలో వారముదినములు పెట్టుము.

లేక ఉప్పువామదామ పనరు వెన్నతో కలిపి రెండువేళల కంటిలో పెట్టవలెను.

లేక జడిచమురు కొడియొకతో తేలికగా కంటిలో పెట్టుము.

అంగ్లేయ (Allopathic) వైద్యము

సిల్వర్ సైట్రేట్ లోషన్ ఆప్టడప్పుడు కండ్లలో వేయుచుండుము.

లేక అలంలాషన్ ఆప్టడప్పుడు వేయుచుండుము.

అవిరి (Ophthalmia)

స్వభావము (Causes)

పశువులకు వాతరోగమువలనను, కౌకరోగమువలనను, కండ్లకు అదరు దెబ్బలు తగులుటవలనను, మనుష్యులు రాళ్ళు మొదలగునవి పశువులమీద విసరవపుడు కంటికి

తగులుటవలనను, కుమ్ములోనుండు నలకలు పడుటవలనను, ఎప్పుడు చురుకుగానుండి బొలిచుచులు గలిగి స్నానించేయుటవలనను ఎద్దులకు ఈవ్యాధి రావచ్చును. దీనిలో త్రిట్ట అవిరి, కోడిసాట్టఅవిరి, గ్రుడ్డుఅవిరి అనునవిగలవి. ఏకాంతియైనను ఆరంభములో చికిత్స చేయవలెనుగాని ముదిరినతరువాత నేమియు లాభములేదు. అనిరికి సరియైన చికిత్సలు చేయక ఎల్లప్పుడు రోగపశువును పనిచేయించుటవలన పెదదూకరిగి కనుగ్రుడ్డు త్రుళ్లిపోయి మూడగా నగును. కొబ్బటి చాల జాగ్రత్తగా ఆవిరిచికిత్స చేయవలెను.

లక్షణములు (Symptoms)

పశువు ఎండగాని, వెలుతురుగాని చూడజాలదు. కంటినుండి నీరు విస్తారముగా కారుచుండును. కన్ను రెప్పరెప్పలాడు చుండును. రెప్ప లావెక్కి క్రిందిపార ఒత్తుబారి యుండును. ఇంకను రెప్పలమీద నన్నుని పొక్కులుకూడ లేదును. కంటి గ్రుడ్డుమీద దుర్గాంసము పెరుగును. ఈ దుర్గాంసము కంటి లోపలికుంచి పుట్టును. ఇట్లు పుట్టిన యెడల గ్రుడ్డు చెడినదని గ్రహించవలెను. దీనినే కంటిమాదయందురు. ఒక కన్నుచెడిన మరల రెండవకంటికికూడ రావచ్చునుగాన త్వరగా మేలుకొనవలెను.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

పశువుకంటిలోపలిభాగమందును, రెప్పలలోను నుండు మలినపదార్థములను తీసివేసి పటిక నీటితో కండ్లను శుభ్రముగా కడుగవలెను.

తరువాత వామదాన పసరు 1రు, వెన్న 2రు, ఉప్పు $\frac{1}{2}$ రు కలిపి ఉదయసాయం కాలములందు కంటిలో పెట్టవలెను.

లేక కేసినెయ్యి 1 రు, పెంకుసాడి $\frac{1}{2}$ రు, ఆరటినుంప రసము $\frac{1}{2}$ రు కలిపి కంటిలో రో దినములు పెట్టుము.

లేక చిల్లగింజను లేసెతో ఆరగదీసి పచ్చకర్పూరముకలిపి కండ్లయందు పెట్టుము.

లేక ఉసరికపప్పు 1 రు, కరక్కాయపప్పు 1 రు, తానికాయపప్పు 1 రు. తెచ్చి మెత్తగానూరి నిమ్మపండ్లరసములో మర్చించి కణికలు చేసి నేత్రములలో పెట్టవలెను.

లేక కావిరాయి నీటితో ఆరగదీసి గుడ్డపపట్టించి కండ్లపైన వేయుము.

ఆంగ్లేయ (Allopathic) వైద్యము

హైడ్రోక్లోరిక్ ఆఫ్ ఫోస్ఫోరస్ 21 గ్రెయిన్లు

మెర్క్యూరి 12 గ్రెయిన్లు

డిస్టిల్డ్ వాటరు 12 డ్రాములు

ఈ మందును అయిదారు చుక్కల వంతున కంటిలో వేయుచుండవలెను.

మాఘమాసములో మాకులు నొగుకురివి.

లోపలి

మాగ్నెట్టు 3 పాను, వేడినీరు నేరు కలిపి త్రాగించవలెను. కన్నులదుట్టు గిసరిక్ అప్పుడప్పుడు రాయుచుండవలెను.

కన్ను మిక్కిలి బలహీనముగానున్న మొదల

సిల్వర్ సైట్రేట్	2 గ్రాములు
లేక బింకుసల్ఫేటు	3 గ్రాములు
లేక ఆలం	6 గ్రాములు
నీరు	1 అవున్సు

కలిపి కొద్దికొద్దిగా అప్పుడప్పుడు కంటిలో వేయుచుండవలెను. లేక స్వచ్ఛ మైన చేపకానెను కొన్ని దుక్కులు వేయుచుండవలెను.

కామెర్లు (Jaundice)

వ్యభావము (Causes)

ఇది పైతృ గ్రంథ సంబంధమగు వ్యాధి. పైతృగ్రంథ మధిక మగునపుడు అది రక్తము లోనికి చేరి శరీరమునకును, కండ్లకును పనుపునన్నె గలుగజేయుచున్నది. ఈవ్యాధి కొలది కాలములలో తగ్గుటయు, లేక చాలాకాలముగడుటయు గూడ గలదు.

లక్షణములు (Symptoms)

కండ్లలోని రేలుపు, ఆకుపచ్చగానని, పనుపువర్ణముగానని యుండును. పశువు చర్మము నలుపురంగుతో కూడిన పనుపుఛాయ గలిగియుండును. పశువునకు జ్వరము సోకును. నుండకొడిగానుండును. కొమ్ముల మొదలునుండి వేడిగానుండును. పేగులలో మలబద్దక మేర్పడును. పశువు శరీరముపై దురగగూడ నేర్పడును. నాలుకనుండి ఒకవిధ మైన పొర గ్రమ్మును. విశేషము రేలుపుగానని, లేగడివర్ణముగానని యుండును. మూత్రము నల్లజేగురంగుగానుండును. కన్నులువాచి నీరు గారుచుండును. ఆకలి ఎక్కువగానుండును. పశువు విచారముగా నుండును. నెనురు సరిగాజేయరు.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

ముసాంబ్రము 2 కు, నేలవేము 1½ కు కలిపి బెల్లపు పానకముతో నాలుగుదిన ముల కొకసారి యిచ్చుచుండవలెను.

లేక పిప్పళ్ళు 3 కు, మిరియాలు 3 కు పెత్తగా నూరి వెన్నపూసతో కలిపి కంటిలో పెట్టవలెను.

లేక ఉత్తరేణి ఆకుపసురు 4 కు, పెరుగు అరవేరు కలిపి నాలుగుదినములు ఉదయపుత్రాట త్రాగించవలెను.

లేక ఊడగడ్డటవేరు రసం 3 తులములు, మజ్జిగ అరసేరు కలిసి త్రాగించవలెను.

లేక గుంటగలిజేరావరసము కాటుకగాజేసి కండ్లలో పెట్టుము. కన్నుగ్రుడ్డు మీద అవిరిపుట్ట పెరిగినయెడల శస్త్రము చేయవలసియుండును గాన మీ తాలాకొ దాక్తరుగాకికి చూపించుము.

ఆంగ్లేయ (Allopathic) వైద్యము

అప్పుడప్పుడు బోరిక్ లోషన్ వాడుదురు. లేక ఆలంబోషన్ వాడుదురు.

కంటిజబ్బు (Common Eye Disease)

స్వభావము (Causes)

పశువు కంటికి గానుము తగులుటవలనను, శరీరములోపల వ్యాధి యేర్పడుటవలనను, కొరడాతో కంటిమీద గ్రూముగా కొట్టుటవలనను, రాళ్ళు, మట్టిగడ్డలు మొదలగునవి విసురునపుడు కంటికి తగులుటవలనను, పశువునకు సరిగా మేత మేపక ఉపవాసప్రత్యములు నేర్పటవలనను, ఎల్లప్పుడు పశువు దీక్షముగా, విచారముగా నుండుటవలనను, తలపై అదగు దెబ్బలు తగులుటవలనను, కండ్లప అవిరిసోపట్టచేతను, చెవులు పట్టి కంటిలో జీర్ణముగుటవలనను కంటికి గొప్ప యేర్పడును.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

కందింజలపై పొరతీసి నానమీద నీటితో అన్నిదినము గంధమును అప్పుడప్పుడు కంటిలో పెట్టుచుండుము.

లేక చిల్లగింజ తేనెతో గంధముతీసి పచ్చకమ్మారమును చేర్చి కంటికి పెట్టుము.

ఆంగ్లేయ (Allopathic) వైద్యము

ఆలం 4 గ్రాములు, డిస్టిలునాలరు 1 ఔన్సు కలిసి కండ్లలో వేయుచుండుము.

మెదటిభాగమునకు క్యూప్టర్ ఆయిల్ ముగ్గి చేయుచుండుము.

లేక బోరిక్ ఆసిడ్ లోషనును ఉపయోగించుము.

కంటిరైలువు (Amaurosis)

స్వభావము (Causes)

నీటికే నీటికాదు లందును. పశువు కన్నుగ్రుడ్డునకు దెబ్బ తగులుట వలనను, వాతము, జలుబు రోగమువలనను, ఇంకిను దుమ్ములోనుండు చిన్న చిన్న సలకలు మొదలగునవిపడి కంటిలో నిలవయుండుట వలనను కలుగు చుండును.

లక్షణములు (Symptoms)

మొదట కన్ను ఎరుపెక్కి నీరు గారుచుండును. పోటుకలుగును. పునులుకట్టును. వెంటనే తెలుపుపుట్టి క్రమక్రమముగా కన్నంతయు వ్యాపించును. తుదకు కన్నంతయు తెలుపురంగుగా నుండి గవ్య ఆకారముగా నుండును. పశువు తక్కుసలాడును. మాటి మాటికి పశువు తన కంటిరెప్పు పైకెత్తుచుండును. ఎక్కువగా దెబ్బతగిలి తెలుపు పుట్టిన కంటియొక్క కనురెప్పలు మూసికొనిపోయి తెరచుటకు కష్టమగుచు వెలుతురుకు చూడ బాలక బాధపడుచుండును.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

పశువును వెలుతురువచ్చు సలమునగుచుమాత్రము కట్టవలెను. మామూలుకంటె మేత తగ్గించి పెట్టవలెను.

సొంటి 1 తు, విప్పళ్ళు 1 తు, మిరియాలు 1 తు మెత్తగానూరి వస్త్రభారితము చేసి తగినంత వెన్నతోకలిసి పెట్టవలెను.

లేక అయిదు పచ్చగాజులు తెచ్చి కాల్చి భస్మముచేసి నిమ్మకాయరసముతో నూరి కంటిలోపెట్టము.

లేక ఏనుగకాలిగోరు ఓటితో అరగదీసిన గంధము కంటిలో పెట్టము.

లేక శిలాజిత్తును శుద్ధిచేసి వెన్నతోకలిసి కంటిలో పెట్టవలెను.

లేక మిరియాలు 1 తు, అక్కలకర్ర క్షి తు, లవంగాలు క్షి తు, ఉప్పుకబియ్యము 1 తు తెచ్చి నూరి నిమ్మకాయ రసములో కలిపి కొడియొకతో కంటికి రాసువలెను.

లేక విప్పళ్ళు, సీసము, సీసాపెంప సమానభాగములుగా తెచ్చి పొడిచేసి గొట్టములో పోసి పారఱుచుము.

లేక దినమునకు రెండుతులముల అల్లము వంతున వారము దినములు తినిపించుము.

ఆంగ్లేయ (Allopathic) వైద్యము

సిల్వర్ సైట్రిక్ 2 గ్రెయిన్సు, డిస్టిల్వాలరు 1 డ్రామ్ కలిపి సీసాలో నుంగు కొని అప్పుడప్పుడు కంటిలో వేయుచుండవలెను.

లేక జింకుసల్ఫేట్ 3 గ్రెయిన్సు, డిస్టిల్వాలరు 1 డ్రామ్ కలిపి అప్పుడప్పుడు కంటిలో వేయుచుండును.

కండ్లనిర్రువు — నీరుకొర్రుట (Inflammation of the eye ball)

స్వభావము (Causes)

రక్కోగమువలనను, అలివేదీవలనను, కండ్లలో ఘాతి మున్నగునవి పడుటవలనను, వినుగు విరామములేక రాత్రింబవళ్ళు పనిచేయుచుటవలనను, ఈ వ్యాధి పశువులకు

కలుగును. కొన్ని పశువులకు చిన్న నాటినుండియు విరువక కండ్లనుండి నీరుగారుచుండును. పశువు మొదటిలో పుట్టిన వ్యాధియే దీనికి కారణమైయున్నది. ఈ వ్యాధి వంశ పరంపరముగ వచ్చుటయు కొన్ని పశువులలో కలదని కొన్ని పశువైద్యశాస్త్రములు తెలుపుచున్నవి. అధికవారముగల పశువులకుకూడ నీరుగారుచుండును.

లక్షణములు (Symptoms)

పశువునకు గుడ్డుపెప్పార వారి మొగ్గుబడును. కన్నురు వేడిగా నుండును. కంటిలో ఎరుపుజీరలుకూడ యుండును. పశువు కన్ను మిక్కిలి ఎరుపుగానున్నచో వెలుతురును కూడ చూడజాలదు. ఇంకను పశువు మురికిగానున్నచో కొన్ని నూళ్ళుజీవులు కంటిలోనికి ప్రవేశించి వుసులు కట్టుచుండును.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

పశువునకు వెలుతురు, ఎండ అంతగా తగులబడురాదు. కండ్లను ఉదయనేలలో యందు వగరునీటితో కడుగుచుండవలెను. పశువుకన్నులు మిక్కిలి ఎరుపుగానున్నచో 30, 40 తులముల అముదమును త్రాగించుము.

లేక కందిగింజల గంధము కండ్లలో రెండునేలల పెట్టుము.

లేక పశువు చూడుపట్టున అముదముకొచ్చి రెండుమాడు దినములు పెట్టుము.

లేక పొంగించిన పటిక అరతులము తెచ్చి దానిలో నూళ్ళముగా నల్లనుండు తేనె చింతామరసముతో కాలతేనెన వేడిపారిమీద మగ్గనచేసి కండ్లప పట్టుము.

ఆంగ్లేయ (Allopathic) వైద్యము

యల్లో ఆయింటుమెంటు దినమున కొకసారి కంటిలో పెట్టుము.

కన్నులు వుసులు కట్టుట

స్వభావము (Causes)

పశువును వినుగు విరామములేకుండ పనిచేయించుటవలనను, వాతరక్తకోగముల వలనను, ఇంకను కంటికిగాని, తలకుగాని, అదరుదెబ్బలు తగులుటవలనను, ఎండలో పనిచేయించుటవలనను, అతివేడివలనను, నేత్రగోళములలో జబ్బుండుటవలనను ఈ వ్యాధి కలుగుచుండును.

లక్షణములు (Symptoms)

కన్ను లెఱ్ఱబడుటయుగలదు. నీరు కారుచుండును. దురిదకూడ నుండవచ్చును. కన్నుల మొదటిభాగమందు వుసులు, నీరు కారుచుండును. అసలమునందె గడ్డలుకట్టి ఉత్తరే పూర్వసన్యాస్య పరసన్యాసి కేవలి, భరణీ సన్యాస్యాని, సర్వసన్యాసి.

యందును. చూచుటకు పశువు చాలా అసహ్యకరముగా నుండును. ఈగుఱుకడ ఆ గడ్డలమీద ముసిరి కండ్లను చెరువును.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

ప్రతిదినము పశువుమాడున ఆముదము కొంచి పోయునుండవలెను. ఇట్లు నాలు గైదు దినములు చేయవలెను. పోకిరిటితో కండ్లు కడుగునుండుము.

లేక పసువుగాని, మంటుగాని కండ్లలో పెట్టుము.

లేక సారచేప తలలోని రాయి, ఖట్టూరిగింజ, చువలతో అరిగి దీసి కండ్లలో పెట్టుము.

లేక కొబ్బరి తుప్పమును వెన్నతో కలిపి అప్పుడప్పుడు పెట్టుము.

ఆంగ్లేయ (Allopathic) వైద్యము

పోరిక్ లోషన్ గాని, ఆల్ బోషన్ గాని అప్పుడప్పుడు వేయునుండుము.

రేజీకటి (Defects of Vision)

స్వభావము (Causes)

కొన్ని పశువులకు రాత్రిపూట కండ్లు ఏమాత్రమును గన్పించవు. ఈ వ్యాధిని పశువుయొక్క చక్కలను బట్టి కనుగొనవలసినదే గాని సాధారణముగా నేత్రపరీక్షవలన తెలిసికొనుట దుస్సరము. కొన్ని చూడలు వుట్టిన వారముదినములలోనే ఈ వ్యాధి జనించును. ఈ వ్యాధిగూడ వంశ పరంపరముగ వచ్చునని కొందరు డాక్టర్లు చెప్పుచున్నారు. ఇంకను ఫ్యాక్టరీలలోనుండు తవుడును విస్తారముగా మేపుటవలనను, పిల్లి పెసరను నెలలకొలది మేపుటవలనను కండ్లకు అతివేడిజేసి ఈ వ్యాధి రావచ్చును.

లక్షణములు (Symptoms)

ఈ వ్యాధిగల పశువులు పగలు బాగుగానే చూడగలవు గాని రాత్రిపూట మాత్రము చూడజాలవు. రాత్రిపూట బుట్టలలో ఆహారపదార్థములుంచి యెదుటనుంచిన యెడల రేజీకటిగల పశువులు ఇటువంటి వెదకకొనునుండును. ఒక దొడ్డినుండి మరియొక దొడ్డికి తోలినయెడల పశువునకు త్రోవ సరిగా కన్పించక గోడలకు, గోతులకు, చెట్లకు అడ్డుపడిపోవుచుండును. మంచి వెన్నెల గాయుచున్నపుడు మాత్రము వీని కొకమాదిరిగ కన్పించును.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

నేత్రమలలో అవువెన్న పెట్టి చర్మీర్ని కొట్టుము.

లేక, మలగాన రసము తేనెతో కలిపి కండ్లకు పెట్టుము.

లేక, గానుగ వేరు లేనతో అరగదీసి కండ్లకు పెట్టుము.

లేక, బాజికాయ లేనతో అరగదీసి పెట్టుము.

లేక, ఒకటి రెండుచుక్కలు ఏరుల్లిపాయురసము కండ్లలో పిండుము.

లేక, అవిసెవువ్యూల రసము నలకలులేకుండ శుభ్రమైపది పోయుము.

లేక, సజ్జలు విసరి సిండిపెట్టుము.

అంక్షేయ (Allopathic) వైద్యము

విల్క్యన్ పై ట్రేజ్ లోషనులు వాడుము.

లేక ఆర్జెరాల్ 50 గ్రాములు, ఏరు 1 ఔన్సు కలిసి వాడవలెను.

కండ్ల కలక (Inflammation of the eye)

స్వభావము (Causes)

గ్రుడ్డుయొక్క పై పొరవాయుటవలనను, పశువు ఇసుకలో తలను ఆనించి నిద్రించుటవలనను, చలిగాలివలనను, కంటికి దెబ్బతగులుటవలనను, కీతోష్ణనీతి మాత్రుగా మారుటవలనను ఈ వ్యాధివచ్చును. ఇది తింటున్నవింధమైనది.

లక్షణములు (Symptoms)

వెలుతురును సహించలేకపోవును. కండ్లకుండి నీరు గార్చును. కంటిలో పుసులు కట్టును. కనురెప్పయిదికి వెచ్చగానుండును. కంటిపొలలో అక్కడక్కడ పొక్కులు లేచును. కంటియందు ఇనుక రేఖలు లున్నట్లు కనకలలాడుచుండును.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

రిల్ల వాడుకాయరసము కండ్లలో పెట్టుము.

లేక పిప్పర్కు $\frac{1}{2}$ తు, మిరియాలు $\frac{1}{2}$ తు మెత్తిగా నూరి వెన్నత్రాసతో కలిపి కండ్లకు పెట్టవలెను.

లేక గుంటకలక రాకు పసరుతో మిరియపుగింజ అవంగపు మొగ్గ అరగదీసి కండ్లకు పెట్టుము.

లేక నందివర్ణ పండుటామలరసము కండ్లలో పిండుము.

లేక తడిపసుపుగడ్డగాని కావిరాయిగుడ్డగాని కండ్లపై నుంచుము.

లేక తుమ్మచెట్టునకు పట్టు ఒకవిధమైన పురుగుగూడు లేచ్చి దానిలో నుంచు పురుగుల రసము కంటిలో పెట్టుము.

లేక అరటిదుంపనాన కండ్లలో పెట్టుము.

అక్కనికురిస్తే ఒక అడవిలోకి చాలదు.

లేక ఆరెచ్చెట్టినను పెట్టుము.

అంగ్లేయ (Allopathic) వైద్యము

జింకు సల్ఫేట్ లోషన్ గాని, లేక బోరిక్ ఆసిడ్ 9 గ్రాములు, డిబిల్ నాటరు 1 ఔన్సు కలిపి చుక్కలుగాని వేయవలెను.

కండ్ల దృష్టి కగ్గుట (Amblyopia)

స్వభావము (Causes)

పశువులను రాత్రివేళలందు బండ్లుకట్టి రోడ్లవూడ 'తమ పాలములకు మట్టి వస్త్రాలు తోలుటవలన మోటారు లైటువెలుతురు, గ్యాసులైటుల వెలుతురు, ఎక్కువగా తగులుటవలన దృష్టి కగ్గుచుండును. ఇంకను మిడిమిడి ఎండలో పనిచేయుటచేతను, ఆ సూర్యరశ్మి కండ్లకుతగిలి దృష్టి తగ్గుచుండును. ఇంకను మురికినీరు త్రాగించుటచేతను, కొవలసివంత వెలుతురులేనిచోట పశువులను కట్టుటచేతను, చెడునీరు కండ్లలో ప్రవేశించుటచేతను ఈవ్యాధి కలుగుచున్నది. ఇంకను నగములవోషమువలనను, రక్తహీనత వలనను కలుగుచుండును.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

పదిమిరియములు పొడిచేసి తుండిలపాకురసములో కలిపి అప్పుడప్పుడు కన్నులలో పెట్టుచుండుము.

లేక పచ్చకర్పూరము, పంచదార సమానభాగములు కలిపి అత్రవెన్నతో నూరి కండ్లపై పెట్టుము.

లేక సాగచేపములము 10 దినములు కంటిలో పెట్టుము.

లేక నీరుల్లిపాయ రసము పోయుము.

లేక తిప్పతీగ రసము, సాంటిరసము, మైంధవలవణము, నూరి కన్నులకు పెట్టవలెను.

అంగ్లేయ (Allopathic) వైద్యము

పొటాషియం అయోడైడ్ 10 గ్రాములు, మైట్రాజన్ అయోడైడ్ రుబ్రం 5 గ్రాములు, గంజలో కలిపి 10 దినములు 3 వేళల యియ్యవలెను.

అలంలోషన్ గాని, జింకులోషన్ గాని, బోరిక్ లోషన్ గాని అప్పుడప్పుడు కంటిలో వేయుచుండవలెను.

కంటిమాద

స్వభావము (Causes)

ఈ వ్యాధి అవిరి ముదిరినతరువాత వచ్చును. ఇది చాల ప్రమాదకరమైనది. ఎక్కువగా పొటుపడుచు చురుకుగా స్వాధీనము బొల్లిమచ్చలుగల ఎద్దులకు తరచుగా గలుగుచుండును. కనుగ్రుడ్డుపైన కొయ్యగండలు పెరిగి క్రమేపి కన్నుగ్రుడ్డు క్రుల్చి పోవును. దీని కెటువంటి చికిత్సలుచేసినను లాభములేదు. ప్రత్యేకముగా మీ తాలూకా పశువుల డాక్టరుచే కన్ను తీసివేయించుట మంచిది. లేనిచో ఈదోషము రెండవ కంటికి కూడ వచ్చును. ఈ కన్ను తీసినప్పటికి కూడ నీరు కట్టరిచో ఆ పశువు త్వరలో చని పోవగలదని గ్రహించవలెను. అందుచేతనే దీనికి కంటిమాదయని పేరువచ్చినది.

లక్షణములు (Symptoms)

పశువు నోరులేనిది గాన అది పడుబాధ భగవంతుని కరుక. చికిత్సచేసే వైద్యుని కరుక. కంటిచుట్టు వాతలు పెట్టుదురు. ఇందువలన పశువున కపాయము గలుగుటయే గాక పశువు మరణించును. నోటివెంట చొంగపడుచుండును. వ్యాధి ముదిరినకొలది కంటినుంచి రక్తము కారుచుండును. కన్ను భీకరాకారముగా నుండును. కనుగ్రుడ్డు ఎరువుగ నుండును. లేక గ్రుడ్డు దుర్బాంసముచే కప్పబడియుండును. ఎల్లప్పుడు విచారముగా నుండును. ముదిరినకొలది ఈగలు కంటిచుట్టు మూగి గ్రుడ్డును తినివేయును. క్రమేపి వాతముగ్రమ్మి పశువు మరణించును.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

దుర్బాంసమును గోటితోగాని, కత్తెరతోగాని తీసివేసి మిరియాలపొడితో పచ్చ కర్పూరిము తగినంతగా కలిపి కంటిలో పెట్టవలెను.

లేక అప్పుడప్పుడు పటికపటి చిక్కిని బిందువులు పోయుచుండుము.

ఆంగ్లేయ (Allopathic) వైద్యము

మీ తాలూకా వెటరినరీ డాక్టరుగారిచే కన్ను తీయించుట నా ముఖ్యోద్దేశ్యము. ఎన్ని చికిత్సలు చేసినను లాభములేదు.

కనురెప్పలచివర పొక్కులు లేచుట

(Stye - Hordeolum)

పశువు కనురెప్పల పొక్కులు లేక మరుపులు బయలుదేరి బాధనుకలుగజేయును. ఈపొక్కులు తెలుపుకను, గట్టిగను యుండును. ఇవి కనురెప్పల పైవైపుకనుగాని,

భరణితురిస్తే ధరణి పండును.

లోపలివైపునకుగాని చిలికి త్రొవ్వకుంటే పదార్థము చెడలుచు ఎక్కువభాగము, రక్తము
యంతటను వాత్రును గలుగజేయును.

అయుర్వేద (Native) వైద్యము

పాశ్చాత్యుల మండపమృత్యుమున్ను ఆరగదీసి దానిలో కొంచెము గంధకముకలిపి
పట్టించవలెను.

లేక మామిడి ఆకులనకము ఈనెలుకొల్పి మసినీసి నీటిలోకలిపి మరుపులకు
పట్టించవలెను.

లేక పటికపొడి 1కు, పసుపు 1 కు, వేపనూనె 2 కు కలిపి అప్పుడప్పుడు పట్టించ
వలెను.

అంగ్లేయ (Allopathic) వైద్యము

కార్బురిక్ ఆయిలుగాని టింక్చర్ అయోడిన్ గాని అప్పుడప్పుడు మరుపులకు
పట్టించుము.

బోరిక్ ఆయింటుమెంటు రుద్దుము.

కొయ్యగండలు పెరుగుట (Trachoma)

పశువురెప్పలు చిరునెక్కును. కంటిరెప్పలచుట్లు కొయ్యగండలు పెరుగును. ఇవి
గ్రుడ్డుమీద కాకుండ తదితరభాగములమీద వుట్టును. వీటివలన పశువు బాధపడు
చుండును.

అయుర్వేద (Native) వైద్యము

బ్రహ్మదండి చెట్టు నమూలము ఉప్పులో మెత్తగా నూరి గాయమునకు పట్టించ
వలెను.

లేక కొబ్బరి, నల్లజీడిపిత్తులు కలిపి ప్రతిదినము ఉదయపుతూట తినుపించుచు
ఆ గాయమునకు కొత్తనున్నము గాడిదగడపాకునము కలిపి పట్టించుము.

లేక మైలతుత్తము, గంధకము, పాదరసము, సమానభాగములు తమలపాకురస
ముతో కలచువల్లెముమీద నూరి గాయమునకు పట్టించుము.

లేక మైలతుత్తము, నూరేకారము, రాతినున్నము సమపాళ్లు రెద్ది నిమ్మకాయ
రసముతో నూరి గాయమునకు పట్టించుము.

నేత్రముల కొలుకులలో దుర్వాంశము వెలిగినచో

దుర్వాంశమును శస్త్రముచేసి పసుపుకొమ్మును కొల్పి అంటించుము.

లేక మిరియాలు మెత్తగానూరి కొలుకులకు అంటించుము.

లేక నూరేకారము పనువు మెత్తగానూరి నేత్రములలో పారజుదుము.

లేక తుంతుకుపువ్వు, కరక్కాయ ఆముదము సమాన భాగములు నూరి కలబండ తుట్ట రసముతో లేసెకలిపి కాటుకగాచేసి కండ్లలో పెట్టుము.

లేక కవిరి, వెలిగారము, పటిక, కొబ్బరినూనె, ఆవువెన్నతో కలిపి కండ్లకు పెట్టుము.

కంటిలో నికర వస్తువులు పడుట

(Foreign bodies in the eye)

పశువు కంటిలో నలకలు, దుమ్మురేణువులు, పురుగులు మొదలగునవిపడి బాధ కలిగించును. అట్టిసమయములలో ఈ క్రింది విషయములను గ్రహించవలెను.

1. పశువుకన్ను మూసి కన్నీటిని కారించుటమంచిది. ఆ నీటిప్రవాహములో దుమ్మురేణువులు కొట్టుకొనిపోయి సౌఖ్యము కలుగును.

2. లేనియెడల కంటిని కడుగుట మంచిది.

3. వెచ్చని నీటిని దెచ్చి కంటిలోనికి పిచ్చికారితో కొట్టవలెను.

4. వుల్లగాని, మేపగాని గ్రుచ్చుకొనినయెడల జాగ్రత్తగా తీసి బోరిక్ ఆసిడ్ లోషన్ కంటిలో వేయుచు వేడినీటి కాపులు తీయించవలెను.

5. మేపగాని, గ్రుచ్చుపట్టిన రేపగాని గ్రుచ్చుకొనినయెడల నెమ్మదిగా తీసివేసి యల్లో అయింటుమెంటు లేలిక గా పెట్టుచుండవలెను.

6. వుల్లగాని, మేపగాని గ్రుచ్చుకొని కన్ను వాచినగాని పై చికిత్సలవలన నొప్పులు తీయనియెడల కొలుకులలో ఆముదపు చుక్కలను విడువవలెను.

శ్వాసరోగములు

పదునేడవ భాగము

క్షయ (Tuberculosis)

స్వభావము - వ్యాపకము

ఇదియొకవిధమైన అంటువ్యాధి. ఈ వ్యాధి అన్నివిధములగు జంతువులలోను వ్యాపించును. పశువుయొక్క శ్వాసకోశములయందు ఒక విధమైన పురుగు ప్రవేశించి వానిని క్షీణింపజేయుట వలన ఈ వ్యాధి కలుగుచున్నది. పశువుయొక్క కలలోను, చొంగలోను, పాలలోను, రక్తములోను, ఊపిరిలోను, ఈ పురుగు వ్యాపించి యుండును. ఆహారపదార్థముల మూలమునను, గాలిమూలమునను, ఈనూత్నజీవి పశువుయొక్క శరీరములో ప్రవేశించును. జబ్బుగల పశువులు మంచి పశువులతో కలిసి యుండుటచేత ఈ వ్యాధి విచ్చలవిడిగా విజృంభించును. కనుక జబ్బుగల పశువులను ఆరోగ్య పశువులనుండి విడదీసి ప్రత్యేకస్థలము నందుంచవలెను. ఈ నూత్నజీవికి పశువుయొక్క శరీరము వెలుపలగూడ జీవించు శక్తిగలదు. పశువుల కొట్లము అనారోగ్యకరముగను, ఆపరిశుభ్రముగ నుంచుటచేత ఈ రోగము పెంపొందును. ఈ వ్యాధి కొన్ని వారములుగాని, మాసములుగాని యుండును. ఈ వ్యాధి మౌనరక్తమును పేచిత్వి చేయుట మంచిది. ఈ వ్యాధి అన్నిజాతుల జంతువులకును, మనుష్యులకును, పక్షులకును గూడ సోకును. ఇది సామాన్యముగ పట్టణములలోనుండు పశువులకు ఎక్కువగా వస్తుచుండును. అనారోగ్యప్రదేశములలో నుంచుటవలనను పశువుపేడ, చెత్త, మూత్రము నున్నగువానిని నిలవయుంచుటవలనను, గాలి, వెలుతురులేని కొట్లములలో పశువులను కట్టివేయుటవలనను, దోమలు, యిగలు ఎక్కువగానుండు మురికి ప్రదేశములలో పశువుల కట్టివేయుట వలనను, ఈ వ్యాధి ప్రచురించుచుండును. ఈ వ్యాధిని కలిగించు నూత్నజీవి మంచి పశువులకుండు గాయముల మూలమునను, త్రాగడి నీటిమూలమునను వీల్చు చెడుగాలివలనను, లోపలికి ప్రవేశించి వ్యాధిని కలిగించును.

లక్షణములు

ఈ వ్యాధి ముఖ్యముగా శ్వాసకోశములలో వృద్ధియగుచుండును. దగ్గు ముఖ్యలక్షణము. ఆదగ్గు మొదట కొంచెము కొంచెముగా నుండి క్రమక్రమముగా హెచ్చును. దగ్గు ఎక్కువైన కొలది తెనుడ ఎక్కువగా పడుచుండును. పనిచేయునపుడు మిగుల ఆయాస

మృగశర విండిస్తే అయిదు కౌరైలు పరుసును.

మాగా నుండును. క్రమక్రమముగా శరీరము శుష్కించును. జీర్ణకృత్తి రగును. అందుచే అహార మెంత పెట్టినను వీరసముగా నుండి పశువు కృశించును. పశువు బలహీనమైన కొలది దగ్గుచుండును. జ్వరముకూడ అప్పుడప్పుడు వచ్చుచుండును. ఈవ్యాధి తగిలినపశువు చనిపోవుటకు కొంతకాలము పట్టును. పైన వ్రాసినట్లు శ్వాసరోగములయందే గాక జీర్ణ రోగములయందు గూడ త్వయ యభివృద్ధినిొందును. అప్పుడు పలుచగా పేడవేయును. కడుపుబ్బర ముండును. కనుగుంటలు విడుచుచుండును. కేగులు చెడవచ్చును. అహార మును జీర్ణము చేసికొనలేక పోవును. పాడి పశువైనయెడల పొదుగు గట్టిపడి నాచి యుండును. ఆ పొదుగులో పాలు పలుచగను, వీరువలెనుండి ఒక విధమైన కచ్చునిరంగు గలిగి యుండును. పొదుగు పూర్తిగా చెడునప్పటికి పాలేమియుండవు. ఈ వ్యాధి మదిరినకొలది ఎముకలు కీళ్లు జబ్బుపడుట, బలహీనత చెందుట, నడచునపుడు తంటుట, మొదలగు లక్షణములు కనపడును. రానురాను కఫజ్వరము ఎక్కువై మరణము సంభ వించును.

చి కి త్త

సాధారణముగా ఈవ్యాధిని వైద్యులు కనుగొనుట కష్టము. అందుకొరకు క్రత్యేక ముగా తయారుజేయబడిన “ట్యూబర్క్యులిను” అను ఇంగ్లీషు మందుకటి కలదు. దానిని శరీరములోనికి ఇంజెక్షన్ చేసిన యెడల దానివలన శరీరమునందు కలుగు మార్పులనుబట్టి ఈవ్యాధిని నిర్ణయించవచ్చును. ఈవ్యాధికి పశువును అతి జాగ్రత్తతో సంగ్రహించుటయే తక్కువేకొందు మంచివికీర్తన లేదు. ఈవ్యాధిగ్రస్తమగు పశువును ధారాళముగా గాలి, వెలుతురు వచ్చు కొట్టములలో నుంచవలెను. పశువును ఎక్కువగా మేపరాదు. అమెరికా మున్నగు దేశములలో త్వయవ్యాధిగల పశువులను ప్రతిదినము పరీక్షించిగాని, వాటిపాల నమ్మనియరు. ఈవ్యాధినిగురించి తగినంత క్రద్ధ తీసికొనక పోయినచో ఒక పశువునుండి మరొక పశువునకు ఈవ్యాధి వ్యాపించును గాన మంచిపశువులతో వ్యాధి గ్రస్తమగు పశువును కలుపరాదు.

హెచ్చరిక

ప్రతిపట్టణములో నుండు పశు వధికాలను, పశువైద్యులచే పరిశోధన చేయించుట మంచిది. ఆహారార్థము వధార్థములగు ఇంతువులు కేవలము వయసు చెందినవి గాకుం డను, చూడిపశువులు గాకుండను, పసిదూడలు గాకుండను, జాడ్యగ్రస్తములైనవి గాకుం డను, కేవలము బక్కిచిక్కినవి కాకుండగను, ఉండవలయును. పశువధికాలు, నాని సమీపప్రదేశములు శుచిగానుండు టావశ్యకము. త్వయ, దోమ్మ మొదలగు జాడ్యముల వలన మృతినొంది జంతువుల మాంసము భక్షించుటచేత భక్షకులకు సంయతము ఈ జాడ్యము సంభవించును. ఈ విషయము చక్కగా మనస్సునందు నాటియుండవలెను.

మృగశిర లిందిస్తే మిగిలినకొర్రెలు వద్దించును.

వీలన ఈ దేశము దంతట హింజాతులవారు తమ కచ్చటనైన చచ్చినపశువు కొరికి యెడల దానిమాంసమును పంజీరములేక తిందురు. అట్టివారు పెక్కు రోగముల పాలగుచున్నారు. పాశ్చాత్యదేశములలో భక్షించు మాంసముల విషయమై, పానము చేయు క్షీరముల విషయమై అనేకములైన కట్టుదిట్టములు, శాసనములు ప్రజల క్షేమము కొరకై చేయబడి యున్నవి.

పట్టణములలో పాలను పితుపట్ట, విక్రయించుట మొదలగు విషయముల గురించి శాసన మొకటి ఆత్యవసరమై యున్నది. అట్టి శాసనము పుట్టువరకు పాలను కొనినవాని తాము కొనుచున్న పాలు ఎక్కడనుండి తమకు చేరుచున్నవో చక్కగా తెలిసికొని బాగరూతులై యుండవలెను. రోగముగల పశువులపాలు పానయోగ్యములు కానేరవు. గనుక అట్టి పాలను వాడరాదు. పశువులయొక్క రోగము నివారించుట, పాలయొక్క ఆరోగ్యము కాపాడుట మున్నగు కృత్యములు పశువైద్యపు టువోగీయులకు చెందియున్నది. పశువులలో ఏ పశువునకైన క్షయవ్యాధి యున్నయెడల ఒక పశువు నుండి మరియొక పశువున కది వ్యాపింపటయే గాక ఈ వ్యాధి తగిలిన పాడిపశువు యొక్క (ఆవు, గేదె) పాల నుపయోగించుటవలన మనుష్యులకును, ముఖ్యముగా చంటి బిడ్డలకును, ఈ వ్యాధి తగిలి వారి కపాయము కలిగించును. ఇదియే మనము ముఖ్యముగా గమనించవలసిన విషయము.

ఊర్ధ్వ శ్వాసరోగము

పశువును చలిగాలిలో త్రిప్పుటవలనను, మితముగా బండికిట్టి తోలుటవలనను, అహారము సరిగా పెట్టకపోవుటవలనను రక్తిములో ప్రాణవాయువు తక్కువగా నుండుట వలనను, శ్వాససాళిమన కేదైన ఆటంకము గలుగుటవలనను ఈవ్యాధి సంభవించును.

లక్షణములు

పశువు వణుకుచుండును. చెవులను వ్రేలాడవేయును. శరీరము వడిగా నుండును. నోటినుండి ఒకవిధమైన తెమడ పడుచుండును. ఈ వ్యాధి మాదిరినకొలది మలమూత్ర బంధరోగముగ పరిణమింపవచ్చును. ముఖము వాడిపోవును. నాలుకను బారవిడచును. పశువు తూలుచుండును. ఊపిరియాడుట కష్టముగా నుండును. మనము తగిన చికిత్స చేయనిచో ఉచ్ఛ్వాసవిశ్వాసము లెక్కువై పశువు వెంటనే మరణించును.

చికిత్స

కర్పూరము ½ తులము

నూలేకారము ½ తులము

మసాంబరము 1 తులము

నల్లచుంగు ½ తులము

కలిసి అప్పుడప్పుడు లేనతో నాకించవలెను.

మృగశిర బిందిస్త్రీ ముసిలేద్దు రంకెవేనును.

తేక కొడిగ్రుడ్డులొని చందమామ 1, ఫిరంగి సాగ్రాణి 1 తులము 1 తిసి నాళించవలెను.

తేక సాంటి 2 తులములు, పిప్పర్చు 1 తులము, నిరియాలు 1 తులము, కల్లు బెల్లము $\frac{1}{2}$ పిసె, ఉలవపిండి సోలెడు కలిసి మద్దచేసి లోపలికి పెట్టవలెను.

స్వామోనియా (Pneumonia)

నీనికి ఊపిరితిత్తుల వాపంగుగు. ఈ వ్యాధిమాడ ఒకవిధమైన అంటుజ్వరమని జంతుశాస్త్రజ్ఞులు తెలుపుచున్నారు. ఇది పశువుయొక్క శ్వాసకోశములను తగులుతు. చలిగాలి ఎక్కువగా సోవటవలనను, ఎల్లప్పుడూ పశువును వర్షములో నుంచుటవలనను, ఈ వ్యాధి వచ్చును. ఈ వ్యాధి సాడిశువులకి తే పాటుచును పశువులను తిరి నుగా సోకుచుండును. ఈవ్యాధిగల పశువుయొక్క ఒక ఊపిరితిత్తికిగాని, కొన్నిటికి రెండుతిత్తులకుగాని సోకవచ్చును. మలిసపుగాలి నెక్కువగా నీల్చుటచేత ఈ వ్యాధి రావచ్చునని కొందరు డాక్టర్లు చెప్పుచున్నారు. ఈ వ్యాధియొక్క లక్షణములు, ఋతువులను బట్టియు, సలములనుబట్టియు, పశువుయొక్క వయస్సునుబట్టియు వ్యాధి తగులకముందు రోగియొక్క ఆరోగ్యమును బట్టియు గలగవు. ఈ వ్యాధికిమాడ కొన్ని పురుగులే మూలకారణము. నీని మన రైతులు కనిపెట్టుట కష్టము. పశువుగుడెమిద పైతసోక్తు పెట్టి లోపలనుండు శ్వాసకోశములనుండి వచ్చు ధ్వనినిబట్టి ఈ రోగమును గుర్తించవలెను. ఈవ్యాధిసంబంధముగు పురుగు లొకవిధమైన విషమును తయారుచేసి తదితర పశువులకు ప్రసరింపజేయును. గాన నాగ్రాతగా పశువును కాపాడవలెను. ఈ వ్యాధి తగిలిన పశువు చొంగబడిన సలము పరిశుభ్రము చేయవలెనా ప్రదేశముమీద ఆరోగ్యసంబంధమైన విష మొకచెంపెన్నము వర వుండునని శాస్త్రజ్ఞులు తెలుపుచున్నారు.

లక్షణములు

ఈ వ్యాధికి ఆరంభములోనే పశువు ప్రక్కభాగములందు శుద్రువేమగు బాధ ప్రారంభమై పొటు పొడిచి నిల్లుండును. ఊపిరితిత్తులు కండియుండుటవలన శ్వాస మిక్కిలి ఆయాసముగా నుండును. కొన్నిటికి జ్వర ముండదు. మేత, నీరు మానును. పశువు పని జేయజాలదు. అంటుసంబంధమైన జ్వర మైనయెడల దీర్ఘకాల ముండును. ప్రారంభములో ఎక్కువ లక్షణములు కన్పిడవు. పని చేయుచునపుడు పశువు అలసి పోవును. తదితర పశువులతో నుండి పడిగా నుండును. శ్వాసకోశములు మ్రులినయెడల ఊపిరి వాసనకొట్టును. నాడి తొందగగా కొట్టుకొనుచుండును. మూత్రము తీవ్రవర్ణము కలిగి యుండును. ఈ వ్యాధియుండు దగ్గుపాడ నుండును. వ్యాధి ముదిరినకొలది రక్తము

పురుగుల వానపరిస్తే ముంగారి పండును.

క్షీణించును. త్రిమక్రమముగ గుండె అస్వస్థత జెంది క్వాసకోశములలో విషపదార్థములు చేరుకొని ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల నాడనియక పోవుటచే పశువు మరణించును.

చి కి త్వు

ఈ వ్యాధికి మన ఆయుర్వేద పశువైద్యులు చికిత్సలు చేయుట బహుశక్తము. కొన్ని మందులను ఇంజక్షన్ చేయవలసియుండును. అందుచే ఇట్టి లక్షణములు కలిగిన పశువులను వెంటనే పశువైద్యశాలలకు తీసికొనిపోవుట చాల మంచిపని. అట్లు చేయుటకు వీలు లేనిచో నీరు ఒకపాత్రలో తుగ్గించి కర్పూరతైలముగాని, యూకలిప్టస్ ఆయిల్ గాని వేసి దానినుండి వచ్చు ఆవిరిని ముక్కుగొర్రెముగానికి పట్టించవలెను. పశువు ఎదురుగామ్మ నొప్పికికూడ ఉపకారంబి చేయవలసియుండును. ఈ నొప్పిని తగ్గించుటవలన రోగి పశువుయొక్క సామాన్యస్థితి అభివృద్ధిపొందును. ఇందుకొరకై కొందరు ఆనాలు నూరి పట్టువేయుదురు. ఇది యెక్కువగా వేసినయెడల అపకారము చేయును. గాఢ అమిరిముగా వేయరాదు. ఇంకను పిండికిట్టు కట్టవచ్చును. కర్పూరతైలము రాది వేడికొపడములు కాయవచ్చును. వేడికొపడములు కాయుగుడ్డలో ఏ రెండుమాత్రము ఉంచక పిండివేసి కాపులు కాయవలెను. అప్పుడప్పుడు సారాయిని త్రాగించవచ్చును.

హెచ్చరిక

వ్యాధితగిలిన పశువును శుచియైన గలములో నుంచి పరిశుభ్రమైనగాలి తగులు నట్లు చేయవలెను. రొమ్మునకు చలిగాలి తగులకుండ వెచ్చని ఉన్నిబట్టలు, గొంగడి, కంబళి మొదలగునానిని కప్పవలెను. మేత మేయనియెడల బలవంతముగా పెట్టరాదు. ద్రవసంబంధమైన పదార్థము లేవియు త్రాగింపరాదు. ఏమంటేనను లేహ్యముగా చేసి నాలుకకు రాయవలెను. బారిగంటిగాని మాకలజానగాని పెట్టవలెను. పశువునకు బలము కలిగించు పదార్థములుకూడ పెట్టవచ్చును. పశువు నోటినుండి కఫము పడుచుండినయెడల ఆకఫమును శుభ్రముగా తీసివేసి ఫిన్వెల్ గాని, కార్పాలిక్ ఆసిడ్ గాని, పిప్పర్ మెంటు ఆయిల్ గాని ఆ కఫముపడినచోట చల్లవలెను.

దగ్గు (Cough)

అ॥ వె॥ పసికిదగ్గు నుద్యవంబంద బాధతో

మేత నర్థగాను మేయుచుండు

నిసియుదగ్గు హెచ్చి నీరసంబునుజెంద

కాక మిగుల తగుల గాసి జెందు॥

పశువునకు చలిగాలి, మంచు తగులుటవలనను, మిక్కిలి అలసిపోవునటుల పని చేయించుటవలనను, అలసియున్నపుడు వర్షమునకు మంచునకు తడిసియుండి టవలనను

మృగేవరే ముఖేభిరన్వృతి సౌతామినితిధా

ఊపిరిత్తులలో నుండు పొరలు కండుటవలనను లేక ఊపిరిగొట్టములలో నున్న పొరలు కండుటవలనను ఈవ్యాధి రావచ్చును. ఇదికూడ రెండువిధములుగా నుండును. అందు మొదటిది ఊపిరిగొట్టములలోనిపొర కండుటవలన కలుగును. రెండవది ఊపిరిత్తులలోని పొర కండుటవలన కలుగును. రెండువిధములుగాఁ జూపిరిగొట్టములలో ఒకవిధమైన పురుగులు పుట్టును.

లక్షణములు

దేనిచే వచ్చినను ప్రారంభములో లక్షణము లన్నియు ఒకేమాదిరిగా నుండును. అందుచే శాస్త్రజ్ఞులు కారణమును కనిపెట్టవలెను. పశువు దగ్గుట, మేత మేయలేక పోవుట, పనిచేయలేక అలసిపోవుట, మొదలగులక్షణము లన్నియు కనపడవచ్చును. ఊపిరి గొట్టములలో వ్యాధికన్న ఊపిరిత్తులలో కలిగిన వ్యాధి ఎక్కువ భయంకరముగా నుండును. దానికంటె పురుగుల వలన కలిగిన వ్యాధి కఠినతముగా నుండును. మొదట చెప్పిన కారణమేగాక మిగిలిన రెండు కారణములవలనను జ్వరముకూడ నుండవచ్చును. ముక్కులవెంబడి ద్రవపదార్థము వెలువడుచుండును. కండ్లనుండి నీరుకార్చుచుండును. దగ్గు రాత్రులయందు విశేషముగా నుండును. ఈ వ్యాధి ముదిరినకొలది పశువు క్షీణించుచుండును. ఒకటిని లేనజాలదు. చాల విచారముగా నుండును. జ్వరము హెచ్చుచు తిగుచుండును. పశువు క్షీణించినకొలది బరియెముకలు స్పష్టముగా కనపడును. నోటినుండి జగటవంటి ద్రవపదార్థము ఎక్కువగా వెలువడుచుండును. కథమెక్కువైన పశువునకు మరణము సంభవించును.

చికిత్స

రావినెక్క 2 తులములు, మిరియాలు 2 తులములు, పచ్చిపాలు అర్థసేరు కలిపి ప్రిదినము ఉదయము తాగించవలెను. ఈ విధముగా వారము దినములు చేయవలెను.

లేక పెన్నెరుడుంపల పొట్టు పావుసేరు, పులిచల్ల అర్థసేరు, కలిపి ఒకపూట మాత్రమే త్రాగించవలెను. ఈవిధముగా వారము దినములు చేయవలెను.

లేక నీరులిపాయరసము పావుసేరు ఒక పూట త్రాగించును. ఈరీతిగా 15 దినములు చేయవలెను.

లేక అడ్డసరపాకు పసురు పావుసేరు, అల్లపురసము పావుసేరు, కలిపి సాయం కాలము త్రాగించవలెను. 4 దినములు చేయవలెను.

హెచ్చరిక

ఈ వ్యాధి కూడ రొంపకు చేయు చికిత్సయే చేయవలెను. కాని పురుగులవలన కలిగిన వ్యాధిని మాత్రము పశువుల డాక్టరునకు చూపించవలెను. ఒక పశువునుండి మరి

యొక పశువునకు ఈ వ్యాధి వ్యాపించి కొన్ని పశువులు చెడిపోవచ్చును. దాట్ల దగ్గరకు వెళ్ళుట తటస్థించిన యెడల జబ్బుతగిలిన పశువులను ఒక గదిలోనుంచి గంధపు పొగ పీల్చునట్లు చేయవలెను.

కొంప (Catarrh)

ఉ॥ కాలము మార్పునొంద కడుకాయము శీతలమొంది బాధతో నాలిగనుండి దగ్గువడ నాసికమందు జనించు వాపును న్బాలగ హెచ్చియుండగను చక్కున శీర్షము వారమొంద తాళగలేక సొక్కి కడు తాహతులేకను బాధచెందెడున్.

ఈ వ్యాధి అంటువ్యాధిలో చేరింది. మనుష్యుల కొందరికి పక్షిములు ఒక్క సారే ఏదిధముగ వచ్చునో అచా నిరిగి నే పశువులకుకూడ వచ్చును. పశువును అతిశీతల మైన గాలిలో నుంచటవలసిన, శీతోష్ణస్థితిలో వింతయగు మార్పులు కలుగుటవలనను, గాలి వెలుతురు లేని ఇసుకుగానుండు కొట్టములలో పెక్కింటిని కట్టుటవలనను వానికి మందు, చలిగాలి తగులుటవలనను, అధికిత్రవ కలుగునట్లు పరిచేయించుట వలనను ఈ వ్యాధి కలుగును.

లక్షణములు

ఈ వ్యాధి సంభవించుటకు రెండుమూడు దినములకు ముందే పశువు నిరుత్సాహ ముగా నుండును. అప్పుడప్పుడు దగ్గునుండ ను. పశువునకు జ్వరముండును. నోటిలో ఒకవిధమైన కఫ మేర్పడును. జంతువు పరుగుడుటను ఇచ్చిగొప్పదు. వ్యాధి హెచ్చు దిన కొలది ఊపిరితిత్తులలో ఒకవిధమైన ధ్వని వుట్టును. ముక్కు రంధ్రములలోని పలుచని పొరకు నెత్తురు ఎక్కువగా చేరుటవలన ఆపార ఎఱ్ఱుండును. ఆ ముక్కురంధ్ర ములనుండి వచ్చు ద్రవపదార్థము చిక్కబడి ముడకట్టును. ఈ స్థితిలో పశువు మేత సరిగా మేయదు. వ్యాధి ముదిరినకొలది పొడిదగు ఏర్పడును. ముక్కునందు తడియుండదు. ఇంకను అశ్రద్ధచేసినయెడల క్యాసకోశములోకి వ్యాధి వ్యాపించి జ్వరము ఎక్కువై పశువు చాల బాధపడును. క్యాసకోశములు చెడి వ్యాధి హెచ్చిన యెడల పశువునకు ఆరోగ్యము కుదుగుట కష్టముగనుక మొదటనే జాగ్రత్త పడవలెను.

చికిత్స

జ్వరముగానున్న యెడల

ఉప్పు 10 తు, నూరేకారము 2 తు, నవాసాగము 1 తు, అర్ధనేరు చెన్నీటిలో కలిపి త్రాగించవలెను.

అరుద్ర చిలిస్తే అరువైరోజులు వరపు, అరుద్రలో వర్షంకురుస్తే అరుకొరైలుకురును.

లేక నల్లమూడు క్షుత, కర్పూరము క్షుత, కర్పూరతైలము 2 క్షుత, అర్థసేరు
నీటిలో కలిపి త్రాగించవలెను.

లేక సొంటి 2 క్షుత, పిప్పళ్లు 2 క్షుత, మిరియాలు 2 క్షుత, అర్థసేరునీటిలో కలిపి
త్రాగించుము.

లేక నీరుల్లిపాయలంసము 4 క్షుతములు ముక్కరంధ్రములలో పోయుము.

లేక మందిలెల్లం సవాసేరు, పసుపు 4 క్షుత నిమ్మకాయంత శుండలుచేసి
తెట్టుము.

పైఁ చెప్పిన చికిత్సలలో రెండు మూడు దినములు మీ యిష్టమువచ్చినది చేయ
వచ్చును.

హెచ్చరిక

మన రైతులలో చాలమంది పశువునుష్కరంధ్రములనుండి నీరుగాని, చీమిడి
గాని, కారుడుడినయెడల కొమ్ముడొల్లలని, శిశోవాతమరి ఇంక నేవోయొకపైత్యరోగ
మని పేరుపెట్టి తెలిసి తెలియని వైద్యములు చేసి పశువును చేతులార చంపుదురు. కాబట్టి
రోగముయొక్క డక, గుణములు గుర్తించి తగిన చికిత్సలు చేయవలెను.

ఈ వ్యాధి పశువున కష్కంఠగా మన్నపును తీవును, బాగ్గింజ లేక నూకలబావ
పెట్టుట మంచిది. పశువును చలిగాలిలోను, ఎండలోను నుంచరాదు. మలబద్ధక మున్న
యెడల విశేషమునకు మృ దీయవలెను. ఈగొంప పశువు శ్వాసవ్యాధిములను చెడగొట్ట
వచ్చును. పశువునిదుడు ఊసిగో పెత్తినను లేపించివచ్చును. జాతువును తగినంత
పరిశ్రమ చేయించుచుండవలెను. పశువునకు బలవంతముగా మందును ఖాళికి పోయ
రాదు. కొంచెము యూకలిప్టన్ ఆయిలుగాని, కన్నూర తైలముగాని బుడగలు వచ్చు
నట్లుగా నీటిలో కేసి ఆ నీటినుండి వచ్చు ఆవిరిని పశువు ముక్కరంధ్రములలోనికి వెళ్లు
నట్లుగా మూతియొద్ద పెట్టి తలమీద నొకగుడ్డ కప్పువలెను.

ఉబ్బసము (Asthma)

స్వభావము

ఈవ్యాధి మన దేశములో బండిఎద్దులకు తరచుగా వచ్చుచుండును. పశువుయొక్క
శ్వాసరోగములో నున్న చిన్నతీతులు పెద్దవియగుటవలన ఈవ్యాధి కలుగుచున్నది. పశువు
తన సారములేని పిప్పివంటి ఆహారవస్తువులు తీవుటవలనను, కొన్ని పనిలేక సోమరితన
ముగా నుండుటవలనను, మరికొన్ని విస్తారముగా తీతమీయు స్వభావము గలవిగా
నుండుటవలనను ఈరోగ ముత్పత్తియగుచున్నది. నోటిగాళ్లు తగిలిన నెమ్మదిందిన
పశువుల వ్యాధి తరచుగా వచ్చుచుండును. ఈ వ్యాధియందు కఫ మెక్కువగా పడును.

కొన్నిటికి కఠముండదు. పశువు పరములు యథాస్థితిలో నుండకపోవుటచేతను, ఈస్థి తిత్తులకు ఒత్తిడి గలుగుటవలనను, దీర్ఘమైన దగ్గులేక క్యావకాళములకు వేడి తగులుట వలనను ఈవ్యాధి రావచ్చును. ఈవ్యాధి తగిలినపశువు చాల కృశించి మిగుల విచారముగా నుండును. ఇది ముసలిపశువుల కెక్కువగావచ్చును.

లక్షణము

పశువునకు ఆరంభములో కొద్దిగ జ్వర ముండును. నీరమైన దగ్గుండును. పశువు ముక్కురంధ్రములనుండి తెల్లని జగుగువంటి పదార్థము నెలువడుచుండును. ముక్కురంధ్రములను పరీక్షించి చూచినయెడల ఎఱ్ఱని వరుపులుగాకనబడును. శరీరముమీది వెండ్రుకలు రాలిపోవుచుండును. రాలిపోవుటకు మిగిలినవెండ్రుకలు బాగుగాపెరిగి నిక్కబాడుచుకొని యుండును. పశువునకు వ్యాధి ముడికొలిపి యున్న ఎక్కువైన చాల దూమువరకు విసబడును. ఈ యుస ఎల్లప్పుడు నుండును. ఈ యుస చూచి పశువునుజూచి చికిత్స చేయించుటకు ఆకుగత పడుచుండును. ఈవ్యాధిగల పశువు అపానవాయువులు తరచుగా విడుదలుచుండును. క్రమముగ జరుగుచున్నప్పుడు కళ్ళి మారిపోవును. ఈ వ్యాధిగల పశువుతో కొందరు శైతులు పనిచేయుచున్నారు. అందువలన ఆ పశువునకు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు సరిగా అడక జోక్యము నెగురజేయుచుండును. పశువులకొట్టములో ఈ పశువును కట్టివేసి దానియొద్ద పరీక్షించినయెడల పిల్లికూతవలె నుండును. పైస్కోపు పెట్టి పరీక్షించినయెడల చక్కగా తెలియును. వ్యాధి ముడికొలిపి పశువునుభిక్షురంగు మారును. దగ్గుచున్నపుడు తెల్లని తెనుడి ఎక్కువగా పడుచుండును. యుస ఎక్కువైన పశువుమూలుగు చుండుటను, క్రమముగా పశువు నీరసము కెరిచిపోవును.

చికిత్స

కర్పూరతైలముగాని, యూజిలిప్టస్ ఆయిలుగాని వేడినీటిలో వేసి నెలసల కొగ నిచ్చి ఆ యావిగి పశువుముక్కు రంధ్రములకు పట్టించవలెను.

నెంటునే అడ్డపకపాత రసము అరసేరు, సొంటి 1 కు, విప్పుళ్ళు 1 కు, మిరియాలు 1 కు ఒకసారిమాత్రమే కలిపి త్రాగించవలెను.

లేక సారాయి 2 డ్రాములు, నిమ్మఉప్పు 1 కు, సొంటి 1 కు, మిరియాలు 1 కు, పసుపు 2 కు ఒకసారిమాత్రమే కలిపి త్రాగించవలెను.

లేక మంచితైలము 2 సేర్లు, అల్లము 2 సేర్లు, వాము అరసోలేను. తెచ్చి త్రొక్కి నెలగకాయంత ముద్దలుచేసి వారము దినములు తినిపించవలెను.

లేక వెలులిపాయలు 4 కు, మిరియాలు 1 కు, వేపచెక్కపొడి 3 కు, మేకపాలు అరసేరు కలిపి నూరి త్రాగించవలెను. ఈరీతిగా వారముదినములు చేయుము.

చరా:—ప్రతిదినము విశేషసాధకము చేయించవలెను. నూరినగు త్రాగించవలెను.

పై చికిత్సలకు లొంగని యెడల నొసలునుండి మూతివగకు వాలుగు దుక్కులు పెట్టవలెను. ముందరి జబ్బలదగ్గర 9 దుక్కులున్న ఎడ రాలలో ఒక దుక్కు పెట్టవలెను. ఆసకమువద్ద ఒక దుక్కు పెట్టవలెను.

హెచ్చరిక

ఈ వ్యాధి కలిగిన పశువు పూర్తిగా ఆరోగ్యము చెందుట కష్టము. అందుచే పశువునకు పెట్టుమేత శుభ్రమైనదిగను బాము కలుగజేయునదిగను, మలఘముగా జీర్ణమునదిగ నుండవలెను. ఆహారము తగ్గించి పెట్టవలెను. పని చేయించుటకు ముంగు కొన్ని గంటలవ్యవధి యుండునట్లుగా జీసి మేత తిగినంత మేసి పనిచేయించవలెను. ఈ వ్యాధి గల పశువును విస్తారముగా ఎండలో పనిచేయించక ఉదయసాయంకాలములయందు మాత్రమే తేలికగా పనిచేయించవలెను. పశువును పరుగెత్తించరాదు. నియమితకాలము లందు మాత్రమే పని చేయించవలెను.

క సి మి రి

ఎద్దులకును, తక్కువమేతమేయు పశువులకును, గాలిపంటు తగిలి ఎండలో తిరుగు పశువులకును, ఇంకను నరములు యథాస్థితి కెప్పుటవలనను, ఊపిరితిత్తులకు ఒత్తిడి కలుగుటవలనను, దీర్ఘమైన దగ్గుండుటవలనను, ఊపిరితిత్తులకు నేడి తగులుట వలన ఈవ్యాధి కలుగవచ్చును.

లక్షణములు

దగ్గు చాల తక్కువగనుండును. ఆదగ్గు ధ్వని కలుగజేయునదిగ నుండినను కొద్దిమారము మాత్రమే వినిపిండును. అప్పుడు గాలి ఆసకముగుండా వెడలుదుండును. ఈవ్యాధిలో పాటు అజీర్తికూడ నుండును. అజీర్తిగా నున్నయెడల జంతువురూపము మారిపోవును. ఎల్లప్పుడు నీడకొరకు ఎదురుచూచునుండును. వెండ్రుకలు నిక్కబొడుచుకొనును. బండి కట్టినయెడల దొక్కలు ఎగురవేయుదుండును. క్రమేణ పశువు క్షయించి చనిపోవును.

చి కి త్స

నీరులిపాములు అర్ధినేరునవటూకు, మజ్జగ అర్ధినేరు, కలిసి దినమున కొకపూట, పక్షముదినములు త్రాగించుము.

లేక మాదుగానుపనరు పావునేరు, కలిపి అర్ధలేరు, కలిసి దినమున కొకసారి, నారము దినములు త్రాగించుము.

లేక మంచిల్లెము 2 నేర్లు, అల్లము 2 నేర్లు, తెచ్చి వెలగకాయంత ముద్దులు చేసి వారముకోజాలు పెట్టుము.

లేక గంటలు తెచ్చి వడ్డికూడగా పండి అంగులో మంగిమానె కలిపి తవ్వెడు, మానెడు పంతున 40 దినములు పెట్టిచో హరించును.

హెచ్చరిక

గాలివంటు తగిలినపశువుతో పనిచేయించరాదు. ఎండలో త్రిప్పురాదు. లేనిచో ఇటువంటి వ్యాధుల పాలగును. ఈ కిసిమిరిగల పశువుతో పనిచేయించరాదు. తగిన ఆహారము వేళకు పెట్టుచుండవలెను.

ము కు బంధి

అ॥ వె॥ నాసికంబునందు నంటియుండగనుండ
కాయ కోలనగుట కాననగును
నాకుచుండ జూలు నాసికముననుండు
ముకును బతియంద్రు ముదముతోను.

అ॥ వె॥ ముక్కునాళమందు ముడికాయ పెంపొంది
పసియు దగ్గునొంది బాధచెందు
నాసికంబునందు నడచుచుండును నీరు
గాలి పీల్చి వదల కష్టమగును.

దీనికే ముకుబంధి లేక ముగబాధి అంగురు. ఇది రెండు విధములుగా నుండును.

(1) ముక్కురంధ్రముల లోపలి పైభాగమున నొక విధమైన మార్కకండ గుండ్రని కోలగా నుండు కాయలవలె పెరుగును. అది ముక్కురంధ్రములలో నుండు శ్లేష్మపు పొరలకు ఒక సన్నని కాడపంటిదాని నంటుకొనియుండును. ఈ వ్యాధి చలి గాలివలనగాని, తదితర వ్యాధులవలనగాని లేక పశువులకు తగదుగా వచ్చుచుండును.

(2) ముక్కురంధ్రముల పొడుగున అనగా పైయండి క్రిందవరకు చిన్న గుండ్రని చిక్కలవలెగాని, ఉండలవలె గాని దుర్గాంసము పెరుగును.

మొదటివిధమైన వ్యాధిగల పశువునకు దగ్గుండును. కాయగాని, ఉండగాని గొంతువద్ద అడ్డుపడుటవలన శ్వాస సరిగా ఆడక తన్నుకొనును, కొద్ది జ్వరముండును. కండ్లు యెర్రగా నుండును. ముక్కులగుండా ద్రవము వచ్చును. ముదిరినకొలది ద్రవము చిక్కుచుండును. వ్రులసియుండును.

అరు కార్తలకు పోతుకార్త అరుద్రకార్త

రెండవవిధమైనదానితో దుర్భాసము పెరిగి బిళ్ళలుగాని, ఉండలుగాని, చిలికి యుండుట, నల్లగా క్రుళ్ళుట, ముక్కురంధ్రముల వెంబడి చీమిడి వంటి పదార్థము కారుట, శ్వాస తీసుకొను సమయములలో విస్తారముగా శబ్దము కలుగుట మొదలగు లక్షణములు కనబడును. వ్యాధి ముదిరిన కొలది పశువు ఆటు నిటు తిగుగును. మూర్ఛ కూడి రావచ్చును.

చి కి త్వు

మొదటి విధమైన రోగమునకు ఒకదారము బారముడి వేసి ఒక సన్నని చివర మొయగా నుండెడి పుల్లతోగాని లేక సన్నని తీగతోగాని, ఆముడిని బొవలికి తీసికొని వెల్లి జాగ్రత్తగా సన్నని కాడవలె నుండుచోటను తగ్గించి ముడిని లాగినయెడల ఆకాడ తెగిపోయి ఉండ బ్రతికి వచ్చును. దీనినే ముగబంతియని చెప్పుదురు. ఈ ప్రకారము సాధ్యము కానిచో పశువైద్యకాలకు తీసికొనిపోయినయెడల వారు ఒకవిధమైన పని ముట్టుతో తీసివేసెదరు.

పశువు, శరీరము నాకికొనుటచే ఆబొమ్మ కేసమునోనికి బ్రవేశించి పెద్ద పొట్టలో జేరి ఉండకట్టును. దిగువపును ఆ కాయ నేలబడును. దీనినే మొగబంతికాయ యందురు. ఈ కాయను ఆవుచంచితములలో కొంతసేపు ఉంచినే సాగ్రబాటి పొగ వేసి జబ్బుపశువుయొక్క ముక్కురంధ్రములదగ్గర కొంచెముసేపు వుంచి తరువాత పశువునకు ముమ్మారు దిగుడుడిచేయుదురు. ఇదియొక దాంలిక వికీర్ణయేగాని పశువునకు ఈ రోగమువలన ప్రమాదము లేదనియు మూడునాలుగు దినములుండి తానంత టదియే పోవునని కొందరు డాక్టర్లు చెప్పుదున్నారు.

హరి కర్పూరము $\frac{1}{2}$ తు జీలకర్ర 1 తు దానిమ్మ మొగ్గలు గుప్పెడు చను బాలతో నూరి గుడ్డలో వేసి సిండి 5, 6 చుక్కలు 2, 3 దినములు ముక్కులలో పోయ వలెను.

లేక పిల్లివీచరగడ్డరసము ముక్కురంధ్రములలో పోసి నెమ్మదియును.

లేక కాంచించెట్టు కాడలను ముక్కులుగ కొనీ తోటిలో వేసి దంచి అపొడిని ముక్కురంధ్రములలో నవ్వుము చేయించవలెను.

లేక పాలతీగాకు రసములో వసగంధము కొద్దిగా కలిపి 10 చుక్కలు ముక్కులలో పోయును.

పీ న స రో గ ము

ఈ వ్యాధి ఒక విధమైన యిగాలవలన కలుగు వస్తుది. ఇదికూడ అంటువ్యాధియే యని నా నమ్మిక. ముక్కు రంధ్రములలో ఈగలు జేరి ఒక విధమైన ములిపదార్థము నిడిచివెట్టును. తదుపరి ఆ రంధ్రములలో ఒక విధమైన చీము పోతపలు పోతపలుగా

పునర్వసు పువ్వని కార్తులు వణించితే పూరేలి అడుగైన తడియును.

నుండు పశువులుగా లేదును. ఇవి బాగుగా పెరిగి పగిలి చీము కారుచుండును. ముక్కును పరిక్షించినయెడల పశువులు స్పష్టముగా కనబడను. ఈ వ్యాధి ముదిరిన కొలది మెదడు నకు కూడ సోకి పశువు మణమునకుకూడ సిద్ధమగును. ఈ వ్యాధి సంవత్సరమువరకుండును.

లక్షణములు

పశువునకు జ్వరముండును. ముక్కులనుండి చిక్కిని చీమిడి పడుచుండును. అప్పుడప్పుడు తుమ్ముచుండును. అరి మేతమేయును, నోరు చాల అసహ్యముగా నుండును. ముక్కురంధ్రములనుట్టు ఈ లు మురురుచుండును. ఉచ్చాస్యన నిశ్వాసముల నాటంక పరచు చుండును. ఈ వ్యాధి ముదిరినకొలది గురక పుట్టి తుమ్ములెక్కువగును. అప్పుడప్పుడు ముక్కు బెడలి రక్తము కారుచుండును. పశువు చాల బాధపడుచుండును. సరియైన చికిత్స చేయనిచో పశువు కొలది కాలములోనే మరణించును.

చికిత్స

ముక్కులను పైలతుత్తపు నీటితోగాని, పటికనీటితోగాని పిచికారీ చేయుచుండవలెను.

తరువాత, హారతి కర్పూరము - 1 తు, వస - $\frac{1}{2}$ తు కలిపి అప్పుడప్పుడు ముక్కులలోనికి పార ఊడవలెను.

లేక, ఏరుల్లిపాముల రసము - 1 తు, కులసిఆకురసము - 1 తు కలిపి ముక్కులలో పోయుము.

మీ తాలూకా గవర్న మెంటు వెటరినరీ డాక్టరుగారిచే ఇంజెక్షన్ చేయించుము.

హెచ్చరిక

ఇటువంటి పశువులను ప్రత్యేకముగా నుంచుట నుంచిది. వీటికి ఏదైనా బ్రాగుటకు, ఆహారముంచుటకు ప్రత్యేకముగా లొట్ల నుంచవలెను. పశువు ముక్కురంధ్రములలో వీనిధమైన గాయము లున్నను ఆ గాయములగుండ వెంటనే ఈ వ్యాధి సోకును.

యశావనమందమతి

ఈ వ్యాధి యావనము దాటిన పశువులలో మాత్రమే సామాన్యముగ కన్పించుచున్నది. సామాన్యముగా మేపబడినను, ఎక్కువగా మేపబడినను, సరియగు శరీరవరిశ్రమ లేకున్నను, ఎండలో ఎక్కువగా పనిచేసినను, పశువు కంతమునకు తగిలించు పలువురుగాని త్రాడుగాని బిగిసికొని పోయినను ఈ వ్యాధి పశువులకు సోకును.

లక్షణములు

పశువు వెంటనే క్రిందపడిపోవును. లేక అంతకుముందే బద్ధకము ప్రాప్తించి

పుశాల పరిస్తే పూరిపిట్టతడవదు.

చుట్టుప్రక్కల యేమి జరుగుచున్నది చూడబండ రెప్పలు మూతలు బడిపోవును. జంతువు చాల కష్టముతో ఊపిరి విడుచుచుండును. తక్షణమే జంతువు ఒకచోటనుండి కదలలేదు. తూలుచుండును. గాలి సరిగా వీల్చలేదు. దేహమునిండ చెనుటపట్టును. శరీరములోని రక్తస్రావములకు అటంకము కలుగును. మఃస్పృశకు తెలియవండగనే ఊపిరి విడువబడుచుండును. కొన్ని సమయములలో కడుపులో త్రిప్పుటకూడ కనబడును. పక్షవాతము కలుగవచ్చును. సరియైన చికిత్స చేయనిచో పశువు మరణించును.

హెచ్చరిక

శరీరభాగములు కడుపవలెనంత దుస్థితిలో నున్నప్పుడు విరేచనము కానియెడల మందీయవలెను. గాలి ధారాళముగా వచ్చు సలమందు పశువు నుంచవలెను. జంతువు శరీరభాగములను మాలీను చేయవలెను. ముఖ్య ఆవయవముల దగ్గరను, వీపుమీదను జాగ్రత్తగా తోసువలెను. శిరస్సుమీద అప్పుడప్పుడు చన్నిటిని పోయుచుండవలెను. నూకలజావ పెట్టవలెను.

చికిత్స

కర్పూరతైలము శరీరభాగములకు రాయవలెను.

లోపలికి సాంటి - 2 తు, నిమ్మఉప్పు - అరతులము, వేడినీరు - అరసేరు కలిపి దినమున కొకసారి వంతున వారముదినములు త్రాగించవలెను.

లేక ఏరుల్లిపాయల రసము పావుసేరు త్రాగించుము.

లేక ముసాంబ్రము 1 తు, ఇంగువ 1 తు, ఏరు అరసేరు కలిపి త్రాగించుము.

శిరో రోగములు

పిచ్చి (Insanity)

తే॥ పిచ్చికుక్కలు పశువుల పీకినంత

జబ్బుచిన్నెలు రోజు వత్సరముదాక

పశువు మూతి బిగించియు బాధపడును

తృల్లి పడుచుండు రోగము తీవ్రమయిన॥

తే॥ మీదబడి క్రుమ్ము వానుజుని సాదురేగి

కోవ మెక్కునయిపోయి తాపమొందు

దాహ మెక్కుడనయి నీరు త్రావుచుండు

తిండి దినకను చనిపోవుదిటవు దొరగి॥

ఈ వ్యాధి పాలిన్య ప్రతిజంతువునకు రావచ్చును. ఇది నిజముగా జంతువులకు కలిగిడివ్యాధియై యున్నది. ఇది మనుష్యులకుకూడ ఆకస్మాత్తుగా కలుగుచున్నది. ఈ వెట్టి కారణభూతమైన దేదీయో ఇంకను కనుగొన బడలేదు. కాని అదియొక జీవపదార్థ మనుటకు సందియము లేదు. ఈ వ్యాధిగల జంతువు దేహముందు విషమున పదారము నరీ మలుగఁగ భాగమందుండును. అనగా మెదడు, నరములు వీరియందును, ఉమ్మిని కూర్చు నట్టి గవదలవంటి కొన్ని భాగములందును ఉండును, గవదలనుండి విషము ఉమ్మిమూల ముగ వెలుపలికి వచ్చును, గాన వెట్టిపట్టిన జంతువులు కలుగుటవలన ఆవ్యాధి తదితర పశువులకు మనుష్యులకు సోకుచున్నది. అయినను వెట్టిపట్టిన జంతువుయొక్క విషము కాటుయేర్చడిన చర్మమునకు తగిలినచేగాని, అది సోకుడును కలుగజేయ నేరదు. అట్టి కాటు సామాన్యముగా అవెట్టి జంతువుయొక్క పొడవైన నేర్చుడును. కాని మౌలిక త్రి గాయములను, దోమకాటు మున్నగు చిన్న గాయములను ఆపశువు వాకినయెడల ఈవ్యాధి కలుగును. ఈవ్యాధి తగిలిన పశువునకు మూడు లేక ఆమురు దినములవరకు రోగి చిన్నము లగుపడవు. ఇదియునుగాక తనంతట తాను వ్యాధి కలిగిన జంతువులకు సాధారణముగా వ్యాధి ప్రారంభించినది మొదలు కొన్ని దినములలోనే మృత్యుమును కలుగజేయును. విషము వెన్నెముకకు, మెదడునకు చేరువరకు ఈవ్యాధి బయల్పడదు. ఈతావున చేరు టకై ఆవిషము నరములగుండా వ్యాపింపును. కాబట్టి కాటు మెదడునకు ఎంత సమీపమునందుండునో, అంత త్వరగా విషము మెదడున కెక్కి అంత త్వరగా రోగి లక్షణములు కనిపించును. ఈ వ్యాధి కొన్నిటికి ఆరుచూసములవలన వుండును.

లక్షణములు

జంతువు మొదట వ్యాధులతతో నుండి మూతి విరుచుచుండును. మనుష్యుల యొద్దకుగాని, తదితర పశువుల యొద్దకుగాని చేరుట కిష్ట ముండదు. గృహలోపకరణముల క్రిందగాని, నిశ్శబ్దమైన సలములందుగాని దాగియుండును. రోగము ముదిరినకొలది కోపోద్రేకము కలిగి చిగాటకు నుండును. కంటికి కనబడినరాని నెల్ల కలువతోవును. ఈతను పట్టుకొనుటకు ప్రయత్నించుదానివలె ఆగడుచు తిరుగులాడుచుండును. ఒక విధ మైన చొంగ నోటినుండి కాటుకుండును. ఆ చొంగ జిక్కుటగాను, నురుగు నురుగుగాను ఉండును. ఆ చొంగ పశువుల మెదవులనుండి తిగవలె ప్రోహుడుచుండును. కండ్లు ఎఱ్ఱగా నుండును. ఇట్టి సితిలో ఆ జంతువునోరు కొంచెము తెగమకొని సరిగా ముందునకు పరు గెత్తుదు మార్గమున దానికి కనపడు ప్రతివానిని పొడుచుచు కలుచుచు పోవుచుండును. ఆకలి మందగించును. దానికి దొరకునట్టి యే వస్తువునైనను తినజోవును. అది అరచునపుడు దానిఅరపు ఒక విధమైన లోహపు ధ్వనిగఁకుతగా మారిపోవునట్లు కనుగొనవచ్చును. ఇట్టి సితిలో మరణము సంభవించును. పక్షవాతము కలుగును. ఆహారము తినదు. క్రింది దవ్వుడలు నన్నముగా నుండును. మ్రింగునపుడు విశేషముగా కష్టపడునట్లు విశదమగును.

అశ్వేషలో ఆడుగుల ఒక చిహ్న పడినా అదిగనన్ని వడ్లు పండును.

చిట్టచివరకు కాళ్ళు చచ్చుపడి విశేషములై శుష్కించి చనిపోవును. కొంతకాలము కదలకుండ పడియుండిన తరువాత కొన్ని పశువులకు మృత్యువు సంభవిండును.

చచ్చినతరువాత కనబడు లక్షణములు

ఈ వ్యాధిగల పశువుకడుపు కోసి చూచినయెడల మట్టి, రాళ్ళు, పులలు, గడ్డి, చింపిరిబట్టలు మున్నగు వస్తువులతో నిండియుండును. క్రిందివపుడ వ్రేలాడును. చిక్కని ద్రవము కారుచుండును.

చికిత్స

మగ పశువునకు సిచ్చియై త్రివి ఆకుపశువు మూత్రమును, ఆకుపశువునకు సిచ్చి యై త్రివి మగపశువు మూత్రమును పూటకు అర్ధసేగు త్రాగించవలెను.

లేక ఈ వ్యాధిగల పశువు గాయముగూడ గరికైకోగాని, ఇనుప కడ్డితోగాని కాల్చవలెను.

ఈ వ్యాధికి పశువుకొమ్ములనుండి మధ్యగా మూతివలన ఒక వరుసగా చుక్కలు పెట్టవలెను. ముచ్చిలిగుంటలో ఒక చుక్క పెట్టవలెను.

హెచ్చరిక

ఇటువంటి జంతువును సాధ్యమైనంతవరకు చంపరాదు. దానిని శాస్త్రజ్ఞుగా గొలుసుతో కట్టివేసి పరీక్షించుచుండ వలెను. ఆకొలము ముగియునప్పటికి అది యింకను బ్రతికి పొగుగనుండి దెగిపోవునట్లుగాలు ఏమియు కనబడక యున్నయెడల గాఢి నెట్టి పట్టవేదని గ్రహించవలెను.

పొదుగువాపు (Garget)

స్వభావము

ఈ వాపునే పాలసేపు, చనుపడుగు అందును. ఈ వ్యాధి అంటుసంబాధమైన నూత్నజీవులచే కలుగును. ఇది పాడిపశువులకే సోకును. చలి గాలిలో ఎలప్పుడు నుండుట చేతను, పాలు పీతుకువపుడు చేతికి పగులైన గోమలగిడి అవి స్రుచ్చుకొనుటచేతను, చూడలు పాలు త్రాగునపుడు కరచుటచేత గిరిగిడి గాయములచేతను, లేక పాలద్వారము వలనను, ఈ నూత్నజీవులు పొదుగులో ప్రవేశించును. ఏ సమయంలో ప్రవేశించునో ఆప్రక్క సంతకును గలుగును. ఇంకను పశువుల కొట్టములు మొదలగునవి ఆశుభ్రతగా నుంచుట వలనను, పాలు పీలుతుకువారి చేతులు శుభ్రముగా లేకపోవుటచేతను, ఈ నూత్నజీవులు పొదుగులో ప్రవేశించును. కొన్ని జంతువులకు పాలు నిలువకట్టుట వలన కూడ ఈ వ్యాధి రావచ్చును. ఈవిధ జంతువుల పొదుగునుండి పాలు తీయనియెడల ఈ వ్యాధి తలసిండును. ఇది అంటురోగమువలన తలసిండును. అందు ముఖ్యముగా క్షయ

అనేక ముఠలికారై, అగి అగి తుంపర వరుస్తుంది.

రోగమువలన కలుగును. ఈ పాలనేర్లు దృష్టిదోషమువలన కూడ కలుగునని నాకు నమ్మకముగలదు. ఇంకను కొందరు బేరగాండ్రు వేళకు పాలు పిండక పాలు నిలవరము చేయుటచేత కూడ ఈ వ్యాధి రావచ్చును. ఇట్లు పాలు నిలవర ముండుటవలన పొడుగు బాగుగా నున్నదని తదితరులు ఎక్కువ ధరకుకొందురను యుద్దేశముతో పాలు పిండురు.

లక్షణములు

జంతువునకు తీవ్రముగా వ్యాధి తగిలినయెడల శరీరమునకు ఎక్కువ జ్వరము కలుగును. మేత నెమరు మానును. పొడుగు నాలుగు భాగములుగా నుండును. ఒక్కొక్క భాగమునకు ఒక్కొక్క చన్ను ఉండును. ఈ చన్నులలో ఒకదానికిగాని రెంటికిగాని రావచ్చును. పొడుగు ఎఱ్ఱగా కందియుండును. వాచిన చన్ను గట్టిగా నుండును. పాలు వచ్చుట కష్టముగా నుండును. శ్రమముగా పాలు తిగ్గురు. పాలు సింతుకునప్పుడు మొదట కొంచెము పసుపువరముగా నుండి తరువాత రక్తపుడీర కలిగి యుండును. ఇంకను రోగము హెచ్చిన కొలది పాలు చీముగా మారవచ్చును. ఈ సీతిలో పొడుగు ద్రుశ్చి కురుపు యేర్పడిన దని తెలిసికొనవలయును. ఈసీతిలో పొడుగుయొక్క వేడిమి తగ్గి చల్లగా నుండి అపవచ్చరంగుగా నుండును. ఇంకను ఈ వ్యాధి ముదిరిన కొలది పశువు క్షీణించి చనిపోవును.

కొన్ని పశువులలో ఈ వ్యాధి అంత తీవ్రముగా నుండక పశువు మేతమేయురు అరోగ్యముగానే యుండునట్లుండును. కాని పొడుగు మాత్రము కొంచెము గట్టిగా నుండి మామూలుకన్న కొంచెము పాలు తిగ్గుదుండును. కొన్ని దినములకు తిరిగి మనవారు చేయు వివైద్యము వలనైనను మామూలు సీతికి వచ్చుటయు గలదు. ఈ వ్యాధి దీర్ఘముగా నున్నయెడల పొడు గంతయు చెడిపోయి ఒకటి రెండు లేక నాలుగు చన్నుల నుండియు పాలు రాక ఒక నిధిపైన పసుపువచ్చుగా వేరిన ఉండలవలె నుండు పదార్థము రావచ్చును. కొద్ది కాలమున ఆ చన్నులవెంబడి ద్రవము కారును. పొడుగు ఎండి పోయి గట్టిగా నుండును.

చికిత్స

జ్వరము తీవ్రముగానుండి పేదవేయనిచో ఉప్పు చేరెడు, ముసాబ్రము 2 తు వడివీరు అరసేరు కలిపి త్రాగించుము.

పశువు మేతమేయక నిరసముగా నున్నచో సారాయి 10 తు, మిరియాలపొడి 1½ తు, నూకలజావ అరసేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

తేక 18 చింతకాయలు నీటితో రుద్ది వడితిలో కలిపి కెండు మూడు పూటలు పోయవలెను.

తేక జీడిగింజలు 25 కాల్య తినిపించవలెను.

మఖిపుబ్బలు పరుచైతే మా ఆన్న వ్యవసాయము నావ్యవసాయము ఒకజే.

లేక చవుడు 2కు, మన్నము 1 కు కలిపి పశువు ఆపనముక్రింద మూడుగీతలుగా పెట్టుము.

హెచ్చరిక

ఈ రోగము తగిలిన పశువును, దూరముగా నుండు ప్రత్యేకస్థలమునందుంచవలెను. పొడుగునకు దెబ్బలు తగులకుండ కాపాడవలెను. రోగము తగిలిన పాడిపశువుల పాలు పిలికి వెంటనే ముందుద్రావకములతో చేతులను శుభ్రముగ కడుగుకొనవలెను. అట్లుచేయక ఆ చేతులతోనే ఆరోగ్యముగానుండు పశువుల పాలు పిలికినయెడల వానికి నిష్కారముగా ఈ వ్యాధి సంభవిండును. ఈ విషయమునం దెన్నడును వీమటి యుండ గూడదు.

నీటిని ఆవిరి వచ్చువరకు మఱుగ కాగనిచ్చి ఒక కంబళిగుడ్డ అందు ముంచి నీరు పోవునట్లుగా పిండి ఆగుడలతో పొడుగునకును, చన్నులకును, ఒక అరగంటసేపు కాపు తీయవలెను. పాలు రాక చన్నులు గట్టిపడినపుడు పాలగొట్టము (ఇది పశువుల ఆస్పత్రిలో నుండును.) పెట్టి చన్నులలోనుండు మలిన పదార్థములను తీయవచ్చును. ఇట్టి పనిని మనవారు చేయజాలరు. పొడుగు చీము పట్టినయెడల పొడుగు తోసి ముందు వేయవలసి యుండును. ఇట్లు చేయుట మనకు సాధ్యముకాదు. ఇట్టి ప్రమాదకరమగు వ్యాధులు వచ్చినపుడు పశువులను మీ తాలూకా వెటరినరీ డాక్టరుగారికి చూపించుట మంచిది.

మఖ్యముగా వుండను కాకులు పొడువగూడదు. వుండవీడ ఈగలను ముసర నీయరాదు. ఆ పశువును నాకనీయరాదు. ఇట్లు జరుగుచో వుండు శీఘ్రముగా మాని పోవును. మనవారు ఈ పొడుగు వాపునే దృష్టిదోషముని మొంచి వేచదిగురు, ప్రత్తిగింజలు ఉప్పు కలిపి పశువునకు ముమ్మారు దిగదుడిచి నిష్ఫలయందు బోసినయెడల ఆ పశువునకు దృష్టిదోషము పోవునట.

కొమ్ముడొల్లలు

తే. శ్వాసములు మోగు నోటిగ చీమిడియును

ముక్కు-వెంటను ధారగా పోవుచుండు

ఏడురోజుల కావును నేడ్చుచుండు

దగ్గుచుండును కొలదిగ త్రావునపుడు.

తే. మూతి సగమును నీటిలో ముంచి గుటక

వేయుచుండును దిగులున వెతలు గుడుచు

కొమ్ముమాదగ మూరును నమ్మరాదు

కొమ్ముడొల్లని చెప్పిరి కోవిదులును.

నానలకు ఋతువు మఖ శ్వాసములకు ఋతువు చిత్త.

పశువులకు జీర్ణకై తగ్గుటచేతను, ఆహారము సరిగా పెట్టకపోవుటచేతను, శిశు వారము వలనను, ఈ వ్యాధి ఉత్పత్తియగును. రక్తము క్షీణించుటవలనను, విషసంబంధ మైన గాలిని పీల్చుటవలనను, పశువుయొక్క మెదడు కరిగిపోయి ముక్కులగుండు చిక్కిని ద్రవముగాని, చీమిడివంటి పదార్థముగాని కారుచుండును. కొమ్ము కొట్టి చూచినచో ఓటిమోత మ్రోగును. ఈ వ్యాధి పుట్టిన వారముదినములకే పశువు క్షీణించు చుండును. వ్యాధి ముదిసయెడల కొమ్ముతూదగగాని, పార్శ్వపు మాదగగాని పరిణమించును. కొమ్ములయందు రక్తి మేమాశ్రయింపడును. రాలితడిసున్నము తెచ్చి కొమ్ముల మొదళ్లనుట్టు రాచి ఒక దినముంచినయెడల ముక్కులనుండి కారు ద్రవములో రక్తపు బీర కనబడును. ఈ రక్తపుబీర యున్నయెడల కొమ్ము డొల్లలని గ్రహించవలెను. ఈ వ్యాధిగల పశువును నీట్లు త్రాగించునపుడు మూతిని సగమువరకు నీటిలోముంచి గుటకలు వేయుచుండును.

చి కి త్వు

ఈ వ్యాధికి అనేకమంది అనేకరకములుగా చికిత్సచేయుదురు. సొంటి 2 తు, ఆవుపాలు ఆరనేరు వంతున దినమునకొకసారి చింతగింజంత వనగంధము దానిలోకిలిసి త్రాగించవలెను.

లేక కారు ఇంగున $1\frac{1}{2}$ తు, వస $\frac{1}{2}$ తు, మూర్క్కొండాకు పసరు 3 తు కలిపి చెవులలోపోసి, చెవులు కొమ్ములకు కట్టవలెను.

లేక డిరిసెనాకు పసరు ఆవుపాలతో త్రొక్కి రసమతీసి అందులో వనగంధము చింతగింజంతజేర్చి చెవిలో పోయుము.

లేక వస 2 తు, రసకర్పూరము 2 తు, మందిగంధము 4 తు, తుగాకు 6 తు పావునీరు నున్నపు లేటలో కలిపి చెవిలోపోయుము.

లేక మిరియాలు 1 తు, చేదుబీలకట్ట 1 తు, ఆవాలు 2 తు, వెల్లులిపాయలు 2 తు కలిపి నూరి చెవిలో పిండవలెను.

లేక పొగాకు రసమతో నీరునున్నము కలిపిగాని లేక అరతులము పాదరసము గాని, పశువుకొమ్ములకు బెజ్జములు వేసి బెజ్జములయందు పైనుంచువేసి గుడ్డవీరీకలు పెట్టవలెను. తరువాత నీలిరంగు గుడ్డ కాలివన పొగ ముక్కులకు పట్టించవలెను.

ఎం డ దె బ్బు

ఇది పశువుమెదడునందు గలిగెడు అస్పృశతవలన కలుగును. బహుశీత్రణమైన ఎండలో పనిచేయుచుట వలనగాని, అట్లువాపుగల పశువులను ఎండలో పనిచేయుచుట వలనగాని, పొలములలో నుండు చెట్లనీడదగ్గరి నుండు పశువులకు పడగాల్పులు సోపట వలనగాని ఈ వ్యాధి కలుగును.

సుఖివ్రుమిలే మగురుమిది కర్ర అయినా పండును.

లక్షణములు

ఆరంభములో తీవ్రమైనజ్వర ముండును. కన్నులు ఎఱ్ఱగానుండును. దేహముమీద చెమట పట్టును. పశువు పలుమారు బుస పెట్టుచుండును. మూత తడిలేక ఎండిపోవును. ఆకలి మందగించును. తలను ఆటునిటు ఊపుచుండును. ఈ వ్యాధి ముదిరినకొలది నిస్త్రాణమౌచును. శరీరము చల్లబడును. మూత్రము ఎక్కువగా విడుచుచుండును. ముఖము పారిపోవును. ఊపిరి ఆయాసముగా విడుచును. కనుగ్రుడ్లు లోతునకు పోవును. క్రమముగా స్పృగము తప్పి నాలుక బాకవిడిచి చెలిపోవును.

చి కి త్న

మాటిమాటికి పశువుతలమీద చచ్చి పోయుచు దవలెను.

సారాయి 2 గ్రాములు త్రాగించవలెను.

బిగులిపాయల గనము నేగు తీసికొని బేహమునకు పూయుము.

తరువాతి నూనెలో చనుబాలు పోసి రంగరించి చెవులలో పోయుము.

హెచ్చరిక

రైతులలో చాలమంది బండియెగులను వడిగాడ్చులలో బుడ్డుగట్టి తోలుదురు. ప్రతిరైతు సాయంకాలము నాలుగుగంటలవఱకు బిందెకు చచ్చి పశువు మెరిసిపోవడమొకటి అదోషము పోవును. నూకలబావ పెట్టవలెను.


కుందేటి వెట్టి (Gidness)

దీనినే తిక్కరైపులు, రిమ్మ అందురు. ఇదియును నాడికా సంబంధమైన వ్యాధియై యున్నది. సరములకు సంబంధించిన కొన్ని దుర్గుణములు ముందు ప్రారంభమగును. ఈ వ్యాధి ఎల్లప్పుడు వినుగు విరామము లేక పని చేయుచుండుట వలనను, సోమరితనముగా నుంచుటవలనను, కపాలశుభ్రమగు చిములుకాళి అస్వస్థత నొందుట వలనను పశువులకు కలుగుచుండును.

లక్షణములు

ఈవ్యాధి మంచి బలముగల పశువునకు వచ్చును. పశువుతలలో నేదో యొక భాగము మేకు గ్రుచ్చుకొనినట్లుండును. జ్వరము సమశీతోష్ణముగా నుండును. పశువు దవడలకు చాలబాధగా నుండును. నాలుక బాకవిడుచుచు ముడుచుకొనుచుండును. తన తలను కొట్టుపుగోడలకుగాని, తదితరవస్తువులకుగాని ఆనించి ప్రోయుచుండును. వెట్టిచూపులు చూచుచు పైకెగురుచుండును. ఈ వ్యాధి ముదిరినకొలది పశువు గిరిగిరి తిరుగుచూ, నేలమీద పడుచు లేచుచుండును. ఈ విధముగా ప్రతి అరగంటకు

వచ్చును. మనుష్యులను కరవపోవును. కొమ్ములలో పొడుచును. బహుశః వెంట పడుగిడుచుండును. ఆయా సముచిత చికిత్స చేయుచు క్రింద పండుకొనును. కాళ్ళు నిగడవన్నును. శదువలేదు. క్రమేణ నిరసము జెంది పశువు చనిపోవును.



చికిత్స

కరిదూపము - చేరెడు, 'సొంటి - నవటాను, మిరియాలు 2 కు, పిప్పళ్లు 1 కు కలిపి కురాయముకాచి దానిలో బీరాకుపసు - తవ్వెడు, నెయ్యి - తవ్వెడు కలిపి త్రాగించవలెను.

లేక పశువు కొమ్ములకు మామిడిగుడ్డలు చుట్టి వెలిగించవలెను. ఈ వేడిచే నోగము ఆగును.

లేక జనుపనారికొన కొమ్ములకు చుట్టి వెలిగించవలెను. ఇట్లు ఒక గంటపేపుంచి తొడదీయవలెను.

పశువు కొమ్ములమట్టు చుక్కలు పెట్టవలెను. ముచ్చిలిగుంటలో ఒక చుక్క పెట్టవలెను. మూతిమీద మూడు అడ్డగీతలు గీయవలెను.

మోచ్యరిక

ఇటువంటి వ్యాధిగల పశువును చాలా దూరముగా కాపాడవలెను. బండిమోటలు గాని, చొప్పుత్రాళ్లుగాని, గుక్కిమోటలుగాని తెచ్చి ఆ పశువు మెడకు వేసి చెట్టుపడుగాని బండికిగాని కట్టవలెను. లేనిచోడల పశువునకు ఉద్రేకము వచ్చినపుడు నిలువక నోడెలకుగాని చెట్లకుగాని తలతలను వేసి కొట్టుకొనును. అప్పుడు పశువునకు ప్రాణాపాయము రాగలదు. ఈ పశువులు చికిత్సకు లొంగుట చాల కష్టము.

శ్రుద్ధుడేని నా బూతుడేని నా నిలువను.

హి స్త్రీ రి యా

ఇది మెదడు సంబంధమగు శోగ మైయున్నది. ఇది పనిచేయించుకుండ సోమరిగా నుండు పశువులకు సంభవించును. ఇది వాతశోగమువలనకూడ కలుగును. ఈ వ్యాధిని కనిపెట్టుట చాల కష్టము. ఈ వ్యాధిగల పశువును ఎక్కువగా కష్టపెట్టరాదు.

లక్షణములు

ఆరంభములో శరీరముపైని చెడుటలు పట్టును. వణవచుండును. శరీరము కృశించును. కన్నుల నటునిటు త్రిప్పును. నోటినుండి నూరుగు వచ్చుచుండును. దౌడలు విగిసి కొని పోవును. ఈ వ్యాధి వచ్చుటకు పూర్వము మేత తినదు. ఉచ్చాస్య నిశ్వాసము లెక్కువగును. అప్పుడప్పుడు పశువు ఆరచును. ఈ విధముగా ఒక గంట లేక రెండు గంటలుండి తగ్గును. లేక వ్యాధి ముదిరినయెడల ఒకపూటవరకుండి తగ్గును.

చి కి త్వు

ఈ వ్యాధి రాగానే చచ్చిళ్లు ఒక రిందెడు తలమీద పోయవలెను. లేక స్పెల్లింగునాల్లు వాసన చూపించుము. ఒక తులము ఇంగువను, అరసేరు చేడిబిటిలో కలిపి వ్యాధి రాకమునుచే త్రాగించవలెను.

ఈ వ్యాధి ఆరంభించిన వెంటనే గంజాయిపత్రి 1 తు, నూకలగంజి - అరసేరు, ఇంగువ 1 తు కలిపి త్రాగించవలెను.

లేక 6 నిమ్మకాయల రసము త్రాగించుము.

లేక గాడిదమూత్రిము - సేరు త్రాగించుము.

లేక రావినెక్కరసము - అరసేరు, అవుపాలు - అరసేరు కలిపి వారముదినములు త్రాగించుము.

ఇదివరకు ఈ గ్రంథములో చూపించిన తలతరుగుడుశోగమునకు వేయువారేనే ఈ వ్యాధికికూడ వేయవచ్చును.

నా లు క సే ర్లు

ఈ వ్యాధికికూడ పాడి పశువులకు తరచుగా వచ్చుచుండును. నాలుకను దెబ్బ కలుగుటచేతగాని, ముండ్లగడ్డి తినుటచేతగాని, నాలుక కొనికొనిపోవుటచేతగాని, పొడుగున జబ్బు చేయుటచేతగాని, పొడుగు తగ్గి పాన తక్కువ నిచ్చుటచేతగాని, ఎల్లప్పుడు తవుడు జనుపకట్టలు ఎక్కువగా చేయుటచేతగాని, చలికాలి సోకుటచేతగాని, గొప్పవర్షములకు తడియుటచేతగాని ఈ వ్యాధి కలుగును. ఈ వ్యాధికికూడ అనేక ఆయుర్వేద చికిత్సలు చేయుదురుగాని సామాన్యముగా లొంగదు.

లక్షణములు

అలంభములో జ్వర ముండును. వెనుకకొళ్ళు కొన్ని పశువులు పట్టివేయును. పొడుగున ఒత్తినయెడల తన్నును. పాలు తక్కువగా నిచ్చుచుండును. అప్పుడప్పుడు నోటివెంట చొంగ పడుచుండును. వ్యాధి ముదిరినకొలది పశువు మేత తినజాలదు. దాహ మెక్కువగుచుండును. ఆహారసాళము గూడ నొప్పిగా నుండవచ్చును. చెబ్బ తగిలిన భాగము ఎఱ్ఱగా కంది యుండవచ్చును. వ్యాధి ముదిరినకొలది పాలె డిహాయి పశువు క్షీణించి మరొక వ్యాధికి లోనై పశువు మరణించును. నాలుక లావై మొద్దుపారి యుండును. దానిని నటునిటు కదల్చలేదు. నాలుక యెక్కువగా వాచిన యెడల వ్యాధి దుడురుట కష్టము. ఈవ్యాధి తగిలిన పశువునకు శవుడు, చిట్టు విస్తారముగా మేపరాదు. జనపకట్టలు వేయరాదు. తదితర దాణాదినములు వాతము చేయునవి పెట్టరాదు.

చికిత్స

పశువునాలుక యెత్తి పరీక్షించినయెడల నాలుకక్రింది భాగమున రెండు నెత్తురు నరములు పెక్కి లేలియుండును. అవి నలుపురంగుగా నుండును. వానిలో చెడునెత్తురుండును. ఆనెత్తురుండుటచే సరిగా పశువు పాలీయదు. కాబట్టి పశువును పడగొట్టి నాలుకక్రింద నుండు చెడు రక్తసాళములను నూదితో గ్రుచ్చి వేయగ నే నలుపు రంగు గల నెత్తురు కారును. ఆ నెత్తురు కారిన తరువాత పటికపాడి అద్దవలెను.

లేక తిప్పటిగ 4 రు, సిప్పుళ్ళు 2రు, వేప చెక్క 4రు, కటకరొహిణి 2రు, గొండు సేర్ల 5టిలోవేసి కాచి అప్పుడప్పుడు పుక్కిలింపు చేయుచుండవలెను.

లేక మైలకుత్తు లోషనుతో అప్పుడప్పుడు నోరు కడుగుచుండవలెను.

ఈ వ్యాధికినూడ అప్పుడప్పుడు యీ దిగున మందు లీయవలయును.

చేదుజీలకఱ్ఱ 2రు, మిరపకాయలపొడి 1 రు, వేడినీరు అరసేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

నాలుగునెలముల కొకసారి మల్టాన్ ఇంగున 1 రు, వేడినీరు అరసేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

ఆరుపెరుగుట (Pharyngel polypus)

పశువు గొంతుకద్దారము మొదలు దవడలవరకు ఒక విధమైన మెత్తని ముండ్లుండును. వీటివే అంగిటిముండ్లుగారు. అంగిటిలో ఒకవిధమైన పొర యుండును. జీర్ణ భాగము తగినంత పనిచేయుక గాని, జలుబువలనగాని లేక ఆపారలు ఏ కారణముచేత నైన విస్తరిల్లుటవలనగాని ఒకవిధమైన ముండ్లైవును. ఈ ముండ్లు లేలుపురంగుగను, మరికొన్ని నలుపురంగుగను ఉండి నిక్కిబొడురుకొని నూచులవలె నుండును. ఈ

పుట్టు ఉచ్చిబ్బిబ్బునకి నా గుబ్బచ్చి చెట్టుక్రింద నానగు.

ముండ్లకు పరిమిత చికిత్స చేయించో పశువుయొక్క గొంతుభాగము నాచి ఎక్కువ బాధచేయును.

లక్షణములు

పశువు మేతమేయవపుడు చాల బాధపడుచుండును. మేత నెమరుకూడ మానును. నాలుక లావుబారియుండును. మేత తినలేక అప్పుడప్పుడు క్రమస్కంద్యుండును. ఒక విధమైన జిగురు నోటినుండి వెలువడుచుండును. పశువు మూతి విరచుచుండును. వ్యాధి ముదిరినకొంత పశువు విచారముగా నుండును.

చికిత్స

ఆంగ్లీలో నున్న ముండ్లకు కత్తెతో కత్తిరించవలెను. సామాన్యమైన కత్తిరలు పనికిరావు పశుచికిత్సాలయములో నుండు కత్తెలు చాల మంచివి. కత్తిరించుటకు పూర్వము పటికపాడి ఆముండ్లకు రాచి కత్తిరించవలెను. నెత్తురు కారినను భయపడ నవసరములేదు. కత్తిరించునపుడు చాల జాగ్రత్తగా కత్తిరించవలెను. తెలిసి తెలియని వైద్యులు కత్తిరించిన మొదల నాలుక గాని, గవుడల భాగపు మాంసముగాని తెగిపోవును కొట్టి చాల జాగ్రత్తగా కత్తిరించవలెను. ఎక్కువ పాడుగుగా పెరిగిన ముండ్లుగాని, మొద్దుపారియుండు ముండ్లుగాని కత్తిరించవలెను. చిన్నవి కత్తిరింక పోయినను నష్టము లేదు.

మన స్వదేశీయ వైద్యులు పశువంటి చేటలోవేసి చెరగవండ కొంచెము ఉప్పు కలిపి కెంచు మూడు పూటలు ఆ ముండ్లపై వేసి తోముదురు. కాని కత్తిరించినంత దృఢముగా ఈచికిత్సకు బాగవు.

నోటి పూత

పశువునకు బలంబునగాని, అతివేడివలనగాని, జ్వరమువలనగాని ఒక విధమైన పుగురువలనగాని పాదరసము మొదలగు విషపదార్థములు పశువులు మ్రొగుటవలన గాని ఈ వ్యాధి రావచ్చును.

లక్షణములు

అప్పుడప్పుడు జ్వరముండును. నోటిలోపలను నాలుకమీదను చిన్నచిన్న పొవ్వులు బయలుపేరును. ఈ పొవ్వులు ముగిసిన కొలది వుండగలను. ఈ పుండ్లు పగిలి నోరంతయు వ్యాపింపవచ్చును. పశువు నొంగి కార్చుచుండును. నాలుక నొప్పిగా నుండును. నాలుక ఎలుపునగునగుండును. ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా చూడలకు కలుగు చుండును.

మఖిపుబ్బలువరసిచ్చెనునా తెన్నునుంచచ్చెనా త్తెయచివితగంపనా స్తమించిపోయనా

చికిత్స

నోటిపూత సామాన్యముగా నున్నను, నోటియం దంతటను పెద్దపెద్ద పుండ్లు పడినను వెలిగారముగాని, లేక బోరిక్ ఆసిడ్ అను తెల్లపొడిగాని, పొటానియం క్లోరేట్ అను ఇంగ్లీషుమందుగాని లేనెలో కలిపి నోటికి పూయవలెను.

పురుగుసంబంధమైన నోటిపూత యైనయెడల వెలిగారము లేనెలో కలిపి లేచ్యముగా నుండునట్లుచేసి నోటికి పూయవలెను.

పాదరససంబంధమైన నోటిపూత విస్తారముగా పాదరసము మున్నగు విషసంబంధమగు పదార్థముల మూలమున కిలుగును. దీనికి పొటాషియం క్లోరేట్ కలిపిన దీనితో కడుగవలెను.

లేక వగరుగా నుండు తుమ్మచెక్క, రావిచెక్క, తంగేడుచెక్క మున్నగు చెక్కలతో కాచిన దీనితోగాని, పటిక, పైలతు త్తం మున్నగునవి పొడిచేసి వేడినీటిలో కలిపిగాని కడుగవలెను.

హెచ్చరిక

ఈ వ్యాధి ముఖ్యముగా ఆహారవిషయములో కడు జాగ్రత్త రీతి నొనర్చవలెను. బాల్మిథాస్మము దొరకనియెడల నూకలజావతో కొడిగ్రుడ్లకన్నము కలిపి పెట్టవలెను.

మూత్ర వ్యాధులు

రక్త మూత్రము

ఆ॥ వె॥ పసికినుండు మొదట బాయని జ్వరముండు
కడలకుండ వాల్చు కర్ణమంత
మూత్ర మెరుపుజెంది మూడురోజులలోన
బలముతగ్గి మిగుల బాధజెందు॥

ఈ రోగము అతివేడి జేయుటవలన గాని, వినుగు విరామము లేక పూజేయుదుట వలనగాని, విషసంబంధమగు గోమూరులు పశువు శరీరములో ప్రవేశించుటవలనగాని కలుగవచ్చును. ఈ వ్యాధి విషయములో ముఖ్యముగా రోగనిదానము కనిపెట్టవలెను. గోమూరులవలన వచ్చినచో చాలా ప్రమాదముని గ్రహించవలయును.

హస్తమి అతివానకాలము చస్తమి గొల్లబోయలారా, బుడమిని దొడ్డు నేయండి

లక్షణములు

ఆరంభములో జ్వరము తీవ్రముగానుండును. చలికూడ నుండవచ్చును. శరీరము, బొడ్డుస్థానము ముడుచుకొనును. ముఖముగా మాత్రము ఆరంభములో తుమ్మచెక్క కషాయపు రంగువలె పలుచగానుండి వ్యాధి ముదిరినకొలది రక్తమువలె పోయుచుండును. వశువు మాత్రము ఎక్కువగా పోయుకొలది కుప్పించును. మలబద్ధకముండును. ఆకలి మందగించును. దగ్గుకూడ యుండును. నాలుగునుంచి వారమురోజులలో మరణించును. అతివేడిజేసి రక్తమాత్రము పోషక లగ్న చికిత్సచేసి క్రమేపి తగును.

చికిత్స

ఆరంభములో వ్యాధి లక్షణములు కనుగొని జ్వరము తీవ్రముగా నున్నపుడు మూలకారము 4 తు, మంచినంధపుపాడి 6తు, చల్లటిపేరు నేరు కలిపి ఒక్కపర్యాయమే త్రాగించవలెను. పచ్చిగడ్డి తినిన పెట్టవలెను.

అప్పుడప్పుడు ఉప్పు 2 తు, పటిక 2 తు, కలిపి నూరి నేరు నీటిలో కలిపి దినము నవ రెండుమూడు మోతాదులు యిచ్చిన తగును.

తుమ్మచెక్కరంగుగా మాత్రముండి తెలుపుగా, జగటుగల కంఠలుకూడ పడుచు ఈగలు వానిచున్నయెడల ప్రమాదమని గ్రహించవలెను.

ఇట్టి సమయములో మెంపిండి 15తు, మాసరాసుపసురు నేరు, నీలిమందు 1తు కలిపి ఒక మోతాదు ఈయవలెను. లేక కావిరాయి అగగదీసి నేరు నీటిలో, కలిపి పెట్టుము. అప్పుడప్పుడు చూకల జావగాని బారిజావగాని పెట్టవలెను. వేడిజేసి రక్తమాత్రము పడుచున్నపుడు కొబ్బరి బొండుములోని నీటిని రెండు నేర్లు త్రాగించి, వేరినెయ్యి 15 తు, పెసరగుగ్గిల్ల సోరెడు, పంచదార చేరెడు కలిపి పెట్టుము. వేడినీటిని త్రాగించవలెను.

లేక ట్రిపిల్ బిల్ ఇంగ్లీషుమందుగలదు. నీలింగు సిరావలెనుండును. దీనిని ఒక టౌన్సు అరెఖును లోపలికి నేరు నీటిలో కలిపి త్రాగించుము. లేక రక్తనాళములోనికి ఇంజెక్షన్ ఈయవచ్చును.

మూత్రపునఃచిలోరార్థ (Urinary calculus)

దీనినే శిశామేనావారము, ఉచ్చుబుడ్డ కంఠుట, వాగుట, వీర్యముగట్టి పడుట అని పలువిధములుగా చెప్పుదురు.


ఈ రోగము ఈ కేసులు నూ చికిత్సలయమునకు ఎక్కువగా వచ్చినవి.

ఈవ్యాధి అతివేడివలనను, మలబద్ధకము వలనను, కొరజపు అస్వస్థతవలనను ఎక్కువగా పెంచేయించుటవలనను, రిదిలేని పోషకములవలనను ఈవ్యాధి కలుగును. ఇది బహుచిక్రిమైన వ్యాధి.

ఈ రోగి ఉరిమిమరిగినా పాము తిరివికరిచినా పడును.

లక్షణములు

జ్వరము బాగుగానుండును. పశువు తోకనెత్తుచుండును. పేడ వేయవలెనని తిడుత
చుండునుగాని బయటపరచదు. అరమేత మేయుచుండును. మరికొన్ని మేయక బాధ
పడుచుండును. మూత్రము రక్తములోనికి జీర్ణించి కనుగుంటలు విడచును. వ్యాధి ముదిరిన




శిలామేహవాతం

45

కొలది వాహ మెక్కుకగా నుండును. ఏరు త్రాగినకొలది పొట్టయుబ్బును. మూత్ర
కోశము ఉబ్బి పేడవచ్చు మార్గమునుమాడ బంధించును. క్రమేపి పశువు శుష్కించి
రక్తము తలకెక్కి చనిపోవును. మరికొన్ని పశువులు మూత్రము ఎరువుగాగాని, పసుపు
పచ్చగాగాని చుక్కలుచుక్కలుగా పడుచుండును. ఇట్లు పోయుటవలన కొంత ఆక
గలుగునుగాని వారము లేక పక్షము, నెల దినమలవరప యుండి చచ్చుటయు గలదు.
మరికొన్ని మూడునాలుగు రోజులలోనే చనిపోవును. కాబట్టి ఈవ్యాధి వచ్చిన తరువాత
అయినాదు రోజులలో మూత్రము పోయనిచో ఆపశువునకు వైద్యముచేయుట వృధా
యని గ్రహించవలెను. ఒకవేళ పదిదినములైన తరువాత పోసినప్పటికి మరల కొద్ది కాల
ములో ఈ వ్యాధి మరల సోకి పశువును చంపునని తెలిసికొనవలెను.

ఉత్తర పురుషుతప్పివా, రాజు పాడితప్పివా, చెదపురుగునకు రెక్కలువచ్చివా కష్టము.



చికిత్స

ఆరంభములో గోరువెచ్చని నీటితో ఎనిమా చేయవలెను. మునిషివలె పశువువలె మూత్రకోశములో కడ్డివిక్కించి తీయుటను నీలులేదు. పైపటములో పశువు మూత్రకోశము నీటిగా వంకరగానున్నదో చూచుండి. రైతులు ఆకుతపకుదుంగురు. మూత్రకోశములో నునువుపటి చక్కని రాళ్ళువుట్టును. ఇవే అడ్డుపడి పశువును బాధించును. శస్త్ర చికిత్సచేసి నప్పుటికి చాలా పశువులు చనిపోవును.

ఆరంభములోనే మూత్రమును బారీచేయు నూరేకొంఱు, కేవల్పిన్ని, కొబ్బరి తీర మున్నగునవి అనుభవముమీద వాడవలెను.

అతిమూత్రము

పశువును ఎక్కువగా పనిచేయించుట వలనను, న్యూమెరియా వ్యాధి సంభవించుటవలనను, కారీజను సరిగా పనిచేయకపోవుటవలనను, విషపదార్థముల తీసుట వలనను, నీటికుంగ మొదలగు గడ్డి దినుసులు తీసుటవలనను ఈ వ్యాధి కలుగుచున్నది. ఇది తరచుగా సంభవించెడి వ్యాధికాదు. ఇంకను పశువు కరీరములో నుండు చక్కెర పదార్థము లెక్కువగా కలియుటవలనకూడ ఈ వ్యాధి కలుగును. అందుచే దేహములోని జలభోగము లన్నియు పొంగి ప్రవహించును.

లక్షణములు

మూత్రము ఎక్కువగా వగుచుండును. మూత్రము హెచ్చగానగును వ్యాధి ముదిరినకొలది దినమునకు 250 మొదలు 400 జెన్సుల వరకుకూడ వగును. పశువు తుష్కించును. ఈ మూత్రముపై ఈలు విశేషముగా ముగుచుండును. ఈ మూత్రము

ఉత్తరచూడి ఎత్తరగంప, విశాఖమాచి విడువకొంప.

పడిన భాగము ఎండిపోయి పిమ్మట తెల్లగా నుండును. ఈ తెలుపురంగునుబట్టియే ఈ రోగనిదానమును గ్రహించవలెను. మేత సరిగా మేయదు. పశువుకొన్ని వాడును. కండ్లు పొలు గ్రమ్మును. ఈ వేడి సమానముగా నుండును. వగ్గయు తడియునప్పుడు, మబ్బుగా నుండునపుడు, దిరు డెక్కువగా పోయును. కొంత వేడిగానుండదు. ఈవ్యాధి గల పాడిపశువులు సరిగా ఎరకొవు.

చికిత్స

పచ్చి వెలులిపాయలు - అర్ధసేరు నవటాను, కలులెలము - అర్ధసేరునవటాను కలిపి త్రొక్కి పెట్టవలెను. ఇట్లు వారము దినములు పెట్టవలెను.

లేక కలబందరసము 4 టు, ఆవుపాలు - అర్ధసేరు కలిపి అప్పుడప్పుడు పెట్టవలెను.

లేక పటికపాడి - అరతులము, వేడిదరు - అర్ధసేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

లేక పచ్చికంగేడు చిగుళ్లరసము 3 టు దినమున కొకసారి త్రాగించవలెను.

హెచ్చరిక

గోధుమపాట్టుగాని, కందిపాట్టుగాని, నువ్వులపాట్టుగాని, తెలికపిండిగాని, తిలవ గుగ్గిలగాని, నువ్వుల బెల్లము కలిపి త్రొక్కిగాని పెట్టుచుండవలెను. ఈ వ్యాధిగల పశువునకు అప్పుడప్పుడు విశాంతి నిచ్చుచుండవలెను. పశువు ఎంత ఆహారము తినినను, ఎంతదిరు త్రాగినను తృప్తికాదు.

వీర్య నష్టము

అ॥ వె॥ మూత్రముందు వీర్యము పడుచునుండగ
బక్కచిక్కి పశువు బాధనొందు
వీర్య పటిమతగ్గి వీరక నుండును
కడుపునొప్పి మతియు శాంతితోలగు॥

ఈ వ్యాధి వాతమువలనగాని, మిగుల కాకవలనగాని, అజీర్ణవలనగాని, మత్తు పదార్థములు పెట్టుటవలనగాని, మలబంధమువలనగాని, వేడిపదార్థములు పెట్టుటవలనగాని, ఆసనభాగములకు దెప్పి తగులుట వలనగాని, గనేరియ వ్యాధివలనగాని రావచ్చును.

లక్షణములు

అరంభములో మూత్రము ధారారముగా పోయుచు చివరకు నున్నపు లేటవంటి మూత్రమును విడుదును. ఈ వ్యాధి ముడిరినకొలది చులబద్ధక మేర్పడును. మూత్రము వెంట అప్పుడప్పుడు వీర్యము పడుచుండును. మూత్రకోశము చెడిపోవును. మూత్రాంగ

పటుత్వము పోయి వీర్య మెక్కువగా పడుచుండును. అస్వచ్ఛము వీర్యము చుక్కలు చుక్కలుగా గాని, మతపలు మతపలుగా గాని, పడుచుండును. ములు క్రచ్చుకొని నట్లుగా మంటలు గలిగి యుండును. సామ్మసిల్లుచుండును. కడుపుకొప్పి యుండును. దుర్బలత్వ మెక్కువై పశువు నీసింది చావునకు సిద్ధమగును.

చి కి త్వు

విరల్లిపాయలు అరవీసె, అవుపాలు సేరు, జిల్లేకపువ్వులు రెండుపైళ్ళు, నల్లపండు అరతులము కలిసి ఉడక బెట్టి వెలగకాయంత ముద్దచేసి రెండు పూటల రెండు ముద్దలు పెట్టవలెను.

లేక జాజికాయ 4 తు, జాపత్రి 3 తు, లవంగాలు 4 తు, పోకచెక్కలు 2 తు కలిపి పొడిచేసి లేనెతో పరచుచేసి తగ్గువంట ప్రతిపూట తినిపించవలెను.

లేక ఆకటిపండు సగముముక్కతో నిలువున వేలితో రుద్రముజేసి దానినిండ మట్టిపాలు పోసి ఒకగంటసేపుంచి పశువునోటితో వేయవలెను.

లేక మామిడిపిండెల చూర్ణము 2తు, చేడివిగు అద్దసేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

హెచ్చు రి క

ఈవ్యాధిగల పశువుతో పని చెయ్యరాదు. విరేచనములకు అస్వచ్ఛము ముదిచ్చుచుండవలెను. అజీర్తి యున్నచో తిగివచిత్వ చేయవలెను. సరియైనవేళకు ఆహారము పెట్టవలెను.

నీరు చురుకు

అ॥ వె॥ మూత్రకోశమందు ముడికండ నుండంగ

ఉచ్చబుడ్డ వాచియుండు మిగుల

పొట్ట బిగియబట్టి మూత్రము రాకుండు

పండ్లు కొరుకుచుండు బాధతోను॥

అ॥ వె॥ వెన్నుక్రిందనుండు వేగంబె నొప్పియు

మూత్రమును విడువగ ముక్కుచుండు

యెండబెట్టి మిగుల నేర్పడుచుండగ

నీరు చురుకనంగ నెగడుచుండు॥

పశువుయొక్క ఉచ్చబుడ్డ వాడుటచేతన, దానిలో రాయి ఉండుటచేతగాని, చిరుకప్పులు కరుడుటచేతగాని చలిగాలికి లోనగుటచేతగాని, మిగుల వేడికేయుట చేతగాని, మూత్రము పోయునీయవండ్ల బండికట్టి సవరిచేయుండుట చేతగాని, అలసటను కలుగుజేయు వ్యాధులు కలుగుట చేతగాని, మూత్రకోశము ముడుచుకొనుట చేతగాని, అతీర్చిచేతగాని, మిఠము తప్పి పనికేయుండుటచేతగాని, ఈ వ్యాధి కలుగును.

లక్షణములు

ఈ వ్యాధికికూడ కడుపునొప్పివ్యాధిలక్షణము లుండును. మూత్రము గొట్టు బొట్టుగా పడును. మూత్రము పోయునపుడు చురుగుగా నుండును. కడుపు బిగబట్టును. పశువు వెన్నయొక్క క్రిందిభాగమునం దొకనిధమైన నొప్పియుండును. ఏరుడు వెంట వెంటనే విడువవలెను శారీరకయుండునుగాని విడుచునపుడు బాధపడుచుండును. వండ్లు కొడుకుచుండును. వ్యాధి అభివృద్ధి నొందిన కొలది పశువు పాలిపోవును. రాత్రులయం దెక్కువగా మూత్రము విడువవలెనని యిచ్చయుండును. అతీర్చి కలుగవచ్చును ఊసిరి వీల్చునపుడు అయాస మెక్కువగా నుండును. క్రిమేణ పశువు క్షీణించి చనిపోవును.

చికిత్స

సూరేకారము 2 రు, వేడినీరు - అర్ధసేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

లేక దూసరాకు 2 పిండికర్పు, తాటిదెల్లము - అర్ధసేరునవటాప, మంచిదెల్లము - అర్ధసేరునవటాప కలిపి ముద్దలుచేసి పెట్టవలెను.

లేక లేవల్పిన్నీసము - గిద్దెడు, వజ్జిగ - అర్ధసేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

ఏరుల్లిపాయలరసము - పావుసేరు త్రాగించవలెను.

హెచ్చరిక

పశువులకు చలిగాలి తగులనీయరాదు. నూకలవావ పెట్టవలెను. ఈ వ్యాధి విషయమై ఆరంభములోనే తగు చికిత్సచేసినయెడల నెప్పుదించును. పశువు మూత్రకోశములో వ్రేలుపెట్టి చూడవలెను. రాయి యున్నయెడల తీసినేయవలెను.

విషతంత్రము

పదిఎనిమిదవ భాగము

వి ష త త్రి

పాలసముద్రమున దేవదానవులు మధించుసమయమున అన్యరము బుట్టుటతో ముందుగా తీక్షణలేజయ్య గలవాడును, భయంకరాకృతి గలవాడును, పనుపురంగు వెండ్రుకలు గలవాడును, నాలుగుకోరలు గలవాడును, అన్ని సదృశముగు చూపులుగల బాదాను నగు నొక విషపురుషుడు దుష్టునిచేతు. చతుర్ముఖు డాతనిని జూచి హుంకార మొనరించెను. అప్పుడతడు భీకరాకారమువలెలి కొన్ని సావరజంగమములందు తన స్వరూపమును బ్రవేశపెట్టినందున సావరజంగ మవిషము లేర్పడెను. అందు సావరవిషము అమోఘమై జగతియందు ప్రఖ్యాతి గాంచెను.

వి ష ల క్షణ ము

పశువు లోపలికి నుపయోగింపబడినపుడుగాని, లేక శరీరపు పై భాగమున రాది నపుడుగాని ప్రాణముపోవునంతటి ఆయాసమును కలిగించు పన్నువులెల్ల విషము అనబడును.

విషముయొక్క సామాన్యగుణములు

చమరులేని విషము:—ఇది వాతమును గలిగించును.

ఘోటుగల విషము:—ఇది రక్తమును ప్రకోపింపజేసి హృదయమును పరిమళింపజేసితిలోనుంచక సంధిబంధముల చిగువు తప్పించును.

స్వల్పకౌరముగల విషము:—స్వల్పకౌలములతోనే ప్రవేశించి ఆకృతి వికృతము జేయును.

తక్షణమే ప్రవేశించువిషము:—ప్రవేశించిన వెంటనే జీవములదీయును.

దేహమంతటను వ్యాపించువిషము;—శరీరమంతయు త్వరలో వ్యాపించును.

వ్యాప్తిజెందు విషము:—ధాతువును నశింపజేయును.

బరువులేని విషము;—సానచలనము నొనర్చును.

హస్తలో ఆకులు అల్లాడిలే చిత్తిలో చిలుకులు పడుటలేదు.

భారములేని విషము:—చికిత్సాస్పాద్యముగావించును.

జీర్ణముకాని విషము:—ఇది నేనివి జీర్ణముకానియనును.

నేడిమిగల విషము:—నెట్లునే నేడివి పెంపొందించును.

స్థావర విషము

నేళ్లు, పత్రములు, పువ్వుములు, పట్ట, పాలు, చేప, బంక, ధాతువులు, దుంపలు ననువాటియందు స్థావరవిషము లుండును.

తెల్లగన్నెగు, గురివింగ, పలుపుగుగల అతిమధుకము, మ్రుంగ, విజను, విద్యుచ్చిళి, గర్గర, సుగంధ యీ చెట్లచేసే విషమును గలిగియుండును.

విషపత్ర, లంబ, ఎండాంకము, కరంభము మహాకరంభము, లేతజొన్న ఈ చెట్ల ఆకులు విషములు గలిగియుండును.

కుముద్వతి, వేణుక, కరంభము, మహాకరంభము, కర్కొటకము, కేసుకము, ఖిద్యోతకము, చప్పరి, ఇభగంధ, నగ్నపూతి, నందనము, సారపాకము ఈ చెట్ల ఫలము లలో విషముండును.

నేత్రము, కొదంబము, వల్లిజము, కరంభము, మహాకరంభము, ఈ చెట్లపువ్వులు లో విషముండును.

అగ్రపాచకము, కర్కరీయకము, సైరేయకము, మ్రుంగచెట్టు, కరంభము, నందనము, వరాటకము అను చెట్లయొక్కతెగు, చేప, బాకయును వానిలో విషముండును.

కుముదస్మి, జెముడు, బాలక్షీరియను చెట్ల పాలయందు విషముండును.

కంఠిపాపాణము, తాళకములందు విషముండును.

కొలకూటము, వత్సనాభము, సర్పపము, కర్కమకము, వైరాటము, మూతకము, శృంగీవిషము, మూలకము, కక్కటము, హేలాపాలము, ప్రపూడికము, పాలకము, మహావిషము—ఈయంపలు విషమును గలిగియుండును.

పై విషములు చేయు వికారములు

చెట్లనేళ్ల విషములు తినిన పశువులు మెలికలు తిరిగి చొంగపడుచుండును. మందమతిగా నుండును.

చెట్లఆకుల విషములు తినినవి నోరు చేడుగనుండి తిక్కుపుట్టును. బుస యెక్కువగును, చొంగపడును.

చెట్ల ఫలములు తినినవి మేతతగ్గించి మందమతిగా నుండును. మలమును బంధించును.

హస్తాదివారము చిస్త్రీమోము గొల్లబోయినరా కానుకొకదాన్ని కాలువట్టియైవండి

చెట్ల పువ్వులు తినినవి కడుపుబ్బును. మందమతిగా నుండును.

చెట్ల బెరడు బంక, చేసే తినినవి నోటివెంట నురుగు, దుర్వాసన యుండును.

చెట్లపాల విషములు తగిలిన నోరు పొక్కును. పారుచుండును. నాలుక పొక్కును.

ధాతు విషములు తగిలిన దవ్వుడలు నొక్కికొనిపోవును. నోరుపొక్కును. బాధగా నుండును.

దుఃపల విషములు చాల ప్రమాదములు. ఆరంభములోగాని కొంతకాలమునకు గాని బాధగలిగించును.

శత్రువులుచేయు విషప్రయోగములు

తటాకములలో సరస్సులలో విషముకలిపిన జలమెట్లుండును ?

విషముకలిపిన నీరు జిగటలుసాగును. ఘాటైనవాసన గలిగియుండును. నురుగు చారలు గలిగియుండును. తోలక్షణము లుండటవలన జలచరములు చనిపోవును. పక్షులు మదమును బోడినవై నీటియొద్దకు సంచరించుచుండును. ఈ నీటియందు స్నానముచేసిన మనుష్యుల పశువులు మందమతి జ్వరము, శరీరతాపము, వాపులు మొదలగు లక్షణము లుండును.

సలములందు విషములు ప్రయోగించిన నెట్లుండును.

భూమిగాని, కూర్చూడుటకు తగురాతి కష్టమగుగాని, నీటి శత్రుగాని, విషముచే దూషింపబడినపుడు వానిని మట్టు కొనిన ఆవులు, గుఱ్ఱములు, ఎద్దులు, ఏనుగులు, లాటి పిట్టలు గాడిదలు, మనుజులు గూడా చాల బాధనొందుదురు. వీరి శరీరమంతటా భాగము లందు విషముతో పదార్థములు తగులునో యా భాగముల వాపు జనించును. మంటగా నుండును. అచ్చటగల వెండ్రుకలు ఊడిపోవును.

ఆహారపదార్థములు

గడ్డి ఆహారపదార్థములు విషముచే చెరుపబడినచో దానిని సేవించు జంతువులకు అంగ శైథ్యము, మూర్ఛ, వాంతులు గలుగును. మలము పలువగ నగును. చనిపోవును.

పొగ, గాలి

పొగ, గాలి విషయుతములైనచో పక్షులు శ్రమనొందినవై భూమియందు పడును. జగు, వీసన, శిశిబాధకలుగును. భయంకరమైన శత్రువ్యాధులు కలుగును.

ఆహారములలో విషముకలుపుట

ఆహారమునందు విషమున్న దానిని భక్షించిన ఈ లు, కాపలు మున్నగునవి వెంటనే మడియును. దానిని అగ్నియందువైచి చిటచిట యు క్షయమైగయును. వెనుక కంఠమునందలి రంగుపంటి రంగుగల పొగ లైగయును. ఈపొగను భరింతుట చాల కష్టము. మంటలు కలిసియుండక విడివిడిగ నుండును. ఈ యగ్నినుండి వెలువడు గంధము పొగ చాలనేపటి వగటుండును.

విషముగలిగిన ఆహారమునుండి వెడలు ఆవిరితగులుట చే వృధయముకలదు కాథ కలుగును. కన్నులుతిరుగును. కాళ్ళపై అంటిన మంటలుత్పత్తు.

ప్రమాదముచేగాని, యజ్ఞానముచేగాని విషాహారమునునేపించిన నాలుక బండ కాదును. దుదిని గ్రహించుకొని నశించును. మందుదున్నట్లుగ నుండును.

విషము జీర్ణమైనపుడును అతిసారము, మంటలు, కడుపులోగడబిడ, కఠిరకాంతి తగుట గలుగును. సారాయి, కలు మున్నగు ద్రవపదార్థములయందు విషమును కలిపిన యెడల గీతలు నురుగులు బుడగలు గలుగుచుండును.

దాణాదిననులు, వచ్చి*డ్డిశాతులలో విషమును గలిపిన చిటచిటలాడుచు దుది నశించును. దుర్గంధము కలిగియుండును. పచ్చికొనులప విషముకలిగిన వెంటనే పండును పండిన వానికి తగిలిన వెంటనే ప్రల్లిపోవును.

దంతములయందు విషమున్నయెడల మొనలు విరిగిపోవును. నాలుక పండ్లు చిగురు వాచును. పువ్వులప విషము కలిగి వానినువాసన తగ్గును. రంగుమారును. వాడిపోవును. దానిని వాసనకొనిన కిక్కిరాధ గలిగి నేత్రములందు నీరు జేరును.

అంజనమునందు విషమున్నచో కన్నీటియందు జగురు గలుగును. అంధత్వము గలుగును.

పట్టెళ్ళయందు, గంటలయందు, గొలునులయందు విషము కలిపిన నవి మామూ లుగ ప్రకాశింపవు. భరించిన నాయా కఠిరభాగముల హింపించును. ఒడలు మండును. తుండగును.

విషవంతములగు ఆకులు తినునపుడు కలుగు ప్రమాదములు.

మేత దొరకని కాలములందు పశువులు పాదలమీదనుండు విషవంతములగు ఆకులు తినుటవలనను, విషపు పుట్టలు సట్టియుండెను చొప్పు, రెలు మొదలగు గడ్డి దిననులు తినుటవలనను ఆకస్మికముగా మేతతో ఉమ్మెత్తాపలు, జిల్లేదాపలు, పొగాకు లేతబొన్న మొదలగు విషవస్తువులు తినుటవలనను, పశువుల కపాయములు తటస్థించు చున్నవి.

వాస్తవ్యలో వాసవస్త అడగకనే గొట్టుకట్టు.

వివరస్తువులు ఆకులలోను, తవులలోను కలిపి పెట్టుట.

ఇంకను పశువులకు మాంసాదిగలు దుర్బుద్ధిచేతనో, వోళ్లకారణో విషముపెట్టి చంపుదురు. చచ్చిన పశువులను గ్రామ మాదిగలెచ్చి వాచారమునబట్టి వోళ్ళు గిరాకీగానుండు కాలములందు గ్రామమాదిగలు పశువులకు విషములు పెట్టి చంపుదురు.

విషవస్తువులు తెచ్చి పిండితోగాని, తవుడుతోగాని పిసికి ముద్దచేసి అరటియాకు లోగాని యితర ఆకులలోగాని ముడచి పెట్టుదురు. లేదా పశువులముందర పడవైతూతు. అంతట పశువు తినును.

గడ్డిజాతులలో కలిపి పెట్టుట

కొన్ని సమయములందు పశువులుతిను గడ్డిలో కలుపుదురు. కొందరు పశువులు తేయు బీడుభూములలో పాపానపాడి జల్లుదురు.

గాయములు, ఆననములలో పెట్టుట

మరికొందరు చర్మమును చీల్చి ఆ గాయమునందు విషమును పూయుదురు. లేదా ఆననమునందుగాని, యోనియందుగాని విషపదార్థ మెక్కింతురు.

మశూచివడిన తలను క్రుల్లించుట

మశూచివడి చనిపోయిన పశువుయొక్క తలను గూనిలో పాతిపెట్టి అది క్రొల్లిన తరువాత దానిలో ఒక యింజెక్షన్ నూనిన దించి క్రుల్లనీరు నూదికి పట్టించిన తరువాత ఆనూదితో ఇతర జంతువులను కొంచెము రక్తము కారునట్లు చేయుదురు. వెంటనే ఆవిషమెక్కి పశువు చనిపోవును.

జిల్లేడుపాలను ప్రేగులలోనికి ఎక్కించుట

జిల్లేడుపాలను ఒక చిప్పలోనికి నొడిచి మూరెను పాడుగును ఒక అంగుళమా పెడల్పును గల కర్రపైపు కొనకు, అగుడ్డను చుట్టి మూత్రము విడుచు ప్రేగులలోనికి గ్రుచ్చి లోపల అగుడ్డనుంచి వుల్లను వెచ్చదిగా బయటప లాగుదురు. ఈమందు బహు వేడియగు వస్తువగుటవలన వెంటనే ప్రేగులు వాచి బాధపడి చచ్చిపోవును.

అంటువ్యాధుల మలము లుపయోగించుట

పెద్దకోగము, దొమ్మ మొదలగు వ్యాధులు సంభవించిన పశువుల వేవకు తీసి వాచియొంచెదరు. వోళ్ళు గిరాకీగా నుండునపుడు మాత్రము అక్షేప పచ్చికమీద జల్లుదురు. ఆపచ్చిక పశువులుతిని పలువిధసంకటముల పాలగుచున్నవి.

హస్తము ఆవిపంట, చిత్తము చరిపంట.

గన్నేరుగింజల, చెక్కల నుపయోగించుట

కొందరు మాడిగవాండ్లు పచ్చగన్నేరుగింజలను చారమువల దండవలె గ్రుచ్చి పశువులముందర విసరుదురు. లేదా ఎండుగడ్డితో గన్నేరు చెక్కకలిపి పెట్టెదరు.

గురుగింజలను పెట్టుట

మరికొందరు గురుగింజలను పొడిచేసి ఏటిలోకలిపి మద్దజేసి ఒక అంగుళము పొడవుగల కర్రచివరి వాడిగా చెక్కి ఆముద్దను కర్రకు అంటించి జంతువు కిరీరములోనికి తొనవుదురు. పొడి ఎచ్చట ప్రవేశించునో ఆభాగము విశేషముగా వాచి రెండు మూడు దినములలో పశువులు చనిపోవును.

విషము నోటిగుండ పెట్టినతరువాత కనబడు లక్షణములు

పశువునోటినుండి విషము లోనికిచ్చిన యెడల దంతములు, చిగుళ్లు, నోరు, నాలుక వూచి బాధగలుగును. చొంగ యధికముగా కాల్చును. వాంతిచేయుటకు ప్రయత్నించును. కడుపునొప్పి కలుగును. తరచుగాలేచుచు పండుకొనుచుండును. కడుపుబ్బును. పిచ్చుట దుర్గంధములతో గూడ విశేషములగు చుండును ఆ విశేషములలో రక్తజీర కూడ నుండవచ్చును.

ఆసనములో పెట్టినతరువాత కనబడు లక్షణములు

ఆసనములో పెట్టినయెడల ఆసనము ఎర్రబడి చాల బాధపడును. కడపటియవ స్థానా దైవ్యముతో చూచుచు కంటిపాపలు పెద్దవై చాల ఆయాసముకలిగి పక్షపాతముచే నీలువక క్రిందబడి చనిపోవును.

చి కి త్న

10, 20 కోడిగుడ్లకు ఒక సేరున్నర చిక్కిని జావలోగాని, పాలలోగాని కలిపి 3, 4 గంటల కొకసారి త్రాగించవలెను. లేక వెలగబొకసేరుగాని, అన్నభేదిరుగాని త్రాగించవలెను. లేక పచ్చి అపిసెయనె గాని, మన్నపురుగాని, ఘాటుపొరాయిగాని త్రాగించవలెను. లేక సారాయి 10 తు, సొంటి 2 తు, నల్లమిరియాలపొడి 1 తు, జావ అంసేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

ప ధ్య ము

ఏటిని యేమాత్రము త్రాగనీయరాదు. నీఫలవిసెగింజల జావగాని, బియ్యపుకావ గాని, ఎక్కవగా త్రాగించవలెను. ఉడిక బెట్టిన తత్తుకు, చిట్టు ధ్యముగా పెట్టవలెను.

హస్తచిత్తపోలే అంధిరీశద్వం వొక్కటేను.

ఉం గి డి

లేతజొన్న, లేత అడుదపు ఆకులు తమ పశువులు సాధారణముగా విషమెక్కి చచ్చుట నుకరించుటకు తెలియును. ఒక పాలములోని లేతజొన్నను వేసి పశువులు విషమెక్కిచావగా మరియొక పాలములో పెట్టితి లేతజొన్న వేసి పశువులలో పరిమిములై యుండుటనుగూడ మన మెరుగుము. 1903 సంవత్సరములో క్విన్సొండు దేశమునందు లేత జొన్నను చేయుటవలన అనేక పశువులు మరణించెను. అందువలన అద్రీపనాములు శోధనలను జెక్కిరించి జేసి నాని పశుసానమును తెలియపరచి, సావంతములైన ధూమలలో పెరిగిన జొన్నలయందు ఫూరనిషములైన ప్రెస్సిక్ ఆసిడ్ (Prussic Acid) మున్నగు పదార్థములుండను. ధూమియందలి సాము తగ్గించి నందుండు జొన్నలో విషము లంతగానుండవు. కాబట్టి నిస్సారములగు పాలములయందు లేతజొన్నను పశువులకు వేసినప్పుడు నష్టము కలుగవచ్చును ధూమిలోని సారిము మోచ్చివారిది ఆ దలి లేతజొన్నను వేసిన పశువులకు విషద్రవ్యము లెక్కువగా కాన వచ్చుట యీ దేశమువారి శోధనలన గానవచ్చినది. నైట్రోజను విస్తారముగాల ధూమలలో మాత్రమే యిట్టివిషము లేతజొన్న యందు కానవచ్చును. ఇందుకొరిక్ బ్రెన్నిక్ (Brennic) అవదొర ఒక పాలములోని తొలిభాగములో ఎరువును దేని వేరును దానే జొన్నలను జల్లి మిరియించి భాగమునకు నైట్రోజను ఎరువు విస్తారముగా వేసి జొన్నలను విల్లెను. నైట్రోజను చేయుచు భాగమునది లేతజొన్నలో విషములు విస్తారముగా గానవచ్చెను. నైట్రోజను ఎక్కువగా చేయుచునో అంత దుర్భలముగా నందలి లేతజొన్నలో యీ విషములు మోచ్చెను. ఎన్ని పర్యాయములు యిట్లు శోధించినాచినను ఈ తీర్మానే ఫలితము లేలేదు. కాబట్టి ధూమిలోని నైట్రోజను ననుసరించి లేతజొన్నయందు విషముండునని నిరారణ యగుచున్నది.

విస్తారము నెరుగు మొక్కలలో విషము లెక్కువగా నుండును. ఎంతకాలపు మొక్కలలోను, వీలగా నెరుగు మొక్కలలోను ఈ విషము విస్తారముగా నుండును. విస్తారము నైట్రోజనుగల ధూమలలో బెరుగు మొక్కలు ఒక వీరెడెట్లు బెరుగని పెట్టి పసరమైనను చరిపోవును. కాబట్టి లేత మొక్కలను, వీలమొక్కలను అంతగా వారోగ్యకరములైనవికావు. లేతగా కొనినను ఎండుచొప్పుయగునని దీనియందీ విషముండదు. నైట్రోజను విస్తారముగాగల ధూమలలోని జొన్నను కంజీరేయింపవలసి పశువులకు మేపరాదు. మొక్క మొలచిన మూడునాములు మొదలకొని ఏడునాములవరకు నందు విశేషముగా విషముండును. అటువలనాతి నీ విషమునది నైట్రోజను విరిగిపోయి హరిజేయని యితర పదార్థముల క్రిందకు మారిపోవును. మొక్క పూతబట్టి తరువాత నందలి విషము నామమాత్రావచ్చి మైయుండును. కాని కొన్నిచోట్ల కొద్దికాలమునకు పూతపడవు మొక్క మరణింపి చచ్చి నేవుగా పోయి చాలకాలమునకు గాని పూతప

భావంబులచే నైవచ్యము మాడు, ఏమనగాములు నను గడువు సర్వత్రసమముగా వర్తిం
తుడు. కాబట్టి యేది ఎట్లున్నను పూర్తిపూర్ణము ముందు పచ్చిజొన్నను పశువులకు మేతగా
పెట్టరాదు. మాక్సివెల్ (Maksevel) అను ఒక దొంగరాయ లేతజొన్నను ఎందుగడ్డి
కలిపి పశువులకు మేతగా వేయవచ్చుననియు, అందు ఎందుగడ్డి పాలుపొచ్చుగా నున్న
యెడల లాపలికిపోవు లేత జొన్నయందలి విషము చాలతప్పవగుటచేత అంతగా హాని
కలిగించదనియు తెలియజేసెను. ఏది యెట్లున్నను పూర్తిపూర్ణము పచ్చిజొన్నను పశువులకు
వేయకుండుటయే మంచిది. పెరుగునున్న జొన్న మొదలగు పెరులను పశువులు చొరబడి
మేయకుండ కావుదలచేసికొనవలెను. కొన్నివెంటనే పచ్చిజొన్న మొక్కజొన్న వీనిని
పశువులకు వేయరాదు. రెండు మూడు దినములు వీనిని ఎండబెట్టి తరువాతనే పశువులకు
వేయవలెను. పూర్తిపూర్ణముగా నున్న పచ్చి చొప్పను పశువులకు వేయుట యేకప్పు.
లేమనగా పుత్రుగా నెదిగిన దానిని వేయవచ్చును. విశేషముగా ఈ మేతను ఇతర
ఆహారములతో యిచ్చుట మంచిది.

లేతజొన్న తిన్న పశువు లక్షణములు

పశువు అడుగువేయలేదు. తడబడుచుండును. స్పృహ రహితము. నాలుక జార
విడచును. నోటివెంట చొంగపడుచుండును. నాలుక విరగలాగుచుండును. వ్యాధి
ముడికలగొని పొట్ట భేదవలె పొగును. గురకపుట్టును. దవుడలు విగిసికొనిపోవును.
ఊపిరియాడక వెంటనే మృతికొందును.

చికిత్స

అరంభములోనే చికిత్స చేయవలయునుగాని తరువాత నేమియు లాభములేదు.

1. పులుకలిలో ఉప్పు చేరెను, నల్లేరుముద్ద చిన్న నారింజకాయంత కలిపి
పెట్టవలెను.

2. కొమ్ములకు నూనెవత్తులు చుట్టి కొల్చి జామువరకు యుంచిన తగ్గును.

3. కుంకుడుకాయల గంధము కంటిలో కలికము వేయును.

4. నిమ్మపండ్ల రసము, నల్లేరురసము కలిపి మూడు గొట్టములు పెట్టిన తగ్గును.

5. చిత్రిచెట్టు దంచి రసముతీసి పులికలితో మూడు గొట్టములు పెట్టవలెను.

6. జోసకాయలు పది పెట్టుము.

7. దీపత్రుకొడిచే నల్లేరురసము పొట్టములుగా కట్టి చమురుకు కాచి మూడున
పెట్టవలెను.

8. పులికలిలో దుస్తువువేళ్ళుచూరి సారముతీసి ముక్కరంధ్రములలో పోసి కన్ను
లకు ఇంగువ కలికము వేయవలెను.

9. చింతపండు పులుసు కూడు గొట్టములు పెట్టవలెను.

10. నల్లగుళికలు దవుడలకు పెట్టి కొరికించిన తిక్క పోవును.

11. అమ్మనియం కొండ్రో అను మందు బిళ్ళ తులముల పిప్పిని చప్పిటిలో కలిపి త్రాగించవలెను.

12. గోగువరుగు పెట్టుము. అప్పుడప్పుడు పెల్లిగుసాల్లు ముక్కులకు చూపించుము.

పశువుల కువయోగించు పనిముట్లు

పలుపులు, నీరు పెట్టు లోట్టలు, ముసులినిచ్చు గొట్టములు, పాత్రలు ఎక్కుటి కప్పుడి పరిశుభ్రము చేయవలెను. శత్రువులైన ముష్టిపులు విషమందుల కలుపును తేమ తనిఫీ చేయుచుండవలెను.

పశువులకాలలు, పాకలుగూడ పరిశుభ్రముగానుండవలెను. చెత్త వస్త్రములున్నచో వివపుగురులు చేరును. క్రిమికీటాకులు జుంచి పలువిధ రోగములు కలిగించును. గడ్డి నాములు, పుట్టలు, విషముగల తీగలు, లేక జొన్న వస్త్రములుండుచోట్ల పశువులను కట్టరాదు.

మంచి పశువులకు ఓర్పులేనినాగు నోటిలో దబ్బవను, ఇనుపనూతులు మున్నగు వని వేయుదురు. ఇట్లు వేయుటవలన పశువు ప్రేగులలోగాని, తదితర అవయవముల లోగాని నిలువయుండి పశువును బాధించుచు కొన్నాళ్ళకు ఆ వస్తువు త్రుప్పుపట్టి శరీరభాగములను చెరుచును. అకలి తగును. మందులతో నుండును. ప్రేగులలో చిక్కుకొనియున్న యెవల తూట్టుపడును. కడుపునొప్పి, నోటివెంట చొంగ, ముక్కులవెంట చీమిడి ముక్కుకుచి పడుచు క్రమేపి పశువు మరణించును. కండరములలో చిక్కుకొనియున్నయెవల ఆ భాగమంతయు చెడి కలుకులు లేచును. ఆ కంటులు పక్కయినను రాక శరీరమంతయు పుట్టి కొన్నాళ్ళకు అవిషమంతయు జీర్ణమై చనిపోవును.

చికిత్స

ఇటువంటి వస్తువులు మ్రింగిన పశువు చరిత్ర తెలిసికొనుట చాల కష్టము. అనేకమంది పశువైద్యులను తీసికొనివచ్చి చూపించుచును. అందరితో కొందరు పేగులలో చిక్కుకొనినప్పుడు కడుపునొప్పి యుండును. ఇంక అనేకవిధములుగా రోగ నిర్ణయములు చేయుదురుగాని అసలువ్యాధి కనుగొనరు. పశువు మరణించిన తరువాత మాదిగవాండ్రు కొయ్యకప్పుకు ఆ వస్తువులు బడుటకనును. తగిరిగా అనుభవమునూడ కొన్ని కేసులు ప్రత్యక్షముగా చూచితిమి.

ఇటువంటి ప్రయోగములు జరిగినపుడు వెంటనే మూడు నాలుగుసార్లు సబ్బు నీటితో పిసిమూచేయవలెను, తరువాత వెన్నను తినిపించవలెను. కంటులు పుట్టిమెడల శస్త్రవైద్యములలోనున్న ప్రకారము శస్త్రచికిత్సలు చేయవలెను.

జంగమ విషములు

పిచ్చిక్కలు మొదలగునవి చతుష్పాదజంతువులు, సర్పములు, వృశ్చికములు, శరపదార్థములు, బూతులు, మాషికములు, ముఘాకములు అనునవి.

విషమూత్రయించి యుండుస్థానములు

దృష్టి, నిట్టూర్పు, గోలు, గోళ్లు, మలము, మూత్రము, శుక్రధాతువు చొంగ, తోక, ఆర్తవక్రము, ముఖముతో కగుడు, అసానవాతము, గురముచుగరి నెరుక, చేతు, తోకయందలి ముల్లు మృతకశేపము అనునవియును విషముండును.

దేవతాసర్పములకు దృష్టియందును, నిట్టూర్పునందును విషముండును. నేలమీద నుండు సర్పములకు తోరలయందు విషముండును.

పిల్లి, కుక్క, గోరి, మొసలి, కప్ప, మత్స్యము, శిశుము, నత్తవుగురులు, కీడు రాము, బల్లి మొదలగు చతుష్పాద జంతువులకు, పురుగులకు తోరలయందును, గోళ్లయందును విషముండును.

చిపిటము, పిచ్చిటము, కషాయవాసికము, సర్పపవాసికము, తోటకము, చర్మకీటము, కాండీల్యకమును పురుగులకు మలమూత్రములందు విషముండును. ఎరుకలకు శుక్రమునందు విషముండును.

సారెపురుగులకు, చొంగ, మూత్రము, రెట్ట, కాటు, గోళ్లు, శుక్రము, ఆర్తవము-వీరియందు విషముండును.

లేలు, విశ్వభరము, రాజీవమును చేప, ఉచ్చిటింగము, సముద్రపు వృశ్చికము అనునవికి తోకయందుండును.

చిత్రకము, శరావగిరికము, శరదారుకము, అరిమేడకము, కారికాముఖమున కీటములకు కాటు, అసానవాతము, మూత్రము, రెట్ట యనునవియును విషముండును.

ఈగలు కందిగలు జలగలు కాటునందు విషము గలిగి యుండును.

విషముచే చచ్చినజంతువులయొక్క ఎముకలు, పాము శరీరమునందలి శిశ్యములు, వరిటి యను చేపఎముక యునవి అసివిషములు.

శవగి, ఎర్రచారలుగల చేప (రక్తరాజీవము) వరియను చేపలకు చేదుకట్ట యందు విషముండును. నూక్కుకుండము, ఉచ్చిటి గము, వరిటి, కాళ్ళజెట్టి (శరపది,

కూకపలభిక, శృంగి, భ్రమరము (కుమ్మెద) లకును తో కయందు, ముల్లనందు విష ముండును.

చచ్చిక పురుగులు, పాములు శవవిషములని గ్రహించవలెను.

కీటకములు

పామలయొక్క శుక్రము మలము మాత్రము శవము వల్భిసోయిన గ్రుడ్డు పెండ్ల లగుననినండి వాత పీతలేళ్లు ప్రకృతులుగల వివిధకులగు కీటకములు జనించును.

కందిరీగలు

నాలుగుజాతులు గలవు. ఇవన్నియు తీవ్రముగా బాధను గలిగించును. ఇవి కరచి కచో వాపులు పుట్టును. కాటు నల్లబడును. నొప్పులు మంటలు కలుగును.

ఉడుములు

ఇవి అయిదురకములు, ఇవి కరచిపపుకు భయకరమైన కంటుకు పుట్టును. ఉడు మువంగు కృష్ణపచ్చమువలన కలిగిపట్టి నాలుగు కాళ్లు గలిగిపట్టి జంతువునకు గాఢరక మని చేరు. ఈ జాతికడుము కరచిన పశువు బ్రతుకదు.

కాళ్లజెర్రలు

ఎనిమిదిజాతులు గలవు. ఇవి కరచిన వాపు మంటలు కలుగును. కొన్ని కరచిన గడ్డలు లేచును.

కప్పలు

ఎనిమిదిజాతులు గలవు. వీటిలో కొన్ని కరచినచోట దురదకలుగును. నోటివెంట నురుగువచ్చును. ఇంక కొన్ని రకములు కరచిన మంటలు గలుగును. మార్చవచ్చును.

శూకవృంతాదులు

కరచిన దురద, వద్దరులు పుట్టును. కాటునందు తోకముల్లు కనబడును.

కంఠూమకములు

కరచిన శరీరంగు మారును. జ్వరము పారుదు కలుగును.

చీమలు

ఆరు జాతులు, చలిచీమలు కరచిన కాటునందు తీపి, అగ్ని తగిలినట్లు మంట, వాపు కలుగును.

తేనెటీగలు

అరజాతులు. ఇవి కరచిన మంటలు వావులు కలుగును.

దోమలు

అనుభవములు:—ఇవి కరచిన ఎక్కువ గురద కలుగును. కొన్ని కరచిన అస్థమందు గోకియెడల పుట్టు పడును. మంటగా నుండును.

వృశ్చికములు

మాదువిధములు: ఆవుశేవ క్రుక్కుటవలన బుట్టునవి మందవిషములు; కర్రలు ఇటుకలు మన్నగువాని యందుండునవి మధ్యమవిషములు. కుళ్ళిపోయిన పాములనుండి పుట్టినవి, ఇంక ఇతర విషములనుండి పుట్టినవి తీక్షణవిషములు.

మందముగఁ బ్రశ్చికములు 12, మధ్యమవిషముగఁబడి 3. ఉత్తమవిషముగఁబడి 15. మొత్తము 30 జాతులు.

అల్పవిషములు గలవి

నలుపుగను, ఎరుపుగను, చిత్తవర్ణముగను, పచ్చగను, ఆవుపంచితము రంగుగను, పరుషముగను, తెమిలిపురి రంగుగను, తెలుపుగను, ఎఱుపుగను, శోమములు గలిగియు గలికరంగుగను, కొంచెము ఎరుపుగ నుండునవి అల్పవిషములు గలిగియుండును.

ఇవి కరచినచో మంటలు; చెమటలు కలుగులు.

మధ్యవీర్యముగల వృశ్చికములు

ఎరుపుగను, పచ్చగను, శరీరరంగు గలిగి యుదరమునందు కపిలరంగు గలిగినట్టియు, అంతట పొగచూడరంగు కలిగినట్టియు, మాడుకలుపులు కలిగినట్టియు వృశ్చికములు మధ్యవీర్యము గలవి. ఇవి వాత పిత్త శ్లేష్మ ప్రకృతులుగఁ పాములయొక్క మల మూత్రముల వల్లను క్రుశ్చిపోయిన గుడ్డనుండియు పుట్టును. ఇవి యేజాతిపామునకు సంబంధించి పుట్టుచో యా ప్రకృతిచేరి యా దోషమునే ప్రకాశింపజేయును. నాలుక జాతుట మ్రింగుదుబడకపోవుట భయంకరమగు మూర్ఛ కలుగును.

ప్రాణములను హరించునవి

తెలుపుగను, చిత్తవర్ణముగను, క్యామలముగను ఎరుపుగను తెలుపు ఎరుపురంగు గను ఉదరమునందు ఎరుపు నీలము రంగులుగను నీలము తెలుపుగలనీన రంగు

చిత్తస్వాతులు పర్షింపకపోతే చిగురుటామలు మాడిపోవును.

గను ఎరువు చిత్రవర్ణములు గలనీన రంగుగను నుండి వృక్షములును ఒంటికలువు గలిగినట్టి వృక్షములును కలుపులే లేనట్టివి నగు వృక్షములు పాణిములను కీయును.

ఇవి తీక్షణమైన విషము గలిగియుండును. ఇవి వర్షిణ సర్పములనుండి పుట్టును విషముచే మరణించినవానికరీరము నుండియు పుట్టును. ఇవి కరచిన పామువలన గలిగిడి విషవేగములు గలుగును. పాక్షులు బట్టును. శరీరము త్రిప్పును. దేహమునందు మంటలు, జ్వరము, స్తోత్రస్ఫులనుండి నల్లని రక్తము కారును. కనుక నివి కరచినచో నునుజాడు చనిపోవును.

సాలెపురుగులనుతినుట

మనము మన యిండ్లయందును, కెల్లుకబ్బులందును, జనుపగడ్డి వాములందును సాలెపురుగులను లూతలను చూచుచుండును. వీటినిగురించియే ఇదివరకు చెప్పబడి యున్నది. సాలీకు శరీరమందు గ్రాధులనబడు సంచులందును. కొన్ని ధూములలో కప్పములు చేసికొని వానిపై కప్పలను గాననతో నముప్పును. లోపలి భాగమున పగలం తయు నుండి రాత్రులయం దావారముకొకై వెలుపలికి బయలుదేరును. మరికొన్ని చెట్లకొమ్మలప ఛత్రమువంటి గూటిని నిర్మి చి మధ్యను తన పీలలను రక్షించుకొను చుండును. ఇంకొన్ని నీటిచుడుగునె యుండి యచ్చటనే గూండుకట్టుకొని తమవీడ్లలను పెంచుకొనుచుండును. పశువులు కెల్లుకబ్బులను తినునపుడుగాని, జనుపకట్టలు, బొన్న, వగైరె, బీటిమేత, తడితరదాజా ననులు, తినునపుడు వానితోపాటు ఈ సాలీ శ్వును వాటికూర్చు తినిన యెడల ఒకవిధమైనవ్యాధి కలుగును. కొన్ని ప్రమాదము కలి గించును.

లక్షణములు

ఆరంభములో పశువు నల్లకప్పువేయును. పడుపుట్టును. నోటినుండి చొంగపడు చుండును. మలబద్ధక ముండును. చెన్ను విడుచుచుండును. ఈవ్యాధి సంవత్సరము లేక ఆరు మాసముల వరకుండును. కొన్ని వెంటనేతగ్గును. కరచినచోట మంటలు పుట్టును. బుడగలుగా పారుచుండును. వెండ్రుకలు నిక్కబొడుచును.

చికిత్సలు

మందు విరేచనములకు మందీయవలెను.

తరువాత దిరిసెనాకు పసురు ఆరసేరు పసుపు 1 తులం కలిపి త్రాగించవలెను.

లేక సాంటి 1 తు, పిప్పలు 1 తు, మిరియాలు 1 తు, మజ్జగ 1 నేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

ఎక్కడ తీవ్రలక్షణము లున్నచో

సొంటిగండముగాని మిరియాల గండముగాని కండలో కలికము చేయవలెను. పశు పక్ష్యాదుల కపకారమొనరించు సర్పములు 80 అని తెలిసికొనవలెను. ఇవి అయిదు విధములుగా విభజించబడెను.

దర్శకరములు — త్రాచుపాములు

నిష్కరములు — విషములేనివి

మండలులు — పొడపాములు

వైకరంజములు — సంకరజాతులు.

రాజీవంతములు — కట్టపాములు

విభజింపబడిన సర్పజాతులు

త్రాచుపాములు — 26

విషములేనివి — 12

పొడపాములు — 22

సంకరజాతులు — 3

కట్టపాములు — 10

సంకరజాతులవలన పుట్టినవి 7

ఈరీతిగా మొత్తముమీద 80 జాతిసర్పములు గలవని తెలిసికొనవలెను.

రంధ్రములలో దాగియుండునవి

ఈ పాములు భూభాగమునందుండు రంధ్రములలోగాని, తదితరప్రాంతములందు గాని నివసించుచుండును. ఆప్పుడప్పుడు వానికి అవుసరము వచ్చినపుడు మాత్రము భూమిపై తిరుగుచుండును. వీటి శరీరము మిగల దృఢముగాను వలయాకారము గాను ఉండును. తోక పొట్టిగానుండును. నోరు చిన్నదిగా నుండును. దంతములు కూడ మిగల చిన్నవిగా నుండును. వాటికి చిన్నచిన్న పక్షులు పురుగులు మొదలగునవి ఆహారము.

భూమిమీద సంచరించునవి

ఇవి భూమిమీదనే సంచరించుచు ఆప్పుడప్పుడు గుబురు లతలలోనికి, ముండ పొదలలోనికి, బోవుచుండును. వీటిలోనికిగూడ బోవుచుండును. శరీరము కొంచెము వంకరగా నుండును. ఆటునిటు వంగు శక్తి బాగుగా నుండును. వాటి యాహారము పెన్నెముకలుగల జంతువులు చాలా భాగపురకములు ఈజాతిలోనివే.

చెట్లమీద సంచరించునవి

ఇవి పొదలమీదను, చెట్లమీదను కాపురముండును. శరీరము నునుపుగాను సన్నముగాను నుండును. వీటిలో కాంతిగల రకము లనేకములు గలవు. ఆ రకము లలో ఆవపచ్చిది మి ఖ్యమైనది. ఇందు కొన్ని మాత్రము గ్రుడ్లను తినును.

చిత్తస్వాతులు జోడించబడినవి.

నీటిలో నివసించునవి

ఇవి మంచినీటిలో నివసించును. తోక కొనుగానుండును. చక్కగా ఈదగలవు. నీటిలో కొన్ని జాతులు సముద్రములలోనికి పోవును. ఇవి చేపలు, కప్పలు, వీటిల మున్నగువాటిని తినును. ఇవి విషవంతములైనవి కావు.

సముద్రములో నుండునవి

ఇవి సముద్రములో నివసించును. ఆప్పుడప్పుడు ఒడ్డునకు వచ్చుచుండును. చేపలను తినును. ఇవియును విషములు గలవియే. ఇవికూడ పిల్లలను పెట్టును.

కొండలమీద నుండునవి

కొన్ని పాములు కొండలమీదనుండును. ఇవి చాల పెదవిగా నుండును. వీటికి తగినంత విక్రాంతి, ఆహారముండుటచేత చాల బలము గలిగియుండును. ఇవి నూరు సంవత్సరములవరకు బ్రతుకును.

అల్పవిషములు గల పానసర్పములు

ఈగము కలిగినట్టియు, భయపడునట్టియు, సర్పములకు విషము స్వల్పముగ నుండును. ఆ విధముగా నే వృద్ధాప్యము గలిగినట్టియు, చిన్నవియగు పాములకు గూడ స్వల్పవిషముండును. విషహరములగు కొన్నివిధములుకల ప్రదేశములయందు విషము బాగుగా వ్యాపింపజాలదు. జలముగాను సంచరించు సర్పములకు, వీలగుచు విషము సర్పములకు, చిక్కిన సర్పములకు దప్పిగొన్న సర్పములకు విషము తక్కువగా నుండును.

అరిష్టము

ఏసర్పము కరిచినను కాళ్ళయందైనచో మొద్ద మొదట గుడ్డవీరికలచేగాని, తోలు వారులచేగాని, చెట్టుపట్టలచేగాని మరి యేయితరవృద్ధులైన వస్తువులచేగాని కరిచిన చోటునకు నాలుగు అంగుళములపైన కట్టుకట్టవలెను. ఇట్లు కట్టుటచే విషము శరీరము నందు వ్యాపింపక నిలిచిపోవును. ఈ కట్టునకు అరిష్టమాదురు. కట్టు కట్టుటకు వీలులేని సలములైనచో విషమును వెలుపలికి పీల్చుట, కరిచినచోటు కొయుట, కొల్చుట యను నవి అన్ని విషములందును ముఖ్యములైనవి.

సర్పములవిషము

మనుజులకు శరీరమంతటను శుక్రము వ్యాపించియున్న రీతిగ సర్పమునకు శరీర మునందంతటను విషము వ్యాపించియుండును. కొంతము కలిగినతరుచు విషము బయల్పెడలును. సర్పముయొక్క శరీరము చేపలను బట్టుకాలములవలె వంకితగా నుండును. విషము

శరీరమునుండి బుతులుదేరి వానియందు చిక్కుకొనును. కనుక సర్పములు కాటుచేసిన తరువాత వెల్లికిలబడినగాని (పడగవరక) విషమును వదలజాలవు. విషమంతయు గూడ మిక్కిలి ఉష్ణముగ తీక్ష్ణముగనుండును.

మంత్రములు

సర్ప విషహరములగు మంత్రములను తెలిసినవాడు మంత్రముల జదువుచు త్రాడు మున్నగువానిచే కట్టుకట్టిన అవి ప్రభావములచే విషములను హరించును.

దేవతలచేతను, బ్రహ్మర్షుల చేతను చెప్పుబడిన సత్యతపోమాయములైన మంత్రములు వ్యర్థముగాక అతిభయంకరమైన విషములనుగూడ హరిగొట్టును. లేజన్యతములై, సత్యతపోయొక్కములైన మంత్రరాజములచే విషము నివారింపబడు నట్లుగ బోధములచేత నివారింపబడదు.

విషమును పోగొట్టుటకు కలికము (అ. జవము) చూరములు వీల్పించుట (సస్యకర్మ) చేయించవలెను. పూయుటకు వాడెడు పట్టు, గంధము మొదలగునవి చాల చల్లగనుండునవి వాడవలయును.

కాటులోని భేదములు

పాదములతో దన్నినగాని, స్వభావవృద్ధ్యుడేగాని, అహారము కొరికాని, మహాక్రోధముగల యీ సర్పములు జీవుల గూడును పుం. ఈ సర్పదంశము (పాము కాటు) నాలుగు విధములుగా విభజింపబడెను.

స్పృశితము

కాటు ఒకటిగాని, నాలుగుగాని గలిగియుండి కొరలు దిగిన చుట్టు చుట్రి చిగుళ్ళ అకారమువలె పొట్టిగనుండి కొంచెము వాపుగల యంతురములు బుట్టినయెడల స్పృశిత మందురు.

రదితము

కరచినచోట కొంచెము రక్తముగ వచ్చును. పసుపు తెలుపు నీలము ఎరుపురంగు గల గీతలు చర్మమునందు గలిగినది రదిత మనబడును.

నిర్విషము

మూడుకొరలు దిగి వాపులేకుండును. యిందు విషముండదు.

సర్పాంగాభిహతము

భయమొక్కవగుటచే కరచినవానికి వాతము ప్రకొపించును.

మహాసర్పములు

ఇవి నాలుగు సంచరించుచుండును. సర్పముల కన్నిటికి ఇవి అధిపతులు. వీని యాకారము అగ్నివలె ప్రకాశించుచుండును. ఇవి ఎల్లప్పుడును విషమును పరింపుచు లోకములతప్పింప జేయుచుండును. అన్ని సమాద్రములయందును పర్వతముల యందును కన్నట్లుచున్నవి. ఈ సర్పములు కోపగించిన ఈ ప్రపంచమును కేవలము దృష్టి, నిటూర్పులతో ధహింపగలిగి యుండును.

త్రాచుపాములు (దర్వికరములు)

చక్రము, నాగలి, ఛత్రము, చోకము, అంతుశముల చిహ్నముగలిగి పడగలతో కొప్పగుచు శీఘ్రముగ గమనము గలవాటిని త్రాచుపాములందురు.

గోధుమత్రాచు, నల్లత్రాచు, కందిపాడత్రాచు; నాగజెట్టిత్రాచు, అరికవన్నెత్రాచు; మొగలిత్రాచు; తేల్లత్రాచు; కోడిత్రాచు; ఏరుత్రాచు; సెనగపువ్వుత్రాచు; చింతపువ్వుత్రాచు; గిరినాగు మున్నగు రకములు గలవు.

వారములను బట్టి విషములుండును

గోధుమత్రాచునకు శనివారమునాడును; నల్లత్రాచునకు మంగళవారమునాడును; అరికవన్నెత్రాచునకు కందిపాడత్రాచునకు బుధవారమునాడును; నాగజెట్టిత్రాచునకు సెనగపువ్వుత్రాచునకు సోమవారమునాడును మొగలిత్రాచునకు, తేల్లత్రాచునకు గురువారమునాడును; కోడిత్రాచునకు, ఏరుత్రాచునకు, గిరినాగునకు శుక్రవారమునాడును; చింతపువ్వుత్రాచునకు భిషగవారమునాడును; విషప్రక్షేపముండునని తెలిసికొనవలెను.

పాడపాములు (మండలీసర్పములు)

అనేకరకములగు పాడలు - పెద్దశరీరము గలిగియుండును. పెమ్మడిగా తిరుగుచుండును. ఇవి నూర్చునివలె ప్రకాశించుచుండును.

కలంకారీపెంజర - ఇది మూరెడుపాడవుండును. కలంకారీరంగువంటి మచ్చలుండును. ఇది కనిచిన శరీరమున మంటలుండును. దీనిముఠా చివిపోవును.

పొట్టపెంజర:— దీనితల లోక సన్నముగానుండును. శరీరము లావుగానుండును. పొట్టకాయరంగుగలిగి పొట్టకాయవలె పాడవుగానుండును. గురక పుట్టును. శరీరము వాచును; నాలుగుదిశములలో మరణించవచ్చును. తివాసిపాడపెంజర; వీచుకపాడపెంజర; అగ్నిపాడ పెంజర; పాడపెంజర; సున్నపుపాడపెంజర; తేనెపాడపెంజర; కుళ్ళ పాడపెంజర; పొడిరీ పాడపెంజర, గవ్వపాడపెంజర; గరికపాడపెంజర; మోడుగ పాడపెంజర; పసుపుపాడపెంజర; దొండపండు పాడపెంజర; అనురకములు గలవు.

కట్లపాములు (రాజవంశములు)

భగభగలాడుచు వివిధవర్ణములు కలిగి నిడువుగ, అడ్డముగ వ్యాపించిన గీతలతో చిత్రింపబడినట్లు ప్రకాశించు వాటిని రాజవంశము అందురు.

వీటిలో నాలుగు తెగలు గలవు.

క్షుద్రజాతిసర్పములు

ఇవి తొమ్మిదిరకములు. పెడకట్లపాము; నాగులకట్లపాము; నూనెకట్లపాము; బట్టెకట్లపాము; కట్లపాము; తాడిగిరి, చెట్లెగురుపాము; గొడ్డలిమొగపుపాము; గోడ పాము; అనురకములు.

మహాసర్పములు

కొండచిలువ; సముద్రపుపాము; దాసరిపాము.

నిర్విషసర్పములు

కొండచిలువ; క్షీరకము; క్షోతీధము; పుష్పహికము; వానపాము; పుచ్చకలము; అందాహి; పసిగిరిపాము, గలగోలి; నూకపత్రము; జాలకము; కలకిబలాహికము; గజభక్షము; అను నాములుగల పాములు విషహితములై యుండును.

కుంభీనసర్పములు

త్రిశూలిసర్పము; కుంభీనసర్పము; రెక్కలపాము, లోహితాక్షసర్పము; శోణముఖ సర్పము; ఘంటాపుచ్చము; ఛత్రపతిసర్పము.

బ్రాహ్మణజాతిసర్పములు

మత్రియములను వెండిని బోలిన తెలుపుకొంతి గలిగినట్టియు; ఎఱుపు పసుపు రంగు కలిగినట్టియు; బంగారుపన్నె కలిగినట్టియు; సాంబ్రాణి దిరిసెన పన్నము మొదలగు పువ్వుల నువాసనగల సర్పములను బ్రాహ్మణజాతిసర్పము అందురు. ఇవి పర్వతజల ధారలదగ్గరను; రిటాకములదగ్గరను; నూరులదగ్గరను; పెట్లభావులదగ్గరను యుండును. పుష్పములను గాలిని భక్షించును.

క్షత్రియజాతిసర్పములు

ఇవి వజ్రములవలె నిగనిగ లాడుచుండును. వీనికి శోపము ఎక్కువగా నుండును. దీని శరీరమునందు మూర్ఛ్యుడు చంద్రుడు గొడుగులను శంఖచక్రములరంగువలె జాజి సంపంగి పొన్న పుచ్చముల వాసన గలిగియుండును. వేరేడు ఖర్జూరఫలముల రంగువలె

నుండును. ఇవి పరిశుభ్రమైన స్థలములందును; మనుష్యులుండుస్థలములందును నివసించును మూసికములను తినును.

వైశ్యజాతిసర్పములు

ఇవి నలుపుగను: కంపు గోమేధికాంతి గలవిగను; పావురపురండుగను; గులారి పుష్పవాసనగలిగియు నుండును. ఇవి కొటియగదను; బూడిదపప్పులందును; ఊకపప్పు లందును; నదీతీరములందును; పశుశాలలందును నివసించును. మందూకములను తినును.

శూద్రసర్పములు

ఇవి దున్నపోతు, పెద్దపులి యనువాని చర్మములను బోలిన వర్ణము పొరుషము కలిగి చిత్రవర్ణములు కలిగియున్న సర్పములకు శూద్రసర్పములందురు. ఇవి మనుష్య సంచారము లేక పాడుపడినస్థలములందును; నిర్జంజములందును; కట్టెలగుట్టలందును నుండును. ఇవి అన్నిటిని తినును.

ముంగిసలు

ఇవి సాధారణముగా పాములతో బోట్లాడవలచినప్పుడు ప్రభమును తాము కక్కపాల చెట్లున్నచోటును చూచివచ్చి తదుపరి సర్పముపైకి కలహించుటకై బోయి సర్పమును తిన్నగా నా చెట్టుదగ్గరకు రానిచ్చి కలియబడి అవి కాటువేసినపుడెల్ల కక్కపాలాట కొరికి నమలి తినుచు విషము పోగొట్టుకొనుచు పామును చీల్చినయును. ఇది మహాజాగ్రత్తగల జంతువు.

సర్పములకు ఆయువు

5 సంవత్సరములు, 20, 50, 65, 100, 500, 1000 సంవత్సరములు కాకపరి మితి యుండును.

కోరలు వచ్చుట

పాములకు సంవత్సరమున కొకసారి కోర లూడిపోయి మరల నూతనముగా వచ్చుచుండును.

గర్భిణీసర్పము

గర్భిణీసర్పమునకు కరచినమొడల స్పృహమైరి నోటనుంచి రక్తము ప్రవహించును. నహించలేని మంటలు శరీరమంతటను గలుగును. ముఖము తెల్లబడును.

ఆడ సర్పము

స్త్రీసర్పము కరచిన నొసలుబ్బును. క్రిందిమాత్రగలిగి యుండును. పాదములు భూమిమీద నిలుపుట కష్టము.

పురుష సర్పము

పురుషసర్పము కరచిన క్రిందచూడలేపండును. మడికాలు క్రిందబెట్టుట కళత్తుడై యుండును.

ప్రసవించిన పాము

ఇది కరచినయెడల లింగమునుండి రక్తము ప్రవహించును.

కాటు భేదములు

వెలికిల బడినచో మిక్కిలి బలముగా కరచినదనియు, ఒక్క కొరమాత్రమే దిగబడినయెడల అక్రాంతమై కరిచినదనియు, ఒక్క కొరమాత్రమే కొంచెము దిగబడినయెడల భీతిల్లి కరచినదనియు, రెండు కొరలు లోతుగా దిగపడినయెడల తుప్పాథ మిక్కిలముగా నుండి కరచినదనియు, మూడు కొరలు దిగబడినచో మహానాగము కాటువేసినదనియు, మిక్కిలి లోతుగా గాయము బడ నటుల కరచినయెడల ఇదివరకు పగబట్టి కరచినదనియు గ్రహింపుము.

విషాది వివరణ పట్టిక

	విషగ్రాధలో నుండు విషము	కరిచినపుడు వెలుపడు నది	మునుజుని, పశువును చంపుటకు వలయునది	మృణము తటస్థించు కాలము
త్రాకుపాము	1-18 గ్రాయినులు	6 గ్రాయినులు	1/12 గ్రాయినులు	10 ని॥ మొ॥ 30 గంటలు
కృష్ణసర్పము	2-6 గ్రాయినులు	4 గ్రాయినులు	1/12 గ్రాయినులు	10 ని॥ మొ॥ 24 గంటలు
వైపరలు	1-4 గ్రాయినులు	2 గ్రాయినులు	1/8 గ్రాయినులు	6 గంట మొ॥ 8 కోజాలు
కట్లపాము	1/50-2 గ్రాయినులు	1 గ్రాయిను	1/100 గ్రాయినులు	12 గంట మొ॥ 8 కోజాలు

పాగాకుతోటల వైపునకు పాములురావు. గాఢన పాగాకును బొప్పెముగా వాడుచుందురు. ఇదియును కొంతపని చేయును. శీతాకాలములో విష మెక్కువగా యుండును. చీకటిలో వెలుతురుకన్న విష మెక్కువగాయుండును. పాము చాల దూరము నుండి వచ్చి కరచినపుడుగాని, రెండు దివుడలు సరిగ కలువకపోయినగాని విషము చాల కొద్దిగా నెక్కును. మంచినీళ్ళలోనుండు పాములకు విషముండదు. సముద్రములో నుండు సర్పములలో కృష్ణసర్పముకన్న పదిరెట్లెక్కువ విషముండును. ఉష్ణప్రదేశము

స్వాతివానకు మత్స్యపు చిప్పలు యెదురుచూచినట్లు.

అలా మొక్కల విషయమును, శర్మముయొక్క పయస్సునుబట్టి కూడ విషయ మారును. సర్మము కోపముగానున్న విషయ మొక్కవగానుండును. అహారము తినిన తరువాతను, కూసము విడిచిన తరువాతను విషయముండును. ఈ సర్మము అన్నియు చెట్టెక్కలవలె. నదుల దాటగలవు. త్రాడుపాములజాతి చాల జాపకక క్రిగలవి. వాటిని బాధించిన వారిని చాలకాలమైనను జాపకముంచుకొని వీలైన తిరిగి క్షేపించగలవు.

ముఖ్యమైన విషయము

పాములలో అనేకరకములను దేవము సృష్టించియున్నాడని ఇదివరకే చెప్పి యుంటిని. ఒక్కొక్క సమయములో పాము కరచి పారిపోయినపు డది ఏసర్మమైనది తెలిసికొనుట కవకాశము యుండును. ప్రాణాపాయము చేయు పాములయొక్క లక్షణములు త్వరలోనే తెలియును. ప్రాణాపాయము వెంటనే చేయక నెమ్మదిగాచేయు పాములను గూర్చి తగిన చికిత్సలు చేయవచ్చును. అనేకమంది వైద్యులు అనేకరకములుగ చికిత్సలు చేయుదురు. అటువంటివారు మన దేశములో చాలమంది యున్నారు. వీరు వాడునట్టి ఆకుపదార్థులు, మ. శ్రమలు బాగుగా పనిచేయును.

పాము స్వల్పమైనజంతువైనను దానికాటువలన పశుదేహమున ప్రసరించువిషము స్వల్పమైనను దీని తీవ్రస్వభావమువలన కొన్నినిమిషములలో ప్రాణము తీయుచున్నది. కలుచిన వెంటనే చికిత్సచేయుటకు ఆలస్యమైనయెడల చికిత్సచేయువారలకు తగినంత అనుభవము లేకపోయిన గాని కలువబడినపశువుప్రాణమును కాపాడుట కష్టము. ప్రతి సంవత్సరము విషపురుగుల కాట్లవలన అనేకదేహములు మృతినొందుచున్నవి వీటి కష్టముల నివారించుటకు కోగనిదానముగల పశువైద్యుల తత్వసరియు. ఎటువంటి వైద్యపండితుడైనను విషపురుగుల కాట్లను కనుగొనుట కష్టము. అందుచేతనే కొన్నికొన్ని ప్రాంతములందు నునాయాసముగా పశువులు మరణించుచుండును. వేసవికాలములో పాములలోను, బీళ్ళలోను పశువులను కట్టుపశువు కొన్ని పశువులు తెల్లవారుసరికి విషపురుగుల కాట్లచే చనిపోయి యుండును. మరునాటిరాత్రికూడ ఒక్కొక్క సలములో ఆరీతిగనే జరుగుచుండును. అప్పుడారైతు ఆతులతజ్ఞుడి తన పాలములో ఏమైన పాములున్నవానిని విచారించి తగిన ప్రయత్నములు చేయుచుండును. పాముకరచిన పశువు మూల్యోదయము కాగానే మరణించును. పాముల త్రుట్టులులేని ప్రాంతములందు పశువుల నుంచవలెను. ఇంకను పశువులకాలలలోను, కోళ్ళగూళ్ళలోను, గడ్డివాములలోను ఎలుకల కొరకవి వాగియుండును. అవియుండుచోటు గ్రహించి పశువులను వాగ్రత్తగా కాపాడుచుండవలెను.

పాముకాటు లక్షణములు

పాముకాటునకు వెంటనే అనగా విషము దేహమునందు వ్యాపించకమునుకే చికిత్సచేయుట కారంభింపవలయునుగాని “ఆలస్యం అమృతంవిషం” అనునట్లు విషము దేహమునందంతట నుండు రక్తములో ప్రవేశించి రక్తము నల్లబడిన తరువాత

నేమియు లాభములేదు. పాముకరచిన పశువులపై బాగుగా అక్షణములు కనబడుచుండును. కరచిన చోట భరింపరాని మంటయుండును. శీఘ్రముగామత్తును కలుగజేయును. తటాలున క్రిందనుండిపైకి పక్షవాతము క్రమ్మునట్లుగును. కాళ్ళలో నత్తువబోవును. నేలగులబడును. గుండెలు వత్తుకొని పోవునట్లుండి దడగానుండును. క్రమేసి తలవారిపోవును. ఊరియాడుట కష్టముగానుండును. తునవపాట్లు పడుచుండును. దీనినే స్పృశింపజూయదురు.

మొదటి అవస్థ :— పశువును తలుపురంగుగానుండి నీరుకారుచుండును. జ్వరముండును. ఈ అవస్థలో జ్వరక్షణములు, ఉష్ణ, అవుపాలతో నూరి కండ్లలో కలికము చేయుము. లేక దిరిసె పువ్వులను కండ్లలో పెట్టుము. లోపలికి నాగములివేరు 2 తులములు, సన్నావలు అరతులం నూరి మూడుగొట్టముల గంజిలో కలిపి పెట్టుము.

రెండవ అవస్థ :— పశువు శరీరమంతయు నలుపురంగుగామారి చొంగను కార్చుచుండును. ఈ అవస్థలో మణుగుతామర 3 తులములు, లెల్లలివేరు 3 తులములు ఈశ్వరివేరు 3 తులములు నూరి ముద్దచేసి నీటిలో కలిపి త్రాగించవలెను. లేదా నేరు గంధముతీసి కండ్లలో పెట్టవలెను.

మూడవ అవస్థ :— శరీరస్పృశ్యమగుచుండును. మెడనిలపజాలదు. ఈ అవస్థయందు తలకులిమిరేరు 2 తులములు, ఈశ్వరివేరు 3 తులములు దిరిసెనక్కరసం 3 తులములు నూరి నీటిలో కలిపి త్రాగించవలెను. కలి నీటితో దిరిసెనవిత్తులునూరి కండ్లలో వేయుము.

నాలుగవ అవస్థ :— పండ్లుకొరుగును. భూమిగొడపడును. శరీరము నల్లబడును. ఈ అవస్థలో చికిత్సలు చేయుట లాభములేదు.

తదితర చికిత్సలు

1. నాగదుండనుంప నీటితో అరగి దీసి అయిడతులములు లోపలికి త్రాగించి కొంతకరచినచోట పూసిన విషమువిరుగును.

2. లెల్ల ఈశ్వరివేరు గంధముతీసి నాలుగు తులములు లోపలికిచ్చి కుట్టినచోట పూసిన విషము హరించును.

3. ఉత్తరేణి ఆకులునూరి పాముకరచినచోట మందముగ పట్టించిన విషము హరించును. దీని అకరసము లోపలికి త్రాగించుము.

4. కాకిచొండాపసు సేరువంతుల రెండుపర్యాయములీయుము.

5. గాడిదగడపాకు పురు నేరు త్రాగించుము.

6. నాగముషినివేరు చెక్కరసము 5 తులములు త్రాగించుము.

7. పచ్చి నేలవేమురసము తో మిరియాలపొడి కలిపి యిచ్చిన సమస్తవిషములు హరించును.

8. చేడబీరావపసురు నేరు త్రాగించుము.

ఇంకను అనేకవిషములుగా చికిత్సలు చేయుదురు.

ప్రసవతంత్రము

పందొమ్మిదవ భాగము

మన దేశములోనున్న చూడిపశువులు ఈవిధ తరువాతగాని, ఈవిధ మునుపుగాని అనేక వ్యాధులు, అపాయములు అప్పుడప్పుడు సంభవించుచున్నవి. మన కందరము విడదమే కదా? ఇట్టివి సంభవించుట మన రైతులయొక్క తెలివితప్పువేతను, ఆయా పశువులయొక్క అనారోగ్యముచేతను తటస్థించు చున్నవి. ఇటువంటి అపాయములు పోగొట్టి పశుసంతతిని కాపాడవలెనను యుద్దేశముతో ఈ పశుశుక్రమును వ్రాసితిని. పశువులు ఈమట, గర్భము ధరించుట ముగియుచు వానికి స్వాభావిక కన్నులొదిగాని వ్యాధులతో జేరినవిగావు. మిక్కిలి గారాముతో పెంచు చూడిపశువు ఈవిధ సరికాని చాల కష్టముగా ఈమను. ఎగుచేతన దానికి సరివంత నిరాంతరి రియక దృష్టిరోషము తగులునను యుద్దేశముతో వీటికొట్టుములతోనుంచి, అమితముగా వాదానియములు పెట్టి మేపుటవలెన ఇటువంటివి కలుగును. ఇటువంటి పశువులు ఈమవప్పుడు పడు కష్టములు చెప్ప వలవిగాదు. కొన్ని పశువులు చూచుచుండనే నువాయాసముగా ఈవి చాల అరోగ్యకరముగా నుండును. ఈ పశువు లిటుంకు తెండుచేతనకగా :— నిర్మలనాయువులొ దిరుగుచు, నిర్మలబాడకమును వ్రాపుచు, పరిశుభ్రమైన సజములతో పసిచుచు, దేహావృణువలన దేహదార్ద్రమును కలుగ జేసికొనుచు నుండును. చూడిపశువులను తీవ్రతర పశువులతో పెప్పుకు నుంచరాదు. పశువులన్నియు ఎచ్చోట పెండగునో అచ్చోట నాయువు అపరిశుభ్రమగును. కల్లుపాదులు ఎప్పుడ అగును. ఇందుచే నిచ్చోట చన పించు పశువులు అనేకరోగముల పాలగును. పశువును పంచేయించుచో శరీరపటుత్వము తప్పదు. కావున అల్పకారణములచే అవి రోగముల పాలగును.

చూడిపశువుల పోషించుట

ఇంతియేకాకుండ పశువులను పోషించురైతులు చాల జాగ్రత్తతో, ప్రేమతో, చూచు చుండవలెను. ఇవి ఈమకాలము వచ్చిన తరువాత వానికి ఎమైన అలంకములు వచ్చియెడల తెలివిగల వశవైద్యుని రప్పించి తగిన చికిత్సలు చేయించవలెను. పల్లె గ్రామములలో అనేక విధమైన పశువైద్యులు గలరు. కొందరు డబ్బు కాపించి తెలిసి తెలియని వైద్యముచేసి పశువులను చంపుదురు. మరి కొందరు మాడను సరియైన మార్గము లోనికి తీసికొని రాకుండగనే లోపల దానితలకు త్రాకుచేసి యోనిగుండు లాగుదురు.

మరి కొందరు చేయిపెట్టి లోపలిఅవయవము లన్నియు తాకి పశువుయొక్క యొనిని చెడగొట్టుదురు. మరి కొందరు తెలియని మందులు లోపలికి పోయించి పిండమున కపాయము గలుగజేయుచుందురు.

కొబటి సోదరులను రైతులారా ! చూడిపశువుల విషయమై చాల జాగ్రత్తగా నుండవలెను. అవి నోరులేని పశువులు. మనము జ్ఞానము గలవారము కొబటి మన మెంత జాగ్రత్తగా నుండిన అంత పుణ్యము మనకు కలుగును. మీ గ్రామములో పశువైద్యుడు లేనిచో చూడి పశువునకు యేదైన వ్యాధి సంభవించినప్పుడు తదితర మనుష్యులు ఊహ పోహలతో చెప్పిన చికిత్సలు చేయరాదు. అటువంటి సమయములో భగవంతుని మీద నమ్మక ముంచి పశువునకు ఏమందు పోయవండుటయే మంచిదని నా యుద్దేశము.

తరువాత చూడి పశువులను సంభవించు వ్యాధులకు వారలు (కాల్పులు) చేయ రాదు. ఇట్లు చేయుట మహాపాతకము.

పశుగర్భనిర్మాణము


పశువు జీవితమునకు గర్భకోశము ముఖ్యధానమై యున్నది. ఇది మాంసముతో చేయబడిన ఒకసంచి. ఈ కోశములో మూడు భాగములుండును. గర్భకోశములో చిన్న చిన్న అరలుగా నుండును. ఈ అరలు పెదదంతువులతో కొన్నిటికి ఎక్కువగా నుండును. పశువు గర్భకోశములో నుండు భాగములు చాల నూక్కుములుగా నుండును. పశువు గర్భకోశములో నుండుభాగము లన్నియు వారిజరంతులలో నుండుభాగములవలె నుండును.

పశువు శరీరములోపల ఆకారములోను, పైభాలోనుకూడ చాల భేదములు గలవు. గర్భకోశము ముఖ్యముగా మాంసపుత్రాల్లచేత చేయబడినది. ఈత్రాళ్లు అన్నిదిక్కులకు అడ్డదిడ్డముగా వ్యాపించి నరములతో నిండి యుండును. ప్రొవ్యుతిత్తులు గోళాకారముగ నుండును. ఎముక తిత్తులు వంకర టింకరలుగను, కండర తిత్తులు కడుగు ఆకారముగను, నరముతిత్తులు దారములవలె నుండును. ఈ తిత్తు లన్నియు సుక్ష్మతికోశములై యున్నవి. వీనిలో ఎక్కువ భాగములు పిండోత్పత్తికి సంబంధమును. ప్రైచెప్పిన తిత్తు లన్నియు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కభాగము సుక్ష్మత్తిచేయును. మగపశువు బీజములు ఆడపశువు బీజములలో కలిపినప్పుడే ఉత్పత్తియగును.

యోని (Vulva)

దీనికి లోతులేని రంధ్రమందురు. దీనికి ఒకవిధమైన మైత్రని తిత్తి యుండును. దీనిజూలముననే వెలుపలి అవయవములకు సంబంధము కలుగ జేసికొనును. యోని అను భాగము శరీరమునకు తగినట్లు నిడువుగాను, పొట్టిగాను ఉండును. తేరపశువుల యోని

శ్వాసరతుమిద ఉల్లిపారవంటి పార మూసికొని యుండును. ఆరంభములో నుగపశువు దాటినప్పుడు ఈపాగ బ్రద్దలై పోవును. యోనిమూలముననే వెలుపలి అవయవములకు సంబంధము కలుగజేసికొనును. ఈ మాతృకతోడు ఇంకను రెండుమాతలు లోపలి భాగ



మున నుండును. ఒకమాతద్వారా శిశుబుడ్డపై వెళ్లును, రెండవమాతద్వారా భగరంధ్రమునకు వెళ్లును. అది కత్తెయొక్క బోలాగున నుండును. ఒక చివరనుండి యోనికి సంబంధ ముండును. ఇంకొక చివరనుండి గర్భాశ్రయమునకు నుండును. యోనివంటి వస్త్రముండును. పైపటమున నున్న పుష్టికభాగమును చూపును. వస్త్రపు ఎముకవంగినను, విరిగినను, ముడుచుకొనిపోయినను కూడ నిండి మాంసములు వచ్చినపుడు బైటకు రావీలుండదుగాన జాగ్రత్తగా పరీక్షింపవలెను

పెనుపెనవులు (Upper Lips)

పశువు యోనియొక్క పై భాగమున పెనుపెనవులను దీప్తులుండును. ఈపెదవులు నిడుపైన చర్మపు మడతలు గలిగియుండును. ఇవి పశువు మూత్ర, భగద్వారముల చుట్టుకొని యుండును. ఈపెదవులు చిహ్నభాగమునందు కనిపించుచున్నవి. ఈపెదవుల లోపలి భాగమున రెండు చిన్నపెదవులుండును. ఇవి శ్రోత్యుతో నిండియుండి లేమగా నుండును. ఇంకను జిగురుదాగములుగల ఆరలు అనేకము లమర్చుచు యున్నవి.

గర్భకోశము (Uterus)

గర్భకోశ మనునది కంఠములవంటిది. ఇది మూత్రసంచికి, మలపేగులకును మధ్య నమర్చబడి యుండును. ఇదిరబ్బరువంటి ఒక నిధిమైన కుండరముచే కల్పింపబడినది. ఇది రబ్బరువలె చెడబగ్గుటకును, చిన్నదగుటకును అనుకూలముగా నుండుట

వలన గర్భమును భరించి దీనిని గుర్తుగా గర్భము పెరుగు సమయమున గర్భవ్రసంచి వెళ్తున్నది. పిమ్మట పక్ష్యమైన మాడ బయటపడిన తరువాత పూర్వముండిన స్వభావమునకు వచ్చుటకొరకే రబ్బరుపాటి జన్మనే అనుభవించి యున్నది. గర్భాశయము వెడలయినచోటికి కిభిరనునియ్యి, మగ్గభాగమునకు దేహమనియు, వివరమందు భాగమునకు గొంతు అనియు, ద్వారమునకు నోరు అనియు వేరు. ఈనవి పశువు గర్భాశయపు నోరనునది నిడుపుగాను, ఈనిన పశువునకు గుండ్రముగాను ఉండును. ఈ శుక్రముండలము ప్రతి చివరినుండి అండాశయమునకు దారి యుండును. ఈవారులే గర్భాశయనాళము లనబడును. ఈప్రతినాళము చివర పుష్పమువలె విచ్చియుండును. వీరికి అండాశయము నకును దిగ్గర సంబంధము గలదు.

మగపశువు ఉత్పత్తి అవయవములు

(Male germ Cells)

ఈ అవయవములలో వృషణములు, అంగము (చేరు) ముఖ్యమైన అవయవములు. ఈ అంగము మూలముననే ఆడపశువు అండాశయములోనికి ద్రవపదార్థము ప్రవహించును. ఎడ యగుకాలములో తన్ను ఇతరపశువులలో కత్తి ఒకవంటి బేక భాగములలో మూసి యుంచబడును. రెండు మూత్రాశయములు లుండును. ఇవియ్యింద్రియము నుత్పత్తిచేయును. ఈ ద్రవము కొన్ని నాళములద్వారా పోవునప్పుడు మూత్రాశయముల చి కొంత ద్రవము బయలుదేరును. ఈ ద్రవము లన్నియు కలసిన యెడల వీర్యమునబడును.

మగపశువు బీజములు

ఇవి మూత్రాశయములలో తయారగును. వీటికిని ఆడపశువు బీజములవలె చాల భేదములు గలవు. మగ పశువు బీజము $1/400$ వంతు అంగుళముల పొడవుగ నుండును. ఈ బీజములకు ముఖ్యముగా తల తోక అనుభాగములు రెండే యుండును. ఇవి యింత కన్నముగా నుండుటవలననే ద్రవముతో నుంచినయెడల చేప ఈరుసల్లు ఈ రుస. దీని కీశక్తి యుండుటవలననే ఆడపశువుబీజములలో ప్రవేశించును. ఈ ద్రవములో బీజములు లక్షలకొలది యుండును. ఈ ద్రవమునే ఇంద్రియమందురు. ఆహారయొక్క ఇంద్రియమును పరీక్షించిన యెడల బీజములకు కరుగొనవచ్చును. వీర్యములో ఈ బీజములు లేని యెడల సప్తంసకబంతు వందురు.

ఆడపశువు బీజములు

ఈ పశువుయొక్క బీజము $1/1800$ వంతు అంగుళము పొడవునైనది గలిగి యుండును. ఇది గర్భాశయములో నుండును. ఆడపశువు గర్భాశయములో నుత్పత్తి అవయవములు చాల నుండును.

అడపశువు ఎడ

ఆవు ఎడయినపుడు దానిని కట్టివేసి దారిగగన ఆబోతుడు విడువవలెను. ఎడయైన పశువును రైతుడు కన్నీడును లున్నను వెంటనే పశువును మాపించవలెను. కాలువలో గాని, బురదలోగాని పశువును దిగబెడుదురాదు. అట్లు దిగించిన ఎడయినపుడు కత్తి నిలిచి పోవును. తనపరి మరల రావచ్చును. మంచి జాతిలో వుట్టిక ఆబోతు లేక దున్నెత్తును తీసికొని వెళ్లవలెను. మగపశువు దాటుకున్నది లేది బాగ్రాత్రగా పరీక్షించ వలయును.

కలయిక

ఆబోతుడు ప్రతిదినము ఆవులతో కలుపుటను వీలులేదు. వారమునకు రెండుఆవు లతో కంటే పెక్కువగా కలియనీయరాదు. ఆబోతుడు నియమితము లేకుండ విడదుట వలన శీఘ్రముగా నెప్పుడకమగును. లేదా అట్టిదానికి వుట్టివమాడలు రోగగ్రస్తములు, బలహీనులై చచ్చును. లేదా చచ్చియు చావక మనుషుడు బ్రతుకును. ఆవును అనేక సార్లు దాటించుటచేత దాని మాయమాడ నిలిచిపోవును. ఆబోతు ఆవును ఒకసారి దాటివయెడల చూలు కలుగును. రెండవసారి దాటివయెడల చూడికి భంగము కలుగును. చూడి కట్టిన తరువాత ఆవును మరల ఆబోతుతో కలియనీయరాదు. ఇట్లు కలిసిన గర్భి స్రావము కలిగి ఆవు ఈమరణిపోవును. ఒకసారి చూడికట్టి ఆవు మరల ఆబోతును కాంక్షించదని అనేకమంది అభిప్రాయ పడుదురు. కాని ఈ సంగతి మేము నమ్మ కాలము. నాలుగైదునెలలచూడితోనున్న ఆవులనుమాడ ఆబోతులు కలియును.

ఆవునుదాటించుకాలము

ఆవు ఈవిసక మాసములవరకు ఆబోతునికి జేరరుదురాదు. అప్పుడు కరి పచ్చిగా దించుకొని యుండును. గర్భము ధరించుటకు తగిన స్థితిలో నుండదు. ఒకవేళ ఆబోతు కలిసినను చూలు నిలువదు. ఆవు ఈ సమయములో అరచినను దాటించరాదు. ఎడ ఆర నివో చచ్చిపోతే కడుగుట మంచిది. లేక నూరేకారము అతులం చచ్చిపోతే కలిసి త్రాగించిన ఆతాప మగును.

యుక్తవయస్సు

పశువుయొక్క యుక్తవయస్సును గూర్చి పశువైద్యశాస్త్రజ్ఞులలో కొందరికి భేదాభిప్రాయములు గలవు. సామాన్యముగా ఆవు పెయ్య ఆరుమాసములకు పూర్తి 15 మాసములకు యుక్తవయస్సు వచ్చుననికీ ఈరును. కాని అంత చిన్నవయస్సులో గర్భము ధరించి ఈవిస పశువును వుట్టుమాడ బలహీనుడు మగును. వాల సమ్మగనారు ఆవు పెయ్యను ఆరుమాసములకే గర్భము ధరించునట్లు చేయుదురు. దానికి కారణ మేమన:- అంత ట్విలో ఈవియెడల వారు దానిపాలు మొదలగు వారిని అమ్ముకొని లాభము పొందుటకు ప్రయత్నించుదురు. జనసామాన్య మంతయు ఆవు పెయ్యకు రెండుసంవత్సర

మూల వయస్సు' వచ్చుకొన్నట్టికి ఈయనట్లుగా చేయుదురు. ఈ వయస్సునందు ఈయన పెయ్యన మనము జాగ్రత్తగా పోషించిన మొదట అది మొట్టికప్పుమలను పొందక దూడను పెట్టును.

చిన్నతనమునందే గర్భధారిగా జేయరాదు

ఒక పెయ్య మొదటికొప్పు కనగనే మంచి ఆహారమును పెట్టి బాగుగ పోషింప వలయును. పశువును చిన్నతనమునందే గర్భధారిగా (6 మాసములకే) చేయువారు ప్రతి ఈతన మధ్యకాలము (రెండు సంవత్సరముల వయస్సు)లో ఈయన పశువునకు కుండవలసిన కాలము కంటే ఎక్కువగా నుంచినచో అది చిన్నతనమునందే గర్భము భరించుటచేత బలహీనముగా నుండును. గాన ఆ బలహీనతను కొలుపొయి పశువు బలమును జెంది మరల పుట్టిన దూడకు కావలసిన పాలను సమృద్ధిగా జేయగల్గు కొనుటయే కారణమై యున్నది. పశువునకు వయస్సు ఎక్కువైనను త్వరగా పెరుగకున్న చిన్న వయస్సులోనే గర్భధారిగా పనికిరాదని తోచినచో దానిని 18 లగాయకు 24 మాసముల వయస్సు వరకు పార్లనీయమండ నుంచవలెను. కాని అట్టి పెయ్యలు ముందుముందు ఆవులైన పిమ్మట ఎక్కువ పర్యాచములు ఈనును. సామాన్యముగా ఆవు ప్రతిపర్యాయము ఈనుటకు మధ్య సంవత్సరము నడువుండును. ఆవు గర్భము భరించినది మొదలు 9 మాసములకే ఈనునుగాన సంవత్సరమునకు ఒక్కొక్కమాడ పుట్టవలె నని ఒకసారి ఈయన మూడునెలలకే మరల ఆవు పార్లవలెను. కొన్ని ఆవులు ఈనుటకు ముందు 2 నెలలు లేక 6 వారములు వరకు పాలు యిచ్చును. గర్భము భరించిన ఆరునెలల పిదప దానియొక్క పిండోత్పత్తికి అవసరము వచ్చునుగాన పాలిచ్చుట కొంచెము కొంచెము తగ్గును. మనము ఆవు ఈనుటయందే ఆశించక పాలు ఒక సంవత్సరము వరకు నీయవలె నను యుద్దేశముతో ఆ సంవత్సరాంతమువరకు దానిని పార్లకుండజేయవలెను. ఇట్లు జేయుటవలన ఒక్కొక్కసారి ఈనుటకు మధ్య 16 మొదలు 20 మాసముల వరకు గడువుండును. కాని పై విధముగ ప్రతిసారియు జరిగినచోడల ఆవుదూడలు తక్కువ పుట్టుట సంభవించును. ఆ పద్ధతి దూడకైనను ఆవుకైనను అంతమంది పద్ధతికాదు.

ప్రసవకాలపట్టిక

పశువులను పెంచువారు పశువు పొరినలేదీని జ్ఞాపకముంచుకొనిన మొదల అది ఈయన సరియైనదివఱకు ఆయనచూచి తెలిసికొనగలడు. 473, 474, 475, 476 పేజీలలో నున్న పట్టికలోని మొదటి వరుసలో తెలుపబడినవి పశువులు పొరిన లేదీని, వానికి వ్యతిరేకముగ నున్న రెండవవరుసలో నున్న లేదీలు అవి ఈయన కాలమును తెలుపులేదీని గ్రహించవలెను.

దీనికి ఉదాహరణము :— ఒకఆవు జనవరి 10 వ లేదీని పొరినమొదల అగోబరు 21 వ లేదీన ఈనును. జూన్ 16 వ లేదీన పొరినమొదల ఏప్రిల్ 8 వ లేదీన ఈనును.

ఈ పట్టికలో నేసిన లేదీలు సుమారుగ నేయబడినవి. ఈ చెప్పిన లేదీలకు కొద్ది వినములు ముందునెలలుగ ఈనును.

ప్ర న వ రంధ్ర మ ట్రి క

పశువు పొరిస లేడి	ఈనిస లేడి	పశువు పొరిస లేడి	ఈనిస లేడి	పశువు పొరిస లేడి	ఈనిస లేడి
జనవరి 1	అక్టో 12	ఫిబ్రవరి 1	నవం 12	మార్చి 1	డిశం 10
2	13	2	13	2	11
3	14	3	14	3	12
4	15	4	15	4	13
5	16	5	16	5	14
6	17	6	17	6	15
7	18	7	18	7	16
8	19	8	19	8	17
9	20	9	20	9	18
10	21	10	21	10	19
11	22	11	22	11	20
12	23	12	23	12	21
13	24	13	24	13	22
14	25	14	25	14	23
15	26	15	26	15	24
16	27	16	27	16	25
17	28	17	28	17	26
18	29	18	29	18	27
19	30	19	30	19	28
20	31	20	డిశం 1	20	29
21	నవం 1	21	2	21	30
22	2	22	3	22	31
23	3	23	4	23	జనవరి 1
24	4	24	5	24	2
25	5	25	6	25	3
26	6	26	7	26	4
27	7	27	8	27	5
28	8	28	9	28	6
29	9			29	7
30	10			30	8
31	11			31	9

ప్ర స వ కాల పట్టిక

పశువు పార్శ్వ లేడి	ఈవిసలేడి	పశువు పార్శ్వ లేడి	ఈవిసలేడి	పశువు పార్శ్వ లేడి	ఈవిసలేడి
వీసెయల్ 1	జెవరి 10	మే 1	ఫిబ్రల 9	హాన్ 1	మార్చి 12
2	11	2	10	2	13
3	12	3	11	3	14
4	13	4	12	4	15
5	14	5	13	5	16
6	15	6	14	6	17
7	16	7	15	7	18
8	17	8	16	8	19
9	18	9	17	9	20
10	19	10	18	10	21
11	20	11	19	11	22
12	21	12	20	12	23
13	22	13	21	13	24
14	23	14	22	14	25
15	24	15	23	15	26
16	25	16	24	16	27
17	26	17	25	17	28
18	27	18	26	18	29
19	28	19	27	19	30
20	29	20	28	20	31
21	30	21	మార్చి 1	21	ఏప్రిల్ 1
22	31	22	2	22	2
23	ఫిబ్రల 1	23	3	23	3
24	2	24	4	24	4
25	3	25	5	25	5
26	4	26	6	26	6
27	5	27	7	27	7
28	6	28	8	28	8
29	7	29	9	29	9
30	8	30	10	30	10
		31	11		

ప్రపంచపితృము.

పశువు పార్శ్వ లేడి	ఈవిసలేడి	పశువు పార్శ్వ లేడి	ఈవిసలేడి	పశువు పార్శ్వ లేడి	ఈవిసలేడి
కొర్రె 1	ఎక్కి 11	అమ్మ 1	మే 12	పెట్టిబరు 1	జూన్ 11
2	12	2	13	2	12
3	13	3	14	3	13
4	14	4	15	4	14
5	15	5	16	5	15
6	16	6	17	6	16
7	17	7	18	7	17
8	18	8	19	8	18
9	19	9	20	9	19
10	20	10	21	10	20
11	21	11	22	11	21
12	22	12	23	12	22
13	23	13	24	13	23
14	24	14	25	14	24
15	25	15	26	15	25
16	26	16	27	15	26
17	27	17	28	17	27
18	28	18	29	18	28
19	29	19	30	19	29
20	30	20	31	20	30
21	మే 1	21	జూన్ 1	21	కొర్రె 1
22	2	22	2	22	2
23	3	23	3	23	3
24	4	24	4	24	4
25	5	25	5	25	5
26	6	26	6	26	6
27	7	27	7	27	7
28	8	28	8	28	8
29	9	29	9	29	9
30	10	30	10	30	10
31	11	31	11		11

ప్ర న వ కాల పట్టిక.

పశువు పొరిస లేడి	శునివలేడి	పశువు పొరిస లేడి	శునివలేడి	పశువు పొరిస లేడి	శునివలేడి
అక్టోబరు 1	కార్తె 12	నవంబరు 1	ఆగస్టు 12	డిసెంబరు 1	నవంబరు 11
2	13	2	13	2	12
3	14	3	14	3	13
4	15	4	15	4	14
5	16	5	16	5	15
6	17	6	17	6	16
7	18	7	18	7	17
8	19	8	19	8	18
9	20	9	20	9	19
10	21	10	21	10	20
11	22	11	22	11	21
12	23	12	23	12	22
13	24	13	24	13	23
14	25	14	25	14	24
15	26	15	26	15	25
16	27	16	27	16	26
17	28	17	28	17	27
18	29	18	29	18	28
19	30	19	30	19	29
20	31	20	31	20	30
21	ఆగస్టు 1	21	నవంబరు 1	21	అక్టోబరు 1
22	2	22	2	22	2
23	3	23	3	23	3
24	4	24	4	24	4
25	5	25	5	25	5
26	6	26	6	26	6
27	7	27	7	27	7
28	8	28	8	28	8
29	9	29	9	29	9
30	10	30	10	30	10
31	11			31	11

గర్భములో పిండము పెరుగువిధము (Development of Foetus)

పశువు గర్భములో పిండోత్పత్తికి కావలసిన అవయవములు ఆకాగ్యవంతములుగా నుండి మార్గము లన్నియు అడ్డగింపులేక ధారాళముగా నుండి మగ పశువుయొక్క ఇంద్రియము చెడక మంచిసితిలో నుండి ఇట్టి మగ అడ పశువుల సుయోగము ఋతుకాలానుసరణమై సంభవించునెడల మగ అడపశువుల ఇంద్రియ మిశ్రమముచే పిండోత్పత్తి కలుగునని ఇదివరకే చెప్పియుంటిమి. పశువు గర్భము ధరించి నప్పటినుండి ఈ కాలమువరకు 7 భాగములుగా విభజింపవచ్చును.

మొదటిదశ (First Period)

పశువు గర్భముధరించిన తరువాత రెండవ వారమువరకు పిండము పొట్టలో నుండి గర్భాశయములోనికి వచ్చును. అప్పుడది ఒక అంగుళములో పన్నెండవ వంతు నడిమి కొలత గలిగి యుండును.

రెండవదశ (Second Period)

గర్భము ధరించిన మూడవ వారములో పిండముయొక్క మొదటి అక్షణములు కనపడును. శరీరము తల మొదలగు అవయవములు కొంచెము కొంచెముగా గుర్తుపట్టుటకు నీలగును. పిండము మూడవవంతు పరిమాణము గలదిగ యుండును.

మూడవదశ (Third Period)

అయిదు మొదలు ఎనిమిది వారములవరకు 12 అంగుళముల పిండము పెరుగును. ఈ కాలములో కాళ్ళడిక్కుయొక్క చిహ్నములు కనబడును.

నాలుగవదశ (Fourth Period)

తొమ్మిది మొదలు పన్నెండవవారము వరకు 15 అంగుళము పిండము పెరుగును. నాలుగు పొట్టులు కనబడును.

అయిదవదశ (Fifth Period)

15 మొదలు 20 వ వారము వరకు 12 అంగుళము పిండము పెరుగును. ఈ కాలములో స్పృశ్యకక్షిగల పెండ్లుకలు పెదవుల మీదను, పైకనురెప్పలమీదను, కను బొమలమీదను మొలచును. అడపిండమునకు చురు మొసలు వచ్చును.

పిండమును పోషించుట

గర్భము ధరించినది మొదలు ఎక్కువగా తవును, తొండంగి, పిల్లిపెరుర మున్నగు వాత వదార్థములు తినుచుండు పశువు శరీరమునందు వాతముకూడుకొని యుండును.

అనాథము శరీరమున నుండుచు గర్భాశయమున నొండును. అట్లు వాతము పెంపొందుట వలన అంగహీనము, గూని, తక్కువ నెలలుదూడ, ముప్పుగునవి గలుగుచుండును. ఇంకను తల్లియొక్క వాతము చూడవలూడ సంభవించి వాని జీవితము బాధించును.

గర్భస్థుడు చూడకు స్వాశక్తిత్యములేను. తల్లి నిమిషపాంశ పిండమునూడ నిమిష పోవును. మేలుకొనిన మేలుకొనును. కావున పిండము తల్లికి ఆధీనమైయుండును. గర్భాశయమునందు సంయోగము గలిగింది మొదలు ఆ గర్భాశయమునకు అవిరుదముల సరిగా వచ్చువరకు గర్భాశయములోనుండు పదార్థముల మూలమున నీ పిండు వృద్ధి బొందును. అవయవములు సరిగా వచ్చునున్నప్పుడు గర్భయియొక్క వాభియందు ఒక నన్నుని రంధ్రముగల నాడిట్లుబడి యుండును. ఆ నాడితో మాని చేర్చునగును. అమాని తల్లియొక్క రసాశయమును స్వాశయమందు జేర్చునగును. ఇట్లు జేయుటవలన వలన తల్లియొక్క ఆహారసముదాయము వలన శరీరమున ప్రవహించుచు మానిజేయును. ఆ మాని వలన చూడయొక్క వాభినాడిని పొందును. ఆ వాభివలన ఆరసము చూడయొక్క పక్వాశయమందుజేరి అచ్చట చూడయొక్క కాయాగ్నిచే పక్వముగాబడి కొద్ది భాతువులను పోషించును. ఇట్లు గర్భముండున్న సమయములో తల్లి ఆహారసముదాయముచేతనే గర్భము పోషింపబడుచుండును. పుట్టి తరువాత గూడ ఆ తల్లియొక్క ఆహార రసమే చన్నుల యందు స్వయమాపమున పరిణమించి పుట్టి చూడకు పోషించును. తల్లియొక్క రసవహ నాడి పిండముయొక్క వాభిగూడ గూర్చుబడింది. ఆ వాభినాడి రసవహనాడి యందు గూర్చుబడిన దగుటచే ఆ తల్లియొక్క ఆహారసారమును గ్రహించి దానివలన పిండమును పోషించును. గర్భముండున్న పిండము ప్రత్యేకముగ ఆహారపాపియముల నేరి చుక న్నచ్చు మగు ఆహారసారమైన శరీర పోషణము జరుగబడుచుండుట చే గర్భస్థ పిండమునకు మూలములము గలుగదని గ్రహించవలెను.

ఆరవదశ (Sixth Period)

21 మొదలు 22 వ వారము వరకు 2 అడుగుల పరిమాణముగల పిండము పెరుగును. ఈ కాలములో కనుకెప్పులు, కండ్రుకలు బాగుగా మెలకును. పిండము గర్భములో తిరుగుట తల్లి గుర్తించును.

అంత్యదశ (Last Period)

నిండుపిండము సంపూర్ణదశ నొందియుండును.

గర్భమున చూడ వృద్ధిజెందుట

చూడి పశువులు ఈయ సమయము వచ్చువరకు చాల కష్టపడుటయు, ఈనిన తరువాత శరీరయొక బాధపడుచుండుటనుకూడా సామాన్యశోగ్యవిధుల వలక్ష్యము చేయుటవలననే! గర్భము చాల్చినది మొగలు గర్భక్షేత్రమునందేగాక శరీరనిర్మాణ

కుంతయు విశేషమైన మార్పులు గలుగు చుండును. శరీరమున విశేషద్రవము లూరుచుండును. గర్భమున దూడ వృద్ధిచెందుచుండుటయు, గర్భము విస్తరించుటయు, అందువలన యితర అవయవములకు పక్షులుగలుగు చుండుటయు, గర్భపశువుయొక్క శరీర పోషణకే గాక గర్భక్షేత్రమునగల దూడపకూడ పోషించుకల ద్రవము లుత్పత్తికేయుటకును, పోషక పదార్థమునిచ్చుటకును, శరీరావయవములన్నియు నెక్కవపని చేయుచుండుటయు జరుగుచుండుటచే శరీరనిర్మాణమున చిత్రమైన మార్పులు గలుగుచుండును.

చివరమాసములలో జగ్రత్తగా చూడవలెను

గర్భమున పెరుగుచున్న దూడ మాతృశరీరమునుండియు పోషక పదార్థము నాకర్షించుకొని అట్టి పోషక పదార్థములను ఆహార రూపమున చూడింపజేయుట ఏర్పడగా తీసికొనవలసి ముందును. ఎముకలు, కండరములును నిర్మింపబడు లక్షణములు కొనసాగియుండును. ఈ లక్షణములు లేని లోపములవలన ఎన్నియో న్యాధులు పుట్టుచుండును. గర్భము క్రమముగా విస్తరించుచు కొలదిని నాడేను కలయున కెక్కిన శ్రమగలుగుచుండును. కరములు బలహీనమగు చుండును. చూడి పశువుల కొన్ని ఆఖరుమాసమున చాల బాధపడుచుండును. ఈయట ఆ గర్భముగురున్నపుడు గర్భముక్రిందికి జారును. ఇట్టి సమయములందు తగిన చికిత్సలు చేయవలెను.

చూడిలోవచ్చు రోగములు

కడుపులో వాయువుచేరుట


చూడిపశువు కడుపులో వాయువు చేరి డొక్క లుబ్బి యుండును. జీర్ణముకాని పదార్థములు తినుటవలనను, పిండమునకు వీలైన ఆహారము కలుగుటవలనను ఈవ్యాధి రావచ్చును. ఇంకను పేగులయందు జీర్ణశక్తి క్షీణించుటచేత కూడ వాయువు ప్రసరించి కడుపునొప్పి, కూలనొప్పి, కడుపుబ్బరము కలుగును. ఇట్టి సమయములో నేడిసిటిలో ఎరిమాచేయుట మంచిది. లేక ఆముదము అర్ధనీరు త్రాగించిన నెమ్మదించును. కాని విషసంబంధమైన మందు లేమియు పోయరాదు. వైపులమున చూపించిన పశువు జీర్ణకోశమును చూడుదు.

మలబద్ధకము

ఇది సాధారణముగా పశువులలో చాల భాగము ఎఱుంగును. ఈవ్యాధి చూడి పశువులకు పలుమారు వచ్చుచుండును. పశువు తినిన ఆహారము నెరిగా జీర్ణమై పేదగరిగా వేరుపలెను. అట్లు పేద వేయనిచో అనేక న్యాధులు పుట్టును. లోపల పేదలోని మురికి పదార్థములు పేరుకొని తదితర న్యాధులు పుట్టిండును. ఇంకను అవయవముల

నెద్దివాడు పడుచువాడు మామతోనెగూడిరేని విచమితిలేక వానవచ్చును.

యందలి బలమునుకూడ తగ్గించును. మలబద్ధకమువలననే చూడిపశువులకు కడుపుకొప్పి, రక్తకూల గర్భకూల ముష్టిగు వ్యాధులు జనించును. కాబట్టి దీనికి చెప్పిన చికిత్సలు మంచిది.



చికిత్స

చారమునకు రెండు పర్యాయములు అర్ధసేరు ఆముదము నిచ్చుట మంచిది.

లేక వామ అరసోరెను, ఉప్పు 2 రు, వడివీరు అర్ధసేరు కలిపి త్రాగించుట మంచిది.

విరేచనములు

చూలు కట్టినది లగాయతు ఈయవరకు కొన్ని పశువులకు పలుచని విరేచనము అగుచుండును. ఈ విరేచనములు దుర్వాసనగా నుండును. ఇట్లు ఎల్లప్పుడగుచుండు పశువునకు గర్భపాతము కలుగును. కాబట్టి ఆగుంభములోనే తగినచికిత్స చేయుట మంచిది. ఈ విరేచనములతో కడుపుకొప్పికూడ యుగడవచ్చును.

మూచికాయలపాడి 1 రు, పోక చెక్కలపాడి 1 రు, పచ్చినేరేడు చెక్కరసము 15 రు, కలిపి దిసమున కొకసారిపాతము నాలుగైదు దిసములు త్రాగించవలెను.

లేక దానిమ్మ చిగుళ్లు 2 గుప్పెళ్లు పెరుగు అర్ధసేరు కలిపి త్రొక్కి పెట్టవచ్చును. పై మోతాదు దిసమునకు రెండు పర్యాయముల వంతున నియవచ్చును.

గుడ్డివాడు పెడ్డివాడు నామతో పెగుడిరేని వింపమింతిలేక వానవచ్చును.

వారము

ఈ వ్యాధి వారశరీరముగల పశువులకు సోకును. విశేషముగా ఎండలలో తిరుగుట వలనను, యొల్లప్పుడు లేచునెలలో పండుకొనుట వలనను, లేక మలబద్ధమువలనను, చూచి కాకమునుత్ర ఎక్కువగా తవుకు మేవుటవలనను, ఈ వ్యాధి రావచ్చును. నోటి వెంట చొంగపడును. నోరు దుర్వాసనగా నుండును. చెవులు త్రేలాడవేయును. శరీరము అంత బడిగా నుండదు. పేడ వేయజాలదు.

చికిత్స

వాము అరసోలెకు, శిప్ప వేలెకు, కలిపి ప్రొక్కి అర్ధసేరు వేడినీటిలో కలిపి త్రాగించవలెను.

లేక కొంతిపాడి 1 తులము, పిప్పళ్ళుపాడి 1 తులము, మిరియాలుపాడి 1 తులము, వేడినీరు అర్ధసేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

షరా:— పశువులకు మంచి ఆముదము కాచి గోరువెచ్చనిది రాయవలెను.

రొమ్మునొప్పి

వారశరీరముగల పశువులకును, బలహీనముగానున్న పశువులకును గర్భకాలమున యందు రొమ్మునొప్పి కనబడును. ఈ నొప్పిచే పశువు చన్నులలో యేకో ఒకదానినిబాద గడ్డలేచును. అగడ్డ పొడుగువరకు వ్యాపించి చాల బాధవేయును.

చికిత్స

ఆముదము అర్ధసేరు త్రాగించవలెను. తరువాత ఆ గడ్డకు టింక్చర్ అయోడిన్ రాయుము.

లేక వెన్నపూస 3 తులములు, వెలిగారము 1 తులము కలిపి చంటిగడ్డకు రాయవలెను.

తరువాత ప్రతిదినము ఇనుకగాని పప్పుగాని వేయించి గుడ్డలో వేసి ఆ గడ్డకు కావులు కాచి కన్నును. ఈప్రకారము ప్రతిదినము తగ్గవరకు చేయవచ్చును.

తీగలు వేయుట.

పశువు కటినుండి చీమిడివంటి తీగలు పడుచుండును. ఆ పానము మిక్కిలివేడిగా నుండును. పశువునకు వేడిచేసివపుడెల్ల నీతీగలు పడుచుండును. వారశరీరమున్న పశువులకు ఈ తీగలు తరచుగా పడుచుండును.

చికిత్స

పటిక లోపన్తో పశువుకంటి కడుగుటనుంచిది. 1 తులము ఇంగువ వేడినీటిలో కలిపి త్రాగించవలెను.

పశువు ఈనుట

ఈనుటకు ముందు నొప్పులు వచ్చును. పశువు కాంతముగా నుండలేదు. బాధ పడుచున్నట్లు కదలుచుచును. పిండము తరచుగా మార్గము తప్పుటవలన కారణ మేము:— సకాలమునకు ముగ్గు ప్రసవి చుటయే కాక, పక్షివిచు నొప్పులవలననే గాక, దూడ ఉన్నటువంటి స్థానమును బట్టివాడయ్యుచును. పశువు ఈనుటను సరియైన కారణములు బాగుగా తెలియవు. పిండము క్రమక్రమముగా వృద్ధిచూచుకొలదియోనియ నున్నది క్రమక్రమముగా మార్పులు కలిగి పిండము బయటకు వచ్చుటను పిలువవలయు వృద్ధి పొందును.

పిండము వృద్ధిచూచుకొలదిని తల్లికడుపునూడి మాడకడుపునకు గిక్కు మొదలగు సవి ప్రకారములు తెలిపావును. ఇకను వృద్ధిపొందినకొలది తల్లికడరముతో సంబంధముండక దూడ విడిగా నుండును.

దూడ బయటకువచ్చుటకు కారణములు.

పశువు యోనిభాగము నుండు కణ్వములు, నరములు మొదలగు వానియొక్క ఒత్తిడిచేత దూడ బయటికి వచ్చును. ఈ కణ్వములే ఆ యోనిభాగములకు ముడుచుకొనుకట్లును, విడిపోవుకట్లును చేయును. ఆగర్భణశము ముడుచుకొని పోవునపుడు నొప్పులు తిప్పుకొనవచ్చును. దానికి కారణము సరములయొక్క ఒత్తిడియే యెయున్నది. ఇవి నరములు ఒత్తిడిచేయుటవలన కలుగు నొప్పులుగావు వీరిని కష్టపునొప్పులందురు. గర్భాశయము ఒకటి రెండు సార్లు ముడుచుకొని బాధపడిన త మాత్రముననే పిండము బయటకు రాక అనేక పర్యాయములు ముడుచుకొని విడిపోయిన తరువాత దూడ బయటకు వచ్చును. ముడుచుకొనుట, విడిపోవుట మొదలిడినప్పుడు పశువు మిక్కిలి బలహీనముగా నుండి నెమ్మది నెమ్మదిగా ముడుచుకొనుట సంగభవింపను. మొదట బలహీనతకెంది క్రమేణ వృద్ధిచూచు తుంపు తెగిపోయి దూడ పడిపోవును. ఈ సకాలము సమీపించుకొలది యోనిభాగము, పిండము విడిపోవును.

గర్భాశయము ఎక్కడగా ముడుచుకొనును ఆలవ్యము మాత్రము తక్కువగుచుండును. ఈ సదృశమృత్యు కలుగు ఆలవ్యములో కెల్లికిని - లోపలనుండు దూడకును కలుగు నష్టములను తీర్చుకొనుటకు వీలుపడును. అట్లు వీలుపడుచు, ముడుచుకొనుటవలన పిండము బయటకు ఆతిసులభముగా మార్గమును వెలువరింపబడును. సక్రమముగా వచ్చు బాధ

గురుయనులో గర్భాశయము గర్భాంగముగా ముడుచుకొని పోవును. దూడయొక్క రతి ఉచ్చబుద్ధిగా నున్నపుడు ఒక్కొక్కననుచుమందు బయటకు పడవియును. లోపలపలగు శక్తియే బయటకు ప్రోయశక్తికింటె యెక్కువగును. పిండమును చుట్టుకొని యుండు పొరలు బయటకు వచ్చునపుడు గుడ్డముగ నుండు యోనియొక్క చుట్టుభాగమందు కనబడును. పడనోయబడినటువంటి ద్రవముతో కూడువలసిన టి యోనిండ్లగుండు ఒకవిధమైన కాయ (ఉబ్బు) లేక ఉచ్చబుద్ధిహీన ఆశయములగు మిక్కిలి భాగము కలిగించును. కొని మడుచుకొనుట మూని సమయములందు మాత్రమని పగులై అంత భాగకలముగా నుండెను. మాడుచుకొనుట యెక్కువైకొలది పొలు బయటకు వచ్చుట ప్రారంభియును. అప్పుడే కొన్ని ద్రవసములు వానిగుండి వెలుపడిపోవురు. అట్లు నేల వడికమందు కొంతభాగమును యోనిభాగమందు పడిపెట్టును. ఆరసము, గూడ బయటకు పోవునపుడు సక్కుండకముగా పోవుటకు సహాయము చేయును. ఈ పొలులకుక మందుగా పడినపెడల పిండ్లసప్తకడి ఆపొడు ప్రసవము కష్టకైమై మిక్కిలి అలస్యమై ఒక్కొక్కప్పుడు చూడవలసిన అపాయకరముగ కూడ తోచును.

ఈనులక్షణములు - చలనములు

ఈనునప్పుడు పట్టుకొలము నాలుగ భాగములుగా విభజించ వచ్చును.

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| (1) ప్రాసంభవ | (3) పిండము బయటపడుట |
| (2) యోనిభాగ మబ్బుట | (4) పొరులు (మాని) బయటపడుట |

ఈనునప్పుడు పరిస్థితులు

పశువు ఈనుటవముందు విశాలమైన సముదాయముగాని, గాలివచ్చు పశుశాలగదిలో గాని యుంచవలెను. ఆ గది విశాలముగను, లేను లేనిదిగను, నున్నయు కొట్టికగోడలు గలదిగను ఉండవలెను. పశువు ఈనునప్పుడు యజమాని, నౌకరు బాగ్రత్తగా చూచుచుండవలెను. పశువు ఆగోగ్యముగా నున్నచో నొప్పులు ఆగిపో చునే యోనినూర్చునుండి తీగలు, ద్రవము వెలువడుచుండును. గర్భాశయద్వారమున దలి గోళములలో ఉండిన కొంతద్రవము యోని ద్వారమునందు రిక్కుక నూళ్ళుజీవులు విస్తారముగానుండును గాన పానికరములగు వ్యాధులకు కలిగించు క్రిములు గర్భాశయమునకు ప్రవేశింపకండ పిండ్లు; నూళ్ళుజీవులు చానిని నిరోధించుచుండును.

పశువు ఈనుసమయములో గర్భాశయము చాల ప్రమాదములకు గురిమై యుండును. గాన అట్టి అపాయనితీలో పక్షక్రిములు దానిలో ప్రవేశించుటచేయుటకు రిగిన యేర్పాటులు సృష్టికర్త అమర్చియున్నాడు.

వైద్యునిదగ్గర నుండవలసిన పనిముట్లు

చికిత్సచేయు వైద్యునియొద్ద సైతస్కోపు (కబ్బవేణు), ఒక కత్తెర, ఎలకూడకాపు, పొటాషియం పర్మాంగనేట్ తేలికలోపన్, ఒక తుండుగుడ్డ, సబ్బురీళ్ళ, ఫిన్లెల్ మున్నగు వస్తువు లుండవలెను. పశువున కేమైన అపాయములు సంభవించినయెడల వానికి తగిన సామగ్రి తన వాడగుతో తెప్పించిగాని, తాను తెచ్చిగాని తగిన చికిత్స చేయవలెను. వైద్యులకు మట్టలాగు, సగము చేతులుగలచొక్కా, కాళ్ళకు బూటులుండుట మంచిది. అట్లు లేనిచో పశువునకు చికిత్స చేయునప్పుడు తేలికర దున్నులు అడ్డమువచ్చును గాన అట్టి సమయములో తగిన దున్నులుండుటయే మంచిది.

పనిముట్లను, చేతులను శుభ్రముగా నుంచుకొనవలెను.

అయుధములతో పని చేయవలసినప్పుడు వేడిపిటిలో వేసి కాచియుంచవలెను. పశువు ఈనిన తరువాత చూడయొక్క కాళ్ళగోళను శీయుటకు నిద్రముగా నుండవలెను. ఆ వైద్యునియొక్క గోళయం దేమాత్రము మెలిక ముండరాదు. తరువాత నెప్పటి కప్పుడు చేతులను లోపన్ పిటితో కడుగుకొనవలెను. ఇంకను చికిత్సచేయు వైద్యునిచేతులు ముడిగా నుండరాదు యోనియందలి విషద్రవ్యములు వైద్యుని చేతులకు గాని, ఉపకరణములకుగాని అట్లుకొని యుండినను వ్యాధి కలిగించు నూర్పు చేవులు యోనియందు ప్రవేశించుట కవకాశము కలదు. గాన చేతులను శుభ్రముగా నుంచుకొనవలెను.

చూడబొడ్డును బాగ్రత్రగా చూడవలెను.

పశువు ఈనుట పూర్తియైన తరువాత ఆ స్థలమునకు వక్కులనుగాని, కాకులను గాని రానియనుండ బాగ్రత్రగా చూచుచుండవలయును. ఈగలను, దోమలను అచ్చట చూగనియనుండ ఫిన్లెల్లోపన్ చల్లుట ముంచిది. చూడబొడ్డును కాకులు ముట్టకుండ చాల బాగ్రత్రగా కాపాడవలెను. ఈనిన తరువాత పశువుకంటే వెంటడివచ్చు రక్తపు తీగలను కాకులు పొడిచి పెద్దపుండు చేయును. అట్లు పొడుచుటచే పుండులో పురుగులుకడి పశువున కపాయము సంభవించును.

చూడవుట్టిన తక్షణమే అది తుసిరి విడుచునట్లు కాని ముట్కును, నోతును తుడువ వలెను. అట్లు చేసినతరువాత చూడ అంప వారంబించును.

ప్రారంభ దశ

ఈనుటకు కొన్నిగంటలకాలము పట్టును. ఒక్కొక్కప్పుడు సరిగా ఈనవలసిన కాలమునకు కొన్ని దినములు అంశ్యముగా ఈనును. ఈనినతరువాత చచ్చులు ఒకరిక

దూరం గుడి కట్టిలే దగ్గరవాన, దగ్గర గుడి కట్టిలే దూరంవాన.

కుగ ద్రవము నిచ్చును. క్రమక్రమముగా ఆ ద్రవమే ప్రారంభదశలో పాలుగా మారును. యోనిభాగము దొల్లభాగముగా ఏర్పడును. భారీ యెక్కువగా కనపడును. మృదువుగా గూడ నుండును. దాని లోపలిభాగముననుండు పొర ఎఱుబడును. ఆ ఎరువుదల నొందిన భాగమును ఒకవిధమున బంకవంటి ద్రవపదార్థము కప్పితమును. ఈ మార్పులతో ఉదరము మిక్కిలి వ్రేలాడి అంటుకొనిపోవును.

ఈనకముందు జంతువు మిక్కిలి కష్టముగాను, నెమ్మదిగాను నడచును. అది రచ్చి గడ్డి మేయుచున్న యెడల యెక్కువగా కొన్ని కొన్ని నిమిషము లాగుచుండును. దాని కారణము యోనిభాగము ముగుమకొనుచుండుటయే. అట్టి సమయములందు అనైన యెడల అరచును. ఇంకను పశువును కట్టివేయక స్వతంత్రముగా వదలిపెట్టినయెడల దూరముగా పోయి కాంక్షముగా నుండు స్థలమును చూచుకొని ఆచట తీసుటకు ప్రయత్నించును. ఇవియే సాధారణముగా తీసుకొన్నయెప్పుడు యున్నచో ఒక్కొక్కప్పుడు విమోచితులగు కొన్నిదినములు కొన్ని గంటలుగూడ గడచి తీసును. ఇట్టి ప్రసవవేదనలు తీసెడి దినమునకు కొన్ని వారములు ముందుగనే కనబడును.

యోనిభాగ ముబ్బుట

పశువు దీనిని మొదటిదానియంత స్పష్టముగా తెలిసికొనలేదు. జంతువు బాధపడుట చూచి దీనిని కనిపెట్టవచ్చును. గురులే మన కాలిలో మట్టి గీసను. మాటిమాటికి పశువు పండుకొనుచు లేచుచుండును. ఏమియు తెలియనిదానివలె అటునిటు చూచుచుండును. యోనిభాగము చూచుచుకొనుట సక్రమముగా మొదలుపెట్టి పైసచెప్పిన పనులను వాతాత్మకంగా తగవు అనినీయును. చూచుచుకొనుటవలన గలుగు బాధచే నిశ్చిన్తురాలై పోవును. దానికన్నులు దాని బాధను కనపరచును. శరీరము వేడిగానుండును. కాడి ర్వరగా కొట్టుకొనును. పొట్ట పైభాగము (కడుపు) ముగుచుకొనిపోవును. సామాన్యముగా మూత్రముగూడ బాగుగా పడదు. కొంచెము కొంచెముగ పోయును. ఈ కష్టసమయమందు యోనిభాగమును పరీక్షించినయెడల దానియొక్క లోపలిభాగము చుట్టు గట్టిగా నుండును. బాధ తగ్గివచ్చును కాంతి నెలకొనును. ఒక్కసారి వచ్చిన బాధ కొన్ని పెకండ్లు మాత్రమే యుండును. ఒక్కొక్కసారి రెండుమూడు నిమిషములుగూడ నుండును. నొప్పులు ప్రారంభమైన తరువాత 15 నిమిషములకు దూడ తల కాళ్ళు మొదలగు ఆవయవములయొక్క క్రిందిభాగములు తలతో ముందుకు వచ్చును. తరువాత రొమ్ముభాగము బయటకువచ్చును. మొదట నెమ్మదిగా ఆ యోనిభాగ ముబ్బును. దూడ వెనుకభాగమునుండి వచ్చునపుడు యెక్కువగా ఆ యోనిభాగముబ్బును. దూడ కాలు, తల ముందునకు వచ్చినపుడును లేక మొదలయెత్తుగా నుండునపుడును గూడ ఉబ్బును. దూడ ఉచ్చుబుడ్డ బయటకు రాగానే యోని భాగము క్రమముగా నుచ్చి

ఈనాడు, ఒక్కొక్క దూడను పెట్టి సశుభ్రపథ కవలకూడల గగ్గోన్నావపును ఒక్కొక్క
 పిండము ఒక్కొక్క సంవిలో నివసించును. రెండుపిండములు ఒకేపరిమాణము కలిగి
 యుండును.

ఫిండముందు చోటు


పిండము లెప్పుడుగ నామావ్యయముగా ముంగుభాగములూనే ముంగుగు. అప్పుడప్పుడు కొంచెము వెనుకగా ముగ్గురు కుటకూడ తలని దురుచును. ఇట్లే సమయములందు ఒకే మాడను ఈయనమునందుకంటె రెండే మాడలను ఈయనము బహుకర్తమైయుండును. తొంభైభాగము ముడుదుకొనుట పిండము నామావ్యయముట నొకేసారి జరుగును. ఏ మాడను కొంచె మెక్కువగ ముకుమొనురు కుటకూడనుకో దానిని వెంటనే పశువు ఈయన. రెండవపిండము నామావ్యయముగా వెనుకగా ఒకకన్న రెండుగంటలకాలము ప్కొనుటవచ్చును గర్భాశయము ముత సకొను నొక మక్కిలి శక్తిగలవై యుండును తైత్తిర్యమితి వెనుకన, గర్భాశయవ్యామిషము పచ్చగా తన చేతని దూర్చియుంచిన ఈయనయందు గు పిండము ముడుదుకొనుట, కుటకూడ నెప్పుదిగా కలుగును. తల్లియొక్క శక్తిశక్తి కొంచెము సంబంధము తిమ్మతైత్తిరుండును. యోనియొద్ద ఎముక ప్కొట్టిగా ఉట్టినతరువాత సకలవిధ కిండములు నొకసారి గర్భాశయములూ నున్న మాడను బయటికి ప్రోయ ప్రయత్నించును. ఈ ధ్యమగ నే మునపురు అని రొమ్మెముకవద్ద నుండు కుడములచేతను, పశువు వెనుకభాగమున నుండు కిండములచేతను సహాయము చేయుచుండును.

దూడ | కిందబడుట

ఈ సీతీల్ బాధలు అతివేషముగను, అతిశయముగను, వచ్చును. రాక్షసులను
మడుచుకొనటలకూడ ఎక్కువవును. అదేమయులందు రొమ్మునకు పొట్టను నడుమ
నుండు చక్కము, ఉదరములలో కడవములును కదలుటకు, లేక మునిగకొనుటకు,
ప్రారంభించును. పశువు నిలుచుండినయెడల దారియొక్క అవయవముల పల్కిటిని
నడుమక్రిందకు తెచ్చుకొనును. నడుమును వంచును. తోక పైకెత్తును. పరిమాపును
చూచును. పశువు కొండనాలుకను ముడుచుకొనును. సాధ్యమైవలెనని తలచి లోపలి
భాగమునకు ఒత్తిడిగలిగించి చూడచు యోనిభాగములలోనికి వచ్చుటలు గావించుకొను
ముడుచుకొనినపుడు ప్రతిసారియు శచ్చిబుడ్డు గా రాక్షసులములనుండి కొంచెం కొంచెము
క్రిందకు దిగుచు యోనిభాగము ఒలుబువవచ్చి తిత్తలెకనవచ్చును. పిమ్మట
యోనిభాగమునుండి శచ్చిబుడ్డు పూర్తిగా బయటకు వచ్చును. దారియొక్క లోపలి
మరికిపదారమంతయును కొంతదూరము వచ్చును. తరువాత చూడయొక్క రొమ్ముభాగము
మొదలగునవి బయటకు వచ్చునపుడు యోనిభాగమునుండి శచ్చిబుడ్డు చూపును. అడ్డము
లేకుండి నుండునట్లు పూర్తిగా కడివోవును. ఇవి జరుగుటకు ముందే చూచి పైభాగమున
నున్న పొరలు పగిలిపోవును.

ముందు కాళ్లుతల వచ్చుట

మొట్టమొదట మాడయొక్క ముందుకాళ్లును, ఆ భాగమున నుండు కండరప్రజ్వలములును బయటపడవచ్చును. అప్పుడే యోనిభాగ మిందు మిందుగ పెదదగుచుండును.



పెద్దపెద్ద బియ్యమును పాడములు ముందు వచ్చి కండ భాగము మాత్రము తరువాత బయటపడవచ్చును. మాంసభక్షక జంతువుల విషయములో తల పెద్దదగుటచే ముందు

కొర్రె మొదలి ఉరిమినా కొర్రె మొదలి ఉరిమినా చెప్పితిమి.

వచ్చును. తరువాత ముందుభాగపు అవయవములు రొమ్ముక్రిందుగా నతుర్చబడి లైటుట వచ్చును. ఒక్కొక్కప్పుడు అరుదుగా దూడయొక్క వెనుకభాగము బయటపడు సమయములలో రెండు వెనుకకాళ్లు ముందు కనపడును. తరువాత తదితర అవయవము లన్నియు బయటప వచ్చును. సామాన్యముగా యోనినుండి దూడతల బయటప వచ్చి నపుడు తరువాత భాగము రాక కొంచెమాగును. ఎందుచేతననగా తలతరువాత భాగము మిక్కిలి లావై యుండుటచేత అది బయటప వచ్చుటకు యోనిభాగ మింకను ఎక్కువగ ఉబ్బవలసిన అవసర ముండుటవలన, అట్లు ఉబ్బుటకు వీలు గలుగుటకు కొంత ఆలస్యమగును. తల బయటప వచ్చిన తరువాత రొమ్ముభాగములును, భుజములును, పార్శ్వికదుభు లోపలవరకు వచ్చును. అందుచేత నప్పుడు పశువుయొక్క ఆ భాగము మిక్కిలి లావుగ ఉబ్బరముగ కనబడును. అప్పుడే ముడుచుకొనుటలు ఎక్కువగను, అతి బలీయముగను కలుగుచుండి తరువాత దూడ ఒక్కసారి బయటికి బడును. ఆసమయం దిదివరకున్న బాధ ఎక్కువగును. ఒక్క వీలి అటువంటి సమయములందు అరచును. రొమ్మునకు తరువాత భాగము బయటప వచ్చుటకు కొంచెము సులభముగనే యుండును.

ఈనిన వెంటనే పశువుచేయువని

అన్ని పశువులు నోకేవిధమగు స్థితిలో ఈనబాలవు. గుట్టము, ఆవు, గొట్టె మొదల అనునవి సామాన్యముగా నిలబడియు ఈనును. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆవు పరుండి ఈన సమయములో నిలబడుటకు ప్రయత్నించును. పశువు అట్లు నిలుచున్నపుడు వెన్నెముకపై అధారపడుచు శరీర మంతయు ప్రక్కకు వంచి శరీరపుముందుభాగపు అవయవములను రొమ్ముక్రింది ప్రక్కకు లాగుకొనుచు వెనుకకాళ్లు పొట్టక్రిందకు లాగుకొనుచు నుండును అట్లు చేయుచు చాలకష్టపడుచు మిక్కిలి శ్రమనొందిన తరువాత చాల నెమ్మదిగా నిల బడును. దూడక్రింద పడగనే, తలి దూడమీదనుండు పొరలను దీసివేసి బొడ్డుత్రాటిని నాకి తీసినయును. దాని నాలుకతో దూడయొక్క శరీరమును శుభ్రపరచును. దూడను సరియైనస్థితిలో నుంచి తనచన్నులయొద్దకు దానిని మూతితో నెట్టును. తరువాత దూడను పాలు త్రడుపుకొనును.

ప్రసవకాలము - బొడ్డుత్రాడు

ప్రసవతేదన కాలము అనేకవిధములుగా పశువుల సాంప్రదాయమునుబట్టియు, అయాసమయమునుబట్టియు, పరిస్థితులనుబట్టియు నుండును. ఆవు ఒకగంట లగాయకు రెండుగంటలలో ఈనుట పూర్తయగును. ఒక్కొక్కసారి 15 నిమిషములలోనే జరు గును. ఒక్కొక్కసారి ఒకటి రెండు దినములవరకు జరుగును. ఆవుదూడ బొడ్డుత్రాడు మిగుల కురచగ నుండును. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ బొడ్డుత్రాడు దూడ క్రిందపడకమునుపే పశువుయొక్క యోనిభాగములోనే తెగిపోవును. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆబొడ్డుత్రాడు గట్టి

వచ్చును. యోనియొక్క లోపలిభాగము వెంటనే ముడుచుకొనను. ఇంక నా భాగములో నుండు ఎముకలు కొన్ని దినములలో ముడుచుకొని పోవును.

మే యి ది గు ట

చూడిపశువును సరిగా మేపకుండుటవలనను, దుగ్బలత్వమువలనను, వాతరోగము వలనను, అరికావలనను ఈ మేయి కనపడుచుండును. ఇది చాల ప్రమాదకరమైనది. ఈ మేయిలో అనేకరకములు గలవు. చూడిపశువులకు ఈ మేయి కనపడగానే చాల అందోళనపడుచుండురు. ఈ మేయి దిగిన చూడిపశువునకు చికిత్స లెంతమాత్రము చేయరాదు. చికిత్సలు చేయవలెనని కొరికయున్నచో మీ తాలూకా వెటరినరీడ్వారు గారిని కనుగొనుదు. కాని తెలిసి తెలియని వైద్యము చేయరాదు. అట్లుచేసిన పిండము నకు ఆపాయము కలుగును. ఈ మేయి ఈవిసరయవాత కొన్ని పశువులకు కనబడును. మరికొన్నిటికి చూలుగానే తలపించును. కాని పశువు ఈయటవలనను ఈ మేయి అటంకము కలిగించి పశువున కపాయము సంభవించును. ముక్కుచుండును. ఇంకను భరింపరాని నొప్పులుకూడ నుండును. కాబట్టి అది యేహతిలో చేరినదో తెలిసికొని తగిన చికిత్స చేయవలెను.

గ రి మే యి

మనము గడ్డికొయు కొడవలికమ్మ (గరకు) యేమాదిరిగనుండునో ఆమాదిరిగానే ఈ గరిమేయి యుండును.

సొ ర మే యి

ఇది సొరకాయ ఆకారముగ నుండును. ఈ మేయికి మధ్యగాగాని, ఒకప్రక్క నుండిగాని ఒక మొర్రని జోయుండును. ఈ జీరగలభాగము పశువు దెన్నెముకకు తిన్నగానుంది లోపలికి పోయవలెను. లేనిచో మరల వెంటనే ారును.

గు ం డ్ర మే యి

ఇది కొబ్బరికాయ ఆకారముగ నుండును. దీనికిని సొరమేయివలె జరయుండును. ప్రతిభముగానే చికిత్స చేయవలెను.

బల్లి ఆకారపు మేయి

ఇది బల్లిఆకారముగా నుండును. ఇంకను పససమేయి, మిడిమేయి మొదలగు నవి గలవని అయుర్వేద పశువైద్యులు చెప్పుదురు. ఇటువంటివి తలపించినప్పుడు అనుభవముగల వైద్యునితో జాగ్రత్తగా తగిన చికిత్సలు చేయించవలెను.

చి త్ర

మేయిని స్వస్థానమునకు త్రోసి నీసా దూర్చి కట్టుకట్టువలెను. చూడుచాలుగు దినములుంచి తీసివేయవలెను.

లేక ఏటవాలుగా నేల త్రవ్వి అగోరి పైభాగమున పశువుమేయి దిగినభాగ మున్ను, రంధ్రింది భాగమునకు నుండవలెను. ముందు మేయి స్వస్థానములో త్రోసి అపశువు నట్లే కొన్నిదినము లుంచవలెను.

లేక ముందు నందివర్ణపశువులు తెచ్చి గిడ్డెకు రసము తీసి అమేయికి రాచి సరియైన స్థానములో నుంచవలెను. నందివర్ణ రసములో నీరులాగినేయు శక్తియున్నది. అమేయి మరి కొన్నిగంటలలోగాని, కొన్నిదినములలోగాని మరల కడువడవచ్చును. అప్పుడు మేయిని త్రోసివేసి బడలు చెక్కి మానమునకు కట్టిన మరలరాదు. తరువాత ఒకటిరెండు దినములకు బడలు తీయవచ్చును. కొందరు మేయిని త్రోసివేసి మానమున కట్టుదురు. ఇదిచాలా మూర్ఖత్వపు పని - మంచి ఫలధిరకాదు.

మేయిత్రోసివేసిన తరువాత

పశువుమ్మాకు పసురు అర్పిస్తేడు, పాలు అర్పిస్తేడు, ఇంగువ 1 కులము కలిపి చానిలో ఏర్పగా త్రోసి ఒక కంకరరాయి చేసి మజిలీ తీసి త్రాగించవలెను. అంతకు నొప్పులు తగ్గినచో 3 ద్రామల సారాయి లోపలికి త్రాగించుము.

మావిపడకుండుట

పశువు ఈదుకొని పోవునప్పుడును, చాలినేపు నొప్పులు పడి యూనినప్పుడును నీరసస్థితిలో నుండి చాలినంత బలము లేకుండుట వలనకు, బలములేని మురి పశువు లకును, గర్భిణిత్రి ముడుకుకొని పోవుట వలనకు, గర్భిణిత్రిజ్వరములలో బలహీనత వలనకు మావిక్రింద పడక నిలిచిపోవును. పశువు మానమునుండి మావి కొద్దిగా వ్రేలా డును. కాళ్ళు నేలమీద కొట్టుకొనుదురును. తోక ఆడించుదురును. ముక్కుడుం డును. మావి నిలువమున్న మెడల క్రుశ్చి దుర్వ్యాసన వేయును. వెతుకభాగము పైకి లేపలేదు. సరిగా పశువు నిలుకుండలేదు. కనుగుంటలు విడుదును. ఈగలు మానము కుట్టు ముసురును. మానమువెంబడి కుప్పు పడుచుండును. మావి కుళ్ళుటవలన శరీరమున కిమిరబాధ కలుగును. ఈ చెడిపోయినదియు, క్రుశ్చివదియునగు మావియొక్క సారము శరీరమందు ప్రవేశించి నెత్తురును చెరచును. అందువలన జ్వరము, గడ్డలు లేకుట మున్నగు వ్యాధులు సంభవించును. జ్వరము తగిలిన తరువాత చాలుకయందు లేమ యుండదు. పాలుండవు. కల్పవృక్షము నిలిచిపోయి మిగుల బలహీనముగా నుండును.

చి క ర్మ

పశువు తొలిసారి తరువాత కొంతకాలము పరవ మూచిపడనప్పుడు తగిన చికిత్స చేయవలెను. అయినను 24 గంటలవరకు లేక అంతకన్న కొంచె మాలస్యముగా కూడ ఏ దుర్గుణము లేకయే మాచి పడుట పశువులలో కలదు.

1½ దినము కంటె మాచి నిలువయున్నయెడల నువ్వులు అర్ధశేరు, చేదీసెరు నేరు కలిసి త్రొక్కి త్రాగించినచో అది క్రి.దపడును.

లేక తాడికాయలు 9 కు, మంచిబెల్లం 10 తులములు కలిపి పెట్టవలెను.

లేక పులిసిచల్లలో కందనూరి కలిపి పెట్టవలెను.

లేక ఉడకబెట్టిన సజ్జసిండి 1½ శేరు, మంచిబెల్లము అరశా కలిపి త్రొక్కి పెట్టవలెను.

లేక పెండకాయలు 15 లేక 25, నువ్వులు 10 తులములు, పరిగంజ నేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

పై వస్తువులను గుర్రముక మాచి ప్రశ్న గుర్వారూప చేయుచున్నయెడల ఆము కము అర్ధశేరు త్రాగించినచో పడిపోవును.


మాచిని తీసివేయుట

పశువు యోనిద్వారమున చేయి జొరపి మెల్లగా గిర్బలిత్తిలోనికి పోనిచ్చి మాచిని పట్టుకొని బయటకు తీసికొనిరావలయును. చెయ్యి లోనికి పోయినందున గిర్బలిత్తికి మడుచుకొనుక క్రి గలుగును. అందువలన మాచి వెలుపలికి వచ్చి రక్తము నిలిచి పోవును. ఈ స్మారకముకూడ మాచి లేలియుని యెడల ఒక అడుగు పొడవుగల సన్నని బద్దలు తెట్టి తీసికొని ప్రోగుచున్న మాచియొక్క చివరను, ఆ రెండుబద్దల మధ్య నుంచి ఆ బద్దలయొక్క చివరలను రెండుచేతులతో గట్టిగా పట్టుకొని ఆ మాచిని ఆ బద్దలలకు చుట్టవలెను. ఇట్లు చేయగా ఆ బద్దల కరివడకు వచ్చును. అంతట మెల్లగా లాగుదు ఆ విధముగా చుట్టవలెను. కఠినముగా లాగరాదు. ఎంత లేలికగా లాగిన అంత మేలు కలుగును. నెమ్మదిగా లాగినయెడల మాచి రాక బద్దలకు చుట్టుటకు నీలు లేని యెడల అంతటితో ఆ దినము లాగివేయుట మాచివేసి మరునటిదినమున తిరిగి ప్రయత్నించవలయును. మాచిని తీసివేసిన తరువాత పశువులను సత్తువ కూగుటకు గంజి పోయవచ్చును.

ప్రమాదములు

గిర్బము బాగుగా వృద్ధిజేందినతరువాత పశువుయొక్క ఉదరము దిగిసి కదల నందుట, కడుపులో రాయివలె త్రిప్పినట్లుండిట, కూల, గిర్బము చలనగహీలమగుట,

గర్భవేదనలు గలుగజేయుట, యోనిమార్గమునుండి గర్భోదకాదులు శ్రవించుటయు, శీత్రములనుండి నీరుకారుట, ఆయాసముగా నుండుట, శరీరము ఉబ్బుట మున్నగు అక్షణములున్న లోపల దూడ మరణించినదని తెలిసికొనవలెను. పిండమునకు వాత,



పిత్త, కఫము లావరించుటవలనను, దెబ్బలు వగయిరా తగులుటవలనను, తదితర కారణములవలనను, లోపల పిండము వికృతాకారముగా గారి, తదితర ఆకారములుగాగాని తీసుండును.

శక్తికము దెబ్బతగిలి వంగుటవలన గాని, వాతముచేత వంగుటవలన గాని, లోపల దూడ చైటప వచ్చుటకు కష్టముగా నుండును. గాన జాగ్రత్తగా ఆలోచించి దూడను లాగవలయును.

చచ్చిపోయిన దూడను వెంటనే తీయకపోయిన పెద్ద పశువునకు అపాయము కలుగును. దీపముతోనున్న దూడను అజ్ఞానముచేత చచ్చినవని తలంచి శస్త్రముచేసి అటు నిటు లాగినచో దూడ, తల్లిదూడ మరణించును. గాన జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చేయవలెను.

ప్రాణముతోనున్న దూడ యోనికడముగా తగుల్కొనిన చేతిని నెక్కుదిగా దూడ నోటిలోనికి పోనిచ్చిన చేతివలు నాకును. అట్టి సమయములో జాగ్రత్తగా దూడను తీసినవాడే పశువైద్యాచార్యుడనిపించుకొనును.

దూడ లోపల చచ్చి బాధపడుచున్న దారిని శస్త్రముచేసి తీయుట చాలా కష్టము. యెందుచేతనన యోని, య్యూర్, ప్లీహ, పేగులు, గర్భాశయము వీటి మధ్య భాగమున బాధ కలుగజేయునంత, వాటిని మట్టుకొనవలెనంత శస్త్రము చేయువలయును. మరియు అధోగతమైన దూడను ఊర్తమును బంధించుట, గర్భాశయమునకు అడ్డము కిరిగిన దూడను అధోమథముగా తీయుట, ఒక ఆంగమునే కొయుట, అవునొమున్న అన్ని అపయవములను కొయుట, యోని ముఖద్వారమును కొయుట, చాలా కష్టము గాన పశువు మజనానికి చెప్పి శస్త్రచికిత్స చేయుట మంచిది కాని బాధకృత వైద్యుని మీద పెట్టరాదు. ఈ కష్టములన్నియు వారు చూచుచునే కొనినరు అక్షేపించుచును. అవునరమున్న పిండము యోనికి అడ్డు తగిలి ఈ గ్రంథములో మార్పించిన పటముల ననుసరించి దూడ తలను ముక్కలుముక్కలుగా నరకవలసివచ్చును. అవునరమున్న దూడ నన్ని భాగములను కొనువలసివచ్చును గాన వైద్యుడు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చేయవలెను. పెద్దపశువు ప్రతుకదరి అయమానముగా నున్నపుడు వైద్యుడు చికిత్సచేయకుండుట మంచిది.

గ్రామాలలోనుండు పశువైద్యులలో చాలా శిష్టులు లున్నారు. కాని తెలిసి తెలియనివారు పశువు యోనిలోనికి శోకిష్టు దూర్చియు, పిండమునకు మోపు, గ్రాడ్లు చేసి బలపంఠముగా లాగుటయు నాలుగైదు గంటలు తీటబుడిచి చూపి వైద్యుల బిగ్గరకు వచ్చుదురు. మేము మాత్ర మేమిచేయగలము. అయమానముగానున్న చికిత్స చేయవలెండుట మంచిది. ఎందుచేతనన భాగమంతయు వాచి వాతము కూకుకొని దూడ, పశువు చనిపోవునపుడు తాక్షరమాత్రము చేవుడా! కాదు! ముహూటికి కాదు. అట్టి వాటిని చికిత్సచేయక తవలి పెట్టుటయు మంచిది.

గర్భాతి త్తి చీలిపోవుట

గర్భాతి త్తి చీలిపోవుట వలన పశువున కపాయము సంభవించును. సామాన్యముగా అన్ని పశువులకు నిట్లు పరిచిండు. రెండు మూడు చూడలను కనుటవలనను గర్భాతి త్తి వైశాల్యమున కంటె తిట్ట పెద్దదిగ పెరియుండుటవలనను, నిండుచూడిమీద పాత్రి కడుపునకు చెప్పుకగులుటవలనను గర్భాతి త్తి పరిచింపవచ్చును.

అప్పుడు పశువు యోనిద్వారమునుండి రక్తనాళము వెడలుచుండును. ముందుగా వచ్చునొప్పులు ఆకస్మికముగా నెరిచిపోవును. శరీరము శీతలమునకు వచ్చును. నాడి రుద్దలతగా నుండును. ఎగతాళి కలుగును.


చి కి త్త

ఇట్టి అపాయకరమైన సమయములో వైద్యుడు అతిదైర్యముతోను, మెలకువతోను ఆలస్యము చేయక కర్తవ్యమును చేయుట మంచిది. గర్భాతి త్తి పగిలి చూడ గర్భములో నున్నయెడల సత్కారముతోగాని, శక్త యేదైన సమపాయమైన అయుధముతోగాని బయటకు తీయవలెను. ఏసమయములో యేపనిముట్టు ఉపయోగించవలెనో చూచి జాగ్రత్తగా చేయవలెను.

క వ ల దూ డ లు

కవలదూడలు వ్రుట్టుట చాల అరుదు. మూడు చూడలు వ్రుట్టుట మిక్కిలి అరుదు. ప్రతిదూడయును వేరువేరు సంచలనాలలో నుండును. జననము చాల ఆలస్యముగానగును. ఈ దూడలు అంతబలముగా నుండక సత్పగిలియుండును. రెండుచూడలు వస్త్రీకము (తొంటిభాగము) కన్నరకు వచ్చునప్పటికి కష్టప్రసవము కలుగును. ఈ ప్రసవములో గర్భాతి త్తి రంధ్రము ముడుచుకొని, చూడ వెలుపలికి వచ్చు మార్గమున నిరోధము గలుగును. అప్పుడు ఈకుటకు కష్టముగా నుండును. ఒక రుచు వ్రుట్టినతరువాత నొప్పి నిలిచిపోయి కొంతసేపటికి వేరొకటి కలుగును. కొన్నిసమయములలో ఒక దినము ఆగిన తరువాత మరొకటి చూడ వ్రుట్టుటయు కలదు. గర్భరంధ్రమునందు రెండు తలలు ఇరుకుకొని ఈకుట కష్టమైనయెడల శస్త్రము చేయవలసివచ్చును. పశువుయోనిలోనుండి మన చేయి దోపగానే పిడము యొక్క చివరభాగమువరకు వోవునట్లు నిర్మింపబడియున్నది. మనము చేయి పెట్టినవెంటనే ముందు బరి యొముకలుగాని, ఎరుగుగానుండు ఎముకలుగాని, ఎరుగుగా వెనుక ఎముకలుగాని, రెండు ముందుముకలు గాని; లేక రెండు కాలులు, అరుగాని కనపడును. లేక పాదములుగాని, ఒకతోక ఒకతలగాని కనపడును. ఆరంభములో చేయి పెట్టగానే కవలదూడలైన సంగతి కనుగొనుటవ్యయము. జాగ్రత్తగా చేతితో తాకి పరీక్షించి కనుగొనవలెను.

ఒకదూడయొక్క కాళ్ళు, రెండవ దూడయొక్క తల కనబడిన యెడల ఈ భాగములు ఒకేపిండమునకు చెందిన వని తెలిసి కొనుటకు జాగ్రత్తగా పరిశీలించవలెను. కొన్ని సమయములందు రెండు దూడలు వస్త్రీకము దగ్గర కలసి యుండుటచే వాటిని విడదీయుట మిక్కిలి దుర్లభము. కవలదూడల రెంటిని ఆరంభములో చేయి పెట్టిన వెంటనే తప్పక విడదీయవలెను. లోపల చేయి పెట్టినప్పుడు ఒక పిండముకు నుతుపైన దారముతో కట్టిముంచి రెండవ దానిని జాగ్రత్తగా గర్భాశయములోనికి లాగవలెను. అట్లు లాగినపుడు ఒకదూడ బయటికి వచ్చును. ఈ విధముగా రెండవ దానిని కూడ సెప్పుడిగా లాగిన నుభుప్రసవము కలుగును.



రెండుతలలుగలదూడ

ఒక్కకాకారము గలవి నెమరువేయు జంతువులలోనే కలుగుచుండును. సామాన్యముగా చంది, సిల్వి మొదలగు జంతువులలోకూడ కలుగుచుండును. రెండుతలలుగల దూడ పుట్టివచ్చును అది బ్రతుకుట చాలకష్టము. లేక కొన్ని దినములుండి చనిపోవచ్చును. అనేక గ్రామములలో యిట్టిదూడలు పుట్టివుచ్చును ఆ యా గ్రామస్థులు వినోదముగా చూచుచుందురు. మరికొందరు ఆదూడ అటు పుట్టుటవలన ఆ పశువు యజమానికి, పశుకాలకు నష్టము సంభవించు నను యుద్దేశముతో ఆ దూడ చచ్చిన తరువాత గ్రామములో శిత్సవము చేసి దానిని పాలిపెట్టుదురు.

పడమట కొరుడు పడ్డలే పం దెల్లమిద పరి పండును.

ఈ దూడ సామాన్యముగా 50 దిశములవరకు బ్రతికియుండుటయు కలదు. ఈ దూడ శ్రుట్టుక చాలా కష్టప్రసవముగనే యుండును. కాని కొన్ని మాడలు బయటకు ధారకంపశువులు చాలా విపరీతముగా బాధపడుదుండును. ఎంచుచేతననగా ఆ రెండు తలలయొక్క అకుట మెడమొద్దగాని, పుట్టయొద్దగాని నుండుటచేతను, ఒక తల ముందునకు, మరియొక తల వెనుకకు నుండుటచేతను కష్టముగా ఈయిను. ఈనకపుడు ముఖభాగము ముందర వచ్చుట విధియై యున్నది. అట్టి ప్రసవసమయమున యోనిని పరీక్షించినయెడల కారణము తెలిసికొనగలము.

చి కి ర్న

ఇటువంటి కష్టప్రసవము కలిగినపుడు దూడనుకొనితీయుటగాని, లేక ఆ యోని భాగము కొనిగాని దూడను తీయవలెను. ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక తలనుగాని, రెండు తలలనుగాని సరికితీయవలెను. రెండు తలలు కలసియున్న కలసికొని యున్నపుడు కష్టచికిత్సచేసి ఆ రెంటిని విడదీయవలెను. ఒక తలను ఒక మెడకు వీలైనంతవరకు క్రొందకు వచ్చునట్లు నడకవలెను. కొన్ని కొన్ని సమయములయందు అతిజాగ్రత్తగా నేర్పుతో, సమయానుకూలముగా పిండమును లాగుటవలన ముఖప్రసవము కలుగును.


రెండుగా వికృతాకారముగలవి రెండు పిండములచే కూడియుండును. అవి ముఖ్యముగా ఆవులయందు కలుగును. సామాన్యముగా గొట్టెలయందును, పంచులయందును, గుట్టయల యందును మిక్కిలి అరుదుగ కలుగును. చూచి గుర్తించుట:- పశువు కరీరము పెద్దదిగా నుండుటయు, రొమ్మెముకభాగము, తొంటిభాగము ఇవి రెట్టింపు లావుగను, పెద్దవిగను కనబడును. సామాన్యముగా అవి ప్రసవించు కాల మందు మిక్కిలి కష్టము సంభవించును. అరుదుగా ముఖప్రసవము కలిగి మాడలు జీవించుటగూడ కలదని కొందరు కాస్త్రజ్ఞులు చెప్పుచున్నారు.

దూడ అడ్డము తిరుగుట

తల ముందుభాగము నుండిగాని, వెనుకభాగము నుండిగాని క్రమముకొప్పుట, డెక్కలభాగము తల్లియొక్క వెన్నయుకవైపునకు తిరుగుట మొదలగునవి సాధారణముగా జరుగుచుండును. ఈ పరిస్థితులు సంభవించుచున్న పశువుకను ముఖ్యముగా గుండెబరువు అను వ్యాధి తలసిద్ధి మూత్రాయము గర్భాశయము పగిలిన తరువాత మూత్రాయమునుండి పిండము వచ్చును. ఇటు పశుబయట కారణమేమన, ఈ భాగము లోనే పిండము సామాన్యముగా అడ్డముతిరుగుటవలన మూత్రాయమునూచి వచ్చుటచే గాని వేరొకటి గాదని భావించవలెను.

కారణములు

పెడము వెన్నభాగములో నున్నయెకల ముందు బరియెముకలు యోనిలోనికి వచ్చుటయు, పిమ్మట మనచేతికి రొమ్మెముక తగులును. రొమ్మెముక పైభాగము పెడ యొక్క- ముందుభాగము క్యాపశాలముతో అంకానులకు పెడకు నడుచునున్న భాగము



నకు పోవును, లేక ప్రక్క వైపునకు జారవచ్చును. దెక్కయొక్క ముందుభాగము తల్లియొక్క వెన్నముక (యోని) వైపునకుండును, లేక వంకరిగా తిరిగియుండును.

సిండముయొక్క వెన్నముకనుండ చేతితో సరిచేసి శుభయోగించినమొదల దూడ సరియైన స్నానమునకు వచ్చును. దూడయొక్క తల యోనిలోనికి రానిమొదల మగల చేతితో జాగ్రత్తగా తట్టవలెను. మనము యేవిధమైన ఆటాకములు లేమండ చేయిపెట్టి ముందు పాదముల భాగము పట్టుకొనిగాని, లేక కట్టిగాని నెమ్మదిగా త్రిప్పుచు యోని వద్దకు తీసుకొని రావలయును. ఇట్టి సమయములూ దూడకు కొని తీయుటకు ఎక్కువ అవసర ముండదు. అటు కొని తీయవలసినదైనమొదల చివరకు కన్నులప సమయముందు మూత్రము ఆపరేషన్ చేయవచ్చును. ఆపరేషన్ చేసికన్నుటికి ఈవక పోయినమొదల సాధ్యమైనంత త్వరలో మత్తునుండిచ్చి మూర్ఛపోవునట్లు చేయవలెను.

గర్భమునందు దూడ చనిపోవుట

దూడ గర్భమున మరణించినచో పశువునకు జ్వరము కలుగును. మణవకుండును. కడుపులో ఆరాలము కలుగును. పశువు చిరుచు ఊసిరి గర్భాశయముగా నుండును. శరీర నడిమి తగ్గును. కడుపు నల్గు పవలును. గర్భనొప్పులు ఆరంభమైనమొదల యోనిలో నుండి రక్తము మిశ్రమమగు దుర్బంధద్రవము కాయుచుండును. కను పుట్టును. పశువు దొక్కలుబ్బును. ఈ గుర్తులన్నియు పరీక్షించి లోపలి దూడకు రీసి చేయవలెను.

అతివేగముగా ఈనుట

కొన్ని పశువులు అతివేగముగా ఈనును. పాలములను మేరకు కోలికప్పుకును, చెరువులలో నిటిలి త్రాగుటకు పోవునపుడు ప్రసవించిపోయియుండు కొకరాకమే ఒక నొప్పి వచ్చి వెంటనే దూడను పెట్టును.

ఇటువంటి సమయములందు చాలా జాగ్రత్తగా ఆ పశువును కాపాడవలెను. లేచిచో నేడైన ఆపాయము పశువునకుగాని దూడకుగాని సంభవించవచ్చును.

అకాల ప్రసవము

దీనినే ఈదుకొనిపోవుట లేక అకాలప్రసవమందును. పశువులలో అకాలప్రసవము చాల ఎక్కువగా తలసించుచున్నది. అకాల ప్రసవముగా పశువు గర్భాశ్రయంలో దూడ కడలుట ఆరంభించినది లగాయకు 5 లేక 8 నెలల మధ్య ఈనుట. మొట్టికాయ ఈదుకొనిపోయినతరువాత తదితర కాయలను ఈదుకొనిపోవుటనూక కొన్ని పశువులలో గలదు. సామాన్యముకన్న ఎక్కువగా మేసిన ఎనువునకు ఈ అపాయము తప్పక వాటిల్లును.

కడుపుబిడ చెబ్బితగిలినను, చిడిపోయిన మేత తినినను, గర్భము చాల్చినకేడ్కుట మగజంతువులతో సంస్కృము కలిగినను, చుట్టుప్రక్కలజంతువు లేవైన ఈదుకొని పోయిన యెడల ఇది పసిపట్టుట వలనను, పెద్దపులి మున్నగు భయంకరమైన మృగము లను అకస్మాత్తుగా చూచుటవలనను, మరియు బలహీనతవలనను, పేగులలో ఆటంకము కలుగుటవలనను ఈదుకొనిపోవును.

లక్షణములు

మేత మేయదు. మందగించును. విచారముగానుండును. పాలు స్రవించవు. స్రవములు జారును. జంతువు తరచుగా ఆగచునుండును. కఱివండి తీగలు వేయు చుండును. కడుపు మడుచుకొనిపోవును. తలికడుపులో చూడ ఆటలు లెరుగజాలక అగిపోవును. ఒక్కొక్క సమయములో చూడకూడ లోపల చనిపోవుటయు కలదు. ఇంకను చూడ లోపల నుండవలసిన గ్వస్థానమున నుండక తప్పిపోవుటయు కూడ కలుగును. ఎరువురంగుగల ద్రవము మర్మస్థానముయందీ కారుచుండును. పిండము బయట పడునంతవఱకు ఆవు బాధపడును. ఆకాల ప్రసవములో చూడకల చిన్నవగుటచే త్వరగా తోనుట పూర్తయగును.

సారాయి 10 రులములు, ఆవుపాలు అన్నేరు, ఇంగువ 2 రులములు, తుమ్మకు పసరు పొవునేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

ఈదుకొనిపోయినవెంటనే వడిగంజిలో ఉప్పు కలిపి నడుమునవ, తొడలకు రుద్దవలెను.

చూడకాళ్లు ముందుకు వచ్చుట

పశువు ఈనుబట ముందుగా కాళ్లు, డొక్కలు బయటకువచ్చును. తలతప్పిపోయి ప్రత్యేకిముగా ముందుకాళ్లు వచ్చును. అప్పుడు వైద్యుని పిలిపించి సరియైన స్థానములో నుండునట్లు చేయించవలెను.

చూడపిట్టలు ముందుకువచ్చుట

కొన్ని సమయములలో చూడపిట్టలు ముందుగా బయటికి వచ్చును. ఇట్టి సమయములలో చూడ వైద్యుని రిప్పించి తగిన చికిత్స చేయించవలెను.

ఇటువంటి అవసరము అప్పుడప్పుడు ఆరుదుగా కొన్ని పశువులకు తలసించును. పశువు ఆగసముయొక్క మధ్యపల్లమును పట్టి చూచియెడల ముందుగా లెలియును. ఇటువంటి సమయములలో జాగ్రత్తగా వైద్యుని లాగవలెను. లేనిచో లోపల చూడ తల బెణకవచ్చును.

చన్నులలోబాధ

ఈ వ్యాధి క్రొత్తపాలు ఎక్కువగా వచ్చుటవలన చన్నులలో చలనము గలిగి బాధవుట్టును. వెంటనే చికిత్స చేయనియెడల పాలు గడ్డకట్టి చన్నులు గట్టిపడును. జ్వరము 102, 103 డిగ్రీలుండును.

చి కి త్స

పాలను నింపవలెను. తవును నేయించి చన్నులకు పొడుగునకు కావులు తీయవలెను.

నూరేకారము 2 తు, తేపల్పిన్నిరసము 3 తు, వామరసము అర్ధసేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

ర క్త ద్ర వ ము

కొన్ని పశువులకు నిండుమాసములు వచ్చి ఈరుసగా రక్తముతోకలిసిన మూత్రము మిక్కుటముగా పోయుచుండును. వాతము వలనను, బలహీనత వలనను, అతి నేడి వలనను నిది సంభవింతును. పశువు నిస్త్రిక జెందును. తోక పైకెత్తును. అటునిటు తిరుగుచుండును. దూడ లోపలనే చనిపోవచ్చును.

చి కి త్స

వెంటనే నూడను లాగివేయవలెను. తరువాత సారాయి 12 తు, ఇసుక 1 తు కలిపి త్రాగించవలెను.

షరా:—వాత సంబంధముగు పదార్థములు పెట్టరాదు.

మై ల వ దు ట

పశువు ఈరిసతరువాత శరీరమునందలి తదితరకారణముల వలనగాని, మర్మస్థానమును శుభ్రముగా నుంచకపోవుటవలనగాని, వాతమువలనగాని ఈ వ్యాధి కలుగును. దీని వలన మూత్రకోశము దురదవుట్టును. మంటగా నుండును. మూత్రము సరిగా పోయజాలదు. పోవినను రక్తమిళితమై యుండును. వ్యాధి ముదిరినకొలది మర్మస్థానము నలుపురంగ నుండును. ఈ వ్యాధితోపాటు తదితర జీర సంబంధముగు రోగములు వుట్టినయెడల పశువు బ్రతుకరు.

నూతికావారము

ఈ వ్యాధి పశువు ఈరిసవెంటనేగాని, ఈరిసతరువాత రివును చిట్టు బాణాదినములు మున్నగునవి పెట్టుటవలనగాని, చలికాలిలోనుండుట వలనగాని ఈ వ్యాధి కలుగును.

లక్షణములు

పశువు శరీరమంతయు భారముగా నుండును. త్వరలో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు అయాసము, నోరు తెరుచుట ప్రాసంధిమగును. శరీరము చల్లగానుండును. కాళ్లు పట్టికేయును. నోటివెంట చొంగయుండును. క్రమేపి కడుపుబ్బును. చులబద్ధక మెక్కువగా నుండును. కన్నులుమూయును. ఉష్ణమున్నటుల కనపడదు. క్రమేపి కడుపుబ్బి తురచించును.

చికిత్స

1. సారాయి 3 డ్రాములు త్రాగించవలెను.

2. సాంటి 2 తు, మిరియాలు 1 తు, పిప్పళ్ళు 1 తు, వామ గిద్దెకు, ఎండు మిర్చిపాడి 4 తు, కలిపి నీరు కలిపి ఒక మోతాదు నీయవలెను.

వేడిపచ్చుటకు కర్పూరము 1 తు, తాటిబెల్లము 10 తు, కలిపి నాలుకకు రాయు తుండవలెను. లేక లోపలికి ఈయవచ్చును. ఇంకను వేడిపటికాపులు శరీరమంతయు తీయవచ్చును. అంతకుతగ్గినచో ముచ్చిలిగుంటలోను, మూతిమీదను, ఎడరాలలోను కారలు పెట్టవలెను.

సలహా:—మీ ఫిర్కా ఆయుర్వేద పశువుల డాక్టర్ వేడిపచ్చుటకు ఇంజెక్షన్ యిచ్చుట, లోపలికి మందునిచ్చుట వగైరాలు నడుపుచుగాన విలిపింతును.

పాలజ్వరము

పశువు ఈనిన తరువాత ఒక్కొక్కప్పుడు మిగుల అపాయకరముగ జ్వరము లేట స్థించును. ఇది చాల అపాయకరమైనది. ఈనినవెంటనే బలమైన ఆహారమిచ్చుట వలనను, తగినంత విశ్రాంతి లేక పోవుటవలనను, పశువు కష్టముతో ఈకుటవలనను, వర్షములోను, చలిగాలిలో నుంచుబడతలను ఈవ్యాధివచ్చును. ఇంకను పశువు గర్భమునంద ఉండు మలిసము సరిగా వెలువడక రక్తముతో కలియుటచేత నీ జ్వరముకలుగుచున్నది. పశువు ఈనిన కొలదికాలములోనే ఆకస్మాత్తుగా ఈవ్యాధి కలిగి 24 గంటలలోనే చనిపోవు పశువులకుండ గలవు. సోమరి తనముగానుండు పశువులకు ఇటువంటి వ్యాధులు లేటస్థించుచుండును. పశువు ఈనినతరువాత యేకారణముల వల్లనే నను మాడ చనిపోయిన రోడ్డు పాలు సరిగానీయదు. ఆ పశువు పాలియడను యుద్దేశ్యముతో ఆ పశువును విడిచిపెట్టుదురు. అప్పుడా పశువునకు పాలగ్రంధులుబ్బి శరీరవేడిమి అధికమై పాలజ్వర మేర్పడును.

లక్షణములు

అలి లేకపోవుట, పశువు చిరాకుగానుండుట, నాడి తీవ్రముగానుండుట, కావస యెక్కువగుట, పాలుతగుట, కడపుబ్బుట, పొడుగుభాగము గట్టిగానుండి వేడిగా నుండుట, వెనుకకాళ్ళలో సత్తువతగి నిలుచుండుట కష్టముగా నుండుట, పశువు తూలుకు కడిపోవుచుండుట, కన్నులు చూచుటకు కత్తికగుట, నోటివెంట చొంగకార్చుట, నాడి తీవ్రముగా కొట్టుకొనుట, పేగులలో బాధగా నుండుట, నాలుక తెలుపుగా నుండుట, ముఖకాంతి తగుట, మలమూత్రములు గట్టిపడుట. ఇటువంటి లక్షణములుగల చికిత్స చేయనిచో రక్తంలో మరణించును.

ఆయుర్వేద చికిత్స

తిప్పతీగెలసము అరసేరు, సొంటి 1 కు, మిరియాలు 1 కు, కలిసి అరసేరు కలిసి 5 టిలో కలిపి త్రాగించవలెను.


తమలపాకుల రసము పావుసేరుతీసి తులముఇంగువ, నేరు వేడిగంజిలో కలిపి పెట్టవలెను.

82 ద్రాముల సారాయిలో తులము నూరేకారము కలిపి త్రాగించవలెను.

ఆంగ్లేయచికిత్స

1. సోడియం క్లోరైడ్ 5 తులములు, సల్ఫర్ 1 కు, గంజినేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

2. క్విన్సెస్ సల్ఫు 10 గ్రాములు, సల్ఫ్యూరిక్ ఆసిడ్ 20 చుక్కలు, నీరు 3 జొన్నులు కలిపి త్రాగించవలెను.



వత్సభృత్యము

ఇ రు వ ది య వ భా గ ము

ఉ॥ గంటలకట్టి దూడలకు గంతులువేయుచు నాడజూచి
యా వెంటనే రూకలీయనొక వెంగలి వెంటన మార
ణార్థమున్ ఇంటను వీడి పొండనగ నింగిరమింతయు లేక
పంపుమీ తుంటరి వేసబాస పనతూలిక లాభ్యులకుండు చిహ్నాలే॥
మూగతల్లి.

కా॥ గోవత్సంబును నోరుగట్టి పెర సాకుల్లాని దుగ్గంబు న
ర్యావిద్ధంబుగ బిండివైచి యది యాత్మార్థంబు గై
కొన్న లోభావిష్టుండగు మానవుండు దురిత వ్యా
పార పారీణుడై భావాతీత దరిద్రతా నిరతుడై
బాధల్పడున్ వ్యర్థుడై. “మూగతల్లి”

ఏదేశములోనైనను పశుసంతాన మభివృద్ధికావలెననిన దూడలే ఆధారము. అవియు మూలసంతతి. దేశమునోదార్థములు గలదూడలతో గూడిన దేశము మిక్కిలి పొడిపంటలతో తులతూగును. అందుచేతనే వంగసత్తు బొన్నత్యమునకై పెనగులాడు తున్న పాశ్చాత్యదేశములు ఆమెరికా మొదలగునవి దూడల ఆరోగ్యమున కెంతేని కృషి చేయుచున్నవి. ఆరోగ్యవంతములగు దూడలను రైతులు పోషించి పెంచినచో దేశాభ్యుదయమున కంతయు తోడ్పడినవారగుదురు. శతశాతలలో దూడలులేని సంసార మొక నిర్జీవమైన యెడారివంటిది. ఎక్కువ సంఖ్యి వత్సములుగలకాల ఒకరమ్మమైన ఉద్యానవిషమువంటిది. ఆరోగ్యవంతుల దూడలు పుట్టుటకుముందు రైతులు వారికెల్లలను జాగ్రత్తగా పెంచుచు చూచుచుండవలెను. దూడలకు రోగములు కలుగుటకు కారణము అలో ముఖ్యమైనది వారికెల్లల సాంప్రదాయపురోగములే యెయున్నవి. తల్లిరోగము బీజముద్వారా వత్సములందు ప్రవేశించును. ఈకారణమువలననే కొన్నిదూడలు రోగ మతోనే పుట్టును. అటువ్యాధులుగల కెల్లలను పుట్టివదూడలు జన్మించక ముందుగానే మరణించుటగాని; వెంటనేమరణించుటగాని; కొలదికాంతములోనే మరణించుటగాని

జరుగుచుండును. ఈరీతిగ నే క్షయరోగముగల మాడలుగూడ మరణించును. మూడవ కలుగు దీర్ఘరోగములన్నియు తల్లలరోగములవలననే కలుగుచుండును.

మాడలు పుట్టినది మొదలు ప్రకృతిభర్తములకు విరుద్ధముగ పెంచబడుటవలనకూడ ఆ నేరరోగములు కలుగుచుండును. వీటిలో కృత్రిమాహారములు; కృత్రిమ అలవాటులును ముఖ్యముగా రోగజనితములు. మాడలకు గలుగు తరుణవ్యాధులన్నియు వీటివల్లనే కలుగుచుండును.

ఆ హారము

మీడి ఆరోగ్యముగను, త్వరితగా పెరుగుటకు నుత్తమమైన పాలు సమృద్ధిగా నుండి వలెను. ప్రతి దినము ఉదయసాయంకాలములయందు ఆనువన్న వేళల ప్రకారము తుడుపవలెను. తల్లిపాలకంటె మాడకు శ్రేష్ఠమైన ఆహారములేదు. ఇవియు ఆరోగ్యమునకు బలముకలుగ జేయును. ఆవియు త్వరితము జీర్ణము మాడకు పోషణచేయును. రైతులలో చాలమంది దున్నపోతు పుట్టిపెడల పాలు తక్కువగా కుటువనిచ్చుదురు. దూడ లేక పోయిన పశువు పాలిచ్చదు. యుద్ధేయమున్నయెడల ఏమిడయైనను పాలను సరిగా విడిచి పెట్టుదురు. కావుననే మూడలు ఆరోగ్యవంతములుగాక నిత్యము రోగవీడితములై ముక్కుచు మూలుచు ఆకాలవృత్తువునాక బడుచున్నవి.

కోడెమాడయెనచో బాగుగా పాలువిడిచి పెట్టుదురు. ఇట్లు చేయుట చాలతప్పు. పశువులపాలలో ఆనేరకము లుండును. కొన్ని పశువులపాలు చిక్కగనుండును. మరి కొన్నిటిని పలుచుచుండును. కాబట్టి పాలతత్వములకు బట్టి మాడలను కుటువునుండ వలెనుగాని ఎక్కువ తక్కువలుగా కుడివిన పలువిధములైన సంకటములపాలై మృతి నొందును.

ఒకవేళ తల్లివద్ద పాలులేకపోయినను తల్లి చనిపోయినను తల్లి ఆనారోగ్యవంతురాలైనను తదితర పశువులపాలు పిండి పోయవలెను. అలవాటయినయెడల ఆపశువు పాలను కుడిపించవచ్చును. తదితర పాలను కుడిపించు పశువు ఆరోగ్యముగలదై, భయము లేనిదై, సాంప్రదాయముగలదై యుండవలెను. పాలు ప్రత్యేకముగా పోయవల సీపశువు తగినంత పరిమాణముగా నీరువలెనుగాని ఎక్కువగా నిచ్చిన సులభముగ జీర్ణముకొక ఆజీర్ణరోగములు కలుగును.

చిక్కనిపాలు వాడవలసి వచ్చినపుడు ఆవరము కలిగినచో పాలలో ఏరుకలిపి త్రొగించవచ్చును. మాడలకిచ్చు పాలు పశువుకంటె మెంతయుష్ణముగా నుండునో అంత యుష్ణముగా (100 డిగ్రీలు) నుండవలెను. మాడకడుపు చిన్నది. మాడ పెరుగుచున్నకొలది ఆహారపరిమితి క్రమముగా మారుచుండవలెను. వెలలు జరిగినకొలది ఒక్కొక్క పర్యా యము ఇచ్చు ఆహార పరిమితిగూడ పెంచుచుండవలెను. ఆరుమాసములైన కడ నుంచి

గొలకంపు గాలికొట్టింది అత్తగారు—అంటుపండలోనీరు పానపాన్యుకొడెలా.

దూడలకు పాలధ్యానముతోగి మామూలుగానుండు దాదాదినసులు మున్నగువాటిని రుచి చూచుట కలవాటగును. మరియు నందినదానినెల్ల రెక్కచేయక తినుచుండుటవలన అజీర్ణ రోగములు ప్రాప్తించును. శీర్షక క్రి చెడును.

తత్వములనుబట్టి పాలుపడుట

కొన్ని పశువులకు ఈవిధమెంటునో పాలురావు. అంతమాత్రమున వట్టిపోయినదని రైతు నిరుత్సాహపడరాదు. మొదట చన్నులనుండి పలుచగానుండు ద్రవము వెలువ రించును. తరువాత ఒకటి రెండుదినములకు సాధారణపుపాలకంటె గట్టిగానుండు ద్రవము వచ్చును. తరువాత మంచిపాలు వచ్చును. కొన్నిపశువులకు దూడ పుట్టక ముందును మరికొన్నిటికి దూడ పుట్టిన తరువాతను పాలుపడుట అక్కడక్కడ గలదు. కొబ్బటి పాలు త్వరితముగా రానందులకు ఆతురత పడవనవరములేదు. దూడకు పేగు లలోనుండు మలినపదార్థమును తొలగించుటకు తలిపాలనుండివచ్చు నీటివంటి ద్రవమే మిక్కిలి ఉపయోగము. దూడలు పుట్టగానే పాలు త్రాగకపోయినచో అంతగా దిగులుపడ నవరము లేదు.

పాలను విడిచిపెట్టుట

పశువు యీనగానే పాలు ఎన్నియున్నవి తినివి గ్రహించవలెను. పాలెత్క్కువగా నున్నయెడల తక్కువ వదలిపెట్టుటయు, తక్కువగా నున్నయెడల ఎత్క్కువగా వదలిపెట్టు టయు, చేయవలెను. మామూలుగా దూడకు పాలుగునవల ఉండు ఒకవైపు రెండుచన్ను లలోనిపాలే కుడుపవలెను. పాలు చిక్కగానుండి ఎత్క్కువగా నిచ్చుచున్న తక్కువగా వదలిపెట్టవలెను. ఇవన్నియు కూడ పశువు ఈవిధ రెండు మూడు దినములలో ఎత్క్కువ తక్కువ పరిమాణములు తెలిసికొనవలెను. మూడు పాలు తక్కువగా కుడిపిన రక్తము పారును. ఎత్క్కువగా కుడిపిన రైతువురంగుగా పారును నెలదినములు గడచువరకు ప్రక్క పాలు దూడలకు కుడుపుచుండవలెను. ముందరినైపు ఒకసారి రెండువైపు మరియొకసారి వదలిపెట్టుచుండవలెను. ఒకప్రక్కనే వదలిపెట్టుచుండినయెడల పాడుగు ఒరుగుగా దిగు చుండును. పాలు తక్కువగా నున్నయెడల మూడుచన్నులు వదలిపెట్టుచుండవలెను. నెల దినములు రాగానే మేతమేయును గాన ఒక చన్నులోనిపాలు వదలిపెట్టవలెను. దూడనెప్పుడు ఆకలితో నుంచవలెనుగాని కడుపునిండుగా త్రాగించరాదు. ఈరీతిగా మూడుమాసములవరకు చేయవలెను. తరువాత మీ యివ్వప్రకారము వదలిపెట్టవచ్చును. పాలు చిక్కగానున్న దుడలు బ్రతుకవు గాన తగించుచు త్రాగించవలెను. వెన్న తక్కువగానున్న పాలు ఎన్నిత్రాగినను వ్యాధులు రావాలవు. పశువు ఎండిబోవువరకు దూడకు ఒకచన్ను వదలిపెట్టినట్లయిన పెయ్యమా డయిన రెండునవత్సరములు వెళ్లగానే పార్ల మూడవనవత్సరములోనే ఈవిధ పాలిచ్చును.

ఉద్దగిరి గారి చొలితే గుంటలలో నీళ్లు ఉండవు.

దూడలప మన్నుతిను స్వభావము గాన చాల జాగ్రత్తగా కాపాడుకుండవలెను. సామాన్యముగా ఈనిన పదిదినములు లగాయతు పచ్చిమేతకొరవ ఎదురుచూడు కుండును. మరికొన్ని తినుదుండును. కొన్ని వాసన చూడుదుండును. పక్షము దినములైన కడకుంచి అరుదుగా ఒక్కొక్క గడ్డిపరకయే కొఱికి తినుదుండును. పాలు త్రాగుట వలన మేత తినుటవలన సరిగా జీర్ణముగాక నెలజబ్బువచ్చును. కాని బలాత్కారముగా మాత్రము మేత పెట్టరాదు. లేనిచో పాలు మేత కలిసి చాల జబ్బు చేయును. కొందరు పాలెక్కువ తీసికొనవలెనని గరిక, పరికిలక, శాంగూర మేపుదురు. ఇట్లు మేతటవలన చూడకడుపు లావుగా పెరుగును.

ఆహారములో మార్పుచేయుటకు నూచనలు

పాలు త్రాగినవెంటనే కక్కినచో చూడ త్వరగా త్రాగెననిగాని, అధికముగా త్రాగెననిగాని, ఏదైన జబ్బుచేసినదనిగాని గ్రహించవలెను.

ఒకసారి పాలు త్రాగి రెండవసారి త్రాగుటకుగాని, మళ్ళికక్కినచో క్రొవ్వు పదార్థము రెక్కవగుటచే ఆశీర్తి చేసినదని గ్రహించవలెను.

పాలు త్రాగినతరువాత అగంటప పేరుగుబిళ్లవలె కక్కినచో, మాంసకృత్తు లధికమగుటచే అజీర్ణము చేసినదని గ్రహించవలెను.

మలబద్ధమున్నచో క్రొవ్వుపదార్థము రెక్కవైనదనిగాని, కావలసినవానికంటె అధికముగానున్నదనిగాని గ్రహించవలెను.

కడుపుకొప్పి యున్న మెడల మాంసకృత్తులధికముగా మన్నవగాని, పాలు తేగ ముగా పట్టుబడినవనిగాని, అధికముగ నివ్వబడినవనిగాని గ్రహించవలెను.

పుట్టిన వెంటనే పాలు కుడువరాదు

మంచి పుష్టిగల పశువులను పుట్టిన చూడలతోత్పత్తియైన తరువాత ఒకదినమువరకు గూడ బలముచే పాల నపేక్షింపకయే యుండును. మనము ముఖ్యముగా చూడవలసి నది క్వస విడకుట, ఒడలుమంచి నిద్రిండుట—రెండు చిక్కిగా నుండేనేని పాలు త్రాగకపోయినను చూడను తల్లిపక్కనే పరుండబెట్టుటవలన కొంచెము వేడిచే శరీరము ఆరోగ్యవీరియందుండును. చూడలు పుట్టిన పాలు కుడువుట మంచిదికాదు. అది వరకు పదార్థగ్రహణము నెరుగని ప్రేవుల కంత త్వరగా పాలు తుడిచినను ఆ పదార్థ ములు సరిపడక అసంతృప్తి కలిగిండును. ఒకవేళ పశువునగ్గర కొన్నిదినముల భర్త్యం తము పాలు లేనిచో చూడలను ముదిపశువు పాలుపిండి ఇదివరకు చప్పినదీతిగా త్రాగించ వలెను. కొన్ని పశువులకు ఈనినవెంటనే పాలు రానప్పుడు గూడ చన్నుకుడువగనే చక్కెరిగింతపుట్టి పాలు పొగి పారలును.

కోడిరక్క అనేస్తే గొప్పవర్షం కురుస్తుంది.

అపరధాన్యపుగడ్డిజాతు లుపయోగించుట

కొన్నిటికి త్వరగా ఎముక ఎదుగకపోయిన సెడలను, పండ్లు రాకపోయిన పక్షమునను, పాలతోపాటు అపరధాన్యపు గడ్డిజాతు లుపయోగింపవచ్చును. కొన్నిటికి ఎముకలు త్వరితముగా బలినీ చూచుటకు అందముగా నుండును. అట్టివానికి మాంసము, నెత్తురు వృద్ధియగుటకు మారుగా క్రొవ్వు, దుర్బాంసము పెరుగును. అట్టివానికి ఏదైన గోగము వచ్చినచో కుదురుట కష్టముని తలంచవలెను. ప్రక్క ఎముకలయొద్ద దెక్కిన నైన కొంచెము బలుపు కనిపించినచో అది నిజమగు బలుపని గ్రహించక జబ్బోదరమగు వ్యాధి యనుకొని తగు చికిత్స చేయవలెను.

ఆహార పరిమితిని హెచ్చించుట

పండ్ల పెరుగుచున్న కొలది ఆహారపరిమితి క్రమముగా మార్పుచుండవలయును. క్రమముగా పాలను తగ్గి పను మేత పెట్టుచుండవలెను. పండ్లపరిమితులు కొంచెము చేడిగా నుండవలెను. నెలలు బరిగినకొలది క్రొక్కపర్యాయ మిచ్చు ఆహారపరిమితి గూడ హెచ్చించుచుండవలెను. శీతోష్ణముల వ్యత్యాసములనుబట్టి ఆహారములు మార్పుచుండవలెను. మరియు చూడలు మరువడవము పంపించుటలో మిక్కిలి భేద పడుచుండును. కాన ఆహారపరిమితి వానివారి బ్రోక కీబిట్టి నిర్ణయించుకొనవలెను. మట్టి వగైరాలు తినమంద మాటికి చిక్కిములు కట్టుదు డవలెను. జీనిచో వివిధగోగముల పాలగును. పండ్లు వచ్చునంతవఱకు పాలు మామూలుగా యిచ్చుచుండవలెను. మమారు ఒక సంవత్సరము వచ్చినతరువాత దాని పై వగైరాలు పెట్టవచ్చును. ఒక సంవత్సరములో చూడలకు పాలధ్యానము తగ్గి మామూలుగా తిండిపరానము లర్పిటిని రుచియను నల వాల్చేగ్గుడును. మరియు నంగినదానినెల్ల తిక్కచేయు తమను డివసెనెల అజీర్తిగోగము ప్రాప్తించుట, జీర్ణ క్షేత్రములు తటస్థించుచుండును.


దోషరహితమైన పాలు

తెలుపుగను, నిగ్గులముగను, మధురముగను, త్రాగుటకు గుచిగనుముండి ఉదకమును బోనినపుడు నీటిలో గలనీపోవు స్వభావము బరిగి నురుగులేమంద నుండు పాలు పరిశుద్ధమైనవనియు, ఆరోగ్యమైనవనియు చూడల కీర్పుటకు తగినవనియు తెలిసికొనవలయును.

శరీర పరిశ్రమ

చూడల కాహార మె తయవసరిమో, అంతకుంట పదిరెట్లు పరిశ్రమ నుష్కము. చూడ ఆరోగ్యముగను, బలముగాను ఉండుటకుకూడ పరిశ్రమ అవసరము. గేహపరిశ్రమ చేయుని యెడల కండ్లముఖులు తగినంతగా పనిచేయజాలవు. పాలు పండివిన వంటనీ

అటునిటు గంటలు వేయవలయును. తరువాత దినమునకు మూడుసార్లు గంటలు విక్రాంతిగా దొడ్డిలో అటునిటు తిరుగవలెను. దేహపరిశ్రమ చేయవలయును. గుండె చురుకుగా కొట్టుకొనుచుండును. ఇందువలన శరీరములోని ప్రతిభాగమునకు చాల రక్తమును, రక్తములోనున్న యాహారమును బ్రవహించును. దూడ వయస్సుగూడ మంచి



చురుకుగా నుండును. దూడలను బహులవెంటన, రోడ్లమీదకు, గోతులలోనికి, పడి పోవు గోడలదగ్గరకు పోవలెను. అచ్చట గంటలు వేయవలెను. బాగ్రత్తగా కాపాడవలెను. శీతకాలములో పాల యెక్కువ తక్కువలనుబట్టి దూడలను వ్యాధులెక్కువగా కలుగుచుండును. కాన బాగ్రత్తగా కాపాడుదు రగిని పాలను వదులువలెను.

దూడలనుంచు ప్రదేశములు

మిగుల వడిగానుండి పొకలోనిండిన వంటయిండ్లను దగ్గరగాగాని, వసారాలలో గాని, మిగులశీతముగా నుండుచోట్లనుగాని గాలిలేని ప్రదేశములందు గాని, చీకటి కొట్లలోగాని, మిన్నలులు, గోమారులుండు స్థలములందుగాని, అంటువ్యాధులుగల పశువుల దగ్గరిగాని, విషజంతువులుండు ప్రదేశములందుగాని, దూడల నుంచరాదు. అట్లుంచినయెడల అవి ఒకదాని చెవి వొకటి తప్పరించుచు, మోకాళ్ళు నాకికొనుచు ప్రభుమరూపములైన పాచుగులను నవ్వును కలుగుచుండును. కావున అన్నిటి వొకచోట నుంచక సాధ్యమైనంతవరకు నితరచోట్ల కట్టివేయవలెను. లేక ఒకదానివొకటి అందకుండ కట్టివేయవలెను.

పరిపట్టుకడితే గొప్పవరషం వరుస్తుంది.

ఒక్కొక్కప్పుడు దూడలు నోటికందినవానినెల్ల నమలుటకు ప్రారంభించును. అట్లుఅలవాటైనయెడల అవిచిన్నపడుచున్నవంటే ఎండుగడ్డి నమలగల శక్తిగలవగును. వాటిని ప్రత్యేకముగా పశుశాలలయందుంచినపుడు అవి పచ్చికమీదనే యాధారపడి యుండుటకంటే దానికలియుక్త స్తవ్యముమీదనే ఆధారపడినయెడల దూడలు చాల బాగుగానుండును. దూడకు మేత పెట్టినచెట్టనే లేతదిగుల్లను పొట్టులను పెట్టుచుండ వలెను. మనుష్యుని చూచి పారిపోవుట, పొడుచుట, తన్నుట మొదలగునవి దురభ్యాసములు. ఇవి చెడుపోషణవలన గలిగిన దురభ్యాసములేగాని వేరుగావు. పచ్చికగడ్డి మీదనే దూడలు ఆధారపడి యుండుటవలన వానికి పాలకొండై గలుగు ఆకలి నుండగించును. అదియునుగాక అవి తినునపుడు ఆపచ్చికమీద చిన్నచిన్న క్రిములు ఈగలు మొదలగునవి చేరును.

పండ్లు వచ్చుట

దూడపప్పుట్టినపుడే చిగుళ్ళలోనుండి కొంచెము కొంచెము పాలపండ్లుకనబడును. క్రమక్రమముగా ఆపాలపండ్లు పోయి సిరమైనపండ్లు వచ్చును. సిరమైనపండ్లు పాలపండ్ల కంటేపరిమాణమునందు పెద్దవిగానుండును. కొన వానిని నులభముగ తెలిసికొనవచ్చును. అప్పుడూడ పుట్టినపుడు లోదవుడయిండు రెండుపాలపండ్లుండును. రెండవవారమున నాలుగుపండ్లు వచ్చును. మూడవవారమునకు ఆరువచ్చును. ఒక నెలలో ఎనిమిదివచ్చును. ఈ రీతిగా పండ్లవచ్చునపుడు ఊడిపోయినపుడు కలుగువ్యత్యాసములను పశువైద్యులకు చూపించుగు పచ్చికనేగాని దూడకలిగి రాకోగ్యము శుభ్రముగా నుండదు.

పండ్లూడి నులకొత్తవివచ్చినపుడు కొన్నిటికి చిగుళ్ళువాచి చొంగ పడుచుండును. నెలనెలప పండ్లుపెరుగుట, ఊడుటలనుఁ జివ్రాదులు కలుగుచుండును. నాలుక ఎండుట, మూతిమీద చెరుటలేపండ్లు, చిరాకు గానుండుట, కొంచెముజ్వరము తగలుట, విరేణనములు కలుగుట మొదలగు లక్షణములుండును. పైదవుడ లోపలి భాగమునందు పండ్లుండు పానమునకు మధ్యగా ఒక తెలుపుపంటి పదారముగల గట్టిరూపపుముద్ద యుండును. ఆముద్ద దంతపు ఆకారముగానుండును. ఇది మురిసిన కొలది శరీరము మీద దద్దురుపుట్టి నుసిమిరిమాదిరిగా నగును. అట్టిపముయులందు అపన్నును చేరితోగాని, చిన్న చాకుతోగాని గీసినయెడల ఆస్వాధి తగ్గును. ఈ పన్నునే తామరపన్ను అందురు.

గాలి

దూడలను పశువులశాలలోగాని, తమయిండ్లలో కట్టియుంచినప్పుడుగాని, గాలి ధారాళముగా వచ్చుచు పోవుచు నుండునట్లుగా నుండవలెను. దూడలనెట్టిసలములందు కట్టివేసినను భయములేదని కొందరు తలంచుచుండురు. చీకటిగదులలో, మురికిగుంటల

దగ్గరగా నుండుపాకలలోను మాడలను కట్టరాదు. ధారాళముగా గాలిరానిచో లోపల నుండి ఊసిరి పెరిగిడిచిన విషవాయువే కొట్టుమునంతటను నిండియుండుటను, విష హేతువగు దానినే మరల లోనికివేల్పుటచేత శరీరాశోగ్యము నిమిషములో చెడిపోవు తున్నది. గాలిపద్యుటప పశువుల చాపములలోనూడ చిన్నచిన్న కిటికీలు అక్కడక్కడ నుండవలయునేగాని కాలయంతయు కలుపులముడుమై దుస్సహమగు రీతినిగాలి లోపలికి పచ్చనట్లుండిన మాడలప శీతలము కలుగును. కిటికీలు ఎత్తుగానుండవలెనుగాని భూమి నంటియుండరాదు.

వెలుతురు

శరీరాశోగ్యమునకు వాయువెట్లు ఆధారమో నూర్యరక్తియు నంత ముఖ్యమైన దేమని గ్రహించవలెను. నూర్యరక్తి తగులక చెట్లట్లు జీవింపనేరవో అట్లునే మాడలు జీవింపనేరవు. ఇట్లు చెప్పితివని కన్నులు మిరుమిట్లు గొనునంత వెలుతురును లోనికి రానియరాదు. మాడలయావర్జ్యవము అక్కరప వచ్చుగుణములు కలుగుట కనువగు పసి తనమును జాగ్రత్తగా కాపాడవలెను.

పుట్టినవెంటనే మందుల నీయరాదు

కొన్ని మాడలు పుట్టినవెంటనే మలబద్ధకముగా నుండును. అందుచే కొందరు పశువైద్యులు నుండునివచ్చును. ఈ దురభ్యాసము మాన్పవలెను. సాధ్యమైపంతవరకు మండియకుండు ప్రయత్నము చేయవలెను. ఒక్కసారి మండిచ్చినయెడల తరుచుగా నీయ వలసివచ్చునుండును. ఇట్లు కొన్నిదినములై నపుటికి కడుపులో మందులపాపు పెట్టవలసి వచ్చును. పుట్టిన తరువాతి 24 గంటలలో విశేషము గానిచో ఎందుచేత గాశేదో పరీక్ష చేయవచ్చును. మనదేశములో కొందరు కొడెమాడలు పుట్టగానే చచ్చుట నలిపి వడుపు దురు. అట్లు నలుపుటవలన కొన్ని రక్తనాళములు తెగి పోవును చెడిపోవును.

నరములు ముడుచుకొనుట

శ్వాస పీల్పుట, ఆరమట, తుమ్ముట, దగ్గుట, పాలు వడుడుట, మ్రింగుట, క్రొక్కట, మలమూత్ర విసర్జనము చేయుట మొదలగునవన్నియు నరములవలన చేయ బడు పనులైయున్నవి. మాడనరములు మిక్కిలి నూత్నముగా నుండును. అందువలననే అవి ధ్వనులకు ఉలికిపడును. మూడుమాసములు వచ్చునంతవరకు మాడమెదడునుండి వచ్చునరములు వృద్ధికొనాలవు. ముఠలిపశువులకు పుట్టినవియు, శోగపశువులకు పుట్టి నవియు, చిన్నపశువులకు పుట్టినవియు నరములబలము లేకుండుటచే దృఢముగా నుండ జాలవు.

గొర్రవంపుగాలి తోలిత వాన తప్పదు.

నాడి పరీక్ష

ఆరోగ్యముగా నుండుమాడకు నిమిషమునకు 50 నుంచి 120 వరకు నాడి కొట్టు కొనును. ఈ క్రమముతప్పిచో అనారోగ్యముని గ్రహించవలెను. నాడి తీవ్రముగా నున్నచో జ్వరముండును. నాడిక్షీణించి వెచ్చుదిగానున్నచో ప్రాణశక్తి తక్కువవలెను నూచించును.

ఉచ్చాస్య నిశ్వాసములు

నిమిషమునకు 32 నుంచి 48 వరకు తీయుచుండును. శ్వాస యేనిధమైన వాస నయు లేక యుండును. మాడలశ్వాస యందు పొత్తికడుపు కదలుచుండును. ఇది తప్పి నచో అనారోగ్యము. ఊపిరి వేగముగా తీయుచున్నను, ధ్వని యున్నను, శ్వాసరోగము లను నూచించును. ఊపిరి వాసనకలిగి యున్నచో జ్వరరోగముల నూచించును.

శరీరకాంతి

మాడరంగు నల్లకప్పువేయక మామూలుగ నేయుండును. ఆరోగ్యముగల మాడ ముఖమునం దొకవిధమైన కళియుండును. ముఖపద్మస్సు ఆరోగ్యమును నూచించును. పర్మస్సుమారినచో అనారోగ్యమును నూచించును. నల్లకప్పు వేసినయెడల జ్వరమున్న కని గ్రహించవలెను.

ఇతర అవయవములు

ఇవన్నియు సరిగా వయస్సుచుట్టి అభివృద్ధిచెందుదున్నచో ఆరోగ్యముగా ఉత్సాహముగానుండును. అట్లుగాక అవయవములు సరిగా అభివృద్ధిజెందక పొట్ల పెన్ దగుట, కాళ్ళు నన్నగిలుట, శరీరము కృశించుట మున్నగునవి రోగలక్షణములు.

శరీరోష్ణము

మాడలకు పెద్దపశువులకంటె శరీరోష్ణమెక్కువగా నుండును. అదియును గాక తీర్థ, రక్తసంబంధమైన రోగములలో శరీరోష్ణము త్వరలో హెచ్చుచుండును. మాడలకు ఉష్ణముకన్న ఒక డిగ్రీ హెచ్చినను, ఒక డిగ్రీ తగ్గినను భయములేదు. విశేషముగా హెచ్చినజ్వరము, విశేషముగా తగ్గినవారము. దీనిలో నేది జరిగినను ప్రమాదమే యని గ్రహించవలెను.

పొత్తికడుపు

అపారపుదొక్క మెత్తగానుండిన ఒక విధమైనబాధ లేకుండిన మాడ కులా సాగానుండును. పొత్తికడుపుబ్బి గట్టిగా నుండుట అనారోగ్యలక్షణము. ఇట్లుండుట వలన అజీర్ణ రోగములు పుట్టును.

దక్షిణం మబ్బసాగిన వాస తిప్పును.

అ ర మ ట

ఆరోగ్యముగానున్నదూడ అకలిజేయునపుడు మాత్రమే ఆరచుచుండును. కాని కొన్నిదూడలు ఏమియుతోచక ఆరచుచుండును. శశీప్రకారము ఆరచుచుండునపుడు, పాలుకుడిసిందినపుడు ఊరుకొనిన ఆకలిచే ఆరచుచున్నదని తెలుపవచ్చును. కాని ఒకప్పుడు మత్తువలనకూడ పడుకొనవచ్చును. కాని మొత్తముమీద మాడొప్పును కనిపెట్టుటకష్టము. పాలుకుడిసినను, త్రాగించిననుకూడ అరచినచో కడుపునొప్పిగాని, తదితర బాధలుగాని, యున్నవని గ్రహించవలెను.

మ ల ము

దూడపుట్టినప్పుడు పనుత్రుపచ్చగాగాని కొంచెము నలుపు రంగుగాగాని యుండును. తరువాతి విశేషముగా పలుచగ గాని గట్టిగ గాని యుండుకొంచెము పనుపు రంగుగను ఏవిధమైన గుర్తూరము, శ్రమకము నామోహముగా క్రిందికి జారిపోయినచో ఆరోగ్యమును నూచిండును. మలము గట్టిగా ఉండుటకలవ. నుండి దూడ విశేషముగా తినుటనున్న మలబద్ధకమున్నగలియు, తెలుపుగాగుగా పలుచగ విశేషమైన ఆజీర్ణమరియు, జీగురు నేర్చుకొనినమున్నచో జలుబుగలు తెలిసికొనవలెను.

మూ త్ర ము

ఇది తెలుపు కొంచెము పసుపురంగుగలిగి పరిశుద్ధిముగా నున్నచో ఆరోగ్యము. ఏకాధారగా పోయుచుండును. నీరిని నిలువయుంచినచో ఏవిధమైన పదార్థము అడుగున జేరదు. మూత్రము పనుత్రు యెరుపురంగుగా నుండినచో జ్వరవిహ్వములనియు, రక్తముతో కూడికొనియున్నను, మూత్రద్వారము చురుగు నున్నను, నిలువయుంచినచో అడుగున మడిగను, తెల్లని పదార్థముగాని, ఉప్పువంటి పదార్థముగాని చేరినచో మూత్ర రోగములనియు, యెల్లప్పుడు ఎడతెగకుండు ప్రవించుచున్నచో ఆజీర్ణలక్షణము లనియు గ్రహించవలెను.

దూడలకు సంభవించు రోగములు

దూడలు పుట్టినవెంటనే మలబద్ధకము మొదలగు కొన్ని వ్యాధులు కొన్ని కారణములచే వచ్చుచుండును. దూడలను మట్టిలో తిప్పించుటచే ఈగలు గోమూరులు మ్నిల్లులు మున్నగునవి దూడలను చచ్చును. అవి పేదపప్పులనుండి తుప్పునుండి అన్నిరకముల కల్మషములను దూడలు తిను ఆహారముమీదకు తీసికొనిపోవును. దూడలు నీటిని తిను తరువాత పలువిధరోగముల పాలగుచుండును.

పాలుకుడుచు దూడలకు దాణాశిశ్నముగా పెట్టరాదు. అట్లు పెట్టుటవలన అతి సారము, కడుపుకొప్పి మొదలగు ఆజీర్ణ సంబంధమును వ్యాధులు పుట్టును. దూడకు

కలు చట్టిలో పొడగువ్వ పడితే నాలుగురోజులలో పరిష్కరింప.

అరిసారము వచ్చినపుడు తల్లికి రోగముమైన యున్నదేమో కనుగొనవలెను. వాతరోగముచే బాధపడు పశువుపాలు త్రాగి దూడ అంబాయని అంతగా అరువకాలదు. శరీరము కృశించును. అపానవాయువులు తరచుగా విడుచుచుండును. మలము జగురుజగురుగా నుండును. పైత్యరోగముచే చాలా బాధపడుచున్న పశువుపాలు త్రాగిన దూడ మలము వంటలువంటలుగా నుండును, శరీరము అధికవేడిగా నుండును. ముక్కురంధ్రములయందు లేను అంతగా నుండదు, కఫరోగముచే బాధపడుచున్న పశువు పాలు త్రాగిన దూడ నోటినుండి మౌంక కారుచుండును. పాలను వెడలగ్రమ్మచుండును.

వ్యాధులు కనుగొనుట

దూడ విశేషముగా ఆహారవేళలయందుగాక తదితర వేళలయందు అరచుచున్న యెడల మిక్కిలి బాధకలదనియు, కొంచెము తక్కువగా అరచుచున్నయెడల కొంచెము బాధగా నున్నదనియు గ్రహించవలయును. దూడ తన శరీరముపై నెక్కు డెక్కువగా పుకించుచుండునో అచ్చట బాధ కలదనియు, ఎక్కువ మసము చేతితో తాగిన బాధ నొందుచుండునో అచ్చట బాధకలదనియు తెలిసికొనవలయును.

మలబద్ధకమున్న దూడను ప్రేగులు ఆగదుట, కడుపుబ్బరము, శరీరము మడుమ కొనుట, విచారముగా నుండుట, పాలు కుడువవండుట యెడలగు లక్షణములుగిడును.

వస్త్రీకమునందు బాధ కలిగినపుడు మూత్రమున్ను, ఆసనమునందు బాధకలిగినపుడు మలమున్ను నిలచియుండునని గ్రహించవలెను.

ప్రతి ఆవయవమును, కండ్లను మాటిమాటికి నిగుల శ్రద్ధతో చూచుచుండువలెను. ఇంతటిశ్రద్ధ మనదేశములో యిప్పటి నాగరకతా లక్షణములుగల రైతులు గలిగియుందురా యని సందేహము. దూడలయందు తగినంత శ్రద్ధబుచ్చుకొననిచో మీపశువు సంతతి క్షీణించునుగాని వృద్ధిలోనికి రావాలదని గట్టిగా నమ్ముడు.

దూడల రోగములు

పెద్దరోగము (Pinderpest)

దీనినే మనరైతులు పారుదురోగము లేక నల్లమునురు, చీడపార్డు, సరకు, అమ్మ వారు, విషజ్వరముందురు. పశువులకు సంభవించు వ్యాధులన్నిటిలో నిది ప్రమాదకరమైనది. ఈ వ్యాధి అంటుసంబంధమైనది. పాలుపడుచుదూడలకు తలులనుంచి సోకును. కాబట్టి పెద్దపశువులకు సోకినప్పుడు వెంటనే దూడలను పాలుపడుచునుండు ప్రత్యేక సలమందుంచి మంచిపశువుయొక్క పాలు త్రాగించుచుండవలెను. రైతులలో చాలమంది గేదెదూడలకు, దున్నపిల్లలకు ఈవ్యాధితగిలిన లక్ష్యపెట్టరు. పెక్కుదొడ్లలో

బాపలుతప్పినా వేపలు తప్పవు.

నేతల మాదలు చికిత్సచేయబడక యీ వ్యాధివలన నిష్కారణముగా కనిపించిన పశువు లనేకములు గలవు.

లక్షణములు

ఈ వ్యాధి సోకినపిమ్మట మూడుదినములు మొదలు ఏడుదినములవరకువట్టును. కొన్నిటికి 10, 15 దినములుపట్టును. పశువుల ఖానుందులు, ఈ జాడ్యముసోకిన అంత్య దశలో అసగా పారుట మొదలుపెట్టిన తరువాత జబ్బుతగిలినదని యూహించుదురు. మొదటనే తెలిసికొనుట దుర్లభము. మొదటనే తెలిసికొనినయెడల కోగమును నులభ చికిత్సతోడనే బాల్యవస్థలోనే నశింపుచేయవచ్చును. జాడ్యము ముదిరి పారుట మొదలుపెట్టిన తరువాత కోగము కుదురుట కష్టము.

ఈవ్యాధి సోకిన ఆరంభదశలో తీవ్రమైనజ్వరము 106, 107 డిగ్రీలుండును. ధర్మామిటరుతు అపసములో పెట్టిచూచిన స్పష్టముగా కనబడును. అప్పుడప్పుడు ఆరమేత మేయుచుండును. తల నిటువటు ఆడించును. చెవులనుండి రక్తికారును. నల్లకప్పవేయును. కన్నులకొలుకులు బిరునుగానుండి పురులుకట్టును. మలబద్ధక మెక్కువగానుండును. చెవులు వ్రేలాడవేయును. వ్యాధిముగిసిన కొలది పలుచగా పారుచుండును. పారు డెక్కువైన కొలది నుర్వాసనగానుండును. క్రమేపి శీతలములోనికివచ్చి చూడ మరణించును.

ఆయుర్వేద చికిత్స

వ్యాధితగిలిన వెంటనే సాంటి 1 తులము, నాము 2 తులములు; హంతికర్పూరము పావుతులము కలిపి నూరి అర్ధశేరు చిక్కుపుట్టిలో కలిపి త్రాగించవలెను.

లేక చింతపండువులును అర్ధశేరు, ఉప్పు 2½ తులములు కలిపి త్రాగించును.

ఈరీతిగా తగిలినప్పటినుంచి మూడు దినములు పెట్టుట మంచిది.

పారుచున్నయెడల

పచ్చి తుమ్మ చెక్కరసముగాని, పచ్చి నేరేడుచెక్కరసముగాని పావుశేరు తీసి కొని దానిలో నిమ్మకాయంత వెన్నకలిపి రెండుమూడు మోతాదులిచ్చిన తగ్గును.

లేక దానిమ్మచిగుళ్ళు పెరుగులో నూరి రెండుమూడు మోతాదులిచ్చిన తగ్గును.

ఇంకను ఆయుర్వేద చికిత్సలు కావలసిన నేను రచించిన పశుచికిత్సాసారము గ్రంథములో చూడుడు.

లేక కార్పాలిక్ అసిడ్ 10 చుక్కలు నీరు అర్ధశేరు కలిపి రెండు మూడు మోతాదు లీయవచ్చును.

నోటిభ్రండ్లకు పటికలోషణతో పుక్కిలింపు చేయుచుండవలెను.

ఆహారము - సలహాలు

మాడలకు సులభముగ జీరముగు పదార్థములను వాడవలెను. దీపనకారలను విసర్జింపవలెను. కండను పటికనీటితో తడితరచి గరు లోచనముతోను కడుగుచుండవలెను. ఈగలు వాలకుండ ఫ్లినెల్ లోతునును అచ్చటచ్చట జల్లవలెను. సులమూత్రములు ఎప్పుటికప్పుడు తీసివేయించుండవలెను. పాగుగుపుట్టిన వెంటనే తగిన చికిత్సచేయుట వలన కొంత ప్రయోజన ముండగలదు వ్యాధి నెమ్మదిగించినతరువాత తగిన ఆహారముచ్చుచుండవలెను. వ్యాధి తగ్గువరకు నితని కాచియిప్పుట మంచిది.

గాళ్లు (Hoot and Mouth Disease)

ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా తుక్కుగడ్డి తిరి తిరుగుటచేతను, చూడ ఆనానోగ్యముగా నుండుటవలనను, చలిగాడ్పులలో నుండుటవలనను, గరియైనపోషణ లేకపోవుటవలనను, అంటుసంబంధముగ పశువులను సోకుటవలనను కలుగును. ఈవ్యాధి తగిలిన పశువుల పాలను చూడలకు త్రాగించరాదు. ఈపాలు త్రాగిన దూకు వివిచయలప్రకారము చనిపోవును.

లక్షణములు

ఆరంభములో చూడ మందముగినుండును. జ్వరము తీవ్రముగా నుండును. కండ్లు ఎరుపురంగుగానుండును. దగ్గు ఉండును. తల అడించునుండును. నోటికిసోకినమెడల చప్పరించుచుండును. పండ్లు కొరుకుచుండును. చిక్కినమూడలు బలము కలవానికన్న ఎక్కువ బాధపడుచుండును. నోటిలోను, కాళ్ళమీదనుండు పుండ్లుచికి పుండ్లుగా నగును. గిట్టలుపగిలి ద్రవము కారుచుండును. పురగులుపడి ప్రాణాపాయముకూడ కలుగుచుండును.

ఆయుర్వేద చికిత్స

నాలుకకు అప్పుడప్పుడు మద్దకర్పూరము వేసెతోకలిసి రాయుచుండవలెను.

ఫనియాలు 2 కు, మిరియాలు అగతులగా, మద్దకర్పూరము 1 కులం కలిపి రెల్లెవు పానకముతోగాని, వియ్యపునీటితోగాని త్రాగించవలెను.

నోటి పుండ్లకు

మాచికాయపాడి, పటికపాడి సమానభాగములు కలిపి అప్పుడప్పుడు అద్దుచుండవలెను. పటికనీటితో నోరుకడుగు చుండవలెను. ఇంకను తుమ్మచెక్క, రానిచెక్కవేసి కాచిన నీటిని కాళ్ళను నోటిని కడుగు చుండవలెను. కానిపుండ్లకు అప్పుడప్పుడు నెయ్యి రాయుచు వచ్చిన జల తగ్గి మానుకు. వేపచెక్కబూడిద పుండ్లకు పట్టించవచ్చును.

మామిళ్ళుమగ్గినా నేరేళ్ళు నెగినా ఫలము పెద్ద.

అహారము - సలహాలు

దూడను విక్రాంతియైన పరిశుభ్రమైన కాలలో నుంచవలెను. ఔత్తని ఆహారపదార్థములు, యితరజావలు పెట్టుచుండవలెను. పెసరపప్పు శేరి నెయ్యి కలిపి పెట్టుటనుంచిది. కొని తగిలినదూడలను ఎండలో నెంతమాత్రము తిరుగనియరాదు. అట్లుతిరుగనిచ్చిన దూడల రొప్పుపుట్టును. దూడలు చెడిపోవును.

పాలదొమ్మ (Milk Anthrax)

దూడలు పాలు ఎక్కువతక్కువలుగా తుడుచుటవలనను, పాలుపీతుడనప్పుడు ఎక్కువగా విడిచిపెట్టుటవలనను, చిక్కిరి పాలు కడుపులో జేరుటవలనను, ఈ వ్యాధి కలుగును; నోటినుండి జిగురువచ్చిపదార్థము వెలువడుచుండును. పాలు కడుపులో జేరుకొనును. తుక్కిపాటు పడుచుండును. దగ్గురుండును. మందమతిగానుండును. నల్ల కప్పువేయును. శరీరము మడుచుకొనును. వ్యాధిముదిరినకొలది గురకయుండును. కడుపుబ్బును. కండ్లనుండినీరు గారుపును. ముక్కులగుండ ఒకవిధమైన ద్రవము కారును. క్రమేపి ఊపిరి ఆడక చనిపోవును.

చి కి త్త

ఆప్పుడప్పుడు దూడలను చుట్టబడక ములేమండ చూచుచుండవలెను.

పసుపు 1 తులము, కొట్టసిండి 1 తులములు, వెన్న నిమ్మకాయంత కలిపి పెట్టవలెను.

లేక పెన్నేరుచుంప 2 తు, గిల్లేరువేళ్ళు ఆసుపైడ, కలిపిటిలోకలిపి త్రాగించవలెను.

లేక మోడుగవువు 1 తులము, బియ్యపును ఆరశేరు కలిపి త్రాగించుము.

బరిప్రక్కలను తుక్కువవేయు రక్షలు వేసిన పాలదొమ్మతగ్గును.

తగిలిన వెంటనే సారాయిపట్టిన మంచిది.

చలిదొమ్మ (Cold Anthrax)

ఈ వ్యాధి వర్షాకాలములోను శీతకాలములోను తరచుగావచ్చును. ఈ వ్యాధి గల చూడకడుపులో నూత్నజీవులు ప్రవేశించును. తరువాత అవి రక్తములో చేరి వ్యాధిని వృద్ధిజేయును. 105, 106 డిగ్రీలవేడి లోపలనుండును. చలిచే గజ గజ పగులుచుండును. వెండ్రుకలు నీక్కబొడుచును. చొంగమెక్కుర గారుచుండును. పారును. నల్లకప్పువేయును. వ్యాధిముదిరినకొలది నాలుక బారివిడచును. క్రమేపి కడుపుబ్బి చనిపోవును.

చికిత్స

సారాయి 2 డ్రాములు తగిలించెంటనే త్రాగించుము.

కారపుపాలు ఒక అరగొట్టము త్రాగించుము.

అవుపంచిరము శ్రీకూకరము సమానభాగములు కలిపి మాడుగొట్టములు పెట్టి తగును.

పనుపు 1 తులము, ఉప్పు అర్ధచేరడు, కలిపి అర్ధనేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

తాటిలెల్లము ఉలవపిండి కలిపి పెట్టి తరువాత కలిపి త్రాగించవచ్చును.

పాలదొమ్మకుచేసే చికిత్సలే ఈవొమ్మకు చేయవచ్చును.

అజీర్తి (Dyspepsia)

కొన్ని పశువులపాలు చిక్కగుండుట చేతను, హెచ్చుగుండుటచేతను ఆకలి లేనప్పుడు తానంతటది పాలుత్రాగుటచేతను ఈవ్యాధికలుగును. మాడనాలుకమీద తెలుపుకర్ణముగల పొరయేర్పడును. ఊసిరి పులుసువాసనగా నుండును. పాలు అప్పుడప్పుడు కమ్మకుండును. కక్కినపదారములతో పాలసంబంధమైన విరుగుడువీరుగాక జగటగుండు తెనుడ యుండును, హంతితోపాటు అధికముగ మలబద్ధముండును. మాడ చిక్కిపోవును, ఆరోగ్యము క్షీణించును. ఎముకలు పెరిగనబడుచుండును. శరీరము కిరలముగానుండును. కొన్నిటికి కడుపునొప్పికూడ యుండును. సరియగుచికిత్స చేయనిచో మాడ చనిపోవచ్చును. దీనినే నెలజబ్బు అనికూడ యందురు.

అయుర్వేదచికిత్స

నామరసం పావునేరు, సొంటిరసము పావునేరు, ఉప్పు తులము కలిపి త్రాగించవలెను. తమలపాకులు 10, ఇంకువ అరతులము, గురివిందాప 1 తులము కలిపి నూరి పెట్టి తగును. పాలలో మిరియాలపొడి కలిపి దానిలో కంకిరాయి ఎఱ్ఱగా కాల్చి పడనేసి త్రాగించవలెను. వెల్లులిపాయలు, 1 తు, దుఘ్నుచిగుళ్ళు అరగుప్పెడు, పెరుగు పావునేరు కలిపి పెట్టుము. కంతమదగ్గర మాడుగీతలుగా గక్షలువేసిన తగును.

విరేచనములు (Diarrhoea)

కొన్ని మాత్స్యజీవులు పశువులపాలతిత్తులలోజేరి ఆపాలను నూడ కుడుచునప్పుడు దానికి సోపటచేతను, పాలలోనుండు వస్తువులు తగ్గుటచేతను ఈవ్యాధిమాడలకు రావచ్చును. సాధారణముగా నివ్యాధి చాలసందర్భములలో అయుక్తవార పాపముల వలన కలుగుచున్నది. ఇంకను మాడలు చెడిపోయిన పదార్థములను తినుటవలనను, జెడువిన త్రాగుటవలనను రావచ్చును.

కలిపిపండ్లు పండిలే కరువువచ్చును.

లక్షణములు

కొన్నిదూడలకు పెల్లపెల్లగా పారుట ప్రారంభించిక్రమముగ అధికముగ కావచ్చును. మరికొన్నిటికి అకస్మాత్తుగా అధికముగనే ప్రారంభించును. విరేచనపురంగు కొంచెము పనుపుపచ్చగనుండి తరువాత నలుపురంగుగఁబడిగా నుండును. వానితోపాటు కొంచెము జగురుకూడ నుండవచ్చును. ఇంకను దుర్వాసవతోగూడిన నీళ్ళవిరేచనము లగును. పెరుగుతునకలవలె గుండ్రముగ ఉండ లుండలుగ నలుమలు విరేచనముతో కలసియుండును. ఇవి జీర్ణముకానిపాలు అని తెలిసికొనవలెను. విరేచనము తక్కువైనకొలది దూడ పిరసింది చనిపోవును.

ఆయుర్వేద చికిత్స

నూనెలో ఏనుముంది దూడ కందించవలెను.

పమిడిప్రత్తియాకు మెత్తగా నూరి కలితో కలిపి పెట్టవలెను.

దానిమ్మయిగుళ్ళు గుప్పెడుతీసుకొని పెరుగుతో నూరిపెట్టవలెను.

ఈ చికిత్సలు విరేచనములు కట్టువరకు రెండుమూడుసార్లు ఈయవచ్చును.

వైరూష్యేషధ చికిత్స

క్యాస్టర్ ఆయిల్ 2 ఔన్సులు యిచ్చిన ప్రేగులను శుభ్రము చేయును.

ఒపియం $\frac{1}{8}$ తులమును అర్ధసేరుగంజిలో కలిపి పెట్టము.

ఆహారము - సలహాలు

దూడను పాలుకుడుపరచు. వేడినీటితో ఆరంభములో ఎసిమాచేయుట మంచిది. విరేచనములు పలుచగనుండి మిక్కిలి దుర్వాసవగా నున్నయెడల వగరుపదార్థములిచ్చుట మంచిది. దూడకు వెచ్చనము నీయవలెను. పొడిఆహారము పెట్టవలెను.

మలబద్ధకము (Constipation)

దూడకు మలబద్ధకము తరచుగా సంభవించుచుండుట వాడుక. శీతకాలములో ఈ మలబద్ధకమువలన అనేకదూడలు చనిపోవుచుండును. చిక్కపాలు త్రాగుదూడలకు ఈ వ్యాధి తరచుగా వచ్చుచుండును. ఈ వ్యాధినిగూర్చి రైతులు బాగుగా తెలిసికొనవలెను ఈ వ్యాధిగల దూడలకు తగుచికిత్స చేయని యెడల దాని యావజీవమును బాధించును. ఇది పాలు తక్కువగుటవలనగాని, తగినంత క్రొవ్వుపదార్థము లేకపోవుటవలనగాని, ప్రేగులలో సరియైన గమనము లేకపోవుటవలనగాని, చిలిగారి ఎక్కువ సోపుటవలనగాని రావచ్చును.

కలిసిలు పండిలే కాలము తీరుతుంది.

అక్షయములు

మలబద్ధముగల మూడలవ కడుపునొప్పి కూడ సంభవించును. మూడ చిక్కిపోవు చుండును. పెద్దప్రేగు దిసదిసలు తిత్తివలె పెద్దదై అందు మలము నిలువయుండి నానాటికి ప్రేగు బలహీనము చెందుచుండును. ఆయాసపడుచుండును. వ్యాధి మదిరినకొలది ప్రేగుచివర భాగము బైటికిరావచ్చును. మలము గట్టిగా రాయవలె ఉండబండలుగా అసనముపద్దనుండి బయటకు రాకపోవుటచే తినుటకుండును. సరియైనచికిత్స చేయని మేడల మలము శరీరములో జీర్ణించి దుగ్గుములు పుట్టి చనిపోవును.

ఆయుర్వేద చికిత్స

4 అరటిపండ్లను తోలు తీసి అముదములో ముంచి నోటిలో వేయుము.

సున్నపులేటగాని కార్పుపాలుగాని అరిగొట్టుము పెట్టుము.

గొలిమిదాపలును నూరి రోక్ష నిమ్మకాయలంత తీసికొని అముదముతో కలిపి పెట్టుము.

2 తులముల ఉప్పును అర్ధసేరు గోరువెచ్చు నీటిలో కలిపి త్రాగించుము.

వైరూప్యచికిత్స

ఎప్పనసాల్తు 2 బొమ్మలు తీసికొని అర్ధసేరు గోరువెచ్చు నీటిలో కలిపి త్రాగించవలెను.

క్యాస్టర్ ఆయిల్ 1 బొమ్మ సిప్పర్ మెంటురీరు అరిబొమ్మ కలిపి త్రాగించుము.

టింక్చర్ నవ్వువామికా 30 చుక్కలు తీసికొని అర్ధసేరు నీటిలో కలిపి త్రాగించుము.

ఆహారము - నలహాలు

రైతులలో చాలమంది అతివేడివేసి మలబద్ధకముగానున్న చూడకు బలుసాకు, అముదము, సొంటి, మున్నగు వస్తువులు పెట్టుదురు. ఇట్లు పెట్టుటవలన ఇంకను వేడివేసి మలము గట్టిపడి బయటకు రాకపోవుటచేత కూడ బాధపడుచుండును. కాబట్టి వ్యాధి నిదానముగా కనుగొని చేయవలెను. మూడయొక్క తత్వమును గ్రహించి ఎవరూ చేయవలెను. వేడిబాగుగా నున్నపుడు ఎవరూ చేయవలెను. శీతలముగా నున్నపుడు చేయరాదు.

కడుపునొప్పి (Gastralgia)

చూడకడుపులో పాలు పులిసిపోవుటవలన కొన్నిరకముల పదార్థములుపుట్టి ప్రేగులలో రెచ్చపెట్టుటవలనగాని, ప్రేగులలో పాలబిళ్ళలుండుటవలనగాని, పాలు

బలునులు పండిలే గొలునులువలె పండును.

సరిగా జీర్ణము కాకపోవుటచేత ప్రేగులలో గాలిచేరుటవల్లగాని యింకను తదితర వ్యాధులవల్లగాని యీవ్యాధి రావచ్చును. ప్రేగులలో క్రిములుండుటవలనకూడ ఈవ్యాధి రావచ్చును.

లక్షణములు

కడుపు గట్టిగానుండును. తనతలను పొట్ట నానించుకొని నాలుగుకొళ్లను తన దగ్గర జేర్చుకొని ముడుచుకొని పండుకొనును. దూడవ బాధవిక్లవైనకొంది కొళ్లతో నటునిటు తన్నుకొనుచుండును. దూడమూత్రద్వారసంహిపమున నుండు చర్మము ముడుచు కొనిపోవును. చులబద్ధము కొన్నిటికియుండును. అపాకనాయువులు విడచుచుండును.

ఆయుర్వేదచికిత్స

నామూరసము అర్ధసేరు, జీలకర్ర ౩ కులము, అర్ధసేరు కారవుపాలలో కలిపి త్రాగించును.

అరతులము ఇంగువనను అర్ధసేరు గచ్చాకురసములో కలిపి త్రాగించును.

అరదొండాకు పసరు రే కులములు అనువము 4 కులములు కలిపి త్రాగించును.

ఇంగువ 2 కులములు, నామూరసము అర్ధసేరు కలిపి అర్ధసేరు, కలిపి పెట్టును.

ఆహారపు నలహాలు

జీర్ణముకొని పదార్థములు పెట్టరాదు. వడినీటిని దాహముగా యిచ్చుటమంచిది. చలిగాలి సోకినీయరాదు. మలబద్ధముగానున్నచో సమ్మిరిటితో ఎర్రమాచేయుట మంచిది. దొక్కభాగములకు వడికావులు తీయుటమంచిది.

కడుపుబ్బు (Tympantitis)

పాల జీర్ణముకాక పొట్టలో నిలువయుండుటవలనను, తటాలున వడిరివోట్టిని జేరినరుత్రాగుటవలనను, ఏపదార్థమైనను గొంతుకలో అడ్డము వడుటవలనను, పొట్టలోపల గాలి ప్రవేశించుటవలనను, దాహాదునులుగాని, ధాన్యము మున్నగునవి తినుటవలన గాని ఈవ్యాధి రావచ్చును.

లక్షణములు

కడుపు విస్తారముగా పొంగును. వ్యాధి ముదిరినయెడల బాధపడుచుండును. దీర్ఘమైన క్యాపవిడచును. పొట్టముబ్బి రాతికంటె కఠినముగా నుండును. మూలుమందును. గాలి జేరినయెడల ఒత్తిస మై ఉబునచుండును. అటునిటు జొర్లుచుండును. వ్యాధి ముదిరిన కొంది దూడకు ప్రాణాపాయము కలుగవచ్చును.

కలుగును. పాలు చెడిపోయినపుడు, వాని అంతురములనుబట్టి నోరు శుభ్రముగా నుండ నచ్చుడు ఈవ్యాధి కలుగును. పెనవులలోను, చిగుళ్ళమీదకు, అంగిటిలోను, దవ్వుడల లోను చిన్న చిన్న పొక్కులుండును. ఆ పొక్కులదుట్టు ఎరువుగా వాచి పాలు మ్రింగుటకైనను కష్టముగా నుండును. నోటినుండి నురుగుమాడ వచ్చుచుండును. చూడఁ పాలు కష్టముగా తాగుచుండును.

ఆయుర్వేదచిత్రి

కుక్కుచెక్క, కాచిచెక్క నిటితో దినమునకు రెండుచూడు పర్యాయములు నోటిని కడుగుచు మాచికాయపొడినిగాని, కివిరిపొడినిగాని లేనతోకలిపి నాలుకకు నాకించుచుండ వలెను.

వైరూప్య చిత్రి

పొటాషియంపర్మాంగనేట్ లోషనుతోగాని, ఆలం లోషనుతోగాని నోటిని దూషచేయుచు పొటాషియం ఆను తెల్ల పొడిని లేనతోగాని, గ్లిసెరిన్తోగాని కలిపి అప్పుడప్పుడు నోటికి రాయుచుండవలెను.

ఆహారము - సలహా

తల్లికియుచ్చు ఆహారము పథ్యముగా నుండవలెను. పరిశుభ్రమైనకాలలో నుంతు వలెను. వ్యాధి తగ్గినతరువాత క్రమేవీ నోటిని పరిశుభ్రముచేయుచు సులబద్ధము లేకుండ, కాపాడవలెను.

రక్తవిరేచనములు (Dysentery)

ఇది ప్రేగులలోని మాలిన్యమువలన కలుగును. అతిసారమునుండి ఈవ్యాధి కలు గును. అతివేడివలనను చలిగాలి సోపుటవలనను, చెడు ఆహారములు యిచ్చుటవలనను అపరిశుభ్రముగా నుండు నిటిని త్రాగుటవలనను, గాలిలో ఆకస్మికముగా మార్పు కలుగుటవలనను ఈవ్యాధి కలుగును.

లక్షణములు

చూడ నుండమతిగను, అసౌఖ్యముగను కొంతకాలముండి ఈవ్యాధి అకస్మాత్తుగావచ్చును. నులము నుండి లుండలుగానుండి బుర్రతోడను బాదతోడను కలుగును. నడచును వంగిపోవును. తోకను లేపుచుండును. తరచుగా పేదచేయుటకు ప్రయత్నము చేయుచుండును. మూలుగుచు పండ్లు కొడుకు కొనుచుండును. విరేచనములు పెక్కుగు వాసన కలిగియుండును. క్రమేవీ నిరసించి చనిపోవును.

ఆయుర్వేద చికిత్స

పెన్నెరుడుంపను శరీరస్యోలోకలిసి రెండుమాడు పశ్యాములు పెట్టవలెను.

10 కులముల అమాదములో క్షీ కులము నల్లనుండు కలిసి పెట్టవలెను.

వామ 1 కులం, జీలకర్ర క్షీ కులం, సొంటి 1 కులం కలిసి బెల్లముతోకలిసి నాలుకకు నాకించవలెను.

వైద్యుల చికిత్స

క్రిసారీను ఒక చుక్కను తీసికొని అర్ధసేరు నీటిలో కలిపి త్రాగించవలెను.

గం ఆకేసియాలో ఒక్కొక్క చుక్క క్యాప్టరాయిల్ పోయుచు నన్నె కలులో వేసి నూరి క్రమేసి నీరు క్యాప్టరాయిల్ కలిపిన చిక్కిని పాలగును. ఇది త్రాగించవలెను.

క్లోరోడైక్ గాని క్యాంఫర్ డైక్ గాని 15 చుక్కలు అర్ధసేరు నీటిలో కలిపి యిచ్చిన లగ్గును.

ఆహారము - నలహాలు

ఆహారము ద్రవరూపముగను, బలమొసగునదిగను, చురుకైన శరీరముగనదిగను యుండవలెను. ఘనపదార్థములు ఈరోగము సారముగ మరిక వారముదినముల పర్యంతమును దూడకు తినుటకీయరాదు. చన్నిటిని తీయరాదు. కాదిన నీటిని త్రాగించవలెను.

క్రిములు (Worms)

దూడప్రేగులలోను, మలకోశములోను అనేక రకములైన క్రిములు చేరుచుండును. (Round worm) అనగా గుండ్రని పురుగు అనునది తెలుపుగా పొడుగుగా నుండును. ఇది 6 లేక 12 అంగుళముల పొడవుగలిగి చిన్నప్రేగులలో నుండును.

(Thread worm) (రెడ్ వెరిం అనునది 1, 6 అంగుళముల పొడవుగలిగి పెద్ద ప్రేగులలోను, అననములోను యుండును. ఇది చిన్నదిగానుండి నన్ను నూదినలె నుండును. (Tape worm) టేపువరం ఇది పెద్దప్రేగులలోను, చిన్నప్రేగులలోను యుండును. ఈ క్రిములు ఆశుభ్రరవలననే ఎక్కువగా శరీరములో ప్రవేశించును. అంటు వ్యాధుల ప్రకరణములో చూచిన ఈక్రిముల ఫోటో కనపడును.

లక్షణములు

దూడకుప్పించును. అకలి హెచ్చుతగ్గులు కలిగియుండును. తోకను దీనికైన వేసి రుద్దుకొనుటకు ప్రయత్నించు చుండును. మట్టితినుటకు ప్రయత్నించును. మలము

జగటగానుండును. కడుపునొప్పికూడ నుండును.

ఆయుర్వేద చికిత్స

గాడిదగడపాకుపసరు పావుసేరు త్రాగించుము. అరచేరెడుఉప్పు, అరసేరు చింతపండు పులుసుతో కలిపిత్రాగించుము. పచ్చినేలవేమురిసము పావుసేరు, కలిపి అరసేరు కలిపిత్రాగించుము. యింగువను పెట్టుము.

వైరూప్య చికిత్స

టర్పెంటైన్ శీత్రు, క్యూబెబాబా 5 గ్రాములు, కలిపి రెండుపర్యాయములీయుము. సోప్‌వాటరుతో ఎరిమాచేయుము.

రుబాబ్బుపాడరును సోడాలైకార్బనేట్‌ను సమానభాగములు కలిపి బెల్లెపు నీటితో త్రాగించుము.

ఎస్పెస్‌సాల్టు 10 గ్రాములు తీసికొని అరసేరువేడినీటిలో కలిపి త్రాగించుము. రాతసాల్టును 3 గ్రాములు అరసేరు నీటిలో కలిపి త్రాగించుము.

ఆహారము - సలహాలు

ఆహారము త్వరగా జీర్ణమగునదిగా నుండవలెను. ఉప్పుకలిపిన నీటిని పెట్టుట తుంచుచి. దూడను అటునిటు తిరుగనిచ్చు చూడవలెను.

రక్ష చైత్రి

దూడతకు ఈవ్యాధి తరచుగా వచ్చుచుండును. కరీరముమీదను, మూతిమీదను తదితరభాగములయందును చిన్నచిన్న వురుపులు లేచి బాధను కలుగజేయును. ఈ వురుపులు నలుపురంగుగా నుండును. నీటిని చిదివిన రసికారి ఎరుపురంగుగా నుండును. ఇంకను నీటిని తాకిచూచినయెడల వేడిగను నొప్పిగను యుండును. అశుభ్రమైనగాలిని వీల్చుటవలన ఈ వ్యాధి కలుగును. ఇది 15 దినములవరకు నుండును. సరియైన చికిత్స చేయనిచో వురుపులన్నియు కలిసి పెద్దవాపుగా నగును.

ఆయుర్వేద చికిత్స

నమ్మనీటితోగాని, వంతుడుకాయనురుగిలోగాని కరీరభాగములు కడిగి మైల తుత్తం పావుతులం, వెన్న 5 గ్రాములు, గంధకము తులము, ముద్దకర్పూరము అరతులం కలిపి మైత్రగానూరి రెండుమాడు పర్యాయములు రాసిని తగ్గిపోవును. లేక బ్రహ్మ దండి ఆకుపసరులో ముద్దకర్పూరము కలిపి రాసిన తగ్గును.

వైరూప్య చికిత్స

కార్బారిక్ ఆసిడ్ 20 చుక్కలు, సల్ఫర్ ఆరతులం, హోరిక్ ఆసిడ్ 1 తులము. జింకు ఆక్సైడ్ $\frac{1}{2}$ తు, వ్యానులైను 6 తులములు కలిపి అప్పుడప్పుడు రాసిన తగ్గును. లేక క్రిసాల్ 10 చుక్కలు, కాపర్ సుల్ఫేటు $\frac{1}{2}$ తులం, జింకాక్సైడ్ 1 తు, వెన్నగాని వ్యానులైనుగాని 6 తులములు కలిపి అప్పుడప్పుడు రాసిన తగ్గును.

మిన్నల్లుల వలన కలుగు వుండు

దూడలకు మిన్నల్లులు పట్టి చాలబాధించును. వీటివలన అనేకదూడలు చని పోవుచుండును. వెంట్రుకలు రాలిపోవును. శరీరముమీద అంగుళము రెండంగుళముల లోతు వుండు పడుచుండును. మిన్నల్లులు చర్మమునందు రంధ్రముచేసి గుడ్డు పెట్టుచుండును. ఆ గుడ్డు పిల్లలై చర్మముపై దురదను త్రట్టిచుండును. ఇవి రోగములుగల పశువురక్తమును వీల్చి యితర పశువుల దేహములలో దీనిని విడుచుటవలన అందు వ్యాధులు కలుగుచుండును.

చికిత్సలు

వేపాకుపసరులో మంచినూనె కలిపి రెండుసార్లు పూరపెట్టుము. ఫైరెల్ 1 భాగము, నీరు 2 భాగములు కలిపి శరీరమునకు పట్టించిన మిన్నల్లులు చనిపోవును. వేపనూనె 1 భాగము, కిరోసనాయిల్ 2 భాగములు కలిపిపట్టించిన తగ్గును. లేక ఎండు చేపలకడిగిన దీనిని పట్టించిన పోవును.



పాడి ప రి శ్ర మ

ఇరువది ఒకటవ భాగము

సీ॥ సంసారిజనునకు సౌఖ్యదములు రెండు
పాడియు బంట నా బరగుచుండు
గోవు వానికి నెల్ల దావలమాటచే
బాయక యది సేవనీయమయ్యె
పాడివంటలు లేనివానిదే భవనంబు
వనకల్పమై కనంబడునుగాదె
పంటలేకుండిన బడయుటెటశనంబు
పాడిగల్గక తృప్తిపరగుటెట్లు

గీ॥ ఇట్టివౌ కారణంబులబట్టి గోవు
భూజనంబులకెల్లను బూజనీయ
మయ్యె నద సద్వివేక విఖ్యాతమతులు
ధేనుగణమును బోషింప బూనరెట్లు.
“ గో ప్రభావము ”

సీ॥ గోభూములనుదున్న గోష్పాదమంతయు
బీడులులైనట్టి యా గోడుకతన
నావులపాలన్ని నంగళ్లపాల్సేసి
చిల్లరసొత్తు లాసించుకతన
వృద్ధోక్షములు చాల వివిధవిధంబుల
సూదనాపణముల జొచ్చుకతన
సోమరితనమున జూచి చూడక యాల
మందలు పాడయినందువలన

తే॥ గీ॥ బంట లారోగ్యములుతగ్గె బ్రబలె ఋణము
 వైద్యశాలలు సావము వాసికక్కె
 గాన బ్రత్యక్షలక్షుల గాంచినట్లు
 గోవులను దేవతలనెట్లు గొలువరయ్య.

“మూగతల్లి”



భారత దేశపు పాడిపరిశ్రమ

వ్యవసాయమే భారత దేశముయొక్క ముఖ్యపరిశ్రమ యనియు, తక్షభివృద్ధికి కోట్లకొలది భారతీయుల జీవన మాధారపడి యున్నదనియు వేరుగ చెప్పవలసియు లేదు. కాని మన దేశమునందు వ్యవసాయము చాల వెనుకబడియున్నది. విరామకాలములయందు కృషిపలపగాని, నిరుద్యోగులపగాని పనికిల్పించుటకై గ్రామపరిశ్రమల నెఱకొల్పుట అత్యంతావశ్యకమను విషయమును గ్రామపునరుద్ధరణయందు శ్రద్ధ తీసికొనుచున్న ఆర్థికవేత్తలందరు గుర్తించియున్నారు. గాఢమహాత్ముని చరణాసం దేశము గూడ నీ యావశ్యకతను గుర్తించుటయే ముఖ్యకారణము. కాని పెరుగు, పాలు, వెన్న నేయి మొదలగునవి ఎక్కువ విలువయైనట్టివిగను, ఆహారపదార్థములయొ దత్వావశ్యక

మైనవిగను పరిగణింపబడు భారతదేశములో పాడిపరిశ్రమను గ్రామపరిశ్రమగా నేర్పాటుజేసి యభివృద్ధికి దెచ్చు విషయమై యేమాత్రము శ్రద్ధ జూపవలయును మిగుల చిత్తము.

పాడిపరిశ్రమవలన లాభములు

సరియైన పద్ధతులపై నేర్పాటుచేయుటచే గ్రామ పాడిపరిశ్రమ యత్వంత లాభ దాయకమై అనేక విధముల గ్రామజనాభివృద్ధికి తోడ్పడుతున్నది. గోరక్షకులగు వ్యవసాయకులకు, ఆతని కుటుంబమునకు సువర్ణగుహపాడుగున నది చాలినంత పనిని కల్పించును. పాడిపరిశ్రమాలయ వ్యవసాయకులకును, ఇతర పనివారలకును అనేకులకు జీవనాధారము జూపించును. పాడిపరిశ్రమ మిగుల సభివృద్ధిజేరిన దేశములన్నిటిలోగూడ గోసంరక్షణము వ్యవసాయకృషియూ దొడ్ భూముల నే పరిగణింపబడుచున్నది. వ్యవసాయకుడగు గోరక్షకుడు తన గోవులనూడి నీకరింపగలుగుచున్న పాలను విక్రియించుటకును, ఇతర పదార్థములను తయారుచేసి లాభమును గూర్చుటకును ఆతని గ్రామముగ దున్న పాడిపరిశ్రమాలము మెంతయు తోడ్పడుచున్నది.

గ్రామములలోనే యేర్పాటు చేయవలెను

పాలను నుంచుకొనవచ్చు లాభము పొందవలయుననిచో పాల యుపయోగము ప్రాచీనా వినియోగము లోనికీ గొప్పతేజయును. ఒకచూడిరి మంచికముగా నుండునట్లు గూడ చూడవలయును. అందుచేత నీ పనులనన్నిటిని నిర్వహించుకొనుట పాలను స్వీకరింపగలుగుచున్న వ్యవసాయకునికిగాని సాధ్యము కాజాలదు. కావున పాడిపరిశ్రమాలయములకు తోడ్పాటు గోసంరక్షణము (cow protection) గూడ రైతుల కిత్తంతావసరమగుచున్నది. కొని యీ పరిశ్రమాలయములు పాలు లభించు ప్రదేశములకు చాల దూరములో నున్నను లాభములేదు. అందుచే పేరు తమతమ గ్రామములలోనే యిట్టి ఏర్పాట్లగునట్లు చూచి వానిసహాయమును పొందవలయును.

వ్యవసాయమునకు మిగుల సభివృద్ధికలలోనున్న డెన్మార్కు, న్యూజిలాండు, హాలండు, ఐర్లండు, ఆమెరికా మున్నగు దేశములయందు గ్రామమునకేగినను ఆ గ్రామ పాడి పరిశ్రమాలయములు కన్నులపండువుగా గానపడుచుండును. ఆ దేశముల యందలి వాని నాదగ్గుముగా పెట్టకొని కో-ఆపరేటివ్ పద్ధతి పై నే మనము ఏర్పాటుచేసికొనవచ్చును. అవి పాల పరిశ్రమాలయములగుల పాలను కొనితయారుచేసి ఎప్పటికప్పుడు విక్రియార్థము సగరముల కగుమతిచేయవచ్చును. ఇదియునుగాక ప్రత్యేకముగా మీగడ పరిశ్రమాలయములు, నేతపరిశ్రమాలయములు, గడ్డపాలను చేయు యత్ర లయములు, ఇతరవిధములైన పరిశ్రమాలయములు మున్నగునవి పాలయిమ్మకమును సాగించుచునే యిట్టివానిని గూడ తయారుచేయు పరిశ్రమాలయములుగాని అనేకములు నెలకొల్పు

చేసవలయుగానీ చెప్పవలయును.

లకుట కవకాశములు గలవు. ప్రస్తుతము ఆస్పృబకు నెయ్యి పాలు మిశ్రమ మెదలగు పాలపదార్థములను కేశుగు చేయు పద్ధతులను, పాలను ప్రాంత్య నుండి కాదు సనతియు పూర్వకాలపునాటి మోటుపట్టుతులై యున్నవి. భారతదేశములో నిట్టిగ్రామ పాడివరిశ్రమాలయములను నెలకొల్పబడును, వాని నభివృద్ధికి తెచ్చుటకును సహజముగ నెక్కువవకాశములున్నవి. ఒక్కగ్రామములో ఐట్టి పరిశ్రమాలయము నెలకొల్పబడినచో నెందఱో లేవనాధార మేర్పడగలదు.

గొడ్డుపోవునట్లు చేయుట

పాడిపశువులపట్ల పట్టణములలోని పాలవాండ్రు చేయుచున్న ఘోరకృత్యములలో పూకా యనునదికీ. ఇది ప్రాచీనభారతవర్షము గడించిన ఆధ్యాత్మిక యశస్సునకు గూడ భాగము కలుగ చేయుచున్నది. పాలవాండ్రు దురాచారములై లేగ మాడలను తగినన్ని పాలువదలక చంపుటయే గాక పాడిపశువులవలన వీలగునంత ఎక్కువగ పాలు పొగుటకు “పూకా” యను పరిచేసి పాడిపశువులను గొడ్డుపోవునట్లు చేయుచున్నారు. ఇటీవల లిన్ లిత్ గో (Linlithgo) ప్రభువునాడు ఇట్టి దెగ్గ మిగుల అవినీతికరమైన దని నిరూపించుచున్నాడు. పూకాయనగా చాలమందికి తెలియకపోవచ్చును. అదిపలురకములు. అవురొక్క గుహ్యంగములలోనికి గాలి నెక్కించుదురు. లేదా వెదురుగొట్టముతో ఉప్పునీటిని ఎక్కించుదురు. ఇతెన్నెన్నానములలోనికి దానితోకను మడిచి దోపెదరు. లేదా దానికి నరికిపోవునంతటి లావును, మూరకపోవుచున్నది గడివెంటిని తయారుచేసి లలవంతముగ ఎక్కించుదురు. ఒక్కొక్కప్పుడు మోచేతివరకు చేతిని దోపెదరు. దీనినే పూకా యందురు.

లేగలు చనిపోయినను పశువులు పొగిచ్చుననియు, పొగిచ్చునదిమితి పెరుగుననియు, సహజముగ పశువులు తమలేగలనుగాను పొగుగులలో నిలుపుకొనియుండు పాలు అవి నిలుపుకొనుటకుచేసి పూర్తిగా కిరుమికినావుననియు, కడుదీచమైన స్వాస్థ్యహానియితో ఇట్లు చేయుచున్నారు. పూకా వలన పశువులను అమితమైనచాధ కలుగును. ఇట్లుచేయు సమయమున పాపమా పశువు గ్రుడ్లు లేలవేయును. దానికి వెనుక చట్టభాగము ముడుచుకొని పోవును. భయాలిశయమును గజగజవణమునతో చెంత కెవలైన నచ్చివీసితనే ఆగి త్రుళ్ళిపడుచుండును. లేగలనోరు కట్టి అని త్రాగు పాలనుకూడ తామే తినెకొనవలెనని చేయు దుండగమునకంటె వేరొకటిగలదా? బుద్ధి వంతులు ఈ ప్రచారమునకు నోడ్చుకుందు గాక.

ఇంతియేగానండి ఎండి: ఆవులను, గేదెలను, నాగళ్ళు, బండ్లుకట్టి పరిచేయుచు దురు ణ్ణిమాడ ప్రట్టివ బాగుగా మేవుచును. గున్నపిల్లప్రట్టివ అనలేమేపరు. ఈరీతిగా పశుపోషణ యున్నది. వందలకొలది మాంసము ఆవులు కడుపునించి తిండిలేక కల్వ్యావ శిష్టములుగ నున్నవి. కాని ఈరీతిగా దుగ్ధకాలం చేసినచి దుగ్ధతమును ఆరోగ్యము

కాదుగదా, గడ్డియైన పెట్టగు. మాడచిక్కి ముగియవలసిన సంప్రాప్తమగును. కనాయి వానికి అమాడ నీతుగనే మాంసముతీనికొని గడ్డిచిక్కి చేతమాడను సప్తము చేయును. ఆవు పిచ్చిది, గడ్డిబొమ్మను చూచి భ్రమపడి పాలిచ్చును. తురిగిగా చేయుదురు.

పాడిపశువుల కష్టములు

మన దేశములో అనాదినుండియు ప్రతిరైతు తన పశువులకు తగినంత ఆహార మిచ్చి పోషించుటయు, పూజించుటయు, అనుభవించుటయు కలదు. పశుసంరక్షణ వేద కాలము నుండియు ధర్మసంరక్షణగా నెన్నబడుచున్నది. మన దేశప్రజలకు పూర్వకాలము నుండియు పశువులను బెంచు విధానము తెలిసియుండియు క్రమక్రమముగా మూఢనమ్మకములకు లోనయి ఈ విధానము నశించుచున్నది. ధనికులు విశేషము మున్నగువారందరు ఆంగ్లేయగురువులు చూచి మన పశు పశువులను భూములను పోగొట్టి యువ్యోగాల కౌశలపడుచున్నారు. ఇంకను తనితర కృత్యములన్నియు నక్షరజ్ఞానములేని ప్రజలకు విడిచి పెట్టబడుచున్నవి. అందుచేతనే పశుసంరక్షణ వ్యవసాయము మున్నగునవి క్షీణించుచున్నవి. ఇంకను మన దేశముందు పశువులవిషయమై చాలభాగము తగినంత శ్రద్ధ తీసికొనుటలేదు. పుట్టినవి పుట్టుచున్నవి, చచ్చినవి చచ్చుచున్నవి, కోగములు కుదుర్చుటకు రైతులకు తగినన్ని చికిత్సలు తెలియుటలేదు. పూర్వకాలములో ఆయుర్వేదపశువైద్యము చాల వ్యాప్తిలో నుండెడిది తనతన శాస్త్రములకుట్టి తెలియుచున్నది.

సోమరి రైతులు

మనదేశములో పాడిపశువులను పోషించువిధానము తెలియుని రైతులెందరో గలరు. జిల్లాబోర్డులు, కౌన్సిల్ యెలెక్షన్సులో స్టాండుయి పశుపోషణ వ్యవసాయము మున్నగునవి పురచిపోయిన రైతులెందరోగలరు. పట్టణములలో నుకొములుపెట్టి దురభ్యాసములకు లోనైన తమ యింటివద్దనుండు పశువు లేమిచేయుచున్నవో యెరుగని రైతులుకూడ గలరు. తమకు మించిన ఆస్తికలదు అందువలన బుణములుజేసి జప్తులు రాగానే తమ పశువులను తోలుకొనిపొమ్మను రైతులకూడ గలరు. జప్తుక్రిందవచ్చిన పశువులు కోర్టుదగ్గరను, బండెలదొడ్లలోను ఉండి మేత దొరికక కృశించుచుండును.

దొంగ పశువులు

మరికొందరు రైతులు పాడిపశువులను సరిగా మేపరు. ఇటువంటి రైతులను సోమరిపోతులందురు. వీరు చీకటిపడగనే తమ పశువులను తదితర రైతుల పొలముల లోనికి తోలుదురు. ఆ పశువులు పొలములలోనున్న మేత కలవాటయి దొంగతనము చేర్చుకొని ప్రతిదినము ఆహారిగిగానే పొలములకు బోవుచుండును. ఇట్లు కొన్నిదినము లైనతరువాత ఆ పొలము యజమాని యీ దొంగపశువును బట్టుకొని యాగ్రామము దగ్గరగా నున్న గ్రామాదుల బండెలదొడ్లకు తోలుకొనిపోయి పెట్టును. దొంగమేత

మేసిన ఆ పశువులు మిగుల విచారమునొంది తినుటకు వైదిన గడ్డి తినక మిగుల చిరాకుగా నుండుచుండును. వారాకాలములో వారమునెనులు మనుగుపట్టి వస్తము వరియు నప్పుడు తమ యింద్రోనుండి నిలబడకముచేతగాని, సోమరితనముచేతగాని, పశువులుండు సలములలోనికి రాలేక మేతమేపక పశువులను చూచు రైతులు గలరు. తమ పాలములను తదితరుల కమంకమునకిచ్చి కొదిగా గడ్డిని నిలువయుంచుకొని సంవత్సర కాలము గడుపవలెనను యుద్యోగంలో పాడిపశువులను సరిగా మేపకుండు రైతులు కూడ గలరు. మన దేశములో పాడిపరిశ్రమ, పశుపోషణయు, వివిధములగు చుప్పదని తెలుపుటకు విచారపడుచున్నాను.

పాడిపశువులను కడుగుట

ఈ పశువులకు పరిశుభ్రమైన సింహుగుండుటవలన మంచి యారోగ్యము కలుగును. ఆవులకంటె గేదెలు చిగురు పాడిపశువులు గాన చాల జాగ్రత్తగా వీనిని కాపాడుచుండవలెను. ఆ గేదెలకు బుద్ధిమంస మిగులప్రీతి. కాశీశరీరముగల పశువులెప్పుడును బీటిలోనే యుండువలెని కోరిక గలిగి యుండును. కొన్ని గేదెలు శరీరము నిండ మట్టినింపుకొని యుండినవగును. ముఠానాలలో కొందరు వారి శుభ్రముగా బీటిలో కడగ యిట్లే యుండును. అటు చుట్టవలన పశువు కంటుకొనియున్న బురద యెండి చెరుడు కట్టును. లేకుంటే పశువు శరీరము దిగదీయును. అందువలన పాలు కూడ క్షియింపెను. వ్యాధిగ్రస్త కలుగవచ్చును. కావట్టి పాడిగేదెల నెప్పుడును నియమించిన కేశవ శిష్యులుగా బీటిలో కడిగినయెడల వారి శరీరము లారోగ్యకరములుగ నుండును. పాలమునుండి గేదెలు రాగానే జాగ్రత్తగా పరీక్షించి వానికి తగిన సదుపాయములు చేయవలెను. పశువు కంటుకొనిన బురదలో ఒకవిధమైన రోగమును కలిగించు నుట్కజీవు లండవచ్చును. లేదా యీ బురద దుర్వాసనగా నుండవచ్చును. కావున వెంటనే బీటిలో కడుగవలెను. ముఖ్యముగా పశువుల తోకల కంటుకొనియుండు బురదను పొదగునానందు బురదను శుభ్రముగా కడుగవలెను. లేనిచో లోకమునెవరి, పొదగునావు చున్నగు వ్యాధులు కలుగుచు పోవు.

జలగలు పట్టుట

వేసవికాలములో మధ్యాహ్నము 12 లేక 1 గంటవఱకు, సాయంత్రము 4 లేక 6 గంటలవఱకు తప్పకుండ పాడిగేదెల శరీరములు చిట్టిలో కడిగినయెడల వానికి హాయిగానుండి చక్కగా నెరుని వేయుచు చెవులాడించుచు డును. ఆవులను, గేదెలను వలె స్నానము చేయించరాదు. ఆవు గేదెలె మట్టిజుతువుగాదు. కనుక యీగూమునతో యే పక్షమునకొ స్నానము చేయించుట మంచిది. గేదెలు చెరువులలోను కొలువలలోను స్నానము చేయుచు యిట్టి ఎచ్చునపుడు జలగలు శరీరమునట్టి ప్రేలుడు చుండును. అప్పుడు వాటిని వెచ్చుడగా తీసివేయవలెను. అవి శరీరముండి రాయెడల

ఉప్పునీటినిపోసి తీయవలెను. ఇంకను పొలముయొడి పశువులు రాగానే యేవ్యాధితో నైన వచ్చుచున్నవో, యే విషపుగుగైన కాటుకేసినవో, యే విషసాలీడైన కరదినవో, యే చిరుకప్పలైన పీకీసినవో తనిఖీ చేసి యింటిపద్దనుండు దాదాదినములుగాని, గడ్డిగాని వేయవలెను.

పాడిపశువుల నుంచువేళ్లు

పాడిపశువులు ఉదయము 9 గంటలవఱకు యింటిపద్దనుండి తరువరి సాయం కాలము 6 గంటలవఱకు బీళ్ళలో నుండవలెను. సాయంకాలము 6 గంటలనుండి ఉదయము 10 గంటలవఱకు ఇంటిపద్దనుండు కొట్లములలోగాని, పీకీ ప్రత్యేకముగా నుండు కొట్లములలోగాని యుండవలెను. పాడిపశువులకు కొట్లములలోండి యిండ్లకు తీసికొని వచ్చి పాలు సేకుటకొని మరల వెంటనే కొట్లములకు పోవలెనుచుంది. లేనియెడల యింటికిని కొట్లమునకును దూరముగా నున్నయెడల పాడి సేకుటకును ప్రత్యేక పనిమీద వెళ్ళవలసియుండును. ఇంకను కొట్లముయొడి తెచ్చు సాయపాత్రలలో తదితర నూత్ను బీవులు చేరి గోగములు కలిగింపవచ్చును. కాబట్టి పాత్రలపైను మూతలువేసి బాగ్ర త్రగా లేవలెను.

పాడిపశువుల విశ్రాంతి

వర్షాకాలములో 10, 15 దినము లొకేనాదిరిగా ధాన్యముల పరిసరపుడు పాడిపశువులను దొడ్లలో నుంచుదురు. మాగాణిభూముల పైకులు మెట్లరైతులకంటె పశువుల విడుదలమై చాల యిక్కటలు పశువులగును. మాగాణి రైతులు పశువులు పరిసరపుడు నిడితనిపోటులను తోలుటకు గలము లేక ఆ కొట్లములలోనే యుండుదురు. వర్షములను దొడ్లయంతయు తడిసి చెత్తములమాత్రములు పగిలెను (వర్ష) దుర్వాసన వేయును. అందుచేత ఆ చాసన సహించలేక పశువులు దొడ్లనుండి బయటకు వెళ్ళుటకు ప్రయత్నించును. కాబట్టి వర్షము పరిసరపుడు మిగ్రాము పశులసలములోనికి మిగ్రాము పశువులను తోలుకొనివెళ్లి అక్కడ కొంచెముసేపుంచి అటుంటి తీరుగనిచ్చుట మంచిది. లేక పొలములో నున్న మెరకనేలను తోలినను తోలవచ్చును. కొన్ని ప్రాంతముల యందు పశువుల నెల్లప్పుడు మెట్లభూములయందే వానికి తగిన కొట్లముల నేర్పరచి అక్కడనే యుండుదురు. ఈ పద్ధతి చాల మంచిదియే గాని ఆప్యదెప్పుడు యిండ్లకు గూడ సలవాటు చేయవలెను. వర్షములు లేనిపుడు, తిండి సాయములందును, పశువులను కట్టుకొయ్యలను కట్టివేయక విశ్రాంతిగా ఆ దొడ్లలో తీరుగనిచ్చుచుండవలెను. లేనిచో అవి బయటకు పోవుటకు ప్రయత్నించుదుండును. జబ్బుగానుండు పశువులను మాత్రము పొలములకు తోలరాదు. గ్రామములో అంటువ్యాధు లున్నపుడు గూడ పశువులను విచ్చలవిడిగా త్రొక్కురాదు.

పాలుతీయుమనిషి

సాధారణముగా ధనికుల యిండ్లలోతప్ప తదితరచోటుల పశువులయజమానులు గాని, వారీశ్రీలుగాని పాలుపితుకుదురు. ప్రతిరైతు సోమరితనముంచక తనంతట తానే తమపశువును పాలుపితుకుట మంచిది. ధనికులలోగూడ చాలమంది తదితర వ్యవసాయపనులు చేయకపోయినను పాలు పితుకుట మాత్రము విధిగా చేయుదురు. పాడిలేనియింటియొక్క సిరిగతులు నూకే తెలియును. కొబ్బటి పాడిగల ప్రతిరైతు తప్పక పాడిపశువులను పోషించి పాలుపితుకుట మంచిది.

ధరించు వస్త్రములు

పాలుపితుకు మనిషి మురికిగానుండు చేతులను శుభ్రముగా కడుగుకొని పాలు పిండవలెను. పాలు పితుకుమనిషికి మగచచ్చొక్కాయును, మోకాళ్ళవరకు సరిపావుకట్టు పంచెయును, ఇవ్వున్న తలపాగయు నుండవలెను. పొడుగుచొక్కాయును, లావైన కట్టుపంచెయు, నుండుటవలన పశువుయెప్పుడైన తన్నినయెడల అనునిషికి ప్రమాదము కలుగవచ్చును. ఆశారోగ్యకరముగ మనిషి అనగా క్షయమొడలగు అంటువ్యాధులుగల మనిషి పాలు పితుకరాదు. పాలుపితుకువారిగోళ్ళు చాల పొట్టివిగా నుండవలెను.

బాధ లేకుండ పితుకుట

పాడిపశువును పాలుపితుకుట కష్టమైన పనికాదు. పశువునకు బాధలేకుండ పితుకుట కలవాటు జేసికొనుటయే ముఖ్యమైనపని. చచ్చుట దగ్గర బొటనవ్రేలుతోను, చూపుడువ్రేలుతోను, పట్టుకొని చివరకు నొత్తుచు నాగుచు పాలుపితుకవలెను. పాలుతీయు పశుడు పశువునకు దగ్గరగా కూర్చుండి పితుకవలెను. చేతులమీద చెంబు బరువు పట్టలేని వారు రెండు మోకాళ్ళమీద పట్టుకొని పిండవలెను. పాలను పితుకుటకు పూర్వము దూడనువిడిచి అయిదునిమిషములు చచ్చులను వుడిపించి చేవునకురాగానే దూడనుతీసి విడిగాకట్టి తరువాత పాలు పితికినయెడల జలజల రాలును. పాలుపితుకు ముందు పొడుగుభాగమునను శుభ్రముగా కడుగవలెను. పొడుగునుంచి ప్రతిదినము దూడకు ఒక్క చచ్చువంతునమార్చి వుడిపించవలెను. లేనిచోపాలు ఒకప్రక్కకు చేరి చచ్చుకుదురు వ్యాధి వచ్చును. ఇంకను దూడను పశువునకు దగ్గరగా నుంచిన అది దూడను శాకుచు చాల సంతోషముగా నుండును.

పాడిపశువుల యారోగ్యము

మంచి పరామర్శతో జూడబడిన పశువు లెప్పుడు పాలిచ్చును. బాతి మంచిదిగా నున్నను శ్రద్ధగా జూచుటవలన కొన్ని గొడ్లెక్కువ పాలియ్యగలవు. ఉత్తమబాతి పశువును అక్రద్ధగా నిర్లక్ష్యముగా చూచినయెడల పాలిచ్చును. దినమునకు రెండు పర్యాయములు మాత్రమే పాలుతీయవలెను. అట్లుతీసినపాలు ఎక్కువగను, బలముగలవి

గను యుండును. దినమునకు మూడునాలుగు పర్యాయములు తీసినపాలు రసహీనముగానుండును. అతిశీతలములలోను, చునుక భూములలోనుండు పశువులు సరిగా పాలీయవు. మొకభూములలోని పశువులు గట్టిపారి ఆరోగ్యముగానుండును. ఇంట కట్టివేసి పడితి తవుడు చిట్లు పెట్టి బీళ్ళలోనికి పంపబడు పశువులెక్కువగా పాలిచ్చును. ఆరోగ్యవంతులును ఆనారోగ్యవంతులును పసిబిడ్డలను సంతానము పాలను వినియోగించుచున్నారు. పాలు సామాన్యముగా బలముకలుగుటకు పుచ్చుకొందురుగాన పాలిచ్చు పశువులకూడ అలముగలవలసి ఆరోగ్యముగ నుండవలెను. లేనియెడల రుగ్మరేగల నిల్వ పాలను గ్రోలిత నినును. ఆనారోగ్యముగ నుండునో అంతటి ఆనారోగ్యము గలిగి కట్టియు, బొగ్గచిక్కినట్టియు పశువులగమును గ్రోలినవారు అబలులగుబయ్యెగాక కోపీడితులగుటలో నొప్పుమేమియులేదు. కాబట్టి పాడిపశువులారోగ్యముగా నుండవలెనని వానిని గట్టివేయుకాలల సాధ్యమైనంతి పరిశుభ్రముగ నుండవలెను. రేడివది యాహారవిషములలో తగుముగ్గు త్తి వహించి కాపాడవలెను. మూడవది ప్రతిదినము ఒకపర్యాయమైన పశుశరీరము శుభ్రముగా కడుగవలెను.

పాడిపశువులను కొనునప్పుడు పరీక్షచేయుట

పాడిపశువులను కొనునపుడు బాగా పరీక్షించవలెను. ముందు శరీరమునుబట్టి, ఆకారమునుబట్టి, బాతిలిబట్టి, తలనాత బాతునుబట్టి పశువు ఖరీదుండును. చాలనుండి గునుచూచి మోసపోవుదురు. నువము ముఖ్యముగా చూడవలసిన విషయమేమనగా దానిపొడుగును చూడవలెను. అన్నిలక్షణములు కలిగి సరిగా పొడుగులేకపును, అన్ని లక్షణములుండి కాళ్ళుసరిగా లేక ఆవును గొఱమునో పోలియుండును. అన్ని అవయవ లక్షణములు డివను పొడుగు సరిగాలేదు డివదారికొనరాదు. పొడుగు పైజాను బట్టిపాడ పాలుమును. ఎంత పొడుగు డివ అన్ని పాలు యిచ్చును. పెద్దపొడుగుంటుంటున్న బాధిమేనా పొగాళ్ళకు బాగుగాలేలియును. పొడుగును బాగుగా చేయుటకై వారు ప్రయత్నించుదురు. కాని ఈ పద్ధతి ఆవులకే గాక రైతువంతుడైనవైమువచ్చును. పొడుగురూపము గాతుండ లక్షణములనుబట్టిగాన నుండును.

పొడుగును పరీక్షచేయుట

పొడుగులలో అనేకవిధములుగలవు. కొన్నిటికి ముందవలసిన ఆకారములుండవు. మనలి పశువుల పొడుగులు సరిగా నుండవు. పడుచునాటిని, ముదుసలివాటిని పొడుగును బట్టి నిగ్గులొపపచ్చును. కొన్ని పొడుగులు నీసా ఆకారముగ పొడుగుగానుండును. ఇవి ఈ ప్రశ్నమైనవిగావు. ముందరికపు పొడుగు తగినంతలోతు వెడల్పు క్రిందిభాగము చక్కగా గాన చుట మంచిది. ఇంకను చక్కముగానుండి అడుగుభాగము వెడల్పుగా నుండవలెను. వెనుకటి కాళ్ళనగ్గి పొడుగు పెద్దదిగాను, ముందువైపు చాల తక్కువగా నుండి డెడ్డిని గ్రహించవలెను.

చన్నులను పరీక్ష చేయుట

చన్నులట్టికూడ నిర్ణయింపవచ్చును. కొన్నిటిచన్నులు వేళ్లు ముడుచుకొని నట్టుండును. ఇట్టివి చెడవని తలంచవలెను. సామాన్యముగా విడిగిను, వెనుక చన్నులు పెద్దనిగను యుండుట మంచిది. కొన్నిటికి పెద్దవి చిన్నవి యుండును. కాని సైజునుబట్టి పాలుండవు. కొన్ని చిన్నసైజులుగలవి కాగుగా పాలిచ్చును. పె్చుచున్నలుగలవి పిత్తుకుటకు పాలుగా నుండును. గాని పాలీయవు కంటిపొదుగుగలవి అంతి శ్రేష్ఠమైనవి కావు. మెడటి ఈతలకు చన్నులు చిన్నవై చిన్నటికి తునికొలది పెరిగియుండును. పాలు సరిగా పిత్తుకకపోయినను చన్నులు తక్కినవి. కాబట్టి వేరేతకు పిత్తుకుడుండవలెను. చన్నుల విషయమై పరీక్షించుట మంచిది.

చన్నులలోని రకములు

ముఖ్యముగా మాడవలసిన విషయ మేమన కొన్ని చన్నులు స్పష్టంగా, తిన్నగా నుండి వాలురావు. కొన్ని ఈతలలో కొరివిచన్నులై యుండును. అట్టివానిని మోసపుచ్చి చవుకగా అమ్ముదురు. అట్టివానిని బాగుగా పరీక్షించి కొనవలెను. తప్పుగానుండి పాలు రాకపోవుటకు కారణము వేళ్లకు సరిగా పిండక ఆశ్రయచేయుటయే. మూడుచన్నులు గలవి అష్టేష్ఠాయుండురు. పాలుకూడ తక్కువగా నమ్మును. ఇది చన్నులు గలవానిని అసలే కొనరాదు. కాబట్టి వాలుగు చన్నులను భాగ్రత్తగా చూచి కొనవలెను.

పొదుగును నొక్కిచూచుట

ఈవిషయందుగాని ఎండిపోయినపుడుగాని, ఆవును కొనినచో నాలుగునెక్కుక లోనిపాలు పచ్చవా? రావా? యని తెలిసికొనవలెను. పొదుగు మెత్తగానుండి పాలెక్కువగా నుండును. పొదుగు గట్టిగా నుండిన పాలు తక్కువగా నుండును. కాబట్టి పొదుగు చేతులతో నొక్కి పరీక్షించవలెను. గట్టిగానుండి వండపొదుగుగా నుండునది చాల దానికముగా నుండుటవలన రైతులు మోసపోవుదురు. మెత్తగా నున్నదానినే కొనవలెను.

సంతలలో మోసపుచ్చు బేరగాండు

మంచిపాడిపశువులను కొనునపుడు దానిగుణములన్నిటిని ముగిసిన పొగగు చుండును. కొందరు బేరగాండు మాటతనే అమ్మి మోసపుచ్చుదురు. మంచిపాడిపశువులను కొనకలచుకొనునపుడు అనుభవముగలవారగు మో ప్రాచీనైత్యులను స. ప్రదిించి, బాగుగాపెచ్చారించి కొనవలెను. ముఖ్యముగా స. తలలో జగుగు, బోయి చాలదగాగా యుండును. సంతలకు దొంగపశువులు, లోకల జబ్బుచ్చు పశువులు, తాత్కాలిక బలువు మిద నన్న పశువులు వచ్చుచుండును. కాబట్టి బాగుగా వాణిసాగ్రహాయములు కను గొని కొనవలెను. చెడపశువు పరిసీతులు వేరుగాపే యుండును. ఆప్పుడు యజమాని కంటికిగపడదు. అక్కడనుండి శ్రేష్ఠకులలో కొనియుండి ఈపశువుదగ్గరకు వచ్చు నును

మృతము చూచుచుండును. సామాన్యముగా సంతకు బేరగాండ్రు ఎక్కువగా వచ్చు చుండును. యిటువంటి బేరగాండ్రందరు ఖరీదే పట్టుకువరకు ఆపశువును ఆక్కడనే యుంచె దరు. సంతకు వచ్చు పాడిపశువులు రెండవోములోనివే వచ్చునుగాని సరిష్టమైన సాగ్రవ దాయముగలవికావు, అటువంటి సాగ్రవదాయముగలవి యున్నచో ఆపశువును గ్రామ ములోగాని, సంతవచ్చు వ్యధిదారిలోగాని అమ్ముదుబోవురు. చాలాకాలమునుండి గొడ్డుతనము గలిగి తటాలున చూలులివిని ఆవులయకూడ సంతకు తోలుకొని వచ్చు చురు. ఇట్టిఆవులకొమ్ములు పొట్టిగా నుండును. చిన్నపొడుగుగలిగి యుండువని గ్రహించవలెను.

పాలెండిన పశువులు

రైతులలో చాలమంది, పశువులు పాలెండిపోగానే తదితర చిల్లపశువులతో మేపుచురు. మరియెందు నెలలకు పాడిపోవుననగా ఎవ్వలఖరీదునతో అమ్ముచును. మరికొందరు ఈ పశువుల నెల్లూది మరయొక పాడిపశువునుకొందురు. పాడియిచ్చు కంతకాలము పశువును భాగుగా మేపుచును. పాడిపోవగానే సరిగా మేతకూడవేయరు. అందుచేతనే ఆవి క్రమశాసనముగా ఎన్నుకొని అనేకలోగముల పాలగుడుచువి. మరి కొన్ని కొనయూనిరితో నుండును. మరికొన్ని మేతకొరకు త్రాళ్ళుతెంపున పాలము తమ పాలపోవుదుండను ఆస్తవదావాలయకావు ఈపశువును కట్టితోకొట్టుటయో, లేక బండలదొడ్డిలో పెట్టుటయో తలసెందును. మరికొన్ని పశువులు కంటికికనబడకుండు నూనిదోముతమోవును. ఈమాదిరిగా మందేతములో పశువులపెషయమై రైతు లత్రది చూపుచురు. మరికొందరు పచ్చిగడ్డి, దాచాడనుములు మున్నగువి పాడిపశువులయందగ వేయగా పాలెండిపోయిన పశువులు లాగుచు డును. కొనిసామాన్యముగా వరిగడ్డి తప్ప తదితర దినుషులు పెట్టరు. కొబ్బటి మోటుపశువులు మేత చూడిగా నుండవలెనని పులిదెను సరిగా మేపుచు డవలెను. పాడిపశువులను పెట్టునంతి ఆవారిము పెట్టక పోయినను వానిలో నుభాగ మైనను పెట్టవలెను. లేనిచో ఆవి మరిల చూడివి కావాలవు. కొబ్బటి నోరుతనిపశువులను బాధించక క్రమముగా నావారము పెట్టును తగినంత యార్జన తీయవలెను.

గొడ్డుబోతు పశువులు

ఆబోతులతో ఆవులు కలియక చివ్కొని పెట్టుచునేను, వేడియగు మేతమేయు టవలనను, మేత తక్కువగా పెట్టి పాతెక్కువగా తీయుటవలనను, గర్భము దిగుకొని పొవుటవలనను, గర్భోత్పత్తి ఆయవములు సరిగ నభివృద్ధి చెందకపోవుటవలనను గొడ్డుబోతుఆవులు కావచ్చును. ఇటువంటి పశువులను పాలముతమ దోలి పనిచేయించ వలెను. వరిపప్పులలో బియ్యముకట్టి నూర్చవలెను గడ్డి వేడికి శరీరతిక్వము మరి పొన్న వచ్చును. దున్నుట, మోటులాగుట మొదలగు పనులు చేయించవలెను.

పాడిపశువులకు పెట్టు ద్రవపదార్థములు (తవుడు నెక్కువగా మేపరాదు)

పశువు లాశోగ్యముగనుండి తగినపని చేయుటకుగాని పాలిచ్చుటకుగాని వాని కనుకూలముగ అహారముల నీయవలెను. వ్యవసాయదారుడుగాని గోరక్షకుడుగాని ఈ విషయమై తగినంత శ్రద్ధ వహించినయెడల నితర విషయములలో నెంత శ్రద్ధ తీసికొని నను నెంత జ్యాయము జేసినను లాభములేదు. అన్నిగానుల పశువులకు పచ్చిక స్వాభావికాహారము. పచ్చికగడ్డి అన్నికాలములందు తగినంత దొంగుకొనల పశువులకు సాధారణముగా వేరొక మేత ఏమియు నవసరముండదు. ఇట్లు అభింపనవుడును, విరామములేక పగలంతయు పనిచేయు పశువులకు దినమంతయు మేసి పోట నిండినకొనుటకు తగిన యవకాశము లేకపోవుటచే గడ్డి మొదలగునవి తెచ్చివేయుటయే గాక కొదిపరిమాణము నందె యెక్కువ సారముగల తవుడు తెలికపిడి మొదలగు దాణాదినములు నీయవలసి యుండును.

స్త్రీలు వెన్నను అమ్ముట

మన యిండలోనుండు ఆడువారలకు పాడిపశువు లనిన మిగులప్రీతి. వీరెప్పుడును వీసెలకు వీసెలు చేతిని తయారుచేయవలెననియు, ఉబ్బాల్లకు ఉబ్బాల్లు వెన్న సమృద్ధివలెననియు, అమ్ముగా వచ్చిన ఉబ్బు తమ భర్తల కీయక నగలు చేయించుకొనవలెనను యుద్దేశ్యముతో తమ పాడిపశువులను సంరక్షించుకొనుచుండుట మనము కన్నులార గాంచుచున్నాము. ఇంకను నుమారు రెండు సంవత్సరములనుండి ఆడగా మదరాసులో వెన్న పరిశ్రమాలయములు స్థాపించినకడనుంచి వెన్న కొను పర్తకుల పట్టుకొళ్ల కేగి మిక్కిలి ప్రచారము చేయుటవలన గృహాంగనలు మిగుల విలువగల పాడిపశువులను కొని విస్తారముగా తవుడును మేపుచున్నారు.

తవుడువలన వ్యాధులు కలుగుట

పశువులకు తవుడు విస్తారముగా అలవాటుచేయుటవలన తగినదాణా దినము అటు అలవాటుపడుట లేను. కొన్ని ప్రాంతములందు ప్రత్యేకముగా తవుడుమీదనే ఆధారపడి యుండు పశువులు గలవు. ఇట్లు తవుడు యెక్కువగా మేపుటవలన నేత్ర శోగములు, వాతశోగములు సంభవించుచుండుటచే పశువైద్యులు చికిత్సలు చేయజాలకున్నారు. ఇంకను అనేక పశువులు నట్టిపోవుచున్నవి. మా నిఘాంధ్య ఆయుర్వేద పశువైద్య కళాశాలలో నేర్చుకొను విద్యార్థులందరు ఈ కేసులు చూచి ఆశ్చర్యపడుచుండురు.

పశువు ఈనినవెంటనే తవుడు యెంతమాత్రము పెట్టరాదు. పక్షముదినములవరకు పెట్టకుండుట మంచిది. అట్లు పెట్టినయెడల మద్యవారము మున్నగు వాతశోగములు కలు

గును. వెన్నకు ఆకపడి తవుడు విస్తారముగా మేసిన పశువులు ఎక్కువకాలము జీవించవు అధవా జీవించినను శుష్కించిపోవును. ఆ శుష్కించిపోయిన పశువులపాలు మనుష్యులు త్రాగిన ఆవాతకోగములే వారికి సర్వపాష్టిగతును. క్షయయును వ్యాధికుడు తవుడును విస్తారముగా మేసి పశువు వాటికలను తగినంత విచ్చలవిడిగా త్రవ్వటవలసకుడ పశువునకు సోపానమైనది కాస్త్రవృక్షం శేషమున్నును.

పాటుపడు పశువులచుట్టూ కొలకలుంగి మాహావు రైతులు తవుడును పొక్కుట ముగా పెట్టుదురు. అటు మేతల పరిమితిని నిర్ణయించుట, శైత్యవృక్షములు, పోడి ఆవే పశువులు పాడిపోవుచున్నవి. కాబట్టి సుదీర్ఘము జాగ్రత్తగా వాటి పరిరక్షణమునకు తవుడు విస్తారముగా విస్తారముగా పెట్టరాదు. రంగునేసినతవుడు గాని, మక్కి పోయినతవుడు గాని, నూకలెక్కిపోయినతవుడు గాని మేసినచో ఆతిసాము, కబ్బికిటి మున్నగురొగములు కలుగును. కాబట్టి శుద్ధమైన తవుడును మేత్తుటయేమంచిది.

పాలుపితుకునప్పుడు గ్రామభోనులుపయోగించుట

ఈశ్వరస్పష్టిలో మానవుడే తెలివైనవాడే యున్నాడు. మానవుని ధర్మశివల ననే ఆతడు ప్రకృతిశిల్పములను, స్వభావాని లక్షణములను గుర్రెరిగి వానిని తన తన యోగించుకొనునట్లు చేసికొనుచున్నాడు. మరియు పదార్థములయొక్కయు, భవిష్యత్తు యొక్కయు, తైలములయొక్కయు, వృక్షాది గుళికొటియొక్కయు, నైజలికముల గ్రహించి వానిని స్వార్థన సమకూర్చుకొని వానిని తన యిచ్చపచ్చివట్టుగా నామోగి పరచుచున్నాడు. క్రమక్రమముగ మానవుడు సృష్టిలో నన్నిటి యందును లాభ్యరహితమైన మను, మహిమయు, లక్షణానికంటే మరొక వాయుండు భిన్నముగను, వినియోగముగను, యున్నట్లు తెలిసికొనగలిగి వానిని సాధ్యమైనంతవరకు మార్చి అనేకవిధములుగా తారు మారుచేసి మాతనమైన చిన్నసృష్టిని చేయుచున్నాడు. ఇవిధమున కాస్త్ర మభివృద్ధి గాంచుచున్నది.

మానవుని కాస్త్రజ్ఞాన మోతవరకు పరిణమించినదనగా సంగీతముచే ఆవులు రంజింపబడి స్త్రీములను విశేషముగా నిచ్చుచున్నవి. సంగీతముచే ఆవుల పావశ్యము నొందుచున్నవి. మనము, పాములు పాములవారి నాగస్వరమునకు పరిశ్రమింపి అడుగుండుటను జూచుచున్నాము. అందుననే ఇంగ్లాండులో కొన్ని ప్రాంతములందు ఆవుల కాగొగ్గినవిదముగ నుండుటకై రెండువరలగా (ఒకవరుస కొంటి యెరుగు) కట్ట బడియుండును. ఇదయ సాయంకాలములందును, రాత్రియందును, పాలుపితుకువారు కొట్టములలోని ఆవులను పాలుపితుకు సమయమున కొక పూర్వయరంజనమును (కావ్య గానమును పాడుకట్టి నేటికటి చేయబడును. గ్రామభోను రెండు కొట్టముల వరుసల మధ్య యుంచబడును. అట్టి సమయములందు ఆవులు చెవుల వికసించుకొని వినుచు

తెనురువేయుచు విశేషముగా క్షీరముల నిచ్చుచుండును. అట్టి సమయములందు చేపని పశువులుకూడ చేవునకువచ్చి లెస్సగా పాలిచ్చును.

తవుడు కలిపిన కుడితి

పశువుయొక్క పోషకమునుబట్టి రాతివోట్టిలోగాని, మట్టి వోట్టిలోగాని, మానెడు లేక అడ్డెడు తవుడుపోసి అందులో నాలుగు కులముల ఉప్పు కలిపి తగినన్ని నీళ్ళుపోసి కొంతసేపు నాననిచ్చి త్రాగించవలెను. ముక్కునను తదితర జంతువులను ఆ వోట్టిలోనికి పోనియడము పైను మూతలు వేయవలెను. నాననిచ్చిన కుడితిని త్రాగి కడుపునొప్పిపోని పాలనిచ్చును. కొందరు తే దు వంతులవరకు నీటిలో కలిపి పెట్టుదురు. ఇట్లు పెట్టుటవలన పొట్ట బరువెక్కునై ముక్కుచుండును. అట్లు పెట్టిన యెడల గర్భవాతము అట్టి మున్నగు శోగములు కలుగును. ఈ కుడితి వెన్న నెమ్మకగా కలుగజేయును.

కలగలుపు కుడితి

తూవజ్జి, ముక్కుత్రాగిం పాలు, ఎ గిరితన్నము, వార్చినగంజి, బియ్యపు నీళ్ళు, తవుడు మున్నగునవన్నియు ఒక వోట్టిలో పోయించురు. దీనినే కలగలుపుకుడితి యందురు. కాని ఈ కుడితి అన్ని పశువులు చూత్రము త్రాగవు. నిత్యము అలవాటయిన పశువులుమాత్రమే త్రాగును. ఈ కుడితి పశువులకంత శ్రేష్ఠమైనదిగాదు. త్వరగా జీర్ణముకాదు. ఇది త్రాగిన పశువులు బలహీనముగా నుండును. ఈ కుడితి త్రాగిన పశువుల మజ్జిగ త్వరగా పులుపెక్కి గుర్వానన వేయును.

జొన్న కుడితి

పచ్చజొన్నలు కడిగిన నీటిని, జొన్నపిండి కలిపిన నీటిని, వార్చిన గంజినీటిని ఒక వోట్టిలో పోనియించి దానిలో గిరిదను ఉప్పు కలిపి పెట్టవలెను. ఈ కుడితి బలము కలిగించును. మలమును గటిపరుచును. పాలెమ్మకవగా నిచ్చును. వెన్న గట్టిగా నుండును. బక్కచిక్కిన పశువులు క్షయముగా జీర్ణము చేసికొనును. బలము గలిగించును.

నెజ్జ కుడితి

పెట్టలెత్తులు నెజ్జకుడితి నెమ్మకగా తిను పశువులకు పెట్టుదురు. తక్కిన కుడు కులకంటె ఇది మిగుల బలమును, దేహపుష్టిని కలిగించుటలో మిగుల ప్రసిద్ధి కల్గినది. పెట్టనెజ్జకంటె తోటనెజ్జ మిగుల బలము కలిగించును. వాతరోగముల చేతను, శత్రురోగముల చేతను, బాధపడుచున్న పశువులకు ఈ కుడితి మరింత శ్రేష్ఠము. ఈ కుడితిలో చలువజేయు గుణముగలదు. వెన్న గట్టిగా నుండును. పాల నెమ్మకగా నిచ్చును.

కొట్టకుడితి

ఈ కుడితిలో మజ్జగ, గజ విస్తాగముగా కలుపుదురు. బలము కలిగించును. వలబద్ధక మెక్కువగా నుండును. ఎక్కువగా పెట్టి వాతము గలిగించును. పశువుల ఆవయవములు విరిగిపడును ఈ కుడితిని పెట్టిన మంచిది. దీనిలో రక్తక్షయి ఎక్కువగా నుండుటచేత పాల నెక్కువగా నిచ్చును.

రేగుపొట్టుకుడితి

జొప్పకుడితిలోను, నజ్జకుడితిలోను, రేగుపొట్టు కలిపి పెట్టుదురు. ప్రత్యేకముగా ఈ పొట్టును నీటిలో వాసనచేసి పెట్టుదురు. ఇది మిగుల జిగురుగా నుండును. ఇది పుల్లగా ర దిక్కముగా నుండుటచే పాడిపశువులు ప్రేమతో త్రాగును. వాతరోగముల పశువులకు నిది శ్రేష్ఠము. ఆకలి యెక్కువగా కలుగు. వెన్న గట్టిగా నుండును.

ప్రత్తివీర్తులకుడితి

ప్రత్తివీర్తులను రుద్ది నీటిలో కలిపి పశువులకు పెట్టుదురు. ఈ కుడితిని ప్రతిదినము పరిమాణముగా పోయవలెనుగాని యెక్కువ తిమ్మముగా పోయరాదు. అటు పోగిన యెడల ఆరోగ్యము చెడును. ఈ కుడితి అలవాటుయిన పశువులే త్రాగును. ఈ కుడితి త్రాగిన పశువులు పాల నెక్కువగా నిచ్చును. వెన్న చాల గట్టిగా నుండును.

ఉలవకుడితి

ఉలవలను వాసబెట్టి రోటిలోకేసి మెత్తగానుద్ది తొట్టలో పోయిదురు. ఈ కుడితిని వాతరొద్దముగల పశువులకు పెట్టరాదు. కాక పశువులకు మిగుల శ్రేష్ఠము. ఏపూట రుద్దిపకుడితి వాపూటనే పెట్టవలెను. పాలు, వెన్న నెక్కువ కలుగ జేయును.

శనగకుడితి

శనగలను వాసనచేసి రుద్ది నీటిలో కలిపి త్రాగించుదురు. వాతపశువులకు పెట్టరాదు. మారువేరగాండ్రు ఈకుడితిని ఎక్కువగా బెట్టుదుండురు. పాలు తక్కువగా నిచ్చి వెన్న నెక్కువగా నిచ్చును. వెన్నకూడ గట్టిగానుండును. పాలు, వెన్న నమ్మకొను వాసములు ఈకుడితిని బాన్తిగా వాడుదురు. పాడిపశువుల కంత శ్రేష్ఠమైనది గాదని వాయుభిప్రాయము. దీనివలన వాతరోగము లెక్కువగా కలుగును.

తాటిపండ్లకుడితి

బాగుగా పండిన తాటిపండ్లనుండి నువ్వులను తీసి అప్పులుగా పోసి నిలువదుండుదురు. ఆపరచైనప్పుడు దానిని నీటిలో కలిపి పాడిపశువులకు వడిగిగా పోయిదురు. ఈ కుడితి త్రాగిన పశువులపాలు చిక్కగా నుండి వెన్న ఎక్కువ కలుగ జేయును. వాత

శరీరముగల పశువులకు పెట్టరాదు. ఎక్కువగా పెట్టడమిడియేడల నేతనోగములు కలుగుతుండును.

గో ధు మ కు డి తి

ఇది పశువుశరీరములోని చెడువిరు తివీచేయును. శీతాకాలములో నీనినెక్కువగా వాడవచ్చును. వారెక్కువగా పడును. ఎక్కువగా పెట్టరాదు. ఎక్కువ పెట్టిన ఆతివేడి జీనీ గర్భమునకు హనిఁబిగిండును. చెన్న జడ్డుగానుండును.

చోడిరుడితి

చలువ చేయును. వేసవికాలములో ఎక్కువగా నుపయోగించవచ్చును. బలము కలుగ జేయును. పాలు రుచిగానుండును. వెన్న అంతగట్టిగానుండును.

మినపకుడితి

ఈ మిశ్రితవలన వెన్న అద్భుతముగా ఎచ్చి గట్టిగానుండును. దీనిని తినుదగా వాడరాదు. నాతిలోగము లెక్కువగా కలుగును. కండ్లకు జలుబుచేయును.

బా వ లు

జల్బుల పశువులకు వైడచెప్పిన కుకతుల నుపయోగించు దాజాలనే బావలుగా కాచి ఆయాలోగపశువులనుబట్టి బాగ న్నిగా పెట్టుటనుచిది. వజ్రబావ, గోధుమబావల వలన పాపొక్కిలగా పడును. నాతిలోగములు నొకించును. పథ్యములుగా నుపయోగించును. ప్రతి బావలోను తిగివంత ఉప్పులిని పెట్టుటనుచిది. తైనుబావ, కాకిపశువులకు నుంచిది. గోగిపశువులకు ఆలోగముగానుండి త్తే ప్తీని గలిగించును. మొక్కపోన్నబావ పాల నెక్కువజేయును గాని నాతియు గలిగి యును. పూకలబావ పశువు లుగా వాము తిననప్పుడు పెట్టుట నుంచిది. ఎక్కువగా పెట్టిన శీతలము గావించును.


పాలుపితుకు యంత్రము

పూర్వము ఎంతయోక్తప్రపడి సేగ్గుకొనిన సేగాని చేయబాలని పశులన్నియు సేకు మిక్కిలి సులభముగ యంత్రము వలన సెనవేర్చుచుండునని. ఈయంత్రమువలన చేతితో యుండుదానికంటె మిక్కిలి సులభముగను, ఆత్మ్యలృకాలమునను జేయబడును. ప్రస్తు తిము కనిపెట్టబడిన యంత్రములలో పశువుల పాల పిండు యంత్ర మొకటి యున్నది.

ఇది తక్కిన యంత్రములంత యుపయోగకరము కాకున్నను సేర్పరిమైన కొల పానితో సహాము గావచ్చును పరికొన్ని మార్పులు కొలరికాలములో జేయబడసేని మిక్కిలి ఉపయోగకరయై ప్రవేదిపడియును. మనదేశములో నింకను యీ యంత్ర ములు విశేషముగా నుపయోగింపబడినందుటచే పాలను పిండుటకు మిక్కిలి స్పెరి గినవారు ఆనుభవముగల వారయింపలేదు. పాలను పిండువిద్యయు నొకఘనమైన



పాడిపశువుల కొట్టము.



ఇంగ్లీషు జాతి పెయ్య



శ్రీ నల్లపాటి విజయరామయ్యగారి పొట్టిగిత్త
తెనాలి



శ్రీ ముక్కామల వీరయ్యగారి ఎడ్డలతో బండవట్టు
ఎడ్డపల్లి (గుం. జ.)

విద్యయేయని నడువవచ్చును. చిన్నతనమునుండియు పశువులలో దిరుగుచు వాటిని సంరక్షించుచు పాలను పిండువారి కాపని తేలికగానే యుండును. పాలయ్యత్రయమును గురించి ఇదివరకే చెప్పబడియున్నది. గొల్లకొవుల బిడ్డలు చిన్నతనమునందే యీపని నేర్చుకొనుచుండుట ఎల్లరకు తెలిసినవిషయమే. వాగల కపరియందు యాపక్తిమెండు. చిన్నతనమునం దీపని కడు దుస్సాధ్యమయ్యు కొంతకాల మగుసరికి యీ విద్యయందు కడు నేర్పరులై సునాయాసముగా పాలను పిండుదురు.

పాలను పిండుట

పూర్వమెన్నడును పాలు చెడియుండుకొత్తగా పనిచేయు నుత్తమించినవానికి మిక్కిలి ఆశ్చర్యమును, కష్టమును దోచును. ఇతరులు పిండు పప్పుకు మిక్కిలి మలగముగా వగుపడిన వానిని వానికప్పుకు అతికష్టముగా నోచును. వారు బిలికినపాలు పాత్రయగుగుభాగ మైనను వదిలివేసెదను. కనుక పాలను పిండుటను కొంతకాలము పరిశ్రమచేయవలెను. పశువుకడ నొక ధారయైనను లేకుండ పాలను పిండగలిగినపుడే ఆపని యందాతడు నేర్పరియని చెప్పవచ్చును. పాలను మలగముగ ముఖ్యముగ పిండువారు రెండువిషయముల నేనురియుండవలెను. ఆవేచియన ఏరితిగ బిలికిన పశువు అధికముగ పాలిచ్చునోయను విషయమును, పాలను పిండినపుడు యితర వరిన పదార్థములతో నేకిభవింపక పాలు శుభ్రముగనుండు విషయము జాపకముండుకొనవలెను. పశువేచిది ముగ నధికపాలిచ్చునో ఆయాపశువునుబట్టి గ్రహింపవలెను. పాలను పిండునపుడు ఏ భాగము ముందు పిండవలెనను విషయమున నియమము నేర్పరపవలెను. కొందరు ముందుభాగమును మొదటపిండుదురు. ఎట్లుపిండిన చేతులకనుకూలముగను ఆనతికాలము లోను పిండుటను వీలగునో అట్లు పశువున కహంకారము కలుగకుండునట్లు పిండవలెను. ఆసమయమున పశువుత్రవరనను బాగురూపితో పరికించిన ఏరితి పిండిన చికాకుపడకుండు పాలనియగలదో తెలియగలదు.

పితుకునపుడు బాధ కలుగనియరాదు


సాధారణముగా పాలను పిండు నేర్చుకొనువారు భయముచే పశువునకు దూరముగ నూర్చుండురు. ఇట్లు చేయుట మిక్కిలి పొరపాటు. సరిగా పాలను పిండువారు పశువునకు మిక్కిలి దగ్గరగ నూర్చుండి రెండు మోకాళ్లనుండునను పాత్రను గట్టిగా నొక్కిపట్టి పాత్ర పొదుగునను నూటిగా నుండునట్లు నూర్చుండవలెను. అట్లు నూర్చున్నయెడల పశువు గ్రహించి కెప్పుడెగ విడువవును. లేచినో వెనకి చిందులు త్రొక్కి పాలనీయదు. పశువు కొంతమాత్రము బెదరిన పక్షము చూడవలెను. పశువు చికాకుపడి తన్నినచో దానిని గొట్టి యింకను బెదరునట్లు చేయక నెమ్మదిగా చేరి లోబరుకొనవలెను. పాలుపిండు ముసి పశువు నదితను బాగుగా గుర్తించి దాని కనుకూల

ముగ ప్రవర్తించవలెను. పాలను పీఠుననవుడు చేతులు పొడిగ నుండవలయునని కొందరు చెప్పుదురు. చేతులు పొడిగ నున్నయెడల పాలలోనికి మలినము రాకపోవచ్చును, గాని పశువున కౌగ్రహము తప్పుక కలుగును. చేతులు పొడిగనుండిన పాలుపిండుటధికముగ నొత్తిడి నయవలసి యుండును. అందువలన పశువునకు బాధ కలిగి నిలువబడదు. చేతులు కొంచము తడిజేసుకొని పిండినచో పిండువానికిని పశువునకును గూడ అనుకూలముగ నుండును. పిండుపాలలో చేతులు తడిజేసికొనగూడదు. ఆయాదేశముల పశువులనుబట్టియు, వానివయస్సునుబట్టియు అవి యొసగుపాలపరిమితము భేదించుచుండును.

ముట్టపాలు

పాలలో నీరు క్రొవ్వుతో గూడిన మిగడ, పంచదార, బూడిద, ప్రొటీన్ యుండును. చివర నాలుగు భాగములు ఘనపదార్థము లనబడుచున్నవి. పశువు పాలిచ్చు కాలములో ఈ పదార్థముల పరిమాణములు భేదింపచుండును. మొదటిసారి పశువు ఈనీనవుడు పాలు చిక్కగను, పసుపువర్ణముగను, మంచి వాసన, రుచిగ యుండి జాన్ముపాలు అని పిలువబడును. ఈ మొదటి పర్యాయము తీయుబడిన పాలు వివిధపశువులలో వివిధరకములుగా నుండును. ఈ జాన్ముపాలనే ముట్టపాలందురు. ఈ పాలకును సామాన్యపాలకును కొంత భేదము కలదు. సామాన్యపాలు మిగుల చిక్కగను, పసుపుపచ్చగను, సాద్రత యెక్కువకలదిగ నుండును. ఇంతియేగాక అందలి చమురుదక్కులు పెద్దవిగ నుండును. ముట్టపాలయందు అల్పమినద్రవ్యము లెక్కువగా నుండును. ఇందుచేతనే ఈ పాలు కాచినయెడల గడ్డకట్టి జాన్మువంటి పదార్థ మగును. ముట్టపాలు విలేచనకారి యగుటచే అప్పుడు పుట్టిన దూడ ప్రేగు యందలి ఒకవిధమగు మాలిన్యమును గొట్టివేయును. పశువు ఈనీన వెంటనే పాలు పిండిన తరువాత తొట్టలో పోయవలెను. తరువాత దూడను కుడుపవలెను. దూడను విడిగా కట్టివేయక తన తల్లిదగ్గరనే యుంచవలెను. అటుంచినయెడల దూడ యిష్టము వచ్చినపుడల్ల పాలు త్రాగుచుండును. ఆ పాలు దూడ ఆహారపుప్పుడు త్రాగుచుండుట వలన చన్నులలోని పాలనిచ్చు పాలగొట్టములు విజృంభించును. దూడ ఆకలితో నుండుటచేత చన్నులను గీరి బలముతో త్రాగును. అందువలన చన్నులయందు నొప్పిత్గగును. పశువు ఈనీన తరువాత మూడు దినములవరకు రెండుమూడుసార్లు క్రమము తప్పుక పాలు పీఠుకవలయును. మూడవదినమున పిండుపాలు త్రాగుటకు రుచిగా నుండును. మొదటిదినమున రెండవదినమున నిచ్చుపాలను జాన్ముగా వండుకొని తిందురు. ఇది చాల పొరపాటు. ఇటువంటి పాల నుపయోగించుటవలన వాతకోగములు మొదలగునవి జనించును. గాన నవి యెంతమాత్రము నుపయోగించక దూడకే విడిచిపెట్టవలయును.

అదును పదును చెరుచునది వేపనాగలు.



పాడుగు

పాడిపశువులకు పాడుగును అంగముండును. ఈ పాడుగునందు నాలుగు పాల గ్రంధులుండును. ఈ గ్రంధులు పశువుయొక్క వెనుకకొళ్ళ సందున యుండును. ఒక ప్రక్క నున్న రెండు గ్రంధులును ఒక తంతుచుయుతమైన తొడుగుచే పరివేష్టించబడియుండును. రె వవప్రక్క నున్నవి మరియొక తొడుగుచే పరివేష్టించబడియుండును. ప్రతి గ్రంధికి ఒక్కొక్క చన్ను యుండును. ఈ చన్నులు పాడిపశువులకు 3, 4 న్ను, ఆడగుట్టము, ఆడుగొట్టలకు 2 ను, ఆడుపందికి 10 లేక 14 ను, యుండును. అప్పు డప్పు డీ నాలుగు గ్రంధులుగాక మరియొక రెండు మాంసగ్రంధులు కలిగియుండును. ప్రతిదానికి ప్రత్యేక ద్వారము లుండును. చంటిపైని ప్రతి గ్రంధిలోను పాలతిత్తియొకటి యుండును.

క్షీరనాళములు

ఇందులోనికి పాల కాలువ లన్నియు ప్రవహించును. ఈ పాలతిత్తినుండి చంటి గుండ వైభాగమున నొక కాలువ గలదు. పాలగ్రంధికి రబ్బరువంటి తొడుగు గలదు. ఈ గ్రంధికి క్షీరవాహికలట్లు ననుగ్బబడియుండు కణముల గుంపులచే నేర్పడిన యంగము క్షీరవాహిక లనేకములు చేరి పెద్దవాహికలుగ నేర్పడును. ఇవియన్నియు చంటిపై నుండు పాలతిత్తులలోనికి ప్రవహించును. ప్రతి పాలతిత్తినుండియు నొక కాలువ చంటిగుండ పైకి వెలువడుచుండును. చంటిచివరనుండు మాంసకండరములు పాలు తమంతట తాము కొరిపొవండు నీ కాలువలను మూసికొనియుండునట్లు చేయును.

దుక్కిడున్ని లే భూమికి కాంతము,

పాలసంచి

పాలగ్రంథికి కొన్ని రక్తనాళములగుండ రక్తము వచ్చును. ఆ రక్తమునుండి గ్రంథికణములు, పాలకు పనికివచ్చు ద్రవ్యములు తీసికొనినతరువాత తక్కినభాగము దువ్వ రక్తనాళములగుండ మరలిపోవును. ఈ దువ్వరక్తనాళములలో కొన్ని లోపల నున్నను మరికొన్ని ప్రైభాగమున నుండును. ప్రైభాగమునందువానినే పాలనాళము అని చెప్పుదురు. పశువుల లోపలిభాగమున నుండు రక్తనాళము లెంత పెద్దవిగ, స్పష్టముగ నున్న అవి యంత గాఢముగా పాలిచ్చును. పాలగ్రంథులలో తమ మూల పోషకకై పాలు చట్టునుండును. చంటి మొసలగు పోయిన మార్గములగుండ పాలు ప్రవహించును. ఆ మార్గమునకు ప్రైభాగమున క్రిందిభాగమున ద్వారమును మాయగల కండము నేర్పడి యున్నది. చనుమొసకు పైని పాలతోట్టి సుమారు $1\frac{1}{2}$ పైంటు పాలు పట్టగలగా నుండును. దానినుంచి చంటిద్వారముగుండ పాలు లాగబడును. శరీరములో మాంసకండకములన్న భాగములకు పోయగుభాగమునకు మధ్యగా పాలగ్రంథులు యేర్పడి ఏమిగా జేరి పాలను నిలువజేయుచున్నవి. ఈ గ్రంథులు గొక్కిరికి అంగుళములో 30-వ వంతు వెడల్పు గలిగియుండును. పోయగుచుండుకంటే దానిలో నుండు పాలయొక్క బరువు మొక్కవగా నుండును. ప్రాయముపచ్చికపుడు పోయగు విడిసింది యీనుటకుముందు నది పెద్దదగును. ఈనిన నది చురుకుదనము గలిగియుండును. పాలిచ్చుకొల మంత్ర్యమగునప్పటికి మరల సంకోచము నొంది తమ వ్యాపారముచూసును. క్షీరగ్రంథులవలన పుట్టుకుపాలు మూలమ సగవ్రాధాహారము.

'పాలలోనుండు నస్తువులు

పాలలో నీరు, ప్రోవ్యూనోగూడిన మిగిలి, పంచదార, లూడిన, ప్రోటీన్ యుండునని యిదివరకే చెప్పబడినది. 87.40 నీరు, 3.75 మిగిలి, 5.00 పంచదార, 3.15 ప్రోటీన్, .70 లూడిన మొత్తము 100.00. ఈరీతిగా పాలలో భాగములున్నవి. ఈ భాగములు పశువులనుబట్టి భేదించుదుండును. ముఖ్యముగా మిగిలి విశేషముగా మార్పుజెందుదుండును. కొన్ని ఆవులు నూటికి 8 భాగములును, కొన్ని 3 భాగముల లోపును యిచ్చుచున్నవి. పాలిచ్చు చివరభాగములో మిగిలి మొక్కవగా వచ్చును. కాని పాలరుచి తగ్గినను. పాలయొక్క పరిమాణముగూడ చాలవరుగు తగ్గినను. ఈమార్పులనుబట్టి తేరిగాండ్రందరు చేరము చేయుటలో సరికాచెదరు.

పదార్థముల భాగములను తెలుపు పట్టిక

జంతువు	నీరు	మిగిలి	ప్రోటీన్	చక్కెర	లూడిన
	100 కి	100 కి	100 కి	100 కి	100 కి
ఆవు	...	84.40	3.75	3.15	5.00
మేక	...	85.71	4.78	4.29	4.46
గొర్రె	...	80.82	6.86	6.52	4.91
గుర్రము	...	90.78	1.21	1.99	5.27
					35

ఈ పట్టికనుబట్టి గొట్టాలనుండి మేకలనుండి వచ్చు పాలు ఎక్కువ. ప్రోటీన్, క్రొవ్వున్ను, గుడ్డుమునకు వచ్చు పాలలో మిగడ, ప్రోటీనున్ను, అవుపాలలో వచ్చు పరిమాణముకంటె తక్కువగను, దీనిలో చక్కెర ఎక్కువగను, మేక, గొట్టపాలలో నీరున్ను, మిగత రెండు జంతువులకంటె తక్కువగను తయారగునట్లు తెలియుచున్నది.

క్రొవ్వుతో గూడిన మిగడ

ఒక చిన్న పాలబొట్టలో 3 కోట్లవరకు 10 కోట్లవరకు చిన్నకణములు చేరి మిగడగా నగుచున్నవి. ఇవి పశువులనుబట్టి మారుచుండును. ఈ క్రొవ్వు పాలలోని తేలిక పదార్థమైయుండి పాలను కదలించినచో యుంచినచో కణములు పైకిలేలును. జెర్ని, గెర్బిజాతి జంతువులపాలలో నుండు కణములు సార్తారన్ లేక హోస్టీన్ జాతుల పాలలో నుండు కణములకంటె పెద్దవి. సార్తారన్ జాతిలోనుండు కణములు ఒకటిని, గెర్బిజాతి 1.25 న్ను, జెర్నిజాతి 1.6 న్ను కలిగియుండును.

మిగడ (Cream)

పాలలోని ఒకభాగమై, ఎక్కువ క్రొవ్వుతో చేరియుండును. పాలు గిలకొట్టగా పైకిలేరిన పదార్థము మిగడగా నగును.

ప్రోటీన్ (Protein)

దీనిలో కేసిన్ అల్బ్యుమిన్ అను రెండుభాగములు చేరి ప్రోటీన్ అగుచున్నది. దీనిలో కేసిన్ అను భాగము ఎక్కువగా నుండును. ఇది పాలను గిలకొట్టినగాని పైకిలేదు. పాలవలన తయారగు పెరుగులో ఈ కణములు చేరియుండును. క్రొవ్వుకణములు పెరుగును. కదలించిన నే పశువుపచ్చిరంగుగిల గ్రవపదార్థము లేలును. పాలను వేడి చేయగా వచ్చు పదార్థమును అల్బ్యుమిన్ అందును. పాలలో నీ పదార్థము తక్కువ గను, ముద్రపాలలో కొంచె మెక్కువగను యుండును. ఈ పదార్థము పాలను విరుగ కూడి జేయును.

చక్కెర (Sugar)

పాలలో తేలునట్టి చక్కెరను లాక్టోస్ అందును. ఈ చక్కెర రుచికి తక్కువగనుండి పాలను కాచగా తయారగును. ఇది బొవెడకారిగను, పిల్లలకు వాడుకొనుటకు నుపయోగించుదురు. పాలకు రుచి యిచ్చునది చక్కెరపదార్థము. శేరుపాలలో 11 చటాకుల చక్కెర యుండును.

బూడిద (Ash)

ఇది పాలలో నుండు ఒక ముఖ్యమైన పదార్థమై యున్నది. ఇదిక నీ పదార్థము పాలు, పెరుగులలో నుండు నీటిలో ద్రవ్యవగా నుండును. పాలలో తక్కువగా నుండును.

మాగిరిదున్ని లే మాదిగవాడైనా పెరు పెట్టును.

పశుజాతులనుబట్టి పాలవర్ణన

జాతి	నీరు 100 కి	క్రోవుస్ 100 కి	ప్రాటీన్ 100 కి	చక్కెర 100 కి	బూడిద 100 కి
జెర్సీజాతి	85.66	4.78	3.96	4.85	0.75
గెర్బీజాతి	85.52	5.02	3.92	4.80	0.74
అయిర్ షిర్ జాతి	87.30	3.68	3.48	4.44	0.70
హెల్స్టీన్ జాతి	87.88	3.51	3.28	4.69	0.64
షార్టాంజ్ జాతి	87.55	3.65	3.27	4.80	0.73

ఈ పట్టికనుబట్టి వివిధజాతులలో పాలలోని పదార్థములను, మార్పులను, చూపించుచున్నది. జెర్సీ, గెర్బీ, పశువులు క్రోవుస్కు ప్రసిద్ధి. అయిర్ షిర్ జాతి రెండవరకము. అన్నిటికంటే హెల్స్టీన్ జాతి క్రోవుస్కు తక్కువ ప్రసిద్ధి. షార్టాంజ్ జాతి క్రోవుస్కు తక్కువ ప్రసిద్ధి. చక్కెర విషయములో పశుజాతులలోకొద్ది భేదములు గలవు. సరాసరిమీద జెర్సీ, గెర్బీజాతి పాలు ఇతర జాతుల పాలకంటే శ్రేష్ఠమైనవి.

విదేశపు ఆవుల పాడి

క్ర.సం.	జాతి	ఆవు ఎయిర్స్ సంవత్సరములు	ముత్తంమీద ఎన్ని దిన ఎన్ని గజుల పాలిచ్చినది	ములుపా లిచ్చినది	పాల వెల రు. అ. పై.
1	జెర్సీ	7	6937	302	177—11—0
2	జెర్సీ	6	5470	305	657—12—0
3	హెల్స్టీన్	12	5057	284	608—0—0
4	అయిర్ షిర్	7	5044	294	606—8—0
5	జెర్సీ	8	4740	340	569—13—0
6	జెర్సీ	8	4459	348	536—9—0
7	5, 6 జాతుల మిశ్రమము	8	4425	271	532—0—0
8	జెర్సీ	10	3471	300	417—2—0
9	జెర్సీ	11	2458	340	207—13—0

ఈ పట్టికనుబట్టి స్వదేశ ఆవులకంటే విదేశపు ఆవులే అధికముగా పాలిచ్చునని స్పష్టముగా తెలియుచున్నది. అనగా విదేశపు ఆవులను అవ్యదేశములకు గొనిపోయిన పాడి పావుగానే యున్నది. విదేశపు ఆవులే మెక్కువ దినములు పాలిచ్చుచున్నవి. ఆరేండ్ల వయస్సుగల జాతియైన ఒకప్పుడు ఎన్ని పాలిచ్చునో, ఎడెం

దొప్పడు ఆ జాతియావు అంతకంటె యెక్కువ పాలిచ్చును. 6 సంవత్సరములు వయస్సున్నప్పుడు 7 సంవత్సరములకంటె తక్కువ పాడి వచ్చును. కాబట్టి ఆవులు ఏడవ సంవత్సరమున అధికముగా పాలిచ్చుననియు ఆటుతరువాత క్రమక్రమముగా పాడి తగ్గి పోవుననియు గ్రహించవలెను. జనవరి ఆవులు 6వ యేట 5470 రతుల పాలను, 7వ యేట 6937 రతుల పాలను, 8వ యేట 4459 రతుల పాలను, 10వ యేట 3471 రతులపాలను, 11వ యేట 2453 రతులపాలను ఇచ్చినట్లు పైపట్టికవలన మనకు తెలియుచున్నది. స్వదేశీ ఆవులలో ఇట్లే యున్నది.

పాలు తీయు కాలములో జరుగుచుండు మార్పులు

నిత్యము ఒకే కాలముందు పాలుతీయుచున్నపుడు ఒక విధముగానుండును. కొంచె మాలవ్యముగా పాలను తీసినచో త్రొవ్వ ఎక్కువగా నుండును. ఉదాహరణము తీసిన పాలకంటె సాయంకాలము తీసిన పాలు శ్రేష్ఠముగా నుండును.

వరుస	త్రొవ్వ	త్రొవ్వకొని ఇతర పదార్థములు
మొదటి పర్యాయము	1.70	8.77
రెండవ పర్యాయము	1.76	8.99
మూడవ పర్యాయము	2.10	8.75
నాల్గవ పర్యాయము	2.54	8.69
అయిదవ పర్యాయము	3.14	8.49
ఆరవ పర్యాయము	4.08	8.59

మొదటి పర్యాయము తీయబడిన పాలలో త్రొవ్వ తక్కువగను, క్రమేసి ఎక్కువగను అగుచుండును. మొదటిపర్యాయము తీయబడిన పాలలోని త్రొవ్వ తక్కువగా నుండుటవలన ఆరవపర్యాయములో తీయబడిన పాలలో త్రొవ్వ ఎక్కువగా నుండుట వలన కారణ మేమన పొదుగుక్రిందిభాగమున నుండు పాలలోని త్రొవ్వను తిరిగి లోపలకు లాగుకొనుటవలన పోగొట్టుకొనబడునని తెలియుచున్నది. కాని ఇది సరియైన సిద్ధాంతము గాదని నా యభిప్రాయము. జంతువును బాగుగా మేసినకొలది త్రొవ్వ ఎక్కువగును. పచ్చిమేత, ఎండుమేత వేయుటలో ఈ మార్పు కలుగుచుండును. పచ్చిగడ్డి వేసినచో త్రొవ్వయొక్క పాలయొక్క రంగు పసుపువర్ణముగా నుండును. ఆహారమును బట్టి పాలయొక్క రుచి మారుచుండును. కొన్నిచుంపదినములు తినుటవలన పాలయొక్క రుచి తగును.

నిగిలిచెట్లే విలనివానికయినా పండును.

పాలలోని వాసనలు

పాలు, మిగడ, వెన్న, మజ్జా మొదలగునవి దగ్గరనుంచి వానియొక్క వాసన అను సులభముగా గ్రహింపవచ్చును. కొన్నిపాలు మేకివాసన కొట్టుచున్నవనియు, నుట్టికంపు కొట్టుచున్నవనియు, గొట్టెవాసన కొట్టుచున్నవనియు, బూజాకంపు కొట్టుచున్నవనియు, చెప్పవచ్చును. పశువులనుండి బయలుదేరు కొన్నివిధములగు వాయువులు పాలుపిండు వేళలయందు పాలతోగూడ కలసి వచ్చుటచే 5 వాసనలు బయలుదేరును. ఇంక నిట్టి వాసనలు మనము పాలనుపయోగించు పాత్రలు శుచిగా లేవందుట వలనను, పాత్ర అడుగుభాగమున నుండు మలినము కడుగుక పోవుటవలనను, పాలు సరిగా కాగనీయకుండ తోడు పెట్టుటవలనను, పాలు చల్లారినతరువాత చురులు మొదలగు జంతువులు నాకుటవలనను, గలుగుచుండును. కొన్నిపశువులు మనుష్యుల మలము, ఏరుల్లి, వెల్లుల్లి, మొదలగు వస్తువులు తినుటవలన అవి యిచ్చుపాలుకూడ ఆ మాదిరిగానే వాసన వేయుచుండును.

పాలగుణములు

పశుజాతినిబట్టియు, ఆహారమునుబట్టియు, అవి ఈనిన రుతువులనుబట్టియు పాలగుణములు మారుచుండును. పసుపురంగుల పాలలో వెన్నను కలుగజేయు పదార్థము మెక్కువగా నుండును. ఏరిరంగుల పాలు రుచికి తీసిగనుండును. కాని అందులో మిగడ, పెరుగు, వెన్న ఎక్కువగా రావు. చిక్కనిపాలకంటే పలుచనిపాలే శిశువులకు తోగులకు ప్రకృతము. నేరు మ చిపాలలో నొకనవటాకు వెన్నయుండును. పశువు వయస్సు ముదిరినకొలది పాలు చిక్కబడును. చూడిపశువులపాలు శిశువులకు సుందవిగావు. ఇంకను పాలలోనుండు ద్రవ్యములలో కొన్నియెక్కువగా నుండుటవలనను, మరికొన్నితక్కువగా నుండుటవలనను పాలగుణములు మార్పుజెందుచుండును.

నీరసముగా నుండు పశువులపాలు

నీరసముగా నుండు పశువులయొక్క పాలు ఒక్కొక్కప్పుడు ఏలివర్ణముగానుండి పలుచగనుండును. పాలొక్కొక్కప్పుడు తీసినవెంటనే కగుకుగట్టును. ఇందుకు కొన్ని నూళ్ళుజీవులే కారణము. ఒక్కొక్కప్పుడు పాలు తీసినకొంతసేపటికి అవి చిక్కగను జిగురుగనుయుండును. ఈ రంగు పొదుగులోనుండు పాలలో రక్తము కలియుటవలన కలుగును. ఈపాలను కలుపపండ నుంచినచో రక్తసంబంధమగు పదార్థములు క్రిందికి దిగును. ఈరీతిగానే పాలుతీసిన కొంతసేపటికి ఎర్రబడుటయు, మిగుల పల్చబడుటయు, చేదగూటయు వివిధములగు నూళ్ళుజీవులచేతనే యని కొందరి యభిప్రాయము.

ఏలి దున్ని లే మూలకై నా పడును.

పాలస్వభావము, మేత మార్పులు

పాడుగు కొంతవరకు మూత్రసిండుమువలె శరీరమునందును కొన్నివిధముల మాలిన్యములను దీనివేయుటకుగూడ ముపయోగపడును. మేతమునందును కొన్నిద్రవ్యము లిటు తొలగింపబడును. కావున పాలస్వభావము మేతమాన్యుగలదు. కొన్నిద్రవ్యము లతో గూడిన మేత మేనిన పాడిపశువులపాలు నునువ్యులకు జబ్బుచేయును. పాలవలన త్వయ మొదలగు వ్యాధులు రాగలవు. పశువులవయస్సునుబట్టియు, అవితి నెడి మేతను బట్టియు, పాలను పీకుటవట్టి వేళలనుబట్టియు, పాలు ముక్కగుణములు మారుచుండును. పాలలో నీటిని కలుపవలసి వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధమైన నీటిని తేర్చవలెను. లేనియెడల చెడునీటిలోనుండు నూత్నజీవులు పాలలో జేరి అనేక వ్యాధులు కలిగించును. కొన్ని పశువు లొక్కొక్కప్పుడు ఈనునయము వచ్చినను పాలిచ్చుచుండును. ఇది యొక వ్యాధిగా పరిగణింపవలసినములేదన్నను జంతువులయొక్క బల మిందువలన క్షీణించును. కావున ఈయటకు కొన్ని నెలలముందు పాలిచ్చుట మాపువలయును. ఇంకను పాల గ్రంధులకు విక్రాంతి గలుగ జేయునెడల ఈనినవెనుక పాలు తగ్గవచ్చును.

పులుపు గలిగించు బీజములు

పాలు తీయగ నే పులియుట కారంభించును. ఎట్టిరీతా (Bacteria) అను ఒక విధమైన బీజములవలన యీ మార్పులు గలుగుచుండును. ఈ బీజములు పాలలో ననేక విధములుగా నుండును. పాలను శుభ్రముగా తీసికేసినచో ఈ బీజములంతగా యుండవు. అశుభ్రముగా నున్న పరిస్థితులలో పాలు తీసినచో ఈబీజము లెక్కువగా నుండును. అందువలన పాలుతీయునపుడు శుచిగా నుండవలెను. ఆహారము మిక్కుటముగా యున్న చోటులందును, గాలి ధారాళముగా వచ్చు ప్రదేశములందును, వేడి ఎక్కువగా నున్న ప్రదేశములందును, ఈ నూత్నబీజములు విశేషముగా వృద్ధియగుచుండును. ఈ బీజములు రెపుపాటులో లక్షోపలక్షలుగా పెరుగును. ఒక్కొక్కబీజము మధ్యగా చీలి రెండేసి యగుచుండును. ఈరీతిగా ఇది సంఖ్యాభివృద్ధియగుచుండును. ఇది ద్రవపదార్థముగా నుండు పాలు, నేయి, నీరు మొదలగువానిలోనే ఆభివృద్ధి చెందుచుండును. పంచ బార, మాంసకర పదార్థములు యెవలగునవి యున్నచోట నెక్కువగా నుండును.

బీజములు చనిపోవుట

ఇంక నివి ఆహారనాళములో కన్పట్టుచుండును. బురద, మురికినీరు, ఎరువు మొదలగు పదార్థములలో నేర్చిన పాలలోకలసినయెడల ఈ బీజములు తప్పుక యుండును. పాలలో నుండుటకు మంచిఆవకాశములేనవి. పెంపరేచరు వరిగానుండి పాలు వేడిగానున్నయెడల బీజములంతగానుండవు. 130 డిగ్రీలవేడిమి యున్నపుడు ఈ బీజ

విత్తులువేస్తే విడువక వ్యవసాయము చేయుము.

ములు చాలవరకు నశించును. 180 లేక 210 డిగ్రీలున్నపుడు అన్నిజాతుల బీజములు నిరభ్యంతరముగా చనిపోవును.

నివబీజములు పాలలో చేరుట

పిరిలకు గాయములు తగ్గులుచుండును. వానినుండి రక్తము, నీము పాలతో కలిసి పాత్రలోనికి చేరును. కాభాహారముల నమ్ముకొనువారు ఈ రక్తపానమును గూర్చి అలోచించుచుండురాక. ఇంతియేగాక వడపోతవలన ఈవోషము నివారింపదు. పాలలో నివి కొంతవరకు మనుజులకు హానికరములుగావు. కాని పాలు నిలువయున్నకొలదిని విపరీతముగ వృద్ధిచెందును. మరియొకవిధమైన నూత్నజీవులు (Micro-organismus) కిండుట తటస్థింపవచ్చును. అవి ఘోరరోగబీజములు. అవులలో వాప్రాణులు ఉదాసీనములై యుండును. వాటిని బాధించువన్నను మనుజునికీరములోనికి రాగానే వృద్ధిచెంది బాధించును. వానిలో ఒకరకపు బీజములు క్షయరోగము (Phthisis) ను కలిగించును. ఈబీజములను వాలను మరుగజెట్టి చంపవచ్చును. పచ్చిపాలు త్రాగువారు పిత్తిక జెంటనే పాలను పొంగుతో త్రాగుదురు. ఈవిషయమై చక్కగా గమనింపవలయును.

ఈలేలనుబట్టి పాలు

పాలు ప్రతిదినముకొలుచుట మంచిది. సంవత్సరమునకు 300 నుంచి 500 గాలనుల పాలిచ్చుఆవులను పెంచుట అంతలాభమైనపని కాదు. కెందుమాడు ఈలేలిన ఆవులను 700 నుండి 1000 గాలనులవరకు యిచ్చు ఆవులను సంపాదించవలెను. పాలు కొలుచుటవలన లాభమేమనగా పాలు తగ్గుచున్నయెడల దానికేమైన వ్యాధి యున్నదేమో గ్రహించవలెను. తరువాతి వ్యాధియున్నచో పశువైద్యునిచే చికిత్స చేయించవలెను. ప్రతిదినము ఉదయ సాయంత్రాలములందు పాలు కొలిచి డైరీ (Dairy) వ్రాసి సంవత్సరమున కంతపాలు యిచ్చినదో తెలిసికొనుట మంచిది. పాలను పొదుగులో మిగల్చరాదు. అట్లు మిగిల్చియెడల పొదుగు (Udder) చెడిపోవును. చివరనున్న పాలలో మిగడ ఎక్కువగా నుండునుగాక తప్పుకుండరీయుటమంచిది. పాలతో చున్నటు తడిచేసి పిండ్ల రాదు. అట్లుపిండుటవలన పాలు చెడిపోవును.

సాలిచ్చు వేళలు

సామాన్యముగా వాడిపశువులలో అనేకరములుండును. కొన్ని, పాలు మనాయాసముగా నిచ్చును. మరికొన్నిటికి చిరుతిండి అనగా ఉలపలు, తవుడు, జనుపకట్టలు మున్నగు దాణాదిననులుపెట్టి వాలుతీయుదురు. కొన్ని దొంగపశువులు తమమాడలకు పాలు తక్కువగనుండు యుద్యోగముతో సగమువరకు పాలించి తరువాత ఎగజేపుకొనును. మరికొన్ని తిన్నును. తరువాత ఆపాలను దూడకు కుడుపును. కొబ్బటి పశువు యొక్క గుర్రమును కనిపెట్టి పాలుపీకుకవలెను. ప్రతిదినము ఉదయము 6 కంటకునకు,

సాయంకాలము 7½ గంటలకు పాలుతీయుట నుంచిది. కొన్ని ఆవులు ఎల్లవేళల నిచ్చును. ఇట్టిపాలు అంత రుచికరముగా నుండవు. కొని దినమునకు రెండుపూటలు పిండుటే మంచిది.

పాలుపితుకుటకు పూర్వము పశువును తనిఖిచేయుట

పాలుపితుకుటకు పూర్వము పశువు నంతోషముగా నున్నదో, జబ్బుగానున్నదో పరీక్షించి పాలుతీయవలయును. పశుశాస్త్రము శుద్ధిముగా బాగుచేసిన తరువాత పాలను తీయుటనుంచిది. పాలుపితుకునపుడు తదితరులెవరును యుండరాదు. అటుండుటవలన దృష్టిదోషము తగులును. పాలలో దుమ్ము ఎంతమాత్రము పడరాదు. పాలు పిండినతరువాత పాలిందె వెనకి మూపించరాదు. దృష్టియనునది యున్నదా యని కొందరు చమత్కార ప్రశ్నలు వేయుదురు. నా అనుభవము మీద దృష్టిదోషము యున్నదని చెప్పవలను.

పాలలోని కలగలుపులు

ఆదపశువులు వాని బిడ్డలకొరకు స్వసంబంధముగ నాళములు తయారు చేయు ఒకవిధమైన తెలుపుగను, చిక్కగ నునుపుగనుండు ద్రవమునకు పాలు అందురు. కొన్ని జంతువులు వానిబిడ్డలకు పాలు అవసరము లేనప్పుడు పాలిచ్చుట ఆసీవేయును. కొన్ని పాపిపశువులు మాడలకు ఆవులరము లేకున్నను పాలిచ్చుచునే యుండును. ఆవుపాలు (Cow Milk) అన్నిటికంటే పేరుగాంచినది. గొట్టె, మేక గాడిద గుట్టము మొదలగు జంతువులిచ్చుపాలుగూడ ఒక్కొక్కప్పుడు మనుష్యులకు నుపయోగముగ నాడవచ్చును. పాలనుండి మిగడతీసినచో మిగడపాలనియు, మిగడ తీయని పాలనియు, ఆ నేకజంతువులపాలు కలసినపుడు మిశ్రమపాలుఅనియు పిలువబడుచుండును.

మన దేశములో పాలను మిక్కిలి కల్తీచేయుచుండురు పాలలో చక్కెరను నిటిలి చేర్చెదరు. ఉదయము పిరికిన పాలను సాయంకాలపు పాలలో కలుపుదురు. మరికొందరు ఆవుపాలలో గేదెపాలను కలుపుదురు. పాలు పెరుగు నెయ్యి చెన్న మున్నగువాటిని అమ్మెదమారిలో అశ్వాదుమునకు జంకనివారు లాభము సధికముగా గడించుటకు బద్ధిభార్యకముగనే పాలలోనున్నమిగడను తీసికేసి పాలలో పిండిని, గంజని కలుపుదురు. పాలలో సహజముగా నిర్దుత చక్కెర చెన్న పెరుగు మొదలగునవి యును శరీరపోషణ కవసరములగు కొన్ని లవణములును యుండును. పాలనమ్మకాదు ప్రత్యేకముగా పాలలో కలుపునీరు తరచుగా అపరిశుద్ధముగా నుండును. అందువలన అట్టిపాలను త్రాగినచో చెడినిబిడివలన కలుగు నట్టి కలరా టైఫాయిడ్ మున్నగు వ్యాధులు కలుగుటకు కూడ నవకాళ మేర్పడును.

ఆవుపాలు

ఈ పాలు తీసిగనుండును. చలువచేయును. జగటగ నుండును. ఆయురాశోగ్యములను శక్తివృద్ధిని యిచ్చును. నలుపు రంగుగల ఆవుపాలు శ్రేష్ఠమైనవి. తెలుపురంగుగల ఆవుపాలు గురుత్వముచేయును. లేతమాడగల ఆవుపాలు, మాడలేని ఆవుపాలు త్రిదోషముల కలగజేయును. తెలకపిండి పెడదగు వస్తువులు తినిన ఆవుపాలు గురుత్వముచేయును. నలుపురంగుగల ఆవుపాలు వాతరోగములను హరించును. పసుపురంగుగల ఆవుపాలు కైక్యము, వాతముచేయును. తెలుపురంగుగల ఆవుపాలు శ్లేష్మమును పోగొట్టును. గురుత్వము చేయును. ఎరుపు రంగుగల ఆవుపాలు వాతమును పోగొట్టును. తీగపెయ్యకలదాని యొక్కయు మాడి చచ్చినదాని యొక్కయు పాలు త్రిదోషములను హరించి బలము కలుగజేయును.

పొట్టలు, గడ్డిబాతులు, ప్రత్తిగిజలు తినిన ఆవులపాలు రోగులకు హితముగా నుండును. ఆవుపాలు తీసిగా, చల్లగా, చిక్కగా నుండును. పశువునకు బుడ్డకొట్టిన తరువాత ప్రతినెలము శేరులలో నాలుగు రోజుగ్రుడ్డు కలిపిపెట్టిన బలము కలిగించి పట్టలు దిగియును. తీగవారములకు, కొమ్మడొల్లలకు ఆవుపాలలో సొట్టి, వన, కిలీరి పక్షముదినములు పెట్టిన యెడల శిశువు, పశువు శుశుువౌటనే శేరుపాలలో 4 కులముల యొడగున కలిపి పెట్టిన నాలుక నేర్చు, గొప్పవారిని హరించును. పశువులకు గలుగు వాత రోగములకు ఆవుపాలు చాలమందేవి. వలముత్రములు చిక్కగా గావింతు. బ్రూక శక్తిని గలిగి నును. నెడలవాడను బుప్పవి, విరిగినవి, గడ్డకట్టినవి నానరాదు.

శేరుపాలు

ఆవుపాలకంటె శేరుపాలు చాల బలకరమైనవి. పీయంగు మాటికి పకవంగు వెన్న, త్రొవ్వ యుండును. సుమారు 10 శేరుపాలలో ఆరశేరువెన్న తేలికగా వచ్చును. నుంచినెప్పలో 70 శేరుపాలకు 80 వ పుడు సేయవచ్చును. పాలయొక్క గుణాదుల మలనుబట్టి మిగడయొక్క హేమ్యుత్తిగులు కలుగుచుండును. ఈ పాలు తీసిగ, జగటగ నుండును. గురుత్వముచేయును. చలువచేయును. ఆవుపాలు దొంగకనపుడు పైచెప్పిన వ్యాధులకు వాడవచ్చును.

మేకపాలు

ఈ పాలు ఆవుపాల గుణము కలిగియుండును మలబిడును కలిగి నును. పశువులకు కలుగు రక్తవాత క్వాశిరోగములకు నాగుగా పనిచేయును. ఈ ఆల్పశక్తిగలదిగ నుండుట వలనను, కొరము చేయ మున్నగు రిషములుగల వస్తువులను తీసుటవలనను, తక్కువనియ త్రొగుటవలనను, విశేషముగా తిరుగుటవలనను మేకపాలు నర్ధరోగముల వారింపజేయును. మేకపాలు పశువులకు కలిగిడి వాతరోగములు, వాగ్మ్యవాతము, తీగ రోగములకు కెండు మానములపాప పెట్టిన నుబ్బిదురుగును.

పాపనను పది నేర్వాల పట్టు.

వెన్నయొక్క గుణములు

వెన్నను నిత్యకృత్యములయందు మాత్రమే గాక వైద్యులుచేయు చికిత్సలన్నిటిలోను తగడుగా వాడుచుండుట వసకగడంబు తెలిసినవిషయమే. వెన్న పశువులకు మంచి చలువచేయును. బలము కలిగించును. చర్మసంబంధముగు రోగములకును బెంకులకును మద్దత చేసిన బాగుగా పని చేయును. జీర్ణ సంబంధముగు వ్యాధులకు తరడుగా వాడవచ్చును.

ఆవువెన్న:—ఇది కొంచెము పసుపురంగులిగి మెరయుచుండును. చూచుట కింపుగానుండును. నేత్రరోగములకు, విశేషములకు వాడవచ్చును. పొరుచున్న మాడలకు దీనిని నిప్పుకాయంత లోపలికి పెట్టవచ్చును.

నేదెవెన్న:—ఆవువెన్నవలె పసుపురంగుగా నుండిక తెలుపుగా నుండును. దీనిలో చమురుపదార్థ మెక్కువగా నుండును. బలము కలిగించును. దీక్ష విశేషములకు చర్మవ్యాధులకు నిద్ర బాగుగా పనిచేయును. చూడల కప్పుడిప్పుడు నాశించుట మంచిది.

పచ్చివెన్న:—చలువచేయును. నేత్రవ్యాధులకు బాగుగా పనిచేయును. బలము కలిగించును.

నిలువయుడు వెన్న:—ఇది పులుపువాడనగలిగి వగరు నుండును. చర్మసంబంధముగు రోగముల కన్నిటికి వాడవచ్చును.

క్రోత్తెవెన్న:—చలువచేయును. శరీరకొంతించుచును. అన్ని వాతనొప్పులకు బాగుగా పనిచేయును.

కొబ్బరివెన్న

సాధుకొబ్బరిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగ చితుకగొట్టి నానినండి యంత్రమాలమున చురును తీయుదురు. ఈపచ్చి నూనెయందు క్రొవ్వపదార్థము లుగడుటచే దానియందు నువాసన యుండదు. దానిలో చెరువాసన యేదియు లేకుండ జేయుటకు మొదట నొక పెద్దతొట్టెలో యీ నూనెపోసి అందులో పొడిగా నుండు సీమనున్నమును కలుపుదురు. అట్లు కలుపుటవలన యాదలి క్రొవ్వపదార్థముతో కూడ నొక క్రిందికి చేరి ప్రకృత మైన నూనెమాత్రమే పైప యుండును. పైకి తేలిపోయిన నూనెతో తొట్టిలోనికి తోడి జేయుదురు. అట్లు చేయుచున్న నాలుగుసార్లు వడపోయుదురు. ఏమిట అని గొట్టమాలగుండ దానిని మరగనిచ్చెదరు. నూనెస్పటికమువలె తెల్లబడి పొంగువరకు పైప మున వడపోసి కాచుదును. బాగుగ కాగి తెల్లబడినతిరువాత దానిని చల్లారనిచ్చెదరు.

సీమనున్నమతోకలిపి అడుగువరకు కరివ క్రొవ్వపదార్థమునొక సల్ఫురిక్ ఆసిడ్ను చేర్చినయెడల సీమనున్నము కరిగిపోయి అద్రావకముపై యీ క్రొవ్వపదార్థము తేలును. ఈ కొబ్బరివెన్న కొన్ని మాసములవరకు చెడిపోకుండ నిలువయుండును. ఉష్ణకాలము

అందుకూడ పెడదు ఈ శక్తితో యెట్టి వ్యవహారము కలిపెట్ట సాధ్యమని తెలియుచున్నది. దీనికి భగవంతుడ యెప్పుడగా నుడును.

వెన్నలో కల్తీపదార్థములు కలుపుట

కొంచె మిందుమిగు వెన్ననుబోలి యుండునదియు దానితో తమ కల్తీచేయబడుచుండునదియు మార్గలింగము అను పదార్థము మొగట పశువుల క్రొవ్వునుండి తీయబడుచుండుచే చాలనుది కనపరచుకొనుగ నుండెడిది. ఇప్పుడిది పలువిధములుగా చేయబడుచుండి దీయు నుపాదము గల గొనుటచే నట్టి యధ్యంతరములు లేకయే యనేక చోట్ల వంటకములలో నుపయోగింపబడుచున్నది. విశాఖాంధ్రములలో చాలదేశములలో దీనిని వెన్నతో కలుపుకూడ జేయుటను చట్టములు గలవు. నూటికి 10, 15, పాదు దీనిని వెన్నతోకలిపి త్రేసికొనుట కష్టము. చురుగులను పరిశుద్ధముచేసి కొన్నియంతరములతో దప్పింపజేసి పాలతో కలిపి బోని ప్రస్థితమెడల సామాన్యపు మోగడలలోనుండి వెన్న పప్పులులనే ఈ మిశ్రమమునుండి మార్గలింగము వచ్చునట. వెన్నవలెనే ఇదియు నూటికి 10 పాదు పప్పులుకలిగి ఆహారయోగ్యముగ నుండునట. ఈ రీతిగా వెన్నపర్తములు, వెన్నపప్పుస్త్రిము మొదలండి బిళ్ళపునీడి, అంటికాయగుడ్డ కలిపి ఇతరుల కనుబడునాగు. కొనుగడు వెన్ను కలిగి వుండువుక ఈ కలిపిన పదార్థములు అడుగు వడిగా తేరుకొనుటచే దిగా నంతయు కనబడుచున్నది. ఇంకను గట్టి పెరుగుకూడ కలుపుదురు. ఇట్లు కలుపుటలకు వెన్న చెడిపోవుటయేగాక కలిగించిన నేయి కూడ ఎక్కువకాలము నిలువయుండిక దుర్వాసన వేయును.

మజ్జిగయొక్క గుణములు

పాలను తోడుకెట్టి పొగ కలిపిననీ మిగిలినపెరుగులలో ఏగు బోని కప్పముతో చిలికి వెన్నపోగా మిగిలింధాగజే నట్టిది. ఇదియొకమజ్జగ చిక్క, సువాసనగ, తెలుపుగ నుండును. దీనిలో చాలగణములు గలవు. ఎడలలోగాని దాహము గొనినప్పుడు గాని తదితరరోగముల కుండుగాని వజ్జిగనుబోని మెడల బాగుగా పనిచేయును. వాత రోగముల పోకొట్టును. ఇంకను పశువులను నోటి కలిగినపుడు మజ్జిగను త్రాగించిన చలు పడవచ్చును. శరీరకొంతరించుచును. మనుష్యులు త్రాగగా మిగిలిన వజ్జిగ మడితితోటలో పోయుట మంచిది. అకడితి త్రాగిన చలువజేయును. నీరు కలుపకూడ జేసిన మజ్జిగ చాల చిక్కగను, జీర్ణముయ్యు డును. జలముకలిగించును. మాత్రరోగములను బాగుగా పనిచేయును. పెడదెబ్బలను ఆమోఘముగా పనిచేయును. పాలు పెరుగు నీరు పోనిచేసిన వజ్జిగ రక్తపిరేవనములు కట్టించును. కూడలను సుభవిండు నిర్భవిరేవ నములను కూడ బాగుగాపనిచేయును. వేడికలిగించును. పెరుగు నిరుకలిగిన వజ్జిగ శేత్ర రోగములను పనిచేయును. చలువచేయును. కొంచిన మజ్జిగ వాతరోగములను నోటి

కోగములకు బాగుగా పనిచేయును. పులుపునుజేగి ఆహారమును త్వరగా జీర్ణము చేయును. కాకకోగములుగల పశువులకు పెట్టుచు నుంచెడిది.

ఈమధ్య నామిత్రులొకరు రు40 0 0ల విలువగల గేదె కొనడానిని తెచ్చి యున్నారు. ఈ పశువును వారు కష్టతరువుగ భావించి లాల్చిదుట చూడ నాశ్చర్యము నొడమి తత్కారణములు తెలుపగోరితి. ఆతనివారు రైతు శలడిలుట కింకను అంతిమ కాలము దాపురిచ లేదనియు, క్రడ వహించి కృషిగల్గించి ఇంకను తరువాతపాదుము కలదనియు నుడిచి, స్వస్థివధముల రైతు ప్రంగిపోవుచున్నాడని భ్రమించుచున్న వారు విస్మయము తోపజేసెను. వారు తమ అనుభవమువలన తమ పశు ఆదాయము కట్టు వర్చించిరి.

పాడిగేదెమీద వచ్చు ఆదాయము

గేదె కొనుగోలుఖర్చు రు 40-0-0 లని ఎదవరిపే చెప్పియుంటినిగా? ఇయ్యది పూటకు రెండుశేర్ల వ. తుచ 4 సేళ్ల పాలు యిచ్చుచున్నది. పాలనే విక్రయించినచో శేరు 1 కి రు 0-3-0 వ తుచ 4 శేళ్లను రు 0-12-0 గిట్టుచున్నది. అట్లుగాక పాడిచేయు నపుడు;—నేయి పాలుబుఖర్చునకు పోగా దినున పశు సహసేరువెన్న వచ్చును. ఈవెన్న ఖర్చు రు 0-5-0, పట్టెగ, పెదగు విక్రయమున రు 0-2-0, పిడవలవలన రు 0-1-0 మొత్తము అనుదినము వచ్చురాబడి 0-8-0 యై యున్నది.

ఈ గేదెకుగుఱుచ్చ దినమునకు తప్పుకు ఒకవంచెకు వెల రు 0-1-0, చిట్ట! తుగదెడు రు 0-0-8. మొత్తము వెళి రు 0-1-0. నామిత్రులు రైతులగుటవలన గడి ఖర్చు లేదన్నది. గడిహూక కొనదలచిన నె 1 కి రు1-4-0. అనగా దినమునకు రు0-0-9 లోపుగా అగుచున్నది. మొత్తము దినవ్యయము రు 0-2-3 అనగా నీకరాదాయము దినమునకు రైతునకు రు 0-5-9. ప్రతిబీద భారీయైనను ఇంతిన్ని లాభప్రదమైనకృషి చేరొందుగలదేమి ప్రాజ్ఞులు వచింతురు గాక. ఇదివినిన నామ “పాడిపంటను మించు” నను లోకోక్తి తద్యమని నమ్మితిని. పెంటపోగును సులభతరంతమున విక్రయించిన కనీసము రు 4-0-0 వచ్చునట. దీనివలన వస్త్రాదివ్యయము కొంతవరకు తగ్గునుకదా !

పాడిపశువువలన వచ్చు ఆదాయము

ఇక గోమాతనివయస్సు చూపు అము. స్వోశమునకు దొరినఅత్ర ముమారు ఏవిది రూకలకు మించుటలేదు ఇట్టి అత్ర పశుమునకు 4 శేళ్లపాు విచ్చుటలో వింతలేదు. ఈ నాల్గశేర్ల ఖర్చు సేరు 1 కి రు 0 4-0 వ తుచ లోడున్నది. అపునకు గేయి తిక్కన వచ్చినను మూల్యసాధికముగదా? వెన్న దినమునకు అర్ధసేరువలన వచ్చును. ఈ వెన్న దినమునకు అర్ధసేరువలన వచ్చును. ఈ వెన్న ఖర్చు రు 0-3-0, పెదగువగైరాలకు

రు 0-2-0, పిడకలు 0-1-0. మొత్తము రు 0-6-6. దీనిగు ఖర్చులు తవుడు చిట్టు వగైరా దినమునకు రు 0-2-0. కోడెదూడ అయిన దూడ గ్రాసము రు 0-0-6. గడ్డి కూడ కొనవలసివచ్చిన రు 0-1-0. మొత్తము దినఖర్చు రు 0-3-6. దీనికి పెంటపోగు నుంచి సంవత్సరాంతమున సుమారు రు 6-0-0 వరకు రాగలదు. నికరాదాయము దినము నకు రు 0-3-0. సంవత్సరాంతమున, అనగా పాలు విడిచిన తరుపరి కోడె అయినచో కనీసము రు 30-0-0, 40-0-0 వఱకు రాగలదని యనవి. ఇప్పుడు రైతునకు పశువుపై వచ్చు సంవత్సరాదాయమును నిర్ణయింతము.

గే దే వ ల న

	రు.	అ.	పై.
దినమునకు రు 0-6-3 వంతున సంవత్సరమునకు.	140	10	0
పెంటపోగు	4	0	0
దూడ	5	0	0
మొత్తము	149	10	0

సంవత్సరము తరువాతకూడ పాలిచ్చునట. సుమారు రెండొండవరకు పాలు ఇచ్చు ననికూడ తెలియుచున్నది. కాని సంవత్సరమునకే నేను అంచన వేయుచున్నాను. దీని దూడలనుంచి ఎక్కువగా ఆదాయము రాదని తలచి విడచితిని. కాని అందువలనను కనీసము రు 5-0-0 వ వరకు రాగలదు.

ఆ వు వ ల న

దినమునకు రు 0-3-0 వంతున.

	రు.	అ.	పై.
సంవత్సరమునకు	67	8	0
పెంటపోగు	6	0	0
దూడ	40	0	0
మొత్తము	113	8	0

రైతు ఒక గోవును, ఒక గేదెను పెంచినచో ఎంతటి లాభప్రదమో ఇప్పటికైన రైతుసోదరులు గ్రహింతురుగాక. ఆ పశువును కొన్నఖర్చు పోను మొదటి సంవత్సరమునకే యెంత నిలువచేయగలడో గ్రహింపుడు. ఇకనైనను రైతుసోదరులు తమ అజ్ఞానమును పోద్రోలి ఇంతవరకు తాము పశువులపై వహించిన ఊపేక్షను వీడి, తా మింత వర కొనర్చిన అక్కర్త్యములకు, అత్యాచారములకు సిగ్గునొందియైన, “అర్జునవృద్ధ భూతాని” యను ధర్మసాధనార్థమైనను కామభయవనంధగిన గోవును, తదితర పశువు లను పోషించుడు నేటి ఆర్థిక చిక్కులనుండి రక్షించబడి ప్రపంచమున కారద్య ప్రాయులై నుఖింతురుగాక.

పాడిపశువుల రోగములు

పాలు చేపకుండుట

పాడిపశువుల చన్నుల గొట్టములలో ననేకమైన నూక్కుమను నాళములుండును. ఈపాలగొట్టముల కన్నిటికి కుడిమొకళ్ళలో మానవముతో చేయబడిన ద్వారములుండును. ఈ ద్వారములు తెరచివారి యున్నయెడల పాలతిత్తులలోని పాలు పినిగుండ ప్రవహించగలవు. పశువునకు ధన్యు కలిగినప్పుడుగాని, జ్వరము పప్పునప్పుడుగాని, పకామునకు పాలుపిండనప్పుడుగాని, పశువునూడకు పాలుదానుకొనవలెనను యుద్దేశమున్నప్పుడుగాని, మనోవాగ్ధులము కలిగినప్పుడు గాని ఈ ద్వారములు ముగించుకొనును. అప్పుడు పశువు చేవుటలేదందుగు. పశువు దూడను దగ్గరకు రావలయు. చన్నులపై నురుపోసి పితికినప్పుడు పాలురావు. బెడలిబెడలి చూచుచుండును, నరిగా నిలబడక ఆటువీటు తిరుగును. కొన్ని పశువుల కిట్టిపనుయములలో దాదాదినుతులు పెట్టిన పాలు చేవుటకూడ గలదు.

చికిత్స

అవునుజగ ఆర్థసేరు, తాడికాయలు 1 కు, కావలపలము ½ కు, నుగంధపాల గనము 2 కు కలిపి రెండుపర్యాయము నీయవచ్చును.

లేక గోధుమగంజ ఆర్థసేరు, వెయ్యి రో కు కలిపి మూడుతూటలు త్రాగిండును.

లేక సాగవార మట్టలురెచ్చి ఉడికించి దానిలోనున్న తెలుపువలుతులతికి మజ్జి గలలో కలిపి త్రాగించవలెను.

లేక ఫుల్లతిగనులచి సమంతిసి చన్నుల పైభాగమున నుద్దించి దేతులతో కొంచెముగా గొట్టిన పశువు చేవును.

లేక కొండగోగు ఆవలము తీసి పాలు పిటుకబోవు ముందు పశువు శరీరమునకు రాచిన తప్పక చేవును.

చన్నుల ద్వారములు ముడుచుకొనుట

పశువుయొక్క చన్నులు పాలతిత్తులలోనికి వ్యాపించును. పాలతిత్తులలో నుగట్టములు ప్రవేశించుచోట నొక ద్వారముండును. ఈ ద్వారము తిసంత నదియే ముడుచుకొనగలదు. అట్లు ముడుచుకొనినపుడు చన్నులనండి పాలురావు. పాడిపశువు పాడుగులో రెండు తిత్తులుండును. రెండు గొట్టములొక తిత్తిలోనికిని, తక్కిన రెండు గొట్టములు మరియొక పాలతిత్తిలోనికిని ప్రవేశించును. కొన్ని పశువులపాలు ఈ గొట్టమునండి

ఎరువుంటే వెలివాడు నేద్యగాడే.

పిడుకమండగనే పొనియంతటమీయే కారిపోవును. కొన్ని పశువులకు బాగుగా పిండి నప్పటికి పాలు రాజాలవు. కారణమేమన పశువుచన్నులలో ఒకటిగాని, అంతకమ్మనగాని పూడిపోయిన రంధ్రములుగలవై యుండును.

ఈవిధ వెంటనే కొన్ని పశువుల గ్రంధులలో పాలుత్రట్టి చన్నులు లావుగా కనబడినను పాలుమాత్రము పైకి రాజాలవు. పాలు పైకివచ్చు ద్వారమున కడ్డముగా చంటి చివర నొకవిధమగుపొర పెరుగుటయే యందుకు కారణము. రైతు లిట్టి పశువులను గూర్చి చాలివిచారపడుచుండును. కొన్ని పశువులు ఈవిధవెంటనే చన్నులద్వారములు మూసికొనిపోయి వట్టిపోవును. కొన్ని పశువుల నాలుగు చన్నులవగాని, రెండు చన్నులవగాని యిది రావడును. ద్వారములు గట్టిగా ముడుచుకొనిపోయిన పశువుల కెన్ని చికిత్సలు చేసినను లాభములేదు. ఆ ఈత కంటియేయని గ్రహించవలెను. మరల రెండవ కౌశ్యసమహాద రావచ్చును.

చంటి రంధ్రములు పొరతోముడునకొని పోయినపుడు సలూక (Probe) తో గాని, కతీటరు (Catheter) అను పనికట్టుతో గాని పొడిచి పాలు పైకివచ్చుకట్టు చేయవచ్చును. లేక పొడుగుగల సన్నని నూదితో నమ్మదిగా నాపాలరంధ్రములోనికి పొడిచి పాలను గప్పించవచ్చును. కాని తెలిసి తెలియనివారు రంధ్రభాగమునకు పొడిచిన యెడల పశువున కపాయము సంభవించును. అంతకు తెలియనిచో మీతాలూకా వెటరినర్ చికిత్సాలయమునకు తీసికొని వెళ్లి చికిత్స చేయుడు.

కంఠరసంకోచము

ఒక్కొక్కప్పుడు చంటి చివరనూడి పాలు తమంతటమీయే కారిపోతుండీ కాపాడు కండికము సంకోచము కొందుటచే రంధ్రము మిగుల చిన్నదయి పాలుతీయుటకు దుర్లభముగా నుండును. దీనికి చికిత్స చేయుట దుర్లభము. శస్త్ర సువసరముగ నుండునుగాని యీపరి విగుల క్షేపరయైన వైద్యుడు చేయవలసి యుండును. అందువలన సైసను లేపుక లాభముండును ఇటువంటి శస్త్రసంబంధమైన వ్యాధులు కలిగినపుడు మీతాలూకా వెటరినర్ డాక్టరుగారికి చూపించుట మంచిది. ఆయుర్వేద పశువైద్యులవలన యేమియు లాభముండదు. లేక ద్రవీధినము నొక సన్నని నూదిని లోనికి జొల్పి పాలను దీయుచు వచ్చినయెడల రంధ్రము పెద్దది కావచ్చును.

చన్నులమీద కాయలు

పశువు చన్నులమీద చిటిపాటి కాయలు మొదలగునవి యుండుటచే పాలు పీకుట కంటంకము గలిగిండును. ఒక్కొక్కప్పుడు రేగినయెడల పూడు పడి పశువు బాధపడును. నాలుగూడ తగ్గవచ్చును, కాబట్టి అటువంటి కాయలను తొసి వేయుట వలనగాని, వైద్యులతో బిగించి కట్టుటవలనగాని అవి పోవచ్చును.

గంపెడిచ్చిన తనకు గరిసెడిచ్చును.

చన్నులకొటంకము గలుగుట

పొలలో ఏమురుగాక కొన్ని ఘనపదార్థములుండును ఈ పదార్థములు విశా
రముగా నున్నయెడల పాలు బరువుగానుండును. ఈ ఘనపదార్థములు పాలువీరుట
నప్పుడు చేతికి చిన్న చిన్న ముద్దలవలె తగగుగా తగలుచుండును. ఇవి పేరుకొనిన
పాలముదలుగాని, లోపల వర్షముపై బయలుదేరిన కంకులుగాని, లేక ఒక విధమైన
శిలలు గాని అయియుండవచ్చును. ఇవి పాలుతీయుట కవరోధమును కలిగించుటయే
గాక ఒక్కొక్కప్పుడు పొదుగునందుగూడ వాపుపుట్టించును. కావున ఏ యవరోధ
మాన దీనినిచేయుట యవశ్యకము తీసివేయుటకు విలులేనియెడల పైనుండు పాలతిత్తి
లోనికి ప్రోసి చేయుట మంచిది.

చంటికి రంధ్రము పడుట

ఏదైన అవయవమువలనగాని, పుండుపుట్టుట వలనగాని, చంటిలో సామాన్య
ముగ పాలుతీయు మార్గముగాక పాలతిత్తిలోనుండి చంటిప్రక్కకు కన్నముపడవచ్చును.
అచటినుండి పాలుకారిపోవును. ఇందువలన పొదుగుంటికికినిగూడ వాపు తగులవచ్చును.
పాలిచ్చుచున్నంతకాలమును ఈ రంధ్రమును పూడునట్లు చేయుట మిగుల కష్టము. పాలి
చ్చుట మానినతరువాత క్షిప్రముగ నే వదుర్చవచ్చును. అయినను పాలతిత్తిలో పాలె
ప్పుడను లేకుండు కారునట్లు మామూలుమార్గములో నొకగొట్ట ముంచి యాపుండును
మాపువచ్చును. కాని యిది కష్టసాధ్యము.

కొరివిచన్ను

పాడిపశువులలో శేదైన కొరివిచన్ను కావచ్చును. అదిగా నాచన్ను తిత్తి
పలెనై పాలు స్రవించునట్లు నుండును. పశువున కలివేడిజేరినపుడుగాని, విషసంబంధ
మైన పదార్థములు తినుటవలనగాని ఈవ్యాధి యేర్పడవచ్చును. పశువు నవమాసములు
విచ్చిన తరువాత యేదైన విషపుయొక్కలు తినియెడల ఈవిధ తరువార ఈ వ్యాధి కు
పడవచ్చును. కొన్నిపశువుల చన్నులనుండి నెత్తున పడుచుండును. మరికొన్నిటికి
నీయ, నెత్తున కలిసి పడుచుండును. అప్పుడు గుడ్డినోయము తగిలినదని అనేక చికిత్సలు
చేయుదురు. కొరివిచన్నుగల పశువు ప్రతిఈతకు పాలు సరిగా దియదు. తక్కిన
మానచన్నులనుండి పాలు వచ్చుచుగాని, ఈ చన్నుచుడిచుత్రము రావు. ఒక్కొక్క
ప్పుడు అన్ని చన్నులకు నీ వ్యాధి రావచ్చును.

పాలుతగ్గిపోవుట (Loss of milk)

పశువుయొక్క రక్తియును బట్టియు, ఆరోగ్యమును బట్టియు, సాంప్రదాయమును
బట్టియు వారెక్కవ తగ్గువగా వట్టుచుండును. పశువులకు ప్రతిదినము పెట్టుదాదా

దినులు తగ్గించి పెట్టుటవలనను, బొట్టిగా పెట్టక పోవుటవలననుకూడ పాలుతగ్గ వచ్చును. ఇంకను పశువుకడముగా తగిన తరక్తవృద్ధి లేకపోవుటవలనను, త్రొత్త మనఘట్టు పిరుగుటవలనను, ఎండలో నెక్కువగా నుంచుటవలనను, పొరుగులొనన్న పాలకు తూర్తిగా సిండ్లపోవుటవలనను, విషసంబంధమైన మొక్కలు తినుటవలనను, దూడ చచ్చినపుడుగాని, పాలన్నియు మాడత్రాగునను యుదేశముతో నుడ వేయుక పోవుటవలననుకూడ పాలుతగ్గచుండును. ఇట్టి తాత్కాలిక కారణములవలన పాలు తగ్గినయెడల ఆహారమును మార్చవలెను.

చి కి ర్వు

వారముగల పశువునకు ప్రతిదినము సాయంకాలమందు సహనీగు తెలిపిండి పెట్టుటవలన పాలవృద్ధి గలుగును. లేక ఆసిండిలి రిటిలో నానవేసి సాయంకాలము పెట్టుటడితితోకలిపి పెట్టవచ్చును.

లేక కాకళోరముగల పశువునకు ఉలపలు నానవేసి గుడ్డి తుడితిగా పోయవచ్చును. లేక తనగలు నానవేసి గుడ్డి తుడితిగా పోయవచ్చును. పశువుయొక్క శరీరతత్వముల గ్రహించి వానికి తగిన ఆహార పదార్థములు పెట్టుచుండిన యెడల పాలువృద్ధియగు చుండును.

మాడకు పాలు మరపించుట

కొన్ని పశువులు మాడలు పెదవైనపుడుకూడ పాలిచ్చుచుండును. ఇట్లు మాడకు పశుయ్యు చచ్చిన తరువాతకూడ తల్లిపాలు తుడుచుటవలన యజమానికి కొంత నష్టము కలుగును. కాబట్టి మాడకు ప్రత్యేకముగా చాచాదిన నులుగాని ద్రవపదార్థములు ఆనగా నూకలదావ, లేదా పచ్చిపడ్డి మున్నగువి వేసి పాలు మరపించవలెను.

అధిక పాలప్రవాహము

కొన్ని పశువు బొక్కిక్కొప్పు డీనుననుమును వచ్చినను పాలిచ్చుచుండును. ఇది యొక శోగముగా పరిగణింపక పోయినను జాగువుయొక్క బల మందువలన క్షీణించును. కొవున తునుటకు కొన్ని నెలలకు ముందు పాలిచ్చుట మాపువలెను. పాలగ్రంధులకు విక్రాంతిగలుగని యెడల తనవ వెనుక గల బొక్కి వచ్చును.

పాడిపశువులను పాలుపీకుకకి శోగముగా ముకటుటవలన గాని మేత మిక్కుటముగా వేసి పాలు పొరుగులో నొంపి యుండుటవలన గాని, బొక్కిక్కొప్పుడు చుంటిచివా నుండు కిండరముయొక్క పటుత్వము తగ్గిపోయి పాలు కారుచుండును. పాలు విస్తాముగా కారునెడల చుంటిచివర నొక్కిపట్టుటకు దిబ్బగు ఉంగరమువంటి లేదా పైటియెడల పాలుకారుట తగును.

పాలు విశేషముగా పోవుటవలన తల్లికి కౌగ్గున బలహీనత కలుగును. కాబట్టి తగిన వేరేలు కలిపెట్టి గూడన పశువులయొ నుజమాని పాలు తినుటయొ నేను పలెను.

శస్త్రవైద్యము

ఇరువది రెండవ భాగము

దహ్యతే దమానే నవత్కారేణేవ ప్రపచ్యతే
విపీలికాగణేనేవ దశ్యతే చిద్యతే తథా॥

పక్ష్యమగుచున్న ప్రణము (కంతి) నిష్క్రతో కాల్పుచున్నట్లును, త్వరముచే పక్ష్య మగు చున్నట్లును, చీమలచే కరవబడుచున్నట్లును, చీల్చబడుచున్నట్లును.

చిద్యతే చైవ శస్త్రేణ దండేనేవ చ తాడ్యతే
పీడ్యతే పాణీనే వాతః నూచీభివర తుద్యతే॥

శస్త్రముచే చిదించబడుచున్నట్లును, కర్రలతో కొట్టుచున్నట్లును, చేతితో లోపల పీనుచు చున్నట్లును, నూగులతో పొడుచుచున్నట్లును, ఆపరిమితమైన బాధకలిగి యుండును.

ఊషచోషే వివర్ణస్వాదంగుల్యేవా వ పీడ్యతే
ఆననే శయనేస్థానే శాంతిం పృశ్చిక విధవత్॥

ఇంటియేగాక తీవ్రమైన మంటలు, పేల్చిన మురున్నట్లు బాధకలిగి యుండును. శోకము మరొకరంగుగా నుండును. నేలతో నొమ్మచున్నట్లు బాధయుండును. పరున్నను, నిలుచున్నను లేలు బట్టుచున్నట్లు బాధపడుచు శ్వాతిని శౌంధకాలము.

వేదనోపశమః శోథో లోహితోల్బాన చోన్నతిః
ప్రసాదుర్భావో వలీనాం చతోనః కండూర్ము హుర్ముహుః
ఉపద్రవాణాం ప్రశమో నిష్క్ర తాస్సుట నంత్యచాం॥

పక్ష్యమైన ప్రణమందు మంట బాధతగ్గి ముడుతలుగ్గిలిగి, కొద్ది మరుగుగ, దురదగ, ఎరువుగ, ఆకార పరిమాణముతగ్గి జ్వరము వగైరాలన్ని తగ్గినపుడు.

బులేనీలాద్రుజే న వినానపిత్తం పాకః కఢంచాపి వినానపూయః
తస్మాస్థిస్సర్వే పరిపాకకాలే పంచతి శోఘాస్త్రిభిరేవదోమైః॥

గృత తొక్కినా చాలును.

ప్రణమ గుంట వీసచో అందలి చిగ్గము పొరలులేచి యుండును. వేలితోవాపు మీద నొక్కిన యెడల లోపలలిల్లిలో నీళ్ళు కదలుచున్నట్లు కదలుచుండును. ఒకచోట వల్లిన మరియొకచోట ఎత్తుగ నుండును. పక్షమైన ప్రణమగలవానికి ఆకలిఎక్కువగా నుండును.

వస్తావివాంబు సంచారః స్నాచ్ఛోధే గులిపీడితే
పూయశ్చపీడయే దేకమంతే మంతే చ పీడితే
బుభుక్షాప్రణశోధస్య భవేత్స్వ క్వస్య లక్షణం॥

ప్రణమ ఉబ్బుగాగాని లేక గుంటగాగాని యున్నచో అందలి చిగ్గము పొరలు లేచియుండును, వాపుమీద వేలితో నొక్కినయెడల లోపలనీళ్ళున్నట్లు నీము కదలుచుండును. ఒకచోటనొక్కిన మరొకచోట ఉబ్బుగానుండును. పక్షమైన ప్రణమగలవానికి ఆకలిఎక్కువగానుండును.

బుతేని లాద్రుజే న వినానపిత్తం పాకః కఫంచాని వినానపూయః
తస్మాద్ధిసర్వే పరిచాకకాలే చచంతిశోఘా స్త్రిభిరేవదోషైః॥

వాతములేకుండ పోటుగలుగుదు, పిత్తములేకుండ పాకమునపురారు. కఫము లేకుండ నీముపుట్టును. కాబట్టి ప్రణపరిపాకకాలమగు త్రిదోషములచేత పక్షమగు చున్నది.

గాయములో చీమున్నప్పుడు త్వరగమాన్యరాదు
న చైనం త్వరమాణః సా నర్దోషం రోపయేత్
సృవ్యాల్నే నాప్యపచారేణాభ్య న్తరముత్సజ్ఞం
కృత్వాభయోపి వికరోతి॥

ప్రణమను శస్త్రముచేసి తరువాత గాయములో చీమున్నపుడు తొందరపడి గాయమును మాన్యరాదు అట్లుచేసినయెడల ఆ గాయము స్వల్పమగు ఆపచారిము విలన లోపలగడ్డకట్టి మగల బాధించును.

గులభముగా శస్త్రచికిత్స చేయుట

తత్రతాయతో విశాలః సమః సువిభక్తోనిరాశయ ఇతిప్రణగుణాః॥

స్పష్టముగా తేలిపియు, అల్పివైపుల పక్షముబొందిపియు, బాగుగా అర్ధమైనదియు, నాలుక ద.తంధులు మున్నగు భాగాములనుండి నదియునగు ప్రణమను తేలికగా శస్త్రము చేయవలెను.

పూనిన తంగెడు వేసినా కొచిన వెంపలి వేసినా చేయవలెను.

ఏకేన వావణేనా శుభ్యమానే నాన్తరాబుధ్యా
వేత్త్యాపరాన్ వ్రణాన్ కుర్యాత్॥

(వణమును చిల్చిన తరువాత చీము సరిగా కారనిచో తన స్వంతబుద్ధితో వికాల మనస్సుతో అలాచించి చేయవలెను. అన్ని వ్రణములను ఈరీతిగా చేయవచ్చును.

యతోయతో గతిం విద్యాదుత్సర్గో యత్రయత్ర చ
తత్ర తత్ర వ్రణం కుర్యాద్యథా దోషోన తిష్ఠతి॥

ఏ భాగమునుంచి చీము కాగుచున్నదో, ఎచ్చటెచ్చట నొక్కిన గుంటలుపడునో అచ్చటనుంచి చీమును తీయుటకు మరియొక బెల్లము వేయవలెను.

శత్రుము చేయవలసిన భాగములు

తత్ర భూ గడ్డ శబ్ద లలాటా క్షిపుటౌ వ దస్తవేష్ట
కత్తౌ కుక్షి వజ్రణేషు తిర్యక్ ఛేద ఉక్తః॥

కనుబొమలు, చెక్కిళ్లు, కణతలు, నొగలు, కనుకెప్పులు, పెదవులు, వంతమాంసములు, చంకలు, ఉదరము, గజ్జలు, ఈ స్థానములందు అడ్డముగా శత్రు చికిత్స చేయవలెను. (ప్రాణము పోవునది అనుమాన మున్నపుడుకూడ చేయవచ్చును.

అన్యథా తు సిరాన్నాయుచ్ఛేదనం అతిమాత్రం వేదనా
చిరాద్రవణ సంరోహో మాంసకర్ష ప్రాదుర్భావశ్చేతి॥

అట్లుచేయక అడ్డము చేసినయెడల నీలు, స్నాయువులుతెగి విపరీతమైన బాధ కలుగును. గాయములు సరిగా మానక గుర్మింపము, కంటులు బెరుగును.

శత్రు చికిత్సలలో కలుగు ప్రమాదములు

హీనాతిరిక్తం తిర్యక్ చ గాత్రచ్ఛేదన మాత్మనః
ఏతాశ్చతస్రోష్ఠవిధే కర్మణి వ్యాపదః స్మృతాః॥

శత్రుచికిత్స తక్కువగాగాని, ఎక్కువగాగాని, అడ్డసిద్ధులుగాగాని జరుగుట, వైద్యుని శరీరముతెగుట ఇట్టివి ప్రమాదములని గ్రహించవలెను.

అజ్ఞానలోభాహిత వాక్యయోగ భయప్రమోహైర వైశ్చవిభావైః
యథాప్రయుష్ఠిత బిషక్ కుశత్రుం తథా సశేషాన్ కురు తేవికారాన్॥

శత్రుతో సంపత్తి వేసివారా కాయలతో కానుకలు వేసివారా?

తెలియకపోతే, దబ్బయ్యగారు తీరి, తదితరులు తమకూర్చి నిందావాక్యములు పలుకుట, భయము, తబ్బిబ్బు, ఇతర ఉద్దేశ్యములు, వైద్యుడు వీటిని విడిచి కలిగియుండి శత్రుచికిత్స కొంతవరకే చేసినట్లుపంటి రోగికి తదితర వ్యాధులుకూడ సంప్రాప్తమగును.

గాయపుసంధి తదితర నష్టములు కలుగుట

సురేంద్ర గోవప్రతిమం ప్రభూతం రక్తం ప్రవేద్యైశ్చ తతశ్చ వాయుః
కరోతి రోగాన్ వివిధాన్ యథోక్తాంశ్చిన్నాన్నానభిన్నాన్వధవాసిరాను॥

ప్రత్యేకముగా పీరలు తెగియెడల ఆ గాయమునుండి ఆర్తపురుగుతో సమానమగు కాంతిగల రక్త మెక్కువగా కాయచుండును. అట్లు తెగుటవలన వాతము ప్రగ్గపించి శిరోరోగములు కలిగిండును.

కొబ్బరి శరీరావయవావసాదః క్రియాస్వశక్తి స్తుములా రుజశ్చ
చిరాద్వ్యగో రోహతి యస్యచాపితం స్నాయువిధంమనుజంవ్యవసేతే॥

స్నాయువులు తెగియెడల పంటితోడుముగిలిగి అవయవములు పనిచేయజాలవు. పనులు చేయుటయందు శక్తికూడ తగ్గును. బాధ ఎక్కువగానుండి చాలాకాలమునకు గాని గాయము మానజాలదు.

శోషాతి వృద్ధి స్తు ములా రుజశ్చ బలక్షయః పర్వసుఖేదశోషో
క్షుతేషు సంధివ్య చలాచలేషు స్నాతసికర్మోపరతిశ్చ లిజ్జమ్॥

కదలుపవి, కదలకుండునట్టి సంధులు తెగిచో వాపు తీవ్రముగా నుండి ఎక్కువ బాధ కలుగును. బలము క్షీణించును. కలుపులు పగులును. వాచును. సంధులు పనిచేయలేక పోవును.

ఘోరా రుజోయస్య నిశాదినేషు సర్వాస్వవస్థాను న శాన్తిరస్తి
తృష్ణాజ్గసాదౌ శ్వయధుశ్చరుక్షః తమస్థి విధ మనుజం వ్యవసేతే॥

అనులు తెగియెడల రాత్రింబవళ్ళు విడువకుండా విపరీతమైన బాధలు కలుగుట, కాంతిలేకుండుట, దానము, అవయవములు కృశించుట, పోటు, వాపు గలుగును.

శత్రుచికిత్సచేయు వైద్యుని లక్షణములు

శౌర్య మాశుక్రియా శత్రుతైక్ష్య మస్వేదవేపధు
అసమ్మోహశ్చ వైద్యస్య శత్రుకర్మణి శస్యతే॥

ధియనులేతుండుట, శత్రువికిత్స యగుట జేయుట, పశుమగల శత్రుపరిముట్లను గలిగియుండుట, చెనుట, పలుకుట, సమ్మాహము లేకుండుట, శత్రువికిత్స చేయు వైద్యుని అక్షణములైయున్నవి.

శల్యాకృతి విశేషాంశ్చ సానాన్యవేక్ష్య బుద్ధిమాన్
తథాయస్త్ర పృథక్త్వం చ సమ్యక్ శల్యమధాకరేత్॥

తెలిసిన వైద్యుడు శల్యముల రూపములను, సాసభాగములను, వాటికి పనికి వచ్చు శస్త్రపనిముట్లను చక్కగా తెలిసికొని శల్యములను దీయవలయును.

కర్ణన్తి తు శల్యాని దుఃఖోహార్యాణి యాని చ
అదధీతభిషక్తస్మాత్తాని యుక్త్యా సమాహితః॥

కర్ణములుగలవిగాని, ఎక్కువ కన్నులతో తీయదగినవిగా నుండు శల్యములను దీయుటలో చాలా జాగ్రత్తతో ఆలోచించి, యూహతో, యుక్తితో, నిపుణతతో వైద్యుడు తీయవలెను.

శోధపాకౌ రుజశ్శ్రోగ్రాః కుర్యాచ్ఛల్యమన్నితమ్
వైకల్యం మరణం చాపి తస్యాద్యత్నా ద్వి నిర్హరేత్॥

శల్యములను తీయనియెడల అచ్చటచావు, పాకము, తీవ్రమగుబాధ, అంగవైకల్యము, మరణముకూడ కలుగును. కాబట్టి సాధించి శల్యములను తీయవలెను.

తదేవయక్తస్త్వతిమర్మ సస్థీన్ హింసాత్పిరాః స్నాయుమధాస్తి చైవ
మూర్ఖప్రయుక్తం పురుషం క్షణేన ప్రాగ్గరియుష్మదధవా కథంభితే॥

మూర్ఖువైద్యుడు శత్రువికిత్స ఎక్కువగా చేసినయెడల మర్మములు, అవయవ సంధులు, నీరేలు, స్నాయువులు, ఆయుని నీటిని పాడుజేసి బాధ పెట్టుటయే గాకుండు లోగి ప్రాణమునుకూడ తీయును. లేదా అట్టి లోగిచాలా కష్టముతో బ్రతుకును.

గాయములను కుట్టుట

తతోన్వణం సమున్నమ్య సాపయిత్వా యథాస్థితమ్
సీవ్యేత్ నూక్షేణ సూత్రాణ వల్గే నాశ్యస్త కన్యవా॥

శల్యమును పరీక్షించి తీసిన తరువాత గాయమును పైకెత్తి సరియగు స్థితిలో నుంచి నూక్షుమగు దారముతోగాని, నేపకొంచినము, జనము, అవియున్నది కాని అచేగాని

శరణక్షామనూతాభ్యాం స్నాయ్యా వావేన వాపునః
ముర్వా గుడుచీ తానైర్వా సీవ్యే ద్వేలితకం శనైః॥

స్నాయువుల చేతిగాని, వెండ్రుకలతోగాని, సాగవార తిప్పతీగవారలతోగాని
వట్టవలయును.

సీవ్యేద్గోఘణకాం వాసి సీవ్యేద్వా తున్న సేవనీమ్
ఋజుగ్రస్థిమథో వాసి యథాయోగమథాపి వా॥

పట్టుటలో బుడలు అల్లిపట్టుగాగాని, పైకి క్రిందప కట్టు దింపుపట్టుగాగాని, చిరిగి
గుడ్డను చేతిగాండ్రు పట్టిపట్టుగాగాని, తిన్నెముడి కలుగుపట్టుగాగాని, ఏదీతిగా వట్టి
తాగుడునో ఆదీతిగా చేయవలయును.

కుటునూదుల పరిమాణము

దేశేల్పమాంసే సస్థౌ చ సూచీవృత్తాబ్జులద్యయమ్
అయతా త్ర్యణ్ణలా త్ర్యసా మాంసలే వాసి పూజితాః ॥

స్వల్ప మాంసముగల ప్రదేశము, సాధుఁల వీటియందు వట్టుపట్టి నూది గుండ్ర
ముగానుండి లెండగురముల పొడవుండవలెను. మాడగురముల పొడవుండి మక్కి
ణముగానుండు సూదిని ఎత్తువ మాంసముగల ప్రదేశమునందు వట్టుటకు పనికివచ్చును.

ధనుర్వకౌ హితా మర్మఫల కోశోదరోపరి
ఇత్యేతాస్త్రివిధాః సూచీస్తేక్షాగ్రా సు సమహితాః ॥

మృస్థానములు, అండకోశములు, కడుపు వీని పైభాగములందు వట్టుటకు
విలువలే ఎక్కియుండు సూదుల నుపయోగించవలెను. ఈ మాదురకముల సూదుల
యొక్క కొనలు పదునుగలవిగ, పట్టుకొనుటకు వీలుగ నుండునట్లుకు,

కారయేన్మూలతీ పుష్పవన్తాగ్రపరి మణ్డలాః
నాతిదూరే నికృష్టే వా సూచీం కర్మణి సాతయేత్
దూరాద్రుజోవ్రతౌష్ఠస్య సన్నికృష్టే వలుఞ్చనమ్ ॥

మూలతీ పుష్పముల తొడిమ కొనలవలె గుండ్రముగా తయారుచేయించవలెను.
గాయములను వట్టునపుడు సూదులను మిక్కిలి దూరముగాగాని, సమీపముగాగాని
గ్రచ్చరాదు. గాయమునకు దూరముగా వట్టినయెడల యెక్కువ బాధ గలుగును.
మిక్కిలి దూరముగా వట్టినచో వట్టు లెనిపోవును.

పుట్టమన్న శస్త్రే భూమిపండును.

కట్టుకట్టుట

తత్రస్థునాం కవిలికాం దత్వా వామహస్త పరిక్షేప మృజు
మనవిధము సంకుచితం మృదుపట్టం నివేశ్య బద్ధియాత్
న చప్రణసోపరి కుర్యాద్దృఢి మా బాధకరం చ॥

గాయముపై దళివరియగు కవలికనుకేసి తిన్ననిదిగ విడిపోవడ మగుతలు
లేకుండా, మృదువుగనుండు పట్టు ఎడమచేతితో పరిగామచి సుఖముగా నుగుపట్టు
కట్టు కట్టవలెను. కొలి గాయముమీదప వచ్చుపట్టు చేయరాదు.

అబధ్యమానోదంశ మశక తృణ శాస్తోపల పాంశు శీత
వాతాతప పృథ్విభిర్విశేషై రభివాన్యతే ప్రణో వివిధవేధనో
పద్రుతశ్చ మప్తతాముపైత్యా లేపనా దీనిచాన్య విశోషమువయాన్తి

గాయమును బంధించక పోయినమొదల నోటిగలు, దోనులు, చిన్నచిన్న తుల్లలు,
రాకు, గుమ్మ, చలి, గాలి, ఎండ, మున్నగునవి గాయముమీద పడుటవలన పలువిధ
బాధతోగూడి నుష్టత్వము నొందును. కట్టలేని గాయములోని లేపములు త్వరలో ఆరి
పోవును.

కట్ట భేదములు

పీడయ న్నరుజో గాఢః సోచ్ఛాప్యసః శిథిలః స్పృహః
నైవ గాఢో న శిథిలః సమో బధః ప్రకీర్తితః॥

గాయమునకు గట్టిగ కట్టుకట్టుటవలన మృదువునను బాధపెట్టనిదిగా నుండు
చానికి గాఢ బంధనమందురు. పదులుగానుండి గాలిపోవుటవ నీలుగానుండు చానికి
శిథిల బంధనమందురు. ఎక్కువ బిగువుగ ఎక్కువ పదులుగ నుండక సమానముగానుండు
చానికి సమబంధన మందురు.

తత్రస్థి కుక్షి కక్షా వజ్జు బోరు ధిః సుగాఢః
శాభా వదన కర్ణ కణ్ఠ మేఢ ముష్క పృష్ఠ పా
రోన్వీద రోరఃసునమ. అక్ష్యోః సద్ధిః చ శిథిల ఇతి॥

కటిప్రదేశము, కడుపు, చెంక, గిజ్జలు, తొడలు, కిరన్న భాగములందు గాఢ
బంధనమును కొమ్మసేమలు మిథిము, చెవులు కంటము కిన్నము వృషాములు, పీఠ పార్శ్వ
ములు, ఉదరము, వక్షస్థలములందు సమబంధనమును శేత్రములు సంధించు శిల
బంధనమును శుపయోగించవలయును.

చూరితం మధితం భగ్నం విశ్లేష్ట మతిపాతితమ్

అస్థిస్నాయు సిరాచ్ఛన్న మాశుబధ్ధేన రోహతి॥

మక్కలుగా జేయబడినదియు, చిలుకబడినదియు, విరిగినదియు, శంధులనుండి యూడినదియు, స్వస్థానము విడచి జారివేలాడునదియు, అనులు, స్నాయువులు, సిరలు మున్నగునవి విరుగుటవలన కలిగినదియు నగు గాయములు కట్టుకట్టుటవలన త్వరగా మానును.

న్యబుద్ధ్యా చాపి విభజేత్కృత్యా కృత్యాంశ్చ బుద్ధిమాన్

దేశం దోషం చ విజ్ఞాయ వ్రణం చ వ్రణ కోవిదః

బుతూంశ్చ పరిసంఖ్యాయ తతో బన్ధాన్ని వేశయేత్॥

తెలివిగల వైద్యుడు సాధ్యాసాధ్యములు కలిపెట్టి గాయములను స్వబుద్ధితో పరికిరించి కట్టుకట్టవలెను. గాయములవిషయమై ఎగుగా తెలిసినవైద్యుడు ఆయా భాగములను, వాతాది, దోషములను ఆయాబుట్టువులను తెలిసికొనిన తరువాత కట్టు కట్టుట ప్రాసంగింపవలెను.

“ సుశ్రుత సంహిత ”

శల్యతంత్ర లక్షణములు

తత్రశల్యం నామవివిధత్యై కాష్ట పాషాణ పాంశు లోహ

లోహాస్థి బాలనఖ పూయూప్రసవ దుష్టవ్రణాన్తర్గభశలోద్ధరణార్థం

యస్త్రశస్త్రక్షౌరాగ్ని వ్రణాధాన వ్రణవినిశ్చయార్థంచ॥

పలువిధములగు త్వణములు, కట్టలు, రాళ్ళు, ఘాతీ, ఇనుపమేకులు, మట్టి గడ్డలు, ఎముకలు, గోళ్ళు, చీము, మున్నగువాటిని వ్రణమునుండి తీయుటయు, గర్భ మునడి శల్యమును బయటకు తీయుటయు, యుక్తి, శస్త్ర, క్షౌ, అగ్నిల నుపయోగించుటయు, వ్రణముల నిర్ధారణజేయుటయు వ్రణములనుగా నునుదానికి శల్యశిక్షిత లక్షణ మందురు.

యస్మింస్తోదాదయో దేశేను స్తతాగురుతాపి చ

ఘట్ట తే బహుశోయత్ర సూయ తేషుద్య తేపిచ॥

శరీరభాగమునందు ఏ అవయవములో నోటు. స్పర్శ తెలియకుండుట, భారముగా నుండుట, మాటిమాటికి కదిలిండుట, స్రవించుట, నోటు మెక్కువగా నుండుట, లక్షణములన్న అచ్చటచ్చట శల్యములున్నవి తెలిసికొనవలెను.

అయితే ఆరిక లేకపోతే కర్చి.

అస్యాత్మకం భజ్యతే తు శల్యమస్తశ్చశీర్యతే
ప్రాచ్యో నిర్భుజ్యతౌ శారమాయసం చేతి నిశ్చయః ।

ఎముక సంబంధముగ వస్తువులు శరీరములో నున్నచో వెలుపలికి తీయునపుడు రెండు మూడు ముక్కలై విడిగిపోవును. ఇంకను అది లోపలనే జీర్ణించును. కొమ్ము, ఇనుము సంబంధముగ శల్యములున్నచో జీర్ణించక వంకరతిరిగి యుండును. బంగారము, వెండి, తగరము, ఇత్తడి, సీసము మున్నగునవి తీవ్రవేయక శరీరములోనున్నయెడల పితౄగ్నులచే కరిగిపోవును.

వార్ష్యే వైణవతార్ణాని నిర్వీర్యస్తేతు నోయది
పచస్తే రక్తం మాంసం చ క్షీప్రమేతాని దేహీనామ్॥

కర్ర. వెదురు, క్రూములు, మున్నగునవి శరీరములోనుండి తీయచో అవి త్వరలోనే రక్తమును, మాంసమును పచింపజేసి నాటకలటవియే సడిపోవును.

ఎముకలు విరుగుట, తొలగుటలో బాధలు

ప్రసరణా కుంచనవర్తనోగ్రా రుక్స్వర్శవిద్యేషణమేతదుక్తం
సామాన్యతస్సంధీగతస్య లింగముత్పిష్ట సందేశ్యయధుస్సమాం
తాత్ విశేషతోరాత్రిభవారుజాచ విశిష్టకేతో చ రుజాచ నిత్యమ్॥

చాచుట, ముడుచుట, త్రిప్పట, కలిగివుండు తీవ్రమైనబాధ, తాకినయెడల సంపించరాని బాధమాత్రము సంధి విగతపుడు సామాన్యలక్షణములుగా నుండును. సంధియందుండు రెండు ఎముకలు కలిగివుండు సామాన్య లక్షణములే గాక సంధియందగుటను శోషకలిగియుండును. రాత్రులయందు మృదువగా బాధయుండును. సంధియంత వాపుండును. మరియు ఎల్లప్పుడు తీవ్రమైన బాధకూడ నుండును.

వివర్తితే పార్శ్వరుజశ్చ తీవ్రాస్తిర్యగ్రతే తీవ్రగుజోభవంతి
క్షీప్రేతిశూలం విషమం రుజశ్చక్షిప్తే త్వధోరుగ్విఘటశ్చసంధేః॥

సంధిఎముకలు మెలికలు తిరిగివుండు సంధియందలి రెండుఎముకలయొక్క ప్రక్కభాగములందు తీవ్రమైన బాధకలిగియుండును. ఎముకతో నెముక అంటుకొని యుండక అడ్డముగ పొడుచుకొని వచ్చుట కలిగివుండు తీవ్రమైనబాటు కలిగియుండును. ఇవి ఒక్కొక్కప్పుడుండును. మరొకప్పుడుండును. సంధియందలి రెండవలలో ఒక ఎముకక్రిందికి మరియొక ఎముకపైకి కలిగివుండు బాధయు, సంధియొక్క రాపిడియు నెక్కువగా నుండును.

పైరుపెట్టక చెడిపోవుటకంటె పైరు పెట్టి చెడిపోవుట మేలు.

ఎముకలు విరుగుట

భగ్నం తు కాండే బహుభావయాతి విశేషతో నామభిరేవతుల్యం
కాండే త్వతః కర్మటకాశ్వకర్ణ విచూర్ణితం పిచ్చితమస్థిచల్లితం ||

ఎముకలు విరుగుటలో అనేకీతములుగా నుండును. పండ్రెండు రకములుగా విరుగునని తెలియుచున్నది. అజీయొక్క చివరభాగములు నలిగి మధ్యయందు నలిగి యెత్తుగ నున్నయెడల భగ్నమని (విరిగినది) తెలిసికొనవలయును. ఎముకలు చిల్లి గుట్టపునెవివలె పొడుకుకొని వచ్చినపుడు, ఎముక చూర్ణముగా నలిగినపుడు ద్వనివలనను, తాపవలనను విరిగినట్లు తెలిసికొనవచ్చును.

కాండేషు భగ్నంహ్యతిపాతితం చ మజ్జాగతం విస్ఫుటితం చ వక్రం
ఛిన్నం ద్విధా ద్వాదశధాపి కాండేసామాన్యమగ్రే కిలతస్యలింగమ్ ||

అస్థి ముక్కలు నలిగి విడిగా నుండును. కీచులును వాపు హెచ్చుగానుండును. ఎముకయొక్క ఒక ప్రక్క భాగము నలిగి పేనులేని బైంప వచ్చునపుడు స్రావముండును. మధ్యకు విరిగి ప్రత్యేకముగా నుండునానికి కాండభగ్నముగాను. దీనిని కదల్చినయెడల విరిగిన భాగము ప్రేలాడుదురును. పూర్తిగా విరిగిన ఎముకకు ఆతొనెమరియు, విరిగిన ముక్క అస్థిమధ్యమందు మజ్జాగోమూరి మజ్జను పైకిత్రోయుటచేత దీనిని మజ్జాగతమనియు, చిల్లిపోయిన ఎముకకు విస్ఫుటితమనియు, తన స్థితిని వదిలి వంగిన ఎముకకు వక్రమనియు, నామములు గలవు. భిన్నము నుండువిధములు. అందు నొకటి పగిలి అటులనే ఆకుకొని యుండుట, మరొకటి పగిలి రెండుగ నుండుట. అవి పండ్రెండు విధములు.

విరిగిన భాగపు సామాన్యలక్షణములు

సస్తాంగతా శోధరుజాతివృద్ధిస్తథా వృణావృద్ధిరతీవనిత్యం
సంపీడ్యమానే భవతిహశబ్దః స్పర్శానహం స్పందనతోడశూలః
సర్వాస్వవస్థాసు న శక్మలాభో భగ్నస్యాకాండే భయ చిహ్న మేతత్ ||

అమయములు శిశువులు, వాపు పోటు హెచ్చుట, బాధ ఎల్లప్పుడు ఎక్కువగా నుండుట, నొక్కినయెడల ధ్వని కలుగుట, స్పర్శకు నహించలేకపోవుట, అవయవములు అదరుట, నరుగుట, పోటు, పరున్నను, లేచినను నుభయలేకపోవుట, యీ లక్షణములు కాండభగ్నమునకు (ఎముకలు విరిగినచో) లక్షణములని గ్రహించవలెను.

పుచ్చిన చిత్తనాలు చచ్చినా మెలవవు.

భిన్నం కపాలం కట్టాం తు సంధీముక్తం తథాచ్యుతం
భ్రమనం ప్రతిపిప్త్వం చ వర్జయేత్తు చికిత్సకః॥

మోకాలు, సిరుదులు, అంశులకిము, గండములు, తాలువులు, శంఖములు, గజలు, కిన్నె పీటియందుండు కపాలాసులు విరిగినను, కంటియందు అసిజారినను, తోలగినను లేక పిరుదులయందలి కపాలాస్థివిరిగినను చికిత్సించక వదలిపెట్టవలెను.

అనంశ్లేష్టకపాలం చ లలాటే చూర్ణితం చ తత్
భగ్నంస్తనే గుదే వృష్టే శంఖే మూర్ధని వర్జయేత్॥

కపాలము విరిగి కలియనవుడు, అలాటభాగము చూర్ణముగా నెరిగినపుడు, స్తనము లకు శుభ్యభాగము, గుదము, వెన్నుశంఖములు, కిన్నె వైభాగములందున విరిగినయెడల విడిచిపెట్టవలెను.

సమ్యక్సంహితమప్సస్థి దుర్భాషాద్దుష్టబంధనాత్
సంక్షోభాద్వాపియద్గచ్ఛే త్విక్రియాం తచ్చ వర్జయేత్॥

విరిగిన సముకనుబాగుగ కలిపి కట్టబడనపుటికి నరియగు సాశములో నుంచక పోవుటవలనను, స్వస్థానమునందు బాగుగానుంచినను ఎరిగి బాధించక పోవుటవలనను, బంధముకదలి పోవుటవలన ఎముక వికృతిబొందును కాబట్టి అట్టివి చికిత్సించరాదు.

తరుణాస్థీని సమ్యంతే భిద్యంతే నలకాని తు
కపాలాని విభజ్యంతే స్ఫుటంతి రుచికానిచ॥

ముక్కు చెవులు కన్నలు గుదముగలందు లేకఎముకలు విరిగినపుడు వరిగిపోవును. కాళ్ళు మెదలగు వాటి యందుండునవి, రిగ్రథములు గలిగి గొట్టమువలె నుండునవి విరిగి పోవును. మోకాలు, సిరుదులు, అంశము, తాలు, శంఖ, కిన్నెకలందుండునవి చికిత్స పోవును. వలయానులు, ప్రక్కభాగములందు, పృష్ఠమందు, పక్షిసలమందు, ఉదరమందు, పాయువు పందు, పాదమునందుండునవికూడ చికిత్సపోవును.

ఆదౌభగ్నం విదిత్వాతు సే చయే చ్ఛీతలంబునా
పంకేనా లేపనం కార్యం బంధనం చ కుశాన్వితమ్॥

విరిగిన వెంటనే ఆభాగమును చల్లని నీటితో తడుపవలెను. తరువాత బూద, జగురు వగైరాలను గుడ్డనుపట్టింది నునుపుగానుండు బద్దలతో కట్టు కట్టవలెను.

అవనామితమున్న హ్యేదున్నతం చావవీడయేత్
ఆంచేదధః క్షిప్తమథోగతం చోపరినర్తయేత్॥

ఎదు ఎండల విత్తనములు ఎంతవగడైనను చూపు.

విరిగినభాగములు క్రిందికి పంగిసయెడల పైకెత్తియు, పైకియెక్కిన వాటిని క్రిందికి లాగి పరిశీలించు, క్రిందికిగారి పైకిత్రోసియు, వెనుకకు తిరిగినచో సరిగా పాటునకు త్రిప్పువలెను.

మధుకోదుంబరాశ్వత్థ కదింబ నిచులత్వ చః
వంశసర్జానానాం చ బందార్థ ముపనంహశేత్
పటస్యపరిబధ్నీ యాన్నగాఢం శిధిలం న చ॥

తరువార ఇసు, మేడి, కడిమి, ప్రబ్బలి, వెగురు, సర్జపుట, మద్ది, పీటిపట్టలతో బాగుగా పై భాగముననే గుడ్డకట్టినట్లు చుట్టి అంత బిగువున, అంత వరులుగ గాఢంబ సాధారణముగ మెత్తని త్రాడు మొదలగువానిచే కట్టవలెను.

ప్రథమే వయసిత్వేవం మాసాత్యంధి స్థిరో భవన్
మధ్యమే ద్విగుణాత్కాలాంతిమే తిక్తగుణాత్తథా॥

మొదటివయస్సున విరిగిన ఒక నెలలో ఎముకలు కలసిపోవును. మధ్యవయసు నందు రెండు నెలలలోను, అంతిమవయసులో మూడు నెలలలోను ఎముకలు కట్టుకొనును.

భగ్నసంధి మనావిద్యమహీ నాంగమనుల్బణం
సుఖచేష్టా ప్రచారం చ సమ్యక్సంధి తమాదిశేత్ ॥

ఎముక కట్టుకొనినయెడల పైకి పాడురునున్నట్లుగాక అవయవము చిన్నదిగాక, పెద్దదిగాక చాచుట, ముడుపుట, కదల్పుట, మొదలగు వాటియందు సాధారణ యుండినచో సరిగా ఎముక కట్టుకొనినదని తెలిసికొనవలెను.

“మమ్రత సహిత”

గాయములు (Wounds)

పశువులను మందలుతుండలుగా నుంచునపుడు వానిలోనవి కలహించి కొమ్ములతో పాడురుకొనునపుడును, పనిచేయునపుడును పశువుల పాదములకు గాని, తదితర భాగములకు గాని దెబ్బలు తగులునపుడును, గోతులలోనికి వంతెనలవలననుండి కాలువలలోనికి ఆకస్మికముగా పడినపుడును, రోడ్లవలన నడచుటవలనను, రైళ్ళవలనను, మోటారులవలనను, తదితర ప్రమాదములవలనను గాయములు (Wounds) ఏర్పడుచుండును.

ఎన్ని ఎండలు పెట్టిన అన్ని వగవులు ఆగును.

గాయములలోని రక్తములు

పోటుగాయములు:—కత్తి, ముండు మొదలగు గజుగుగానుండు పనిముట్లతో పశువులను పొడకుటవలన ఈ గాయము లేర్పడును.

శత్రుగాయములు:—మిక్కిలి పగులుగల శిఖాకత్తితోగాని, తనితర వదులు గల ఆయుధములతోగాని చెదరదీయక చీల్చుట (గీచుట, నోచుట) వలన ఈ గాయము లేర్పడును.

వేటుగాయములు:—బుర్రులు లగల కట్టతో కొట్టుటవలనను, పెద్దవులి మొదలగు ఘోరజంతువులు గోళ్లతో రద్దింపుట (ద్రుచ్చుట, కొరుకుట) వలనను ఈ గాయము లేర్పడును.

నలుగుడు గాయములు:—పశువులు లోటుగల గోతులలో అరిస్పిక్తముగా పడుట, గుముడుట, రైల్లక్రింద, మోటారుకొనులక్రింద పడుటవలన చర్మము క్రింది భాగములు నలుగునట్లు దబ్బులు చెరుగుటవలన ఈ గాయము లేర్పడును.

కుంటుగాయములు:—కుప్పాకి, సిస్టోలు మున్నగు ఆయుధములలో గుండుననీ పశువులను కొట్టుటచే ఈ గాయము లేర్పడును.

గాయములనుండి రక్తమును పోనీయరాదు

గాయము తగిలిన వెంటనే రక్తమును పోరునుండ పుష్కలముగా వైద్యుడుగాని, పశువు యజమానిగాని చూచుచుండవలెను ఈ గాయమునకు వెంటనే తగు చికిత్స ఆలస్యములేకుండ చేయవలెను. ఇటువంటి చికిత్సలు నేర్చుకొనుటకు రైతు ఆకురత పడుటత్యవసరము. రైతుగాని, వైద్యుడుగాని అట్టి చికిత్సచేయుక ఆలస్యము చేసినచో రక్తమంతయు ప్రవించి గాయముతగిలిన పశువునకు ప్రాణాపాయముగూడ కలుగును.

రక్తనాళములు (Arteries)

పశువు దేహమునందు శుద్ధ రక్తనాళములు, మలిసరక్తనాళములు, నూక్కు రక్తనాళములు మున్నగునవి యుండును. వీటికి ప్రమాదము పడినపుడు రక్తము ప్రవించును. రక్తముయొక్క రంగును, అది ప్రవించు విధమునుచూచి, అది యెక్కడ నుండి కాగు రక్తమో తెలిసికొనవచ్చును. రక్త మెక్కడగా పోవుచున్నయెడల బల హీనత, ధనుర్వాతము కలిగి మరణము సంభవిండును. గాయములలో రక్తము పేరుకొని గడ్డకట్టును. నెత్తురుకారకుండ అవుటకు ప్రకృతినిద్రమైన ఉపాదములలోనిది యొకటి. కనుక అట్లు పేరుకొనియుండు రక్తమును ఏకాగ్రముచేర్చినై కడుపరాదు.

ఆదునో పదునో అన్నాదు.

శుద్ధ రక్తనాళములనుండి రక్తము కారుట

(Arterial Bleeding)

ఈ రక్తనాళములనుండి స్రవించురక్తము కాంతిగలిగి ఎరుఘ్రరంగుగా నుండును. లోపల నాడులు కొట్టుకొనుటవలన రక్తము కొంచె మురపడిగా పచ్చుచుండును. ఇట్లు పశువు రక్తనాళములనుండి రక్తము కారుచున్నట్లు తెలిసికొనవలసినవారితో వెంటనే చికిత్స చేయుటకు ప్రారంభించవలెను. ఈ నాళములు (ధమనలు) పశువు దేహమునందంతట నుండును. కనుక వాటిసలమలనుబట్టి చికిత్సలు ప్రత్యేకముగానుండును. శవముల కపాయము గలిగినపుడు యెడల రక్తము నాపుజేయుటకు బొటనరీతితో (Digital Pressure) నొక్కవలెను. ధమనలను ఎక్కడ నొక్కిన రక్త మూగునో తెలిసికొనవలెను. ముఖ్యముగా ఈ రక్తనాళములు పశువుదేహములో ఎట్లు వ్యాపించి యున్ననో తెలిసికొనుట అత్యవసరము.

రక్తము ప్రవహించు భాగములను పరీక్షించుటకుముందు వైద్యుడు చేతులను శుభ్రముగా నుండునట్లు చూచుకొవలెను. ఎముకలు విరిగినప్పుడు, పేళ్లు గాఢముక్కులు గాయములలో నున్నప్పుడు మాత్రము పెద్దశుద్ధరక్తనాళమును పట్కాయలతో నొక్కవలెను. తల, నొసల, కంఠము, జెబ్బు, పొడుగు, తొడ, నాలుక, చెవి మున్నగు భాగములను జెబ్బులతోగలి, ఆకస్మికముగా రక్తము స్రవించునప్పుడు చాల బాగ్రతగా చికిత్సలు చేయవలెను. పైచెప్పిన భాగములను గాయములు తగిలినయెడల పైకియెత్తి యుంచుము. ఇట్లుచేసినయెడల, ఆ భాగమందలి రక్తము కొంతవరకు తగ్గును. రక్తము స్రవించు భాగమందు వ్రేల్లను మోపిగాని, తడిలేకుండ పరిశుభ్రముగానుండు వీడు, దూది, పొడిగుడ్డ మున్నగువని గాయముపైనుంచిగాని నొక్కవలెను. ఇట్లు చేయుటవలన రక్తముఆగును. అంతకు తగ్గనిచో గాయము ప్రమాదముగా నున్నదని గుండేహము తోచినయెడల మిశ్శిర్కా ఆయుర్వేద పశువైద్యచార్యునిగాని మీ తాలూకా వెటరినరీ డాక్టరునుగాని పిలిపించి చికిత్స చేయించుము.

మలినరక్తనాళములనుండి రక్తముకారుట

(Venous Bleeding)

గాయములనుండి రక్తము మలినముగా స్రవించుచున్న యెడల నిరలకు గాయము తగిలినదని తెలిసికొనవలెను. వీటిగుండ చెడుసెత్తురు తిన్నగా ప్రవహించుచుండును. ఈ రక్తనాళములు తెగినభాగములు వాపుదలకొని యుండును. వీటిని గట్టిగా బిగించి కట్టకట్టవలెను.

నెద అదును అయినప్పుడు వెలుగులోనయినా పోయవలెను.

నూక్మనాకులనుండి రక్తముకారుట

(Capillary Bleeding)

ఇవి పశుదేహమునం దంతటను వలయలికలవలె నుండును. ఇవి శేగుదలనొంది నప్పుడు రక్తము చిముర్చునుండును. వీటిని శేతిభాటనవ్రేలితో నొక్కిన ఆగిపోవును.

ముక్కునుండి రక్తముకారుట (Nasal Bleeding)

పశువుముక్కురంధ్రములనుండి ఆనేక కారణములవలన రక్తము స్రవించవచ్చును. అట్టి సమయములందు జాగ్రత్తగా పశువును పరీక్షించి వేడిజేయుటవలన వచ్చుచున్నదో లేక దెబ్బతిలి వచ్చుచున్నదో విచారించవలెను. తగుపరి చికిత్స చేయవలెను.

గాయములనుగూర్చి ముఖ్యవిషయములు

1 గాయములు తగిలినవెంటనే తగు చికిత్స చేయనిచో ఈశలవలన గాయము పెద్దదై చాలప్రమాదము కలిగించును.

2 గాయములందుండు ఇతరపదార్థములను ముఖ్యముగా తొలగించి శుభ్రము చేయవలెను.

3 ఈ శత్రువైద్యమును గ్రంథములో చెప్పిన లోషము, అంగి, ఆయుర్వేద, హానియోపరి చికిత్సలు చేయును.

4 శుద్ధజలముతో గాయములను కడిగి శుభ్రముచేయవలెను.

5 గాయములో బొగ్గుపొక్కుమునుగాని, ఆ పొక్కులో తడితర చూర్ణములుగాని కలిపి వాడినవెంటనే గారపట్టును.

6 గాయములు తగిలినప్పుడు పశువునకు విశ్రాంతి నీయవలెను. పరిపాటులు చేయవలెను.

7 గాయములు చిన్నవైనయెడల అనగా లోతులేనప్పుడు వాటిఅందులనుదగ్గరగా పట్టుకొనజాలిన బంకమంటి పదార్థములను గుడ్డప పట్టించి గాయమునిూడ వేయవలెను.

8 గాయము లోతుగా లేనియున్నప్పుడు ధనుర్వాతము రానుండ కాపాడవలెను.

పోటుగాయములు

పశువును కత్తితోగాని, తడితరపనిముట్టుతోగాని, చర్మమునందుగాని, కండరము లకుగాని, పొడుచుటచే ఆ భాగమంతయు ఆరంభములో రక్తమిళితమైయుండును. అట్టి సమయమునందు ఇదివరకు చెప్పినలోషముతో ప్రతిదివనము కడుగుదు, గాయములకు వేయు బొషణములు వేయుదు, కట్టు కట్టుచుండవలెను. లోతుగా లేనినయెడల అందులు

వట్టపలసినయెడల మీతాలూకా వెటరినరీ ఆస్పత్రికి తీసికొనిపోవుట మంచిది. లేక మీసీర్కా ఆ యుల్లేద పశువులడాక్టరును పిలిపించి చికిత్సచేయించుడు. గాయమువేసిన కత్తిత్రుప్పపడినదో లేక దాని ఆకారమెట్లున్నదో చూడవలెను. లేనిచో గాయమును మాన్పుట చాలకష్టము.

శత్రుగాయములు

ఈ గాయములు చాల ప్రమాదము గలిగించును. ఎందుచేతనన, చర్మమును కండరములను చీల్చుకొనిపోవలికి పోవుటవలన రక్తసాళములు తెగి పశువులకు ప్రాణాపాయము గలుగును. గాన ఈ గాయములు తగిలిన వెంటనే నిమ్ములేపడ చూడవలెను. లేనిచో ధనుర్వాతము పోకి చనిపోవును. కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూడము. బోతు గాయముగా నుండి విస్తరించి చిన్నపు కండలు ప్రేగుచున్నపుడు అందులను వట్టి ప్రతి దినము చికిత్స చేయవలెను. మీ తాలూకా పశువుల ఆస్పత్రికి తీసికొని వెళ్ళుట మంచిది. పశువును తీసికొనివెళ్ళుటకు పిలుచుకొనెడల ఈ గ్రంథములోని చికిత్సలు చేయుడు.

వేటి గాయములు

చేతికట్టలతో కొట్టినపుడు చర్మము పగిలి రక్తము కారును. ఇట్టి సమయము లందు, అంతగా ప్రమాదముండదు. వెన్నెత్తి నున్నగు జంతువులు కోదినప్పుడు బోతు గాయములైనయెడల చాల అపాయము కలుగును. గాన యిట్టి సమయములందు ఏ భాగముపైన కాటువేసినది, ఎంతవలె ఆఘాతము చేసినది వెంటనే కనుగొని చికిత్స చేయవలెను. అట్లు చేచునియెడల వాతముగ్రమ్మి చనిపోవును.

కుంటు గాయములు

ఇదివరకు చెప్పిన గాయములకంటె ఈ కుంటుగాయములు చాల ప్రమాదములు కలిగించును. ఎందుచేతనన, విషసూబంధమైన పుచ్చులు శరీరములో ప్రవేశించుటవలన ఆభాగమంతయు చెడిపోయి చచ్చుచు పుట్టును. కాబట్టి జాగ్రత్తగా పరిశీలించి చికిత్స చేయుట మంచిది.

కట్టుకట్టుట (Bandages)

పశువులకు అవశ్యమగునపుడు సమీపమున దొరకిన పస్త్రపుల నుపయోగము లోనికి తెచ్చి కట్టు గట్టవలయును. అట్టి సమయములందు గాయములకు గుడ్డపీలికలు, నూలుబట్ట పీలికలు, చేతిరుమాళ్లు, ప్లానలుగుడ్డపీలికలు, నారగుడ్డ పీలికలు మొదలగు నవి పనికివచ్చును. కట్టు కట్టుటలో పలురకములు గలవు. ఆయుల్లేద పశువులడాక్టరు కత్తెర, పట్కూరు, గుడ్డపీలికలు, లేవతర పనిముట్లు మున్నగునవి దగ్గర నుంచుకొన

కాలములో విత్తనాలు కలలోనైన పోయవలెను.

వలెను. వీనిని వాడుటకు ముందు పనిముట్లను శుభ్రముగా చేయవలెను. ఇంకను వీడు, దూది, చేతులు తుడుచుకొనుటకు ఒక తుండుగుడ్డ ఉండుటవసరము.

ముఖ్యముగా చేతులు కడుగుకొనవలెనని కట్టను విషయము. గాయములలో గాలి, దుమ్ము, పురుగులు మున్నగునవి దూరి బాధ కలిగింపవలెనని కట్టు గాయములను సంరక్షించును. గాయములనుండి రక్తము కారనప్పుడు దానిని నొక్కి అదిమిపట్టిన గాని రక్తప్రవాహ మాగదు. అట్టి సమయములో గాయము చుట్టును కట్టుగుడ్డను చుట్టి, గాయమును నొక్కి రక్తము నాపుజేయవచ్చును. కట్టు కండరముల (Muscles) కు శ్రమ నీయవలెనని నుండును. గాయముపై కట్టుకట్టి అంతటను వ్యాపించునట్లును, గాలి గాయములకు సోకవలెనట్లును సమావేశముగా కట్టవలయును. కట్టకు చలువగుడ్డగాని, కోరాగుడ్డనుగాని యుపయోగించుట మంచిది. ఆ గుడ్డను మందునీటిలో నానజేసి అరబెట్టి అంచులు చించవలయును. ఈ కట్టుగుడ్డలయొక్క పొడవు వెడల్పు గాయములకు తగినంతగా చింపి వాడుకొనవలయును. కట్టునుడతలు ముడతలు పడవలెనని చక్కగా కట్టవలెను. అపాయపు అవయవములకు కలిసినచో బడలుచేర్చి కట్టవలయును అందువలన అపాయపు అవయవములను కదలించును. అపాయములు సంభవించినప్పుడు అన్ని భాగములకు కట్టు కట్టుటకు నీలుండదు. కాబట్టి ఈ సాయముతో కట్టవలెను.

గాయముపైనున్న కట్టు అంటుకొని యున్నచో రావిచెక్క, తుమ్మచెక్క మున్నగు వగరు నేడినీటితోగాని, తిదితరి లోషన్నుతోగాని తడిసి, నెమ్మదిగాతీసి దూరముగా పారవేయవలెను. లేనిచో పశువు ఆ రసిగిడ్డలను తినును. తరువాత చీము, నెత్తురు రసియున్నయెడల హైడ్రాజీ సల్ఫైడ్స్ తో శుభ్రముచేసి తరువాత మందు వేయవలెను. దుర్వాంశము పెరిగినయెడల మైతతుప్త్ర ముక్కలతో ఆ దుర్వాంశమంతయు పోవువరకు తాకువలెననియును. ముఖ్యముగా గాయములకు గాలి నెంతమాత్రము సోకవలెననియు. ఎంత చిన్న గాయమైనను నిర్లక్ష్యముచేసినచో ధనుర్వాతము (Tetanus) సోకి పశువును బాధపెట్టును.

కుట్టువేయుట (Sutures)

శత్రుగాయములు, పోటుగాయములు, వంటుగాయములు తగిలి ప్రమాదములు కలిగినపుడు అంచులనుచేర్చి కట్టు వేయవలసియుండును. ఇట్టి సమయములందు గాయమును తుపయోగించు లోషన్ను, పనిముట్లు దగ్గర నుంచుకొనవలెను. ఏ భాగముయొక్క అవయవముమీద గాయముపడినదో, అది లోతుగా నున్నదో, ముక్కముక్కలుగా చీలినదో, రక్తనాళములకు ప్రమాదమేమైన కలిగినదో, ధనుర్వాతము వచ్చుటకు నూచనలేమైన నున్నదో, ఏయే గాయమునకు ఏయే నూదితో కట్టిన సరిపోవుచో మున్నగు విషయములన్నియు పరిశీలించి తరువరి కట్టవలెను. గాయము చాల వెడల్పుగ,

లోతుగ, పొడుతుగనుండినయెడల మాదినిగాని పీకుగాని లోపలదూర్చి అంకులకు వట్టవలెను. వట్టు దారములకు నరములు, నీల్కుదారములు, గట్టి నూలుదారములు ఉపయోగించవలెను. లేనిచో తెగిపోవును. దారములు, శస్త్రపనిముటు కావలసిన ఇంగ్లీషు మందుల ఊపులలో దొరకను. వట్టువట్టుపలసినపుడు వెటరినరీ హాట్టెలకుగాని, ఆయుర్వేద పశువైద్యాచార్యులకుగాని చూపించుట మంచిది.

నలుగుడుగాయములు (Bruises)

ఈ గాయములు కలిగినపుడు చర్మము పైభాగమునకు భంగము కలుగును. కాని లోపలనుండు రక్తనాళములు చికిరి బాగుగా నలిగిన ప్రదేశము నల్లబడును. రెండు మూడు దినము లైనతరువాత వట్టునుండు చర్మము పసుపురంగుగాగాని, ఎరుపురంగుగాగాని, నలుపురంగుగాగాని మారును. నలిగిన చోటనుండు రక్తము అటునిటూ చెదరును. అందువలన వాడుటయు, నల్లబడుటయు తటస్థించును. ఆవయవములు ఎక్కువగా నలిగినయెడల ఆయా భాగములను వేడినీటిలో గుడ్డముంచి పిడిచి కాదుటమంచిది. దెబ్బలుతిరిగిన గాయములును, శస్త్రచికిత్సచేసిన గాయములును కొంతకాలమువరకు మానవు. ఈ గాయములు కొంచెముగనో, గొప్పగనో వాపుకలిగి యుండును. ఈ వాపులకు వేడినీటికాపులు తీయవలెను. లేదా అవి సెంజెలపిండియైన కట్టవలెను.

గాయములకు చికిత్స

సామాన్యముగా అన్ని గాయములకు గట్టిగా కట్టుకట్టినయెడల రక్తము ప్రవించుట ఆగును. గాయములపద్ధి వెండ్రుకలు కత్తిరించినయెడల త్వరగామానును. గాయములకు వెంటనే చికిత్సచేయనియెడల ఈగలు మొదలగునవి వ్రాలును. అందువలన ఈసేపట్టును. ఈ యీపి వెంటనే పురుగులగును. గాయములందు పురుగులుపడినచో అచ్చటిమాంసము నవి తినటచే గాయములు త్వరగామానును. కాబట్టి పురుగులుపడినయెడల పట్కూరుతోగాని, క్రావణముతోగాని తీసివేయవలెను. లేక చేతిమాపుడువ్రేలును గాయములోపలకు పోనిచ్చి పురుగులనన్నిటిని తీసివేయవలెను. తదుపరి పుండ్లకు వాడు మందులను వాడవలెను.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

మంచిసూనె 15 తులములు, నేపసూనె 8 తులములు, గాడిదగడపాకుపసురు అర్ధ నేరు సవటాకు, నీమగ్గిలము 4 తులములు, ముద్దారనీంగు 2 తులములు, ఏకశిల్లపాయలు అర్ధనేరునవటాకు

తెచ్చి ఈమూడువస్తువులు నూరి పైవానిలోకలిపి కాచి గాయములకు పట్టించవలెను. ముందు గాయమును తున్నుచెక్క రాచిచెక్క లేక చింతాకు నేపాకుతో కాచిననీటితో కడిగి కరువారత మందుల నుపయోగించవలెను.

లేక కుప్పింటచెట్టు సమూల చూర్ణముతో తగినంత విధూతి కలిపివేసిన గాయములు మానును.

లేక నరిగిన గాయములకు సరమూత్రము వాడిన పనిచేయును.

లేక మునగాకు, వస, నూరి ఉడికించి వేసిన తగ్గును.

షరా:—అయుర్వేద చికిత్స అనేకరకమునుగలవు. పశుచికిత్సాసారమును గ్రంథములో చూచిన తెలియును.

వైరూప్య (Allopathic) వైద్యము

గాయముల కడుగు లోషము

ఫిన్ యెల్ 1 భాగము, నీరు 100 భాగములు.

లేక కార్బాలిక్ ఆసిడ్ 2 డ్రాములు, వేడినీరు నేరు.

లేక పొటాషియం పర్మాంగనేట్ 10 గ్రాములు, నీరు 2 నేర్లు.

లేక ఆలం 1 కులం, నీరు 2 నేర్లు.

పైస చెప్పిన లోషము తయారుచేసి సీసాలోసుంచి బిరడాలు పెట్టి అవనిరమున్నపుడు ఉపయోగించవలయును. రావిచెక్క, తుమ్మచెక్క నీటిలో నానవేసి కాచి ఉపయోగించుము. అవుసరమున్నపుడు మాత్రమే తయారుచేసికొనవలెను. నిలువయున్న చెనును.

తైలములు, మలాములు, చూర్ణములు

పుండ్రకు, గాయములకు అప్పుడప్పుడు టింక్చర్ ఆయోడిన్ రాసివి తగ్గును.

కార్బాలిక్ ఆసిడ్ $\frac{1}{2}$ అవున్సు, వ్యామలైను 8 అవున్సులు కలిపి అన్ని గాయములకు పట్టించవచ్చును.

లేక జోరింట్ ఆసిడ్ 1 భాగము, జింకుఆక్సైడ్ $\frac{1}{2}$ భాగము ఓలియంపేసెప్ $\frac{1}{8}$ భాగము, క్రియోసోట్ $\frac{1}{8}$ భాగము, కొబ్బరినూనె 8 భాగములు కలిపి తయారుచేసిన అన్ని గాయములకు పుండ్రకు పనిచేయును.

లేక టర్పెంటైన్ 1 భాగము, మంచినూనె 4 భాగములు కలిపి వాడవచ్చును.

పుండ్రకు, గాయములను శుభ్రముచేయుటకు హైడ్రాజెలీ పరాక్సైడ్ ను ఉపయోగించిన మురికిని తీసివేయును.

అలిలేరి ఆరంభము ముదురు పుండ్రవలెను.

లేక క్యాంఫర్, బోరాక్సు, జింకాక్సైడ్, సంచదార సమానభాగములు కలిపి అప్పుడప్పుడు పుండ్లకు గాయములకు పట్టించవలయును.

లేక బోరాక్సు, ఛార్కోల, ఆలం, కాపర్ సల్ఫేట్ సమానభాగములు కలిపి అప్పుడప్పుడు జల్లుచుండవలెను.

వణములు (Abscess)

ఇదివరకు చెప్పిన గాయములకు తగిన చికిత్సలు చేయక పోవుటచే నూత్నజీవులు ప్రవేశించును. పుండుపడును. ఈ పుండ్లను బాగా తేగగా కాపాడవలయును. ఇంకను ఈగలు, దోమలు మొదలగునవి పుండ్లమీద వ్రాలి గ్రుడ్లు పెట్టును. గాలిలో కుటకలన ఆగుడనుండి తెల్లను దారములవంటి పురుగులు ఒయలుజేరును. గాయములలో పురుగులు పడిన పశువు పనిచేయుటకు పనికిరాదు. కాబట్టి ప్రతిరైతు తగిన శ్రద్ధ తీసికొనవలసయును. అచ్చట మాంసము ద్రవ్య ఆభాగమంతయు నాచి అపాయము కలుగును. దుర్వాయువులు చేరుటచే, చెడు ఆహారములు మేపుటచే, అలివేడి యుండుటచే, ధాతుశక్తి తగినంత లేకపోవుటచే కరువులు, గడ్డలు మొదలగునవి యేర్పడును. ఇంకను దేహమునందెచ్చటనైనను కలుగవచ్చును. ఎఱుపువర్ణము గలవి త్వగగా మానును. ఇవి పశువుశరీరముమీద వ్యాపించినతోడనే తగిన శ్రద్ధ తీసికొనకపోయినచో శరీర మంతయు వ్యాపించును. దేహసౌఖ్యము చెడిపోవును. అప్రదేశమందలి మాంసము క్రుత్తిపోవ నారంభించును. మరికొన్ని కరువులు క్రమముగా పెద్దవై అంతుయేర్పడి మిక్కిలి యెఱుగానుండి రసి కారుచుండును. ఈరసి కొన్నిటికి దుర్వాసన గలిగియుండుటయు, మరికొన్నిటికి రేపండుటయు గలను. బలహీనములగు పశువులకిది తరచుగాలేచి బాధ పెట్టుచుండును. సామాన్యముగా కరువులన్నియు ఒంటరిగాగాని, అనేకములుగా గాని లేచుటయుకలను. ఇవి బటానిగింజంత పరిమాణము మొదలు కొడి గ్రుడ్డు అకారమువరకును అంతకంటె నధికముగాకూడ నుండవచ్చును. కొన్ని చిమురక్తము చేరకము అంతరించిపోవును.

పిండికట్టు (Poultices)

పశువులకు కలుగు అనేకరోగములకు పిండికట్టు కట్టుచును. ఇవి కట్టుటవలన మెత్తబడు స్వభావ ముండును. పశువులకు కలుగునావులు, నెత్తుగడ్డలు, గూటిగడ్డలు మొదలగు వానికి పిండికట్టు కట్టినచో నొప్పితగ్గి త్వరలో కరువు లేదును. జొన్నపిండి, నరిపిండి, అవిసెగింజపిండి, గోధుమరవును మున్నగువానితో వేడినీళ్లుశర్చి పిసికి ముద్దగాచేర్చి పలుచనిబట్టలోవేసి కట్టుట మంచిది. దుర్వాసనచేయు కరువులకు గాయములకు మణిబొగ్గుపొడి, పిండి కలిపి కట్టుటమంచిది. పశువు సహించగలిగినంత వేడిగా నుండుపిండిని నావులమీదగాని, తడితరభాగముల మీదగాని వేసి పైన ఆకుగాని, దళ

సరియగు కౌగితముగాని పెట్టి కంబళిగుడ్డతో కదలకుండునట్లు గట్టిగా కట్టవయును; ప్రతి మూడు నాలుగు గంటలకు తీసివేసి క్రొత్తకట్టు కట్టవలెను. క్రొత్తకట్టు సిద్ధమగునపుడు ప్రాతకట్టు విప్పురాదు. పశువుయొక్క బాధనుబట్టి కట్టు బిగింపవలయును. అవి సెగింజలు నూరి ఉడికించి కట్టవలెను. వాపు హరించును. గడ్డను మెత్తపరచును.

వత్తు లెక్కించుట (Setons)

పశువులకుగలుగు ప్రణామలు, గడ్డలు, కంతులు మొదలగునవి పగిలి నెమ్మదించక పోయినచో ఈ వత్తులను ఎక్కించుదురు. ఇటువంటిపనులు అనుభవముగలవారిచే చేయించుట మంచిది, బద్దపాలుగల నూదితో పశువుల గాయములలో దూర్పుబెడలు నును పైన గుడ్డనీలికలు దారములు మొదలగునవారిని వత్తులంచును. ఈ వత్తులెక్కించుట సులభమైన పని. నూదిరంధ్రమునకు దారముగాని, గుడ్డనీలిక దారమువలె చేసిగాని యుపయోగించు కొన వలయును. తరువాత చర్మమును కత్తితోచీల్చి ఆ గాయముద్వారా ఎంతదూరము వత్తి పోవలయునో అంతవరకు నూదివిక్కించి ఆ కొనయందుగూడ చర్మమునుచీల్చి నూదినిలాగి దారమును అచ్చట నెమ్మదిగా నిలుపవలయును. ఆ దారపుకొనలకు జీలుగ బెండు కట్టవలెను. లేదా ప్రత్యేకముగా ముసులు వేయవలయును. వత్తులు ఎక్కించుటకు ముందు కొంతమందును వాడుట మంచిది. ఆకొంతమందులు పావ్కనుంచులు, ఎంత పని చేయునో ఈవత్తు లెక్కించుటవలనకూడా అంత ప్రయోజన ముండును. ప్రతి దినము వత్తి నెమ్మదిగా క్రిందికి జారదీసి పుడును శుభ్రముగా పై చెప్పిన లోషన్సుతోకడిగి మరల అవత్తి ఎక్కించుదుండవలెను. అగత్యమైన మొదల క్రొత్తవత్తి నెక్కింపవచ్చును. ఇటువంటి పనులు ప్రణచీత్సయందు అనుభవము గలవారిచే చేయింపవలయును.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

కవిరి పొడిలో తగినంత మాచికాయపొడి కలిపివేసి తగ్గును,

లేక చింతబెరడు మసిలో ఆముదపు పలుకులు సమానముగా వేసి నూరి వేసిన తగ్గును.

లేక పటిక, కవిరి సమానభాగములు తీసికొని రెట్టింపు మసిబొగ్గు కలిపివేసిన పగిలి రసికాయదుండు గాయములకు పట్టించిన తగ్గును.

లేక కర్పూరము, వెలిగారము, ఒకభాగమున్ను, విఘాతి రెండుభాగములున్ను కలిపి గాయములకు, పుండ్లకు పట్టించిన తగ్గును.

లేక గానుగచెక్క పొడి, తుమ్మచెక్క పొడి సమాన భాగములు కలిపి వేసిన తగ్గును.

విత్తులు చలుటకు వినుకగూడదు.

అంగేయ (Allopathic) వైద్యము

జింకుఆక్సైడ్ 2 భాగములు, బోరివల్యూమ్ 2 భాగములు, ఆయివోఫోరము $\frac{1}{80}$ భాగము, యూకలిప్టస్ ఆయిల్ $\frac{1}{100}$ భాగము, కొబ్బరినూనె 8 లేక 10 భాగములు కలిపి సమస్త గామపుష్పాద్య, వ్రణములు చిరికినప్పుడు నీని వాడిన బాగుగా పనిచేయును.

లేక కార్బాలిక్ ఆసిడ్ 1 ఔన్సు, గ్లిసెరిన్ 6 ఔన్సులు కలిపి ఆయాభాగములకు వాడిన బాగుగా పనిచేయును,

లేక క్రియోసోట్ 1 డ్రాము, వ్యాసులైన్ 1 ఔన్సు, కలిపి రాసిన తగును.

కణతులు (Tumours)

పశువు శరీరమున నేభాగముందైనను వాళ్ళు కలుగును. ఈ వాళ్ళు పొంగి మెత్తగా గాని, గట్టిగా రాయివలెగాని యుండును. దీనినే కంటి యందురు. ఇది పశువులకు దెబ్బతగులుట వలనగాని, చలిగాలి సోపటవలనగాని, బలహీనము వలనగాని, పిల్లి పెసర మున్నగు వాతవస్తువులు మేపుటవలనగాని, చిరుకప్పలు ఎక్కువగానుండు చెరువులలోని గుంటలలోని నీరు ఎక్కువగా త్రాగుటవలనగాని పుట్టుచుండును.

కంటియొక్క అడుగుభాగపు చర్మముక్రింద మాంసము మందగించి క్రమముగా వాచియుండును. ఈ కాయలు సొటలుపడి బుర్రబుర్ర లాడుచు నీగుండునటు కనబడిన యెడల మెత్తని కంటియనియు, వేలితో ఆకాయపై నొక్కినయెడల అంగక తిరుగుగా నున్నపుడు గట్టి కంటి యనియు తెలిసికొనవలెను.

ఈ కంటులు ముఖ్యముగా పశువుల మెడమీదను, ప్రక్కలను, అట్రుమీదను, జెబ్బలమీదను, మూత్రకోశ భాగములందును లేచును. జెబ్బలమీదను, గూళ్ళమీదను లేచు కంటులు త్వరగా మానవు. పశువును చాల బాధించును. కంటి పుట్టగానే రైతులు దానిమీద కౌలుచురు. ఇది చాల పొరబాటు. ఎందుచేతనన అచ్చటి మాంస మంతయు వేడివలన గడ్డకట్టి ఎన్ని నుండులు వేసినను మానదు. ఇంకను అచ్చటి రక్త నాళములు కూడ చెడిపోవును. మెత్తని కంటులను శస్త్రము చేసినయెడల త్వరగా నెమ్మదియగును. రైతులు అతురతపడి, కంటి పుట్టినదనగానే కౌలుచు తగదు. ఎకంటి ఏ కారణమువలన పుట్టినదో, కౌలుచువలన తగ్గనా? లేక ఏమైనా పాపముండులు వేసిన తగ్గనా? లేక శస్త్రముచేసిన తగ్గనా? లేక యేమయిన పసరులు, పట్టిలు వేసిన తగ్గనా మున్నగునవి విచారి చి చికిత్స చేయవలెను. కొన్ని పశువుల దొడ్లలో అన్ని పశువులకు ఒకేసారి శరీరముపైన కంటులు పుట్టుచుండును. ఇట్టి సమయములందు జాగ్రత్తగా పరీక్షించవలెను. చెరు నీటిని త్రాగుటవలననా, లేక వరుసగా ఆ దొడ్లలో

నున్న పశువులన్నియు పిల్లిపెంస చున్న గునవి మిక్కుటముగా తిరుటవలన రక్తముచేడి వచ్చినవాయని గుర్తెగుంగవలయును. తరువాత చికిత్సలు చేసికొనవచ్చును. నొసటిమీద పుట్టిన కంటి వలన పశువు మరణించును.

అల్లు కణతులు (Yoke Tumours)

కంటికి ఆంధ్రములో పశువు మెడమీద గీరుకొనిపట్టు అగును. కాడి రాసిడివలన దున్ను చర్మములోనికి పోయి కంటి పుట్టించును. కనుక పశువు మూపుమీద గాయమున మడుపట్టు కాడిని రెండు ప్రక్కల నుమానముగ నుండుపట్టు కట్టవలెను. ఒక నైపుర బరువు తీవ్రమగును, మరియొక నైపుర బరువు ఎక్కువగును, నుంచరాదు. కాడికి మన్ను మొదలగు పదార్థము లేమియు తీవ్రమైన శుభ్రముగ నుంచవలెను. ఎదుమూపు మీద కూడ ముతిననుండరాదు. ఇల్లుంచని యడల కణతులు పుట్టుదురు. కంటిపుట్టిన పశువుచే నెట్టి పనిని చేయించక వానికి పూర్తిగా విశ్రాంతినియవలయును. గాయము పూర్తిగా మానువరకు పనిచేయింపరాదు. లేదా కాడికట్టవలసిన ఆవుసరము లేని పనియేదయిన అనగా దుప్పలుచూర్పులు మొదలగు పనులలో పెట్టవలెను. కాడి మెడ మీద నున్నంతకాలము పుండ్లుపడుచుండును. ఈ కంటులు ముడివయడల చాల ప్రమాదము కలిగించును. తుదకు కంటి యంతయు చూడగలుగును. అప్పుడు శత్రువు చేసినను లాభములేదు. కాంటి అల్లుకణతులను హగ్రతగా చూడవలెను.

గంటిఅల్లు

మెడమీద కాడినిట్లు ప్రదేశమున మంట, నొప్పితో గూడిన దగ్గురవలనను, అక్కడనుండు వెంట్రుకలు రాలిపోవుట వలనను, ఈజబ్బు ప్రారంభమైనదని తెలిసికొనవలెను. అప్పుడు జంతువుతో పనిచేయింపరాదు. పుండుపడిన పిమ్మట పశువుతో పనిచేయించినయెడల ఆపు చూచి పైదదై యెక్కువభాగ పెట్టును. త్రోతగా కలిగిన దూడలకు ఈకంటు లెక్కువగా పుట్టుదురును. కొన్నిటికి కంటిపుట్టవండగనే ఆరు భాగము వాని చర్మము చిట్టి మంటపుట్టుచుండును. మరికొన్నిటికి చినచిన్న కాయలవలె పుట్టి కాడితగిలినపుడెల్ల పశువు బాధకొర్వజాలక యుండును. సామాన్యముగా గంటిఅల్లు మానుల కన్పడు. శత్రువు చేయవలసి యుండును.

కణతులకు దారపుకట్టు (Ligatures)

చిన్నచిన్న కణతులు పుట్టినపుడు అనగా వెలకకాయంత, వారింజకాయంత పరిమాణముగా నున్నపుడు పట్టు, పురికొన, నూలు మున్నగువారితో చేయ బడిన దారములతో అకంటుల మొదటిభాగమునకు గట్టిగా దట్టిన నునాయముగా తగును. ఇట్లుకట్టిన యడల కంటిలో నుండు రక్తపునాడులు బంధించును. అందువలన కంటిపరిమాణము తగ్గిక్రమేపి నెన్నుచుండును. ఇంకను రక్తనాడులను బంధించుటవలన, విషపురుగులు కలగిన భాగముల చుట్టు కట్టివేయుటవలన, ఈ దారములు మిగుల లాభకరములు.

చికిత్స

కణతులు వెటరినీ డాక్టరుగారితో గాని, ఆయుర్వేద పశువైద్యాచార్యునితో గాని శస్త్రచికిత్స చేయించుట మంచిది. ముఖ్యముగా గట్టిగానుండి చాలాకాలము వరకున్న కణతులను తప్పుకొనివేయవలెను. అయినను అటుచేయుటకు వీలుకాని యడల పొక్కు (కోత) మందులుగాని, పలుగు రాళ్ళు అంటించిగాని, కారపు (చూట) మందులు రుద్దుచుట చేతగాని నెప్పుదికావచ్చును. మరికొందరు కంటినుట్టు గట్టిదారము చుట్టి ముడివేసి వదలివేయుదురు. కొన్నిసార్లు ఆకంటి తెగిపోవుటకలదు. ఈ కంటులను శస్త్రముచేయవలసి నపుడు దాని సమీపమున నున్న రక్తిసాగముల దగ్గర శస్త్రచికిత్స చేయుట కంటే మరియొక విధముగా చికిత్సచేయుట మంచిది. కొందరు పశువైద్యులు కణతులను చీల్చి ఎఱ్ఱకడ్డినికొల్చి లోపలికి పొడిచెదరు. ఇదిచాలా అపాయము. వెంటనే పశువు చనిపోవును.

గుంటకరాకు
గొలిమిదావ
గాడిద గడపాకు

} సమ భాగములు

అముదములో వేయించి 3, 4 కట్లు కట్టవలెను.

కొట్టుపనుపు 2 తు, కస్తూరి పనుపు 2తు, స్వర్ణ 1 తు, గంధకము 1తు, మణిశిల 1 తు, మిరపకాయలు 1 తు, అవుశియ్య పావుశేరు, అముదము పావుశేరు, అనూనె పావుశేరు.

ఈ వస్తువులన్నియు కలిపి మెత్తగా నూరి నలగక్రొక్క ఒక పాతకుండలో కెట్టి వారము దినములవరకు ఎండలో నుంచి తీసి పశువుల కణతులకు మూడు దినములు రారీ నాలవనాడు వేడి నీటిలో కడుగవలెను. ఇట్లు చేసినచో కణతులు కరిగిపోవును.

లేక కటక రోహిణి 4 తు, కోమి 4 తు, వెలిగారము 4 తు, అవాలు 1గ తు, కొంచము వెచ్చచేసి మెత్తగా పొడిచేసి జొన్నసిండితో కలిపి నాలుగు దినములు కట్టిన యెడల యీజాడ్యము మరుగును.

లేక గంగ సిందూరము 1 తు, రససిందూరము 1 తు, ఇంగిలీకము 1తు, రస కర్పూరము 1 తు, చిత్రమాలం 1 తు, మైసము 1 తు, తెచ్చి పైక వస్తువులు మైసము కలిపి వుడికించి పాకమునకు రానిచ్చి దింపవలెను. పాలాస్త్రాని కంటికి నరిపకు చిల్లచేసి వెచ్చబెట్టి తరువాత కంటినిద వేయవలయును. దానిపై ఒక యిత్తడిచిల్లగాని తగిరపు చిల్లగాని వేసి పదిదినముల వరకు వరుసగా కట్టిన యెడల కంటి చక్కగా కరుగును.

పశువుల మెడనిద కంటిని శుభ్రముగా యిదివరకు చెప్పిన లోచనతో కడిగి దినమునకు రెండుపర్యాయములు ఒక గంటసేపు చున్నప్పు ధారగా పోయవలెను. ఆ

ఒక్క నాములుకొరును పలచన పాతబ్బి కొరును.

భాగము ఆరిసతర్వాత హఠాత్ కర్పూరము కలిపి మంచినూనెనుగాని, కొబ్బరి నూనెను గాని, నొప్పిపోయి తిరిగి వెంట్రుకలు వచ్చువరకు బాగుగా వుండునట్లు రాయవలెను. వుండుపడిన తర్వాత మరల ఆపశువుతో పని చేయించినయెడల ఆవుండు వాచి పెద్దదై యెక్కువ బాధపెట్టును. అప్పుడు చూడుపాళ్ల ఆపవీండియు, ఒకపాలు మిరపకాయల పొడి, వేడినీటితో కలిపి వేయుట మంచిది. ఇట్లుచేసిన కంఠిలో నీమున్నయెడల పగిలి రిసిన్తోడ్చి వేయును. లేదా వాత్రు హరించును.

వైరూప్య (Allopathic) వైద్యము

గట్టికంఠులకు హైడ్రాజీన్ ఆయోడైడ్ రుబం ఆయంటుమెంటు చేసిన తగును. తేక మెర్క్యరీ 16 ఔన్సులు, లార్డు 16 ఔన్సులు కలిపి కంఠులకు పట్టించిన తగును.

లేక మెత్తనికంఠులకు శస్త్రముచేసి లోవన్నుతో కడుగుచు కాత్బాల్మిక్ ఆయిల్ గాని, తదితర మందులుగాని వేయుచు వచ్చిన తగును. వాతముచేతగాని, చెడు నిద్రవలనగాని వుట్టిన కంఠులుగల పశువులకు కాలికం సర్ప్రైజ్డ్ ను అరద్రాముగాని, ఒక ద్రాముగాని గంజిలో కలిపి ఈయవలెను.

లేక కంఠులకు టింక్చర్ కంఠారిడిస్ అను అంఘ్రును వాడవచ్చును.


లేక ఆయోడిన్ 32 గ్రెయినులు పొటాషియం ఆయోడైడ్ 32 గ్రెయినులు లార్డు 2 ఔన్సులు కలిపి మర్దన చేసిన కంఠులు కలిగిపోవును.

ఎముకలు విరుగుట (Fractures)

పశువుయొక్క ఎముకలు దృఢముగా నున్నప్పటికి పెళుసుగా నుండుటవలన అవి బలమైన దెబ్బలు తగులుటచేతను, క్రిందపడుటచేతను, గుముటుటచేతను, సాధారణముగా పింగాణివలె విరుగుచుండును. బయట బలమైన దెబ్బలు తగులుటవలనగాని, కండరముల మూలమునగాని ఎముకలు విరుగుచుండును. ప్రక్క పటమునందుండు ఎముకల గూడును చూడుడు.

ప్రత్యేకముగా ఎముకమాత్రమే విరుగుట తటస్థించిన యెడల విరిగినభాగము రెండుముక్కలుగానగును. తదితర అవయవములకు హానియుండదు ఇట్టి సమయములందు గాయ మేమైన యున్నదేమో చూడవలెను.

ఎముక విరుగుటతోగూడ ప్రత్యేకముగా గాయములు కలసియున్నయెడల చర్మమునకును, చర్మముక్రింద ఎముకమీదనుండు అవయవములకును గాయముతగిలి బయట నుండి ఎముక విరిగినసలమునకు రంధ్రముపడియుండును. విరిగిన మొనయొకటి చర్మమును పొడుచుకొని బయటకు వచ్చియుండుటవలన రంధ్రముపడును. ఎముక విరుగుటయేగాక



గాయముకూడ పడినయెడల ఎక్కువ ఆపాయము కలుగును. ఈగంధ్రముగుండ గాలి, విషక్రిములు, దుమ్ము చేరి ధనుర్వాతములోని గాలి, విషజ్వరములోనికిగాని రావచ్చును.

ఎముక విరుగుటతోకూడ సమస్త జేహుమందలి కొన్ని అవయవములకు హానికలుగెను. తలపుర్రె ఎముకలు విరుగునప్పుడు కొన్ని సమయములందు మేదదునకు కొమ్ములకు హానికలుగును. ప్రక్కటెముకలు విరుగునపుడు కొన్ని సమయములలో ఊపిరితిత్తులకు హానికలుగవచ్చును.

కొన్నిటికి ఎముక చిన్న చిన్న తుకలుగా పరిగిపోవుటగాని, విరిగిపోవుటగాని తటస్థించుచుండును.

తేతవయస్సుగల దూడలఎముకలు విరుగక చిట్టిగాని పంగిగాని యుండును.

ఎముక విరిగినట్లు కనిపెట్టుట

ఎముక విరిగినభాగము బాధ, పోటుకలిగి వాచును. ఇంతియేగాక హానిపొందిన అవయవములు వంకరగ నుండును.

దెబ్బతిగిలిన భాగమును నుపయోగించుటకు శక్తిలేక యుండును, ఒకప్పుడు వాచియుండును.

విరిగినభాగమును కదల్పుటగాని, ఏపనికైన ఉపయోగించుటగాని స్వేచ్ఛగా వదలివేయుటగాని వీలుండదు.

పలచనిపైను పాతళ్లు నిండును.

ఎముకవిరిగిన భాగమునకున్న, శోహము అవలివైపుననుండు అదే విధమైన భాగమునకున్న ఆకారమందు వ్యత్యాసముండును.

ఏఅయవము విరుగునో దానిఆకారము కోమలత్వము, అందము మొదలగునవి చెడిపోయి వికృతరూపము కలుగును. అది ఖడిభాగమైన యెడల నెడనుభాగముతోను, ఎడనుభాగమైనయెడల ఖడిభాగముతోను సరిపోల్చిచూచి పొట్టి, పొడుగు, లావు, సన్నము మొదలగు భేదములు కనిపెట్ట వచ్చును.

సామాన్యముగా చేతితోకట్టి ఎముకలు కనిపెట్టవచ్చును. అప్పుడు పశువు చాల బాధపడుదు ముట్టుకొననీయదు.

విరిగిన యెముకయొక్క గరుత్వ న మొసలురెండు ఒకటితో నొకటి రాదుకొనుట చేత కరకరమున శబ్దము కలుగును. అయితే ప్రథమచికిత్సచేయువారు ఇట్టిశబ్ద మున్నదో లేదో తెలిసికొనుటకై ఎముకలు రాపిడికిలిగింప ఎన్నడును ప్రయత్నించరాదు.

ఎముక విరిగినది లేనిది వాస్తవముగా తెలిసికొనవలసి యుండునెడల, విరిగిన యెముకయొక్క వాడిమొసలు వాటిమట్టునుండు కండ్లములందును, చర్మముందును గ్రుచ్చుకొనబడునట్లు మిగుల జాగ్రత్తతోను, మెలమవతోను పరీక్షించవలెను. అట్లు గ్రుచ్చుకొనినయెడల ఎముకవిరిగియుండుటతో గూడ ప్రత్యేక గాయములు లేనా శోహముందలి కొన్ని అవయవములకు హానికలుగును.

విరిగిన ఎముకల గాయములకు చికిత్స

విరిగినయెముక ఏ ప్రకారము అతుకుకొనునో దానిని ఆరంభములో తెలిసికొనవలెను. విరిగిన కొనలనుండు ఎముకతో సంబంధించిన ఒకక్రాంత్రపదార్థము ఏర్పడి ఆకొనలు ఒకటితో నొకటి అతుకుకొనును. ఈ క్రాంత్ర పదార్థము మొదట మృదువుగానుండి ఒకచేల లేక రెండునెలలలోపుగా క్రమక్రమముగా గట్టిపడి ఎముకగా మారిపోవును. ఈ కాలముందు విరిగిన యెముకయొక్క మొసలను అవియుండ వలసిన చోట ఉంచి ఏ మాత్రము కదలకుండ కట్టుకట్టినయెడల ఎముక అతుకుకొని పోవును. కాబట్టి ఎముక విరిగిన గాయములకు చికిత్స చేయునపుడు గాయము తగిలిన భాగము నకు కొంచెము లాగి విరిగిన కొనలను అవియుండవలసిన విధమున ఒకటిగా జేర్చి అవి అతుకుకొనువరకు, అవియేమాత్రము విడిపోకుండ చూడవలయును. ఆవయవములు విరిగిన పశువులను మంచములలో వేసి కట్టి వ్రేలాడదీయరాదు.

వృష్టైవముక విరుగుట (Special Fracture)

తల వృష్టై ఎముకలు విరిగినపుడు ఒకచోట విరిగినది, ఎక్కువచోట్ల విరిగినది, ఎముకమాత్రమే విరిగినది, లేక రక్తనాళములకు భంగము కలిగినది మొదలగు సంగతు

పచ్చడము చెడల్పున పదికర్రలుండినా పైరు చెగచవచ్చు.

లను, చేతితో తాకి కనుగొనవచ్చును. ఈ యెముక విరిగిన పశువుతో పనిచేయించరాదు. మీ తాలూకా వెటరినరీ డాక్టరుగారిని పిలిపించి తగిన చికిత్స చేయవలెను. డాక్టరుగారు వచ్చులోపల గాయమునుండివచ్చు రక్తమును ఆశ్రుచేయుటకు ప్రయత్నించవలయును. చల్లనీటిని గాయముమీద పోయవలెను.

క్రిందిదాడ విరుగుట (Fractured Lower Jaw)

క్రిందిదాడ విరిగినప్పుడు పశువు నోరు తెరువలేదు. ఆరవలేదు. రక్తము గాని, చొంగగాని రెండును కలిసిగాని నోటినుండి బయలువెడలుచుండును. పశువు చాల బాధపడును. దీనముగా మనుష్యులవంక చూచుచుండును. పై పుట్టె ఎముక విరిగిన మాదిరిగనే దీనికికూడా చికిత్స చేయవచ్చును. వెటరినరీ డాక్టరుగారిని రిప్పించి చాడను యధాస్థానమునకు తెచ్చుటకు ప్రయత్నించవలెను. అటుతరువాత కట్టుకట్టి ముడివేయవలెను. పశువు గడ్డముయొక్క అడుగునుండి కొమ్ములపైగా ముడివేయవలెను. కట్టుగుడ్డ పొడవుగానున్నయెడల నురల తలకు కట్టి ముడివేయవలెను.

ప్రక్క ఎముకలు విరుగుట (Broken ribs)


పశువు కొమ్మునకును వెన్నెముకకును మధ్యను సాధారణముగా ప్రక్కఎముకలు విరుగును. పశువులను ఈ ఎముకలమీద దెబ్బలు కొట్టెదరు. అందుచే నివి ఎక్కువగా విరుగుచుండును. అట్టివేళలయందు పశువు ఊసిరిని వీల్చునపుడు హృదయభాగము బాధగా నుండును. అట్టిసమయమున బాధగా నున్నచో తగు చికిత్స చేయవలెను. ఇంకను ఈ ఎముకలు విరుగుటవలన కార్జమునకు పూసిరితిత్తులకు బాధ కలుగును.

ఎముకలను స్వస్థానములోనికి చేర్చి కట్టవలెను. ఇక్కడ కట్టుకట్టుట చాలా కష్టము. కనుక పశువు ఎముకలచుట్టును కట్టవలెను.

కాలు విరుగుట (Broken leg)

పశువు మోకాలు క్రిందిభాగములో నేడైన విరిగినయెడల మొదట వాపు తెండును. ఎక్కువగా విరిగినయెడల ఎముకలు చర్మమును చీల్చుకొని వెలుపలికి వచ్చును. ఇటువంటి సమయములో ఎముకలను స్వస్థానమునకు చేర్చి కట్టు కట్టవలెను. పశువులు తొడయెముకలు విరిగినయెడల కట్టుకట్టుట చాల కష్టము. అచ్చట కట్టు నిలువదు గాన యిదివరకు చెప్పిన బద్దలు వేసి కట్టుకట్టవలెను. ఈ ప్రక్కరటములో చూపిన కాళ్ళలోని ఎముకలు చూడుడు.

నాటిక ప్రయోగ సమయము.



ఆయుర్వేద చికిత్సలు (Native)

పశువు శరీరములో ఏ భాగము విరిగినను యీ దిగువ చికిత్సలు చేయవచ్చును. విరిగిన వెంటనే దింతగించల బె నడు దున్ని జీగురు వచ్చునట్లు వ్రవకబెట్టి ఒక ముతక గుడ్డను పట్టిగా చింపి జీగురు బాగుగా రాచి నుంచు విరిగిన భాగమును స్వస్థానములో

మొదలు మెరుగి వేస్తే కొనసలపగి వూరునా?

చేర్చి వైస ఆ పట్టిగడ్డకు వేసి, దానిమీద మరయొక పొడిగడ్డనువేసి నున్నగా చేర్చిన బద్దలనుగాని యిదివరకు చేప్పిన అట్టుముక్కలనుగాని వైసవేసి కట్టినచో త్వరగా ఎముకలు కట్టుకనును. బాధ వాపు తగ్గును. కట్టు కట్టువప్పుడు బాధనొందు భాగము వలన ఆధారముగను దానిని కరలకుండునట్లు చేయుటవలన, ఈకట్టు లుపయోగపడును. ఈ కట్టు 15-25 దినములవరకు నుంచవలయును. తరువాత కట్టువైసనున్న బద్దలు తీసి వేసినయెడల నొప్పి క్రమముగా తగ్గును.

విరిగినయెముకలను స్వస్థానమునచేర్చి నాలుగైదంగుళముల వెడల్పుగల ముతక గుడ్డపై వున్నరిమట్టిని పూసి విరిగినంత వరకు చుట్టవలయును. కట్టు 30 దినములవరకు గాని, అంతకుపైగాగాని, ఈ విధముననే యుంచవలయును. పశువునకు మేత ఎక్కువగా మేపరాదు. మట్టి మాడలకొనలు పిడికెడునూరి అరిశేరు అన్నపాలతో కలిపి దినమువఱి రెండు సార్లవంతున వారము దినములు త్రాగించవలయును. ఇట్లు చేసి నచో ఎముకలు త్వరగా కట్టుకొనును.

కొందరు వైద్యులు వేడ, వెచ్చపూస గుడ్డనురాచి కట్టుకట్టెదరు. కాని దీనివలన నెంతమాత్రము ప్రయోజనములేదు. ఉత్తరేణి ఆపనూరి కట్టుకట్టి పక్షము దినము లుంచ వలెను.

విరిగిన ఎముక భాగములకు సాధారణచికిత్సలు

ఎముకలు విరిగినప్పుడు గాయమునుండి రక్తము కారుచున్నది లేనిది పరీక్షించ వలయును. ఆ గాయము శుభ్రముగా నున్నది, మరణిగానున్నది పరీక్షించవలెను. రక్తము కారదుండినయెడల గాయములో వాయువునగునకు నూక్కుజీవులు ప్రవేశింపవండుటకు గాయములను దూదితోగాని లింబుతోగాని, పీచుతోగాని, కట్టుకట్టవలెను. రక్తమునావుటకవునరమైన యెడల కట్టుకు బిగించుటకు టార్జి క్వ నుపయోగించ వలెను. టార్జి క్వ అనగా బానెసుపాడవుగల చేతికట్టుముక్కలు ఒకదానిని చెప్పి కట్టువలను చున్నిమువలను మధ్య దానికొనలతో నొకదానిని మార్చి గింగిర మెలికలు త్రిప్పువలెను. అట్లు త్రిప్పిపండువలన కట్టుబిగిసి ధుమలకు తగిలిన గాయములగుండి పాయనట్టి రక్తము అగిపావును. ఎముకలు చుర్చముక్రింద నుండి కంటికిగపవవు. అవి విరిగినట్లు కంటితో చూడలేము కాని కొన్ని గిర్తలవలన ఎముకలు విరిగినయెడల తెలిసికొనవచ్చును. గాయము మరణిగా నున్నయెడల పొటాషియా పర్మాగ్నేట్ లోషన్తోగాని, కార్బాలిక్ లోషన్తోగాని కడిగి శుభ్రముచేయుట మంచిది. ఇట్లు చేయుటచే నూక్కుజీవులు చేరిజాలవు. తోడ, మోకాలు, జెబ్బభాగములందు విరిగిన ఎముకలు కట్టుకొనుట చాలా కష్టముగాన చివరకు రాక్షస వైద్యముచేసినను తగ్గును.

ఓత్తువోటివేస్తే ఇట్టువోటి ములుకునా?

కట్టుబద్దలు (Splints)

కట్టుకట్టునపుడు బాధనొందిన భాగమునకు ఆధారము కలిగించుటకును, దానిని కదలకుండునట్లు చేయుటకును కట్టుబద్దలు ఉపయోగించుచున్నవి. కట్టుబద్దలు లేక నన్నని వెదురుచువ్వలు మొదలగువానిని కట్టుబద్దలందురు. ఒకప్పుడు దొరుకనిచో కాగితపు అటలు వెదురుబద్దలు తదితర చెట్లయొక్క బద్దలు ఉపయోగించవచ్చును. వీటిని కట్టుకొనే చేర్చినపుడు ఒత్తుకు విస్తారముగా నుండరాదు. అపాయము కలిగినభాగముయొక్క కీల దాటియుండునట్లు వీటినిచేర్చి కట్టుకట్టవలెను. లేనియెడల జాయింట్లకీలు తప్పి గాయము నకు కదలికలు గలిగించి బాధను కలుగజేయును.

పశువును కదలనిచురాదు. అటు కదలుటవలన ఎముకలు కదలి ప్రమాదము సంభవించును. కట్టుబద్దలు రెండంగుళముల వెడల్పుగల ముక్కలుగాజేసి జుతువు అవయవమునకు తగినవిగా నుండవలెను. ఎముక పగిలినచోట ఆరంగుళములనుంచి ఆరంగుళము క్రిందికి వచ్చునట్టి పాడుగగల బద్దలు నునపుగాచెక్కి చీల్చవలయును. బద్దలుజేసి కట్టుటకు పూర్వము విరిగినభాగమునకు గుడ్డలుచుట్టవలెను. లేనిచో చచ్చుచునపుడు చెరువు గలుగును. లేదా బద్దలు చచ్చుచును చీల్చును ఒకసారి బద్దలువేసికట్టితరువాత అయిదు ఆరువారములకు కట్టువిప్పురాదు. ఎముక విరిగి పాడుచుకొని వచ్చినపుడు కట్టుకు ప్రతి వారమున తీసి మరల క్రొత్తకట్టు కట్టుచుండవలెను. లేనిచో అచ్చట ప్రశ్ని పశువునకు అపాయము సంభవించును. విరిగిన ఎముకలు కలిసికొనక అచ్చట చీలుపట్టినయెడల కత్తితో చీల్చి యెముకముక్కలను చీలును తీసివేసి దానిని గాయముగానెంచి అందుకు తగిన చికిత్స చేయవలెను. పెద్దజంతువుకొరకు విరిగినచో చికిత్సవలన నెంతమాత్రము ప్రయోజన ముండదు.

వైరూప్య (Allopathic) వైద్యము

ప్యారిస్ ప్లాస్టర్ అను తెల్లపాడిని ఓటితోకలిపి గుడ్డకుగాని, చూడికిగాని పట్టించి కట్టుకట్టవలెను. ముందు గాయమెంతవరకున్నదో, విరిగిన ఎముకలను పాటునకు త్రోసివేట్టుకట్టవలెను.

ఎముకలు తొలగుట (Dislocations)

దీనినే యిండితొలగుట యందురు. కీలుపద్ద ఎముకలు అనుప్పబడియుండి గూటినుండి అది బయటకు త్రోయబడుటయే ఎముక తొలగుట యందురు. ఎముక తొలగిపోయిన భాగము వాచి నొప్పికలుగ చేయును. తొలగిపోయినభాగము అంద వికారముగ నుండును. కీలుపద్ద యొక్క తొలగిపోవు సేగాని రెండు కేళ్ళిండునుండు ఎముక తొలగిపోయినచో పశువు నడవజాలక డెక్కచివర నే నేలమీద జారిలాగుచు తిరుగుచుండును. ఎముక విరుగుటయు, విరిగిన మొనలు గరువుగానుండి ఒకనికొనుటయు నుండదు. కరకర

మన శబ్దమండదు. కీళ్ళయందుకప్పు కదికరచోటుల చలనమండదు. ఎముకలొలిగి పోయిన కీలుకదలక నిరముగా నుండును.

చికిత్స

సాన భ్రంశమునొందిన యెముకను స్నానమునకు త్రోయవలెను. తరువాత దానిపైన మంటమండ చేసి పశువును ఒకచోట కట్టినీయక యుంచవలయును. తొలగిన ఎముకను లాగి వడగట్టిన పెరుగుమడు, చింతనూనె, అలుదపుపప్పు, గుంటకరాకు నను భాగములుగా కలిపి తొలగిన భాగముచే పూయవలెను. పశువును అంతగా మేపరాదు. ఎక్కువగా మేపినచో పశువు జీర్ణభాగములు చెడిపోవును. ఇట్టి పశువు నెలనుంచి మూడుమాసములవరకు బాధపడును. కొన్ని మంటివిరుగును.

అవుసరమున్నపుడు రక్షకూడ వేయవలెను. నొప్పికగుటకు తంబెపాప నూరి కట్ట వలెను.

ఎముకలు గూళ్లనుండి జారుట

ఎముకలు గూళ్లనుండి తొలగిన చోట గూళ్లనుండు బాధయుండి వాపుగని పింకును. ఆభాగము కదల్చుటకు వీలుండదు. ఆభాగముమీద బరువు అనుటకు వీలుండదు. ఆ భాగముతో నేవిధమైన పనులను నుసలు చేయవలదు. అట్టి భాగమును మనము చేతితో నెంత మెల్లగాతాకినను నొప్పికలుట. ఆభాగముయొక్క ఆకారము చెడి యుండును. అనగా వంకరతలుగుటయో, పొట్టిపొంగుటయో తలసింతును. ఒకప్పుడు కీళ్లులిట్టిదిగి కదలుటకు వీలుండదు. ఎముకలు గూళ్లనుండి తొలగునని గ్రహించవలెను. సాధారణముగా పశువుమోకాలు చీలమండనోడ ఎముకలుగు జబ్బుమొదలగు భాగములయందలి ఎముకలు గూటినుండి తొలగుచుండును. వీటిలో భుజాసియొక్కతల పెదదిగాను అద్దిప్రవేశించు గూడు చిన్నదిగా ముందుటనుబట్టి తరచుగా గూటినుండి తొలగుచుండును. ఇట్టిబాధలు పైవాటికి పొగుగా కలుగుచుండును. ఎముకలు గూటి నుండి తొలగినచో లేక అసలే నిలిగినచో నెలనుంచి కష్టము. కొన్ని మిఠాలాకా నెటినెరిచాక్షురుగానికిగాని మిక్కిలి అనుభవముగల మిత్రాను పశువైద్యునకుగాని తొలగించవలయును.

జెబ్బు కుడక జారుట

పల్లెయందుండు పశువుల కీ ప్రమాదము సామాన్యముగా తలసిండును. ఎత్తు నలమునుండి పల్లమునకు దూకుట వలనగాని లేపుటకును వేయుటవలనగాని కొలు జారుటవలనగాని యిదితలసిండును. ముడకచూరిన కొలుపైన భారమేమియు మోప వలదు; కనుక మూడుకొల్లతో నడచును. బానిసట్టి కీలును పట్టిమారినయెడల ఎముక

యొక్క చివరభాగము మామూలు స్వము నుంచి వెలుపలికివచ్చి చేతికి గట్టిగాతగులును. ఈనీటి వెంటనే తెలుసుకొని కీలు సరిచేసినచో నట్టివనమువము బాగుపడుట కష్టమయవకాశము కలదు. దగ్గర లోలేన చెరువుగాని కాలువగాని యున్నయెడల దానిలో జంతువును ఈరొట్టింపవలెను. అందులన కీలు స్వరొవచ్చును. లేనియెడల నుంచి ప్రక్కను పడత్రోసి జబ్బుకాలునకు చిసముడుపనకు నిూనుగా త్రాడుగట్టి యొకరు దానిని ముందుకు నెక్కుదిగా బలముతోగా బాగుచుండగా పెట్టించిన యొక కొనను సాధ కడు తన యరి చేతితో మామూలుస్వములోనికి ప్రోయుటను ప్రయత్నించవలెను. ఇట్లు త్రోసిన టక్కుమని యొక లోనికి పోవును. సిగ్గుట పంటుచిహ్నములు పోయేవరకు జంతువును నెక్కుదిగ నూచవలెను. ఈ మార్గిగ నే పశువుల కాలు విరిగినప్పుడుకూడ స్వస్థానమునకు చేర్చి కట్టకట్టవచ్చును. జెబ్బుఎముక బోసవును 24 గంటలలో త్రోసి కట్టించి రక్తము గడ్డకట్టి కాలురాదు.

కాలు రెల్లపోవుట (Sprain)

స్వభావము (Causes)

బండి యెదులను సవారి బండ్లనుకట్టి వివాహములకు తిశర గ్రామాదులకు వెళ్ళు నప్పుడు స్వారి చేయించునపుడును రాతిగొడ్డనిగ ఎక్కువగా స్వారి చేయించునప్పుడును, కాలిని తి మెలక నడి నప్పుడును ఈ ప్రమాదము చుట్టించును. పశువు పరుగెత్తు నప్పుడు వాలుగు పాదములను ఒకసారి భూమిని విడుచును. ప్రతి అడుగునందును, కాలుడెక్కులు మాత్రమే భూమిని తామిలును. మరియు ప్రతి అడుగునకు పిమ్మట మోకాళ్లు తిన్నగా నుండవు. పరుగెత్తుటలో వెనుక పాదములు భూమిని విడుచునప్పుడు ఆకస్మాత్తుగా మోకాళ్లు తిన్ననగునప్పుడు. చిరుమండలు కీలు సాగి లుముతో కాలి డెక్కులగు దా త్రోవుతున్నది దేహమును పైకి మూడుడు ప్రోయుచున్నది. పాదముల యొక్క గిట్టలు భూమిమీద పడును. అట్లు పడకముందే తిన్నగానన్న యా వెనుకటి మోకాళ్లు బాగుగావంగి దాని పాదములు భూమిని విడచి కొంత దూరమువచ్చును. పైకత్తబడిన వెనుకకాళ్లు నడకలో నున్నట్లు దానంతటియె యాగక అందలి కండరములచేత బలముతో ముందునకు లాగి బడునున్నది అడుగుల త్వరితమును బట్టి యా చలనము జరుగుచున్నది. భూమిని విడువబోవునపుడు వెనుకటి మోకాలు తిన్ననై అతి తొందరగా లాగుకొనుటవలన ఒకవిధమైన జంట కాళ్లతో దుముకుటయే జరుగుచున్నది. దీనికి పరుగెత్తుట యందును. ఇటువంటి సమయములలో పశువుకాళ్లు రెల్లపోవును. యనగా పశువు డెక్కునుండి జబ్బు పోవు నగము చెరుగును. పశువు రెల్లపోయినకాలును భూమిమీద ఆనించలేదు. చాల బాధపడును. పశువు మిగల దీనముగా నుండును. రెల్లపోయిన భాగమందు వాచి వేడిగా నుండును. మనము చేతితో తాకినయెడల గిలగిల తన్ను కొనును. బాధచే పండ్లుకొరుకును. పశువునకు జ్వరము కూడా నుండును.

పూచిన పూరెల్లా కాయలైతే భూమిన దానికి సలమవుండదు.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

రెల్లపోయిన భాగమునకు రెండు బిందెల చుట్టూ ధారగా పోయుట మంచిది. రెండు కుండపెండులు తీసికొని పశువు డెక్కెనునొక్క నొప్పిల భాగమందు పెండులువేసి గుత్తి కిరుప్రక్కల ఒకనొసతో బిగించి ఒకబిందెను చుట్టూ తీసికొని ధారగా పోయవలెను. ఇట్లు నొప్పి తగ్గవరకు పోయుచుండిన నెమ్మది యగును. రెల్ల పోయిన భాగమునకు తవుడు వేయించి కావులు వేయుట మంచిది. ఇట్టి పశువులకు 15 నుంచి 60 దినములవరకు చికిత్స చేయవలసియుండును.

లేక వసు 1 తు, వాము 2 తు, వసుపు 1 తు, కలిపి నూరి నూనెతో ఉడికించి రెల్లపోయిన భాగమందు మర్దన చేయవలెను.

లేక నున్నములో చింతపండు కలిపి పట్టువేయుము.

లేక సారాయిలో కొడిగ్రుడ్డు రెల్లసాన కలిపి పట్టువేయవలెను.

లేక మనగాకు 2 గుప్పెళ్ళు, వసు 1 తులము, వాము 6 తులములు నూనెలోకలిపి ఉడికించి రెండు కట్టు కట్టవలెను.

వైరూప్య (Allopathic) వైద్యము

కాలు పైకి ఎగలాగిన వెంటనే చుట్టిలో అమ్మోనిము క్లోరైడ్ కలిపి ధారగా ప్రతికూట పోయుచుండినచో తగ్గును.

లేక టర్పెంటైన్ ఒకటి లేక రెండు టౌన్సులు ఆ భాగమునకు వేసి వేడినీటి కావులు వేసిన తగ్గును. లేక వైడ్ లోషను వాడిన తగ్గును.

చె మ ట గు ల్ల (Foul)

వ్యభావము (Causes)

పశువులు తిరుగునప్పుడు వాని గొరిజలచుట్టు అప్పుడప్పుడు మన్న పేరుకొనును. దానిని పరిశుభ్రముగా చేయనియెడల ఆచ్చట వాచి వేడిగా నుండును. ఊటధూము లందును, రాతినీలలందును, అరణ్యములందును, బీడుధూములందును, తిరుగు పశు వులకు తరచుగా ఈ గుల్లలు లేదును. ముఖ్యముగా నిని వెనుకకాళ్ళకు వచ్చును. కాలు కంటిన వెంటనే తగు చికిత్స చేయనిచో ఆ భాగము చీముపట్టి బాధపెట్టును. కాలు ధూమిమీద ఆనించలేదు. మేత నీరు మాని విచారముగా నుండును. ఇంకను ఆక్రద్ధ రేసినయెడల పశువు కృశించి మరణమునకు సిద్ధమగును.

పై పెట్టయిన పంటున్ను పగ వాని మోమున్ను చూడిరారు.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

గుల్ల పెద్దదిగానుండి మెల్లబడినయెడల శత్రుముచేసి లోషను నీటితో కడిగి మందులు వాడవలెను. తరువాత ఆ గాయముపై ఒక దట్టమైన గుడ్డవేసి కైముడు చెక్క, ఆవాలు, వాము సమభాగములుగా చేర్చి నలగద్రొక్కి వెచ్చజేసి కాయవలెను. ఈరీతిగా నాలుగుదినములు చేయుము.

లేక అముదవున త్రివేసి పొడినున్నము అది కట్టవలెను.

లేక ముండ్లవోటకూర చెచ్చనిది ఉదయ సాయంకాలములందు కట్టవలెను.

లేక నల్లఉమ్మిత్తాకు పసురు, ఉప్పు మెత్తగా నూరి 3 దినములు కట్టుకట్టవలెను.

వైరూప్య (Allopathic) వైద్యము

శత్రుము చేసినతరువాత మురికిని బాగుటకు హైడ్రాజరీ పరాక్సైడ్ను ఉపయోగించవలెను. తదుపరి టించర్ ఆయోడిన్ గాని, కార్బాలిక్ ఆయోల్ గాని, క్యొంఫర్ లినిమెంటునుగాని వాడిన బాగుగా పనిచేయును.

బెణుకులు (Sprains)

పశువు కాలియొక్క ప్రతికీలు రెండుగాని, అంతవ పైనగాని యెముకలతో గూడి నారవంటి త్రాళ్లతో కట్టబడియుండును. ఈ త్రాళ్లనే పెండ్లెత్తు అందురు. ఈ త్రాళ్లు కీళ్ళను తొలగియునుండ బంధించి యుండును. పశువు కాలువారినను, తప్పటదుగులు చేసినను, అధిక శక్తిగా పరుగెత్తినను, అధికమైన బరువులు లాగినను ఈ పెండ్లెత్తు ప్రట్టుకు నరములు కొరిగినతో గొప్పగనో విస్తరించి సాగినయెడల బెణుకుట యందురు. బెణికిన కొంచెముసేపటికి ఆ భాగము వాచి నల్లబడును. పై చర్మము పగలనిచో మొదటనే రంగుమారినట్లు కనబడును. రెండుమాడు దినములైనతరువాత చుట్టునుండు చర్మము నలుపుగానైనను, ఎరువుగానైనను కొంచెము పనువువర్ణముగా నైనను ఉండును. బెణికినచోటనుండు రక్తము అటునిటు చెదరుచుండును. గనుక వాడుటయు నల్లబడుటయు తట్టసిండును. పశువులకు సామాన్యముగా మణికట్టు, మోకాళ్ళు, జబ్బలు, ఏనుగులుగల మొదలగు అవయవములు బెణుకుచుండును. ఒకప్పుడు అపాయములు సంభవించిన యెడల ఎముకలు గూటినుండి తొలగక కీళ్లమీద నుండు సూధి బంధములు కండములు మొదలగునవి మెలిమెలిగి నలిగి బాధను కలిగించును. అట్టి బాధలకు బెణుకులని పేరు.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

బెణికిన అవయవమును సిమ్ముగా నుంచవలయును. కడలనరుదాడు. బెణికిన భాగమునకు తడిగుడ్డనుట్టి తడిపవలెను. ఇట్లు రిడిపిసతో ఆ భాగము విగియును. కొం

కడు నడినీటికాపులు బెణికిన భాగములకు కాపు తీయుదురు. నడినీటి కాపులకంటె ఇనుకకాపులు చాల శ్రేష్ఠము. బెణికిన భాగమును చాలాకాలము వాడుకచేయని యెడల ఆ ఆవయవము బిగిసిపోవును.

మద్దకర్పూరము 1 కులము, కొబ్బరినానె పావుసేరు, కలిసి బెణికినచోట రుద్దవలెను.

లేక హరితికర్పూరము 1½ కులము, కర్పూరతైలము 6 కులములు, నబ్బు 2 కులములు, కలిసి శుద్ధన చేయవలెను.

లేక పచ్చిజెముడుచెక్కను త్రొక్కి బెణికినచోట కట్టవచ్చును.

లేక రాచిచెక్క మెత్తగా నెగద్రొక్కి యెండబెట్టి మార్చముచేసి బిటిలో కలిసి బిల్లచేసి బెణికినచోట కట్టుకట్టి ఆకట్టుపై చిన్నళ్లు ధారగా పోయవలెను.

లేక కొడిగ్రుడ్డు సొంతో మంచినూనె కలిసి పట్టువేయుము.

లేక మంచిపూటయిన పారాయి ఆరగా ఆరగా గురుడుండవలెను. బెణికిన ఆవయవమునకు ఎన్ని చికిత్సలు చేసినను లొంగని యెడల బొత్తులు పెట్టవచ్చును.

వైరూప్య (Allopathic) వైద్యము

ఆంగు ఎంటంపంబ్లం అసిలేట్ నుగాని, స్లై ఆయంటుమెంటుగాని, టర్పెంటైన్ నుగాని, బోరిస్ ఆయంటుమెంటుగాని, జింకుఆక్సైడ్ ఆయంటుమెంటుగాని ఆయా ఔషధులతో నుర్దనచేయుచు నడికాపులు తీయుచుండినయెడల తగ్గును.


మోర్లుదిగుట

పశువును మరీమురిప్పి మేపుటవలసినను, చర్మములో నుండు బలహీనతవలనను, దుమ్ము, లేమి వగైరాల కొట్టములో నుండుటవలనను, తదితర వాతకోగములవలనను ఈ వ్యాధి కలుగుచున్నది. నెనుక మోకాళ్ళుగాని ముందుమోకాళ్ళుగాని వాపుచెందును. ఈవాపును తాకినయెడల గట్టిగ నుండును. మరికొన్నిటికి మెత్తగ నుండును. నడచునపుడు కాళ్ళు వంగినీయవు. ఆ వాపులదగ్గర గురవకుండును. అంభములో పశువు మోకాలి చిన్నలచుట్టు గుండ్రని వాపుడును. ఈవాపు వృద్ధిచెంది కాలికించి భాగమునకుమాడ సోకును. ఈవాపులలో ఒక విధముగ జీగురుపద్ధాముండును. ఇట్టివి తగ్గుట కష్టము.


ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

జలేశువువృత్తి, ఇప్పసిండి, ఉల్లిపాములు సమభాగాములుగా చేర్చి మెత్తగానూరి విశ్వవలచేసి పశువుమోకాళ్ళ మీద కట్టవలెను.


దూస్తే దోసెము, పూదిలే ఉళిక్కి అన్నట్టుగావాచి 5 సేద్యం.



సాంప్రదాయముగల ఇంగ్లీషుజాతి గోవులు



శ్రీ శరణు రామమోహనరావుగారి చక్క-ని ఆవుపెయ్య. కూచిపూడి గుం. జి.



శ్రీ గడ్డిపాటి కోటయ్యగారి అందములోను, బండపట్టులోను పేరొందినవి.
ప్యాపర్రు (తెనాలి తాలూకా)



శ్రీ పోపూరి వీరయ్యచౌదరిగారి చాలెంజి ఎద్దుల పెద్దపైజా—ఇసుకపట్టు
శిరిపురం (తెనాలి తాలూకా)

శిష్ట, వెలులిపాములు, పెద్దకైములు సమభాగములుగా చేర్చి మెత్తగానూరి లిళ్ళచేసి మ్రాచిరిగా కట్టవలెను. వాగముదినముల కొకసారి పరేగనమునకు ముందును వలెను.

వైరూప్య (Allopathic) వైద్యము

మార్లుదిగిన భాగములకు ద్విస్థిర్న వాడవలెను. లేక లినిమెంటునుగాని ఆయంటి మెంటునుగాని వాడుచు వచ్చినతగ్గును.

మలిమిడి (Sprain)

స్వభావము (Causes)

దీనినే గుడనులిమిడి యందును. ఇది ఒకవిధమైన దెబ్బను. పశువులకు ఆవృతస్థుడు వచ్చుచుండును. పశువు మోకాటి నుత్తిలోనున్న వశములు పాగును. మన మచ్చట తాకినయెడల పశువు చాలా గాఢపడుచుండును. అక్కడ చాపుగా నుండును. మూడుకొళ్ళమీదనే నడచును వేగిగా దెలికినయెడల కొలు భూమిగూడ నిలిచెట్టును. ఆ చాపు వడిగా నుండును. ఈ నొప్పి వాగు లేక సగ్గముదినముల వరకుండును. ఇక్కడ చిత్తు క్షయ కూడ నుండును. క్రమముగా ఆ చాపు పొక్కిపుంగుబడి కుండును. ఇంక వాచాపు పు మిపడమిడి తగ్గవచ్చును.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

పశువు కొలిగి నుత్తిలో నుండి కడిముసుగా పుట్టి ముట్టగానే కొది గోరువెచ్చనిది పోయవలెను. ఇటు గోరువు రుడివయ్యెను గోరువెచ్చని కడిముసులకు తగిలి నెమ్మదిండును. ఇట్లు చేయక మన క్రియలు నూనితో కడిముసుగా చుట్టుచును. దెలికిన స్థలమును కడలనీయరాదు.

ఆయుర్వేదముతో చిత్రిములముల వండి ఆచాపులకు రెండువెట్లు కట్టిక తగ్గును.

లేక చిత్రిములము, నవ్వాచాపులకు ఆచాపులకు మూడు కట్టు కట్టిన వేటలనే తగ్గును. ఇట్లు చేసినయెడల ఆ భాగము పొక్కిండు. తినువాత వెచ్చివూస రాసిత తగ్గును.

లేక నెల్లపుమ్మెత్తాను రిపెను, అప్పు మెత్తగా నూరి ఆ చాపులకు కట్టవలెను.

లేక సొంతి 1 తులము, పిన్నప్పి 1 తులము, మిరియాలు 1 తులము, చిత్రి మూలం 1 తులము నూరి ఆయుర్వేదముతో కట్టి పొక్కి గోరువెచ్చనిది కట్టవలెను.

లేక గొలిమిడాను గుప్పెడు- మిరియాలు 2 తులములు మెత్తగా నూరి ఆయుర్వేదముతో కట్టి పొక్కిపెట్టవలెను.

వైరూప్య (Allopathic) వైద్యము

కావునకు అప్పుడప్పుడు టర్పెంటైన్ రుద్దుచుండిన తగ్గును. లేక టింక్చర్ ఆయోడిక్ రెండువేళల రాసివ తగ్గును. లేక టర్పెంటైన్ లో ముద్దకర్పూరము, పోపు, అమ్మోనియా ఫార్టస్ కలిపి రాసివ తగ్గును.

గిట్టలకు క్రుళ్లుపుట్టుట

పశువునకు కాలిగొట్టుపడుటవలనగాని, తదితర ప్రణయలవలనగాని, మోటారు కారు, బండి మొదలగునవి గిట్టల మీదుగా పోవుటవలనగాని, శవలుపడి గిట్టలు తెగి పోవుటవలనగాని, గాయములకు చేతగాని చికిత్సలు చేయుటవలనగాని, ఈ క్రుళ్లుపుట్టును.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

ఈవ్యాధికి చికిత్సచేయుట చాలకష్టము. ప్రతిదినము కట్టుకట్టవలెను. క్రుళ్లుపండు నుండు పదార్థములువేసి చికిత్స చేయవలెను.

ముద్దకర్పూరము—2 టు, వన 1 టు, వ్యాసులైను 2 టు, కలిపి అచ్చట రాదు వలెను.

లేక బోరికొలసిడ్ అను తెల్లనిపొడివేసి కట్టుకట్టవలెను.

లేక జీడిఃత్తులు సేరుతెచ్చి త్రొక్కి చురు తీయవలెను. తరువాత నేరు గొట్టి క్రొవ్వు, అర్దసేరు మైసము, అర్దసేరు అవునెయ్యి, అర్దసేరు నువ్వులనూనె, అర్దసేరు అముదము, తిసికొని వచ్చి పై చురు కలిపి కాచవలెను.

తరువాత పశువుగిట్టకు రక్తమువచ్చుకట్టు క్రుళ్ళుతీసివేసి దానిపై చురుమ్మనున నట్లు కాచినతైలము పోయవలెను. తరువాత మైసము బిళ్ళగాజేసి దానిపైనవేసి మరె యాడు వేసికట్టుకట్టవలెను. ఆకట్టు మూడుదినములుంచి నాల్గవనాడు ఇదివరకు చెప్పిన లోషనుతోడిగి మరల మైసపుబిళ్ళవేసి కట్టుకట్టవలెను. పూడుమానువరకు నిట్లే చేయ వలెను.

వైరూప్య (Allopathic) వైద్యము

ఇదివరకుచెప్పిన లోషనుతోడిగి కార్బాలిక్ లినిమెంటుగాని, క్యాంఫర్ లినిమెంటుగాని, అయిడోఫారంగుగాని వాడినతగ్గును.

కాలిగొట్టు

పశువును నాగలికటి దున్నునపుడును జీతగాదు నాగలిమేడిసరిగా పట్టుకొనక పోవుటచేతగాని యేనురుపాటున దున్నుటచేతగాని పశువుల కాలిడెక్కలను నాగలిఃట్టు గ్రుచ్చుకొనిన యెడల పశువునకు ప్రాణాపాయముకూడ రాకలదు. ఈగాయముచే పశువు చాలవిచారముగా నుండును. తగినచికిత్స చేయనిచో కాలుచెడిపోవును. కాలు నిరుపట్టి వాడును. పోటుంగును. పశువు నడువజాలదు. లోతుగాయమునను వెంటనే చికిత్స చేయనిచో ధనుర్వాతముపోక మరణించును.

వైరూప్య (Allopathic) వైద్యము

ఆ గాయమునకు ఈగలను ముసరిచేయరాదు. చాల జాగ్రత్తగా నుంచవలెను. గాలి ప్రవేశించుండ కట్టు కట్టవలెను. గాయమును పొటానియం పర్మాంగనేట్ లోనునతో గాని తదితర లోనునతోగాని కడిగి టింక్చర్ ఆయోడిన్ స్వచ్ఛమైనది నేసి దానిపైన బొంక్ ఆసిడ్ అను తెల్లని పొడివేసి కట్టుకట్టవలెను. వాపులున్నయెడల వేడికాళ్లులు కాయవలెను.

లేక నల్లజీడిగింజ కాల్చి ఆ భాగమునకు అంటించవలెను.

లేక గాయపాపవేసి నాలుగుకట్టులు కట్టవలెను.

పశువు కాలిడెక్కలను మేప గ్రుచ్చునున్నయెడల జాగ్రత్తగా తీసివేసి నిరుపట్ట వుండ చేయవలెను.

కాల్చిన యిటుకరాతినిక గుడ్డ మడతలుగా పెట్టి దానిపైన చిన్నగ్గు ధారగా పోయుచుండవలెను. ఈప్రకారము మూడు నాలుగుదినములు చేయవలెను.

లేక టింక్చర్ ఆయోడిన్ ఆ వాపునకు రాయుము.

ఇనుకతో వేసికావులు తీయుట మంచిది. వామ, వెల్లులిపాయలనుగూడ నాలుగు కట్టులు కట్టుము.

మందగుది (String Halt)

పశువునకు ఈ వ్యాధి వాతమువలన వచ్చును. కాళ్ళు ఈక్కుచుండును. కొన్ని టికి లేరికగా తగులుటవలన కొద్దిగా కుంటుచుండును. వ్యాధి ముదిరినకొలది కాలు పైకి లాగుకొని నడువలేకపోవును.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

వామ 15 తులములు, దిరిసెనెక్క 15 తులములు, సొంతి 12 తులములా, చేదుపొట్లకాయలు 10 తులములు, పొగబంతిచెక్క 13 తులములు, చేదుబీరకాయలు

12 తులములు, పెన్నేరువేరు 10 తులములు, ఇవన్నియు కలిపి నూరి విమ్మకాయంత ఉండలు చేసి రెండుపూటల తినిపించవలెను. వ్యాధి ముడిచిన ఈ చికిత్సకూడ బాధితులెదు.

వైరూప్య (Allopathic) వైద్యము

రక్తిఫెడ్ స్పిరిట్ టింక్చర్ ఆయోడిన్ ను రక్తనాశమునకు ఇంటెక్సన్ యిచ్చిన తగ్గును. ఇంతకంటే మంచివైద్యము లేదు.

గిట్టల వస్తువులు

పశువులను బండ్లుకట్టి రాతివేలందు కంకరలోదమీద తోలుటచేతను, దీర్ఘ ప్రయాణములు చేయుదుండుటచేతను, సరియైన వాళ్ళములు డెక్కల అడుగు భాగమున కట్టించక పోవుటచేతను, పశువుల గిట్టలు అరిగిపోవుట చేతను ఈ వ్యాధి కలుగుచుండును. ఈవ్యాధి మందరికాళ్ళకును చేనుక కాళ్ళకును ఉప్పుడప్పుడు వచ్చు చుండును. గోరిజలు పగిలి వాపువుట్టును. ఆభాధచేత పశువు అడుగు నేయబాలడు. అచాగ్ర త్రగానున్నచో ఆవాపు వుండుగా మారి గిట్టలూడిపోవును.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

- (1) వేడినీటిలో ఉప్పుకలిపి డెక్కలమీద పోయుము.
- (2) గుగ్గిలము, మైసము, లక్క, సింహాశము ఒక్కొక్కటి పావుతులము వంతున తేచ్చి మెత్తగానూరి పొడిచెసి నూనెలో కలిపి కొంచెం డెక్కలలో పోసి దానిపై కాచిన వేడియిటుకరాతి పాడుముతో కాచవలెను.
- (3) ముండ్ల తోటకూరలను తేచ్చి ఉడికించి చెచ్చనిది కట్టవలెను.
- (4) కరక్కాయపొడి, కొత్తమన్నము పటికిబెల్లము సమానముగా తేచ్చి మెత్తగానూరి నొప్పిగల గోరిజలను పట్టించి ఉప్పునీటితో కాచవలెను.
- (5) తవుడు నీరు చిక్కగా కలిపి ఉడికించి దినమునకు ఒకసారి కట్టవలెను.
- (6) గుగ్గిలము బెల్లము నెయ్యి మైసము కలిపి రాయవలెను.
- (7) నిమ్మరసము, సైంధవణము, మేకపాలు, జల్లేడుపాలు, గుగ్గిలము అత్త చెన్నతో కలిపి రాయవలెను.

వైరూప్య (Allopathic) వైద్యము

జింకు అక్సైడ్ ఆయంటుమెంటుగాని సింపిల్ ఆయంటుమెంటుగాని వోరిక్ ఆయంటుమెంటుగాని వాడిన బాగుగా పనిచేయును.

మృగశిరలానేసిన పైరు మీసములు రావడమున వుట్టిన కొడుకు మేలు చేతురు.

గిట్టల నందున దుర్మాంసము పెరుగుట

గిట్టలకు దెబ్బతగిలినపుడు తగుచికిత్స చేయనపుడుగాని కాలిగొట్టుపడి గిట్ట చీలినపుడుగాని, యే దెబ్బయిన తగిలినపుడు శత్రుముచేసి సరిగా చికిత్స చేయ నపుడుగాని, యీ దుర్మాంసము పెరుగుచుండును. పశువు పనిచేసినపుడు గిట్టలసండున నున్న ఈ దుర్మాంసమునకు పులలు, గిడ్డలు, గ్రుమ్మకొని బాధనొందును. దుర్మాంసము పెరిగి బాగుగానుదిరిన యెడల శత్రుము జేయుట చాలకష్టము. కాబట్టి యిటువంటి పశువునకు వెంటనే దుర్మాంసమునకు చికిత్స చేయుట మంచిది.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

మీ తాలూకా వెటరినరీ డాక్టరుగారిచో శత్రుము చేయించి తగు చికిత్స చేయించవలెను.

అట్లు వారు దొరకనిచో దుర్మాంసమును పడునైన కత్తిచే కొనివేసి దానిపై న ముసాంబ్రము 1 తులము, పటిక 1 తులము, తెచ్చి పొడిచేసి జల్లేడుపాలలో కలిపి నూరి కొనినభాగముగా వేసి కట్టుకట్టవలెను.

లేక వారిదళము 2 తులములు, కనిరి 2 తులములు, కరక్కాయలు 2 తులములు, కరిమాపము 4 తులములు, ఉళిగికపప్పు 3 తులములు, ఉత్తరేణిచెక్క 6 తులములు కాల్చి పొడిచేయగా వచ్చినది మూడు తులములు తీసికొని మెత్తగ నూరి అముదముతో కలిపి మలముగా వండి దానిపై వేయవలయును.

పురుగు తొలుచుట

పశువు చర్మముక్రిందనుండు రక్తవాళిములో ఈ పురుగులు చేరి చర్మమును తినును. ఈ పురుగులు తొలవని నే రక్తము కారుచుండును. ఇట్లు శరీరమంతటనుకూడ తొలచుచుండును. ఒక్కొక్కప్పుడు నెత్తురు కారుచుండుట చూచిన చాలా భయం కరముగా నుండును. దీనివలన పశువునకు ప్రమాదములేదు. గాని అగాయముపై ఈగలు వ్రాలినయెడల పుండ్లము పురుగులుపడి పశువును బాధించును. కాబట్టి ఆరంభములోనే చికిత్స చేయవలెను.

చికిత్స

మైలుకుత్తవు ఏరుగాని, పటికపొడిగాని, అద్దుడుండవలెను. లేక వసపొడి అం టించవలెను. గంగసింధూరము చెన్నయు కలిపి రాయవలెను. మైలుకుత్తము దొండాకు పసరు కలిపి రాయవలెను.

ముఠునంలో పుట్టిన మొక్క మీసం తిరిగినప్పుడు పుట్టిన కొడుకు పుండవలయును.

ఈ పురుగు తొలకుపురు పెప్పుడిగా పట్టాదుతో పట్టుకొని లాగవలెను.

పులిపిరికాయలు

పశువు శరీరమునుండి ఈ పులిపిరికాయలు వాటంతటనే పుట్టును. కొన్నికాయలు వాటంతటనే పూడిపోవును. వాటిని కోయరాదు. అట్లు కోసిన రక్తమునాపుట చాల కష్టము. ఈ కాయలు రక్తనాళము నాక్రిందించి యుండును. ఇవి చర్మమున కెత్తుగా నుండినయెడల బలమైన దారముగాని, గుఱ్ఱపువేంట్రుకలుగాని తెచ్చి గట్టిగా దుట్టి వారకుండ ముడివేయవలెను. కొన్నిదినముల కవియే వాటంతటవి యూడిపడును.

మెడనరము పట్టుట

దీనినే మిడియందురు. సాధారణముగా రైతులు ఎదులతో పంజెములు వేసికొని బండ్లమీద ధాన్యముగాని గడ్డిగాని బరువుగాని వేసి బుద్దగానుండు కాలువలలో లాగించెదరు. అటువంటి సమయములలో పశువునకు మెడనరము సాగి ఒకవిధమైన నొప్పిని కలిగించును. అప్పుడు మెడ నటునిలు త్రిప్పుకాలదు. ఏపని చేయజాలదు. మేలిమానును. మందమతిగానుండును. క్రిమేణ తెలివి రప్పిపోవును.

చి కి ర్న

అముదముగాని వ్యాధులైనగాని నొప్పిగల భాగమందు మంట పుట్టునట్లు తోమి నడియినుక కాళ్ళులుతీసిన తగ్గును. ఈప్రకారము బాధతగ్గువరకు చేయవలెను. ఇది వాప్రత్యక్షానుభవము.

ఈ కొమ్ముల సందు మొదలుకొని తోకముడివరకు ఒక దారముచే కొలతతీసి ఆదారమును మడతవేయవలెను. మడచిన దారమును మరల కొమ్ములసందునుంచి వెన్ను మీదికి కొలతవేయగా మొదటికొలతలో సగము అగును. ఆచోటగుర్తుపెట్టి వెన్నుకు అడ్డముగా అగుర్తుమీద వాతవేయవలెను.

ఈ జిల్లేడువేరుపాడి వేపనూనెలో కలిపి నొప్పిగలచోట మర్దనచేయవలెను.

ఈ కెముడుపాలు అముదముకలిపి మర్దన చేయవలెను.

ఈ వెన్నలో దుఘ్మపాపపసరు కలిపి రుద్దవలెను.

ఈ మెడప పెద్దదుంగకట్టి చెరువులో యిడించిన తగ్గును.



మాద వగైరా వ్యాధులు

ఇరువది మూడవ భాగము

తోకమాద (Cancerous tail)

దీనినే తోకగురుజ అందురు. పశువుతోకయొక్క కుచ్చుండు సానమానండు ఈ వ్యాధి వుట్టును. కుచ్చుపైభాగమంతయు నల్లబడి వెంట్రుక లూడిపోవును. తోక చివరభాగమున ఉంగరములై మొలికలు తిరిగి బిరుసుగానుండును. క్రమముగా తోక కుచ్చు వెంట్రుక లూడిపోయి మొండితోకగానుండును. పశువు సరిగా మేతమేయక బెట్టిచూపులు చూచుచు తిరుగుచుండును.

చికిత్స

పశువుతోక చివరభాగము కత్తితో తెగగొట్టి గోరువెచ్చని నేతిలో మంచ వలయును. తరువాత కలబందపట్టులు, సైంధవలసణము, ఆవాలు, అల్లము సమభాగ ములుగా తెచ్చి నూరి పులికలిలో మూడుదినములు నానవేసి పూటప గొట్టము త్రాగించ వలెను. వెండ్రుకలు మొలచుటకు ఉమ్మిలో నీలిమందును నూరి 4, 5 దినములు రెండు పూటలు పట్టించుచుండవలెను.

లేక తోక తెగగొట్టినప్పటికి కూడ మగల తోక చెడిపోవునుండును. కాన ఎక్కడకు తోక కుచ్చి ఎండిపోవునో అంతవరకు అనుమానములేపండ తెగగొట్టి మానెలో మంచవలెను. తరువాత టింక్చర్ ఆయోడిన్ ఆవుండును రాయవలెను. ఈగల ముసర నీయరాదు. తోకఎముక ఉంగరములమాదిరిగా ఉడిసవుడు తోకమాదయని గ్రహించి అనుమానములేపండ నరకవలయును.

నైరూప్య (Allopathic) నైద్యము


ప్రతిదినము లోషనునీటిలో కడుగుచు టింక్చర్ ఆయోడిన్ పూటయిన కార్బా లిక్ ఆయిల్ గాని రాయుచుండిన తగ్గును. లేక స్ఫాల్మిన్ ఆయంటు మెంటుగాని ఫిన్లైల్ ఆయంటు మెంటులో కొద్దిచుక్కలు కార్బాల్లిక్ ఆసిడ్ కలిపిగాని రాసిన తగ్గును.

కొమ్ముమాద (Cancerous horn)

పశువుయొక్క కొమ్ములు ముచేతివేళ్ళకును, కాలి వ్రేళ్ళకునుండు గోళ్ళుగాని పదార్థ ముతో నిర్మింపబడినవిగా నున్నవి. ఇట్టికొమ్ములు జంతువుయొక్క యావజ్జీవమును

ఆరుద్ర ప్రభువు వాదమున విత్తిననువేస్తే ఆరింభములు చెనును.

పెరుగుతుండును. అకస్మిముగా నూడవలయునేగాని తమంతటని ఉండవు. ఒకానొకప్పు డేదైన దెబ్బతగిలినపుడు ఇట్టికొమ్ము లూడిపోవును. కొమ్ము తిరిగి క్రిందపడినపుడు నిజమైన కొమ్ముఅమర్చబడియుండును. అకాయమట్టును స్పర్శగ్రహణ శక్తిగల చర్మ ముమర్చబడి యుండును. దానియం దసంఖ్యాకములగు నాడులును, రక్తవాహికలును



గలవు. నిజమైనకొమ్మును నటికీకను బాధకలుగ నేరదుగాని, ఈకాయభాగము సంత స్వల్పముగ న్నుచ్చినను ఎక్కువబాధ కలుగును. కాయమట్టునుండు చర్మములో నాడు లును, రక్తవాహికలు నుండుటచేతనే ఈబాధకలుగుచున్నది. ఈ కాయ అడుగు భాగ మున మెదడను పదార్థముండును. పై పటమును చూచిన మీకే అర్థమగును.

ఈ మెదడుభాగమునకు చీము సంబంధమైన నూక్కుజీవులు ప్రవేశించి కొమ్ము మాడయను వ్యాధిని కలిగించును. ఈ మాడ ఒక కొమ్మునకుగాని, రెంటికిగాని రావచ్చును. తలకు కొంచెము గురద ప్రాగంభమయి, యెఱ్ఱని పర్ణముగల బొబ్బలు కనపడును. ఇవి క్రమముగా పనుపువర్ణముగా మారును. ఇవి చిలికి లేనట్లుపై ఆకారమువహించి పొక్కులుకట్టును. ఈపొక్కుల యడుగున పుండ్లుయేర్చుచును. ఈవ్యాధిని ఆశ్రద్ధ చేసిన యెడల పశువున కపాయము కలుగును. ఇది బహుమొండివ్యాధి. పశువు తలలోనున్న మెదడుకు ప్రవేశించి క్రమముగా కొమ్ములోని భాగముకూడ తిరుచుండును. ముక్కుల నుండి చీముగాని, చీమునెత్తుకలుగాని. పడుచుండుటన పశువు కొమ్ము వాలిపోవును.

విరిగిన కొమ్ము మాడమైన పశువు చాల శుష్కించి పోవుచుండును. ప్రత్యేకముగా ఈవ్యాధికలిగిన పశువు ఎక్కువగా ఒలియుచుండును. పశువునకు కాలిగలుగును. ఈస్థితిలో పశువు చనిపోవును. నెత్తురుచిగుర్చుకూడ నెమ్మదికొడు.

మోచు రిక

ఈ వ్యాధి సామాన్యముగా చికిత్సపలొంగదు. కాబట్టి ఆరంభములోనే ఈ చికిత్స చేయవలయునుగాని కొమ్మువాలిన తరువాత నేమియు లాభములేదు.

అనేకమంది పశువైద్యులు మేము నెప్పుదిచేసెదమని కొంతడబ్బు మండుఖర్చుకలిగి తీసికొని తరువాత మావల్ల కాదందురు. ఇది నా స్వాభవము.

మన రైతులలో చాలమంది నెప్పుది యగునేమోయని ఆతురతతో అనేక చికిత్సలు చేయించెదరు. కొన్ని మంచి బండిగిత్తలకు వచ్చినపుడు రైతు విచారము, ఆతురత చెప్పవలసికాదు. మా పశు చికిత్సాలయము దగ్గరకుకూడ అవుడవుడు చక్కని గిత్తలు వచ్చును. వాటిని చూచిన నాకే చాల విచారముగ నుండును.

చికిత్స

కాని ఇటువంటి వ్యాధిగల పశువు కొమ్ముకొని ఈ దిగువ చికిత్సలు చేయవలెను.

కొమ్ముకొని వెంటనే కలుబెల్లము వెండుకలు తెచ్చి పైననే యిసుపకడీతో కొల్చవలయును. ఇట్లు కొల్చినచో కొమ్ములోపలనుండు పురుగులకు వేడితగిలి చని పోవును. తరువాత కొల్చిన భాగములో చూసువన వురిపాలు పోయవలెను. లేక ఇంగిలీకము, ఇటుకరాలిపాకుము, దురిచెక్క చూర్ణము కలిపి కొమ్ముగాములలో పోసి కట్టుకట్టవలెను. తరువాత సారాయి చటాప, కాజిఆమరసము చటాప కొమ్ముకొనిన వైపు చెవిలో పోసి కట్టుకట్టవలెను.

అప్పుడప్పుడు ఫిన్లైద్రావకముతో కడుగుచుండవలెను.

లేక వామింటాప మూడుగు ప్సెట్లు, దిరులిపాయలు 2 రుతుములు, వస 1 రుతుము తీసికొనివచ్చి నూరి రసముతీసి ఎర్రక్క కొమ్మువ్రాచినచో ఆరక్క ముక్కురంధ్రములలో పోయవలెను.

వల్లబీడిగింజలు నువ్వులుకలిపి పండు జిల్లేడామరసమును నూరి కొమ్ములకుట్టు పట్టించును.

ఆంథ్రాక్ష (Allopathic) వైద్యము


కొమ్మును కొనివేసి లోష్యుతో కడిగి ఘాటుగల మందులను వాడవలెను. గట్టి పడుటకు అప్పుడప్పుడు ఫార్మలిన్ లోష్యును వాడుట మంచిది.

పార్శ్వపుమాద

పశువు మొదలులో ఒకవిధమైన నూక్కుబీవులు పుట్టితే ఈ రోగము కలుగును. దీనినే ఆర్థ్రాంగవారమనియు, పార్శ్వపు వారమనియు చెప్పవచ్చును. ఈ రోగము

ఆరుద్రలో అడ్డెను చల్లితే పుట్టెను పండును.

శిశులవ్రతములో నున్న పశువులకు కలుగుచుండును. పశువుచెనడు సగభాగమునకే సోకును. త్రింది పటమును చూచిన విశదముగా తెలియును.



పశువు రెనరేలను ఆరంభములో అటునిటు ఆడించుచుండును. ఒకముక్కనుండి మాత్రమే చీమిడివంటి పదార్థముకారుచుండును. చెవిలోనుండి కూడ ఒకవిధముగ వ్రవనము స్రవించుచుండును. ఒక కొమ్ముభాగమునకు, కొమ్ముచైపున నున్న చెవికి ముక్కురంధ్రములకు ఈ వ్యాధిసోపను. ఒకకన్ను లోపలికిపోవును. నోటినుండి చొంగ పడుచుండును. ఈ వ్యాధిని ఆరంభములో గుర్తించలేక కొమ్ముదొలలందురు. కాబట్టి జాగ్రత్తగ పరీక్షించవలెను. పశువు పచ్చని, చిక్కని చీమికి చెవులనుంచి ముక్కుల నుంచి పడుచుండును. చాల గుర్వాపనవేయును. వ్యాధి ముడినకొలది తుప్పెతుప్పెలుగ చీమిడి పడుచుండును. ఈ చీమిడి కొడిగ్రుడ్డులోనుండు పచ్చని ఆకారముగనుండును. పశువు శుష్కించిపోవును. చెవిలోపురుగులు పడును. పశువు చూరుటకు చాల అసహ్య ముగా నుండును.

చికిత్స


ఈ వ్యాధికికూడ తగిన చికిత్స లేదు. ఇదియును మొండివ్యాధియై యున్నది. ఈ వ్యాధి తగిలిన పశువు 5, 6 మాసములవరకు జీవిండును. తరువాత చనిపోవును. కాబట్టి ఈ వ్యాధిగల పశువును ప్రత్యేకస్థలము నుంచవలెను. ఇది అటువ్యాధియై యున్నది. పశువుముక్కులను, చెవులను, లోపముటిలో కడిగి టింక్చర్ ఆయోడిన్ చెవిలో వేయ వలెను.

పశువుకొమ్ములనుండిమూతివడు దుక్కలు కెట్టవలెను. చెవిదట్టు మూడు దుక్కలు కెట్టవలెను. మచ్చిలిగుంటయెద్ద ఒకదుక్క పెట్టవలెను. ఈవ్యాధి నెల రెండు నెలలవరకు యుండునుగాని త్వరగా తగ్గదు.

చిన్న పుకాయల కారెలో చిట్టెను వడ్లు చల్లితే పుట్టెను వడ్లు పండును.

చెవిమాడ (Cancerous ear)

స్వభావము (Causes)



చెవిగూబలో వాతసంబంధమైన వురుగులుపట్టి వురుపులు లేకుటగాని, వాత సంబంధమగు అస్వస్థతవలనగాని, ఈ వ్యాధి కలుగును. ఇవి లేకుటచే చెవిమధ్యభాగము, బాహ్య భాగము, వెలుపలిభాగమునూ వాపుపుట్టును. ఆ వాపురతన పోటు అధికమై బాధ కలుగును. పశువునకు చలిగాలి తగిలివస్తును, అటునిటు తిరుగునపుడు, మేత తినునపుడును నొప్పిగలుగును. ఈవ్యాధికితగిన చికిత్స చేయనిచో వురుపులు పెద్దవి చెవిని వ్రేలాడజేయును. చెవిమొదట చాల వాపురతనొంది యుండును. చెవియింట భాగము నందికూడ వురుపు లుండును. ఈ వురుపులు ఎఱ్ఱగానుండును. వురుపులు చిలికి దుర్వాసన వేయును. ఈగలు ఆ రసపైసవ్రాలి పురుగులుపట్టును. క్రమముగా చెవిభాగమునంతన వురుగులు తినును. పశువు క్షీణించును చాల విచారముగా నుండును. ఈ దుర్వాసనను రిక్కిల పశువులు పసిపట్టును. పైపటమునందు చూచిన మీకే తెలియును.

ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము

ఈ వ్యాధి ముదిరినయెడల నెమ్మదియగుట చాల కష్టము. పెద్దజంతువునకు, చిరజీవమునకు మందీనుపలెను. చెవిదుట్టు వాపున్నయెడల వేడికొత్తులు తీయవలెను.

చెవిలో బొక్కవాకునకు పోసి దూది పెట్టవలెను.

లేక వామింటాకు ఉప్పుతోనూరి రసముతీసి చెవిలో పోయుము.

లేక మూర్క్కొండాకునకు 4 తు, చిగురుప్పు 3 తు, విరిమాపము 2 తు, తెచ్చి గోమూత్రముతో కలిపి చెవిలో పోయుము.

లేక నీమకసిందాకు, రారినన్నము నూరి చెవిలో పిండుము.

లేక వేపనూనె $\frac{1}{2}$ తులము, గోరింతాపనరు $\frac{1}{2}$ తులము, వేపావనరు $\frac{1}{2}$ తులము, మిరియాలపొడి $\frac{1}{2}$ తు కలిపి పోయవలెను.

చెవి మొదటి భాగమునందు రీ, రీ చుక్కలు పెట్టవలెను.

వైరూప్య (Allopathic) వైద్యము

హైడ్రాజీరి పర్మాన్గ్నైట్‌తోగాని, పర్మాంగ్నేట్ లోషనుతోగాని చెవిని కడుగుచు టింక్చర్ ఆయోడిన్‌లో వేపనూనెకలిపి కొన్ని చుక్కలు వేయుచువచ్చిన తగ్గిపోవును.

తలమాద (Cancerous head)

వాతము వలనగాని, తలశుభ్రముగాలేకపోవుటవలనగాని, మెదడులో యేవ్యాధి యైన కలుగుట వలనగాని, పశువుల కీవ్యాధి కలుగుచున్నది. ఈవ్యాధి ఒకవిధమయిన మాక్స్‌జీవవలన కలుగుచున్నది. మెదటి భాగమున వురుగులులేరి ఈ వ్యాధి కలుగుచున్నది.

తలలో చీము సంబంధమైన పురుగులులేదును. ఆరంభములో దురదయ్యుండును. ఈపురుగులు ఎరుపు రంగుగా నుండును. ఈ పురుగులు శామరవలె గుండ్రముగ నుండక వంకరలుగ నుండును. కొంచెము పసుపు వర్ణము గల చీముండును. ఈచీమువలన పశువు భూమిమీద తనతలను ఆన్చుచు విచారముగ నుండును. వ్యాధి ముదిరికొలిది ముక్కులవెంట ఆచీము పడుచుండును. మెదడు క్రమేణ లేన తుట్టికారము వహించి తల మెత్తబడి పశువునకు బాధ యెక్కువై చనిపోవును.

చి కి త్న

ఆవుపాలు అర్ధశేరు, సొంటి $1\frac{1}{2}$ తు, వన అరతులము కలిపి ప్రతిదినము ఈ మోతాదు వంతున పక్షము దినములు త్రాగించవలెను.

తలపైన పురుగులను చంపు మందుచే మర్దనచేయుచుండవలెను.

లేక నూరేకారము $\frac{1}{2}$ తు. నీరు అర్ధశేరు కలిపి మెదటిపైన పోయవలెను.

గుట్టపుమాత్రము, నిమ్మకాయరసము, హరితికర్పూరము కలిపి రాయుము.

గంధకపుపొడి 2 తులములు, మెలతుత్తముపొడి 1 తు, పటికపొడి 1 తు వ్యాసలెను రీ తు. కలిపి పూయుము.

పుబ్బలో పుట్టెడు చల్లుటకంటే ఆక్లేషలో అడ్డెడు చల్లుట మేలు.

వైరూప్య (Allopathic) వైద్యము

కార్పాలిక్ ఆయంటుమెంటుగాని, లేలిక్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఆయంటుమెంటుగాని లేక అయోడిన్ ఆయంటుమెంటుగాని రాసిన తగ్గును.

వంపరవాపు (Scrofulous Tumours)

పశువు చెవిక్రిందుగా మెడపను, దవుడక్రిందుగా నుండు స్థానమునందును ఈ వ్యాధి కలుగును. ఈ వాపు తరచుగా చలిగాలి తగులుటచేత కంఠమువరకు వ్యాపించును. గడ్డలు గడ్డలుగా లేచి వాచును. ఈవాపుగల భాగము గట్టిగ రాయినలె నుండును. అందువలన వెంటనే చేయనిచో ఆవాపు పెద్దవుండుగా మారి పశువున కూపిరి యాడక చనిపోవుటయు గలదు. కొన్ని పశువులకు గుండెలోని రక్తముచేత నిరుగా మారి వాపుగావుట్టి చనిపోవును.

చి కి త్స

దీనికి వేడికాపులు తీయవచ్చును.

లేక చవుకు ముష్ము కలిపి వెన్నవెంట కుక్కలు పెట్టవలెను.

లేక తురక వేపను నీటిలోవేసి కాపులు తీయవలెను.

లేక బండిగురివిండాప పసుగు పావుసేరు, ముష్ము 4 తులములు కలిపి వాపులకు రాయవలెను.

లేక చింతపండు పులుసు అంసోలెను, మున్నీండి గిడెకు కలిపి రాయవలెను.

ఇదివరకు కల్లవాపులకు చూపించినట్టిగా ఈ వ్యాధికి కూడ నాతలు వేయవచ్చును.

చేరు వాపు

ఇదివరకున్న పాతగాయములలో నూక్కుడిపులు చేరుటవలనగాని చలిగాలికి లోగగుటవలనగాని చేరుయొక్కలేకుదలవలనగాని గ నేరియావ్యాధివలనగాని అతిమాత్ర వ్యాధివలనగాని ఈవాపు కలుగవచ్చును.

లక్షణములు

మృ. పశువు అంగముమీదగాని లేక అంగముమీదనుండు తిత్తిమీదగాని వాపు పుట్టును. అది క్రమముగా పెద్దదై చితికి పుండగును. పశువు చాల బాధపడుచుండును. అప్పుడప్పుడు కండ్లనుండి నీరు గార్చును. వాపు ఎక్కువైనకొలది పశువు నడువజాలదు. మూత్రకోశము వాచును. మూత్రము పోయలేక బాధపడుచుండును. ఈవ్యాధి పేగులకు కూడ వ్యాపించును. ఇట్టి సమయములో పశువును ఆపాయము కలుగును.

అశ్వేషలో పూడిచినట్టుయితే అడిగినన్ని ధాన్యా.

చికిత్స

ఆరంభములోనే ఈ వాపునకు వేడికాపునీటియుట మంచిది. తేలికయగు ఆహారపదార్థములు పెట్టుచుండవలెను.

నల్లజీలకర్ర 4 తులములు, ఉప్పు 1 తులము, నల్లఉమ్మెత్తాప రసములో మెత్తగా నూరి టండలో పోసి ఉడికించి అతైలమును వాపునకు రాయవలెను. తరువాత నీడక నిప్పుచే కాచవలెను.

లేక చిన్నపిల్లల నీరుడు 2 భాగములు, ఉప్పు 1 భాగము కలిపి అనీరుకు బాగుగా ఇగురించి అందులో ఉప్పు 2 తు. ఉత్తరేణిభస్మం 1 తు. కలిపి పశువునకు బాగాగా పెట్టుచుండవలెను.

లేక గచ్చాప 5 సిడికల్లు, అనాలు 1 తు. నల్లజీలకర్ర 1 తు. వెలులిపాయలు 1 తు. త్రొక్కి ఉండలుచేసి దీపమున కొకటి వ్రతున తియపించుచుండవలెను.

అట్టువాపు (Yoke gall)

ఎదు లెక్కువగా బరువును మోయుటవలనను బురద నీలలలో బండ్లులాగుట వలనను, ఏనుగునిరాములకు రాత్రివిపర్శ్య బండిపని చేయుటవలనను, మెడమీద అనెడికాడి గరుడుగా నుండుటవలనను, పగ్గపురాసిడివలనను, బండి ముంగు వెనుక బరువులు సమానముగ లేకపోవుటవలనను, అచ్చటి చర్మము ఒరిగిపోని పోవుటవలనను, క్రొత్తమాడలను కలుపుచువును మెడమీదకాడి అనెను ప్రదేశమందు, చెనుట ఎక్కువగా పట్టుటవలనను, పశువుచర్మము ఎక్కువగా బియ్యముగా నుండుటవలనను ఈవాపు కలుగుచున్నది. కొన్ని వాపులు మెత్తగాను దును. మరికొన్ని గట్టిగా నుండును.

ఆస్తలములలో ఆరంభమును దుండగానుండి క్రమముగా అది గట్టిపడి వాపుగా పైకి కొంచెము దేలును. ఈవాపు నానాటికి పెద్దదియై పెద్దగుమ్మడికాయంత పరిమాణము కలదగును. ఈ వాపులో చెనుటరుండును. మరికొన్ని వాపులు గట్టిగానుండి పశువు పనిచేయలేక మెడ నలుగుటు త్రిప్పుచుండును. బలవంతముగింప పనిచేసినయెడల మెడ నలుగుటు త్రిప్పులేక మిక్కిలి బాధపడుచుండును. మిగుల విచారముగానుండును. గట్టిగానుండి వాపు కొన్నిదినములవరకుండి పగిలి రసికొరును. గుమ్మడికాయవలె నుండు వాపును శస్త్రము చేసిచో దానినుండి మరికొందరు గారును. ఈవిధ తగ్గినతియవారే పశువులకు బాధతిగ్గును. కొన్నిమాడలకు గంటి అట్టువాపు కలుగును. ఈవాపు క్రొత్తచేసి అట్టుమీద వుండువడును. ఈపుండు పొరలుపొరలుగా నుండి ఎరుపురంగుగానుండును. అది త్వరితగమనము. కాని అట్టువాపువలన పశువులంత ప్రాణాపాయము లేదు గాని మిగుల బాధనొందును. అది భాగముంత వాపుయుండి నెత్తురున్న పశువు కొంత కాలములో మరణించును.

చికిత్స

గట్టిగానుండు వాపులకు వెంటనే ఇసుకవేయించి కాపులు తీసివ వెంటనే తగును.

వాపు కురుపుగాలేలి పూడయి పగిలినయెడల పటికీ టిచే కడగవలెను.

అట్టులయందు ఎరువు, నలుపు, తెలుపు రంగులుగల కొయ్యగండలు పెరిగిన యెడల శస్త్రముచేసి తరువాత కలుదెల్లము తలవె ద్రుకలు మెత్తగానూరి ఆ పుండుపై పెట్టి అగ్నిచే కల్పవలెను.

వాపులకు

బండిగురివెంచాడు పసురు 6 తు, తడిరాతిమున్ను 2 తు, కలిపి రాయుము.

లేక విల్లడుమసి 2 తు, నిమ్మకాయంత వెన్నపూస కలిపి ప్రతిదినము వాపునకు రాయుము.

లేక పరిపాలములందుండు సర్తలగా నెల్లనివి తెచ్చి కాల్చి మన్నముచేసి అము కములో కలిపి రాయుము.

లేక బొంతజెముడుపాలు గిద్దెడు, ఆపు కేడసము లే గిద్దలు, కలిపి వాపునకు పట్టించుము.

లేక కొందరు ముక్కుకొననుండి తోకతుదివరకు గ్రాటిచే కొలిచి అశ్రాటిని సగభాగముచేసి మరల కొలిచి అశ్రులనుండు చురకలు వేయుదురు.

గంగడోలుక్రిందవాపు (Amasarca)

ఈ వాపు వాతవోషమువలన వచ్చునని నా యభిప్రాయము. ఈ వాపు ముఖ్యముగా తళపు ముందురెండు కాళ్లమధ్య పైభాగమున వాచును. దీనినే మనవారు పేడ పురుగు పట్టుటవలన కలుగునని తలంచెదరు. ఈ వాపువలన పసువున కేమియు అపాయము లేదుగాని వ్యాధియుండి వాపు పగిలినయెడల క్రమేగా తగును.

ఆంధ్రములో కొంచెము వాపుండును. దీనివలనమునకు వ్యాధి పెంపొంది పశువు యొక్క గొ తు మొదలు గంగడోలు వరకును, ముంగుకొప్పున వాచును. లేగిక చికిత్స చేయక ఆవిధముగా నే యుంచినచో ఈ వాపు చాల కద్దరై కుసువునకు బాధ కలిగించును. క్రమముగా వాపు ఎక్కువగుచుండును.

చికిత్స

ఒక పసునైన చావతోగాని, సొంములుతోగాని ఆ వాపుపైక నెత్తురువచ్చునట్లుగా గీయవలెను. తరువాత ఉడికించిన పేడసమును, ఆ వాపునూద చీపురుకట్టచే కొట్టి

పుట్టలూ పుట్టడు చల్లుటకంటె మిక్కిలి మనెమ చల్లుట మేలు.

వలెను. కాని కొందరు వైద్యులు ఆ వాపును కత్తిచే చీల్చుదురు. వెంటనే రక్తము ఎక్కువగాకారి గాయము పెద్దదగును. మరల వెంటనే చెనువీరుచేరి పశువును బాధించును. ఇటువంటి సమయములలో వేడికాపులు తీయుటనుంచిది.

బండిగురివెండావపసరు వీరునున్న ముతో నూరి పశువు వాపునకు పట్టించ వలెను.

లేక అవిసె ఆకు వీరునున్నములో నూరి వాపునకు రాయుము.

లేక జల్లేడావపసరు గుడ్డుపాపపసరు చెన్నపూ, పసుపు కలిపి ఆ వాపు భాగమునకు వ్రాయుము.

బుడ్డ కొట్టుట

సాధారణముగా మనదేశములో గిత్తిలకు రెండు సంవత్సరములు మొదలు అయిదు సంవత్సరములలోపుగా, అనగా 2 పండ్లు మొదలు 6 పండ్లు వచ్చునప్పటికిగాని బుడ్డకొట్టరు. గిత్తిల బుడ్డకొట్టునప్పుడు త్రాడుగట్టి క్రిందకు పడద్రోసి వృషణములను గట్టిగా పట్టుకొని దానిపైనున్న నరమును చేతితో పైలగా క్రిందికి జారతీయుదురు. తర్వాత వృషణముల పైభాగమున నొక రోకలియు క్రిందిభాగమున నొక రోకలియు పెట్టి వృషణముల పైభాగమున గట్టిగా నొక్కి రెండవసరమును, కడుపులోనికి ప్రోయుదురు. తరువాత పైనున్న నరమును రోకళ్ళమధ్యనుంచి వృషణములలోనికి జారతీసి క్రింద కొట్టెదరు. అంతట వృషణములలోని మూలపదార్థము పిండివలె నగును. తరువాత రోకళ్ళు తీసి వృషణములకు ఆవుపేద, పసుపు కలిపి రాచెదరు. వెంటనే కొడిగ్రుడ్లు, పాలు పెట్టుదురు. పొగరుబోతు గిత్తిలకు రెండుముక్కల మధ్యనున్నకండను లావుగావట్టి దానిగుండ ఒక అంగుళము త్రాడు ముక్కలో దూర్చి కొమ్ములకు గట్టెదరు. ఇందుచే గిత్తిపొగరు తగ్గును. 10, 15 దినములకల్ల పశువు ఆరోగ్యముగా నుండును.

కాని యిప్పటి పరిస్థితుల ననుసరించి పశువులకు బుడ్డలు సరిగా కొట్టకపోవుట వలన ఆ భాగము వాచి పూర్తిడై మరల వెటరినరీ ఆసుపత్రులకు తీసికొనిపోవుచున్నారు. కావట్టి లోపలి పలుకంతయు పూర్తిగా నలుగునట్లు కొట్టినచో ఆవులమీదికి పోజాలదు. వృషణముల పైభాగ ముచ్చి 10, 15 దినములలో దానిలోపలి పలుకంతయు చీగమై తిత్తిమాత్రమే ప్రేలాడుచుండును. బుడ్డకొట్టినతరువాత ఇరువదిపాళ్ళ నేటిలో 1 పాలుకొర్పాలిక్ అసిడ్ ను కలిపి కొన్ని దినములు ఆ పుండుమీద వేసిన నెమ్మదియగును. బుడ్డకొట్టుట ఆరగంట పట్టును.

బర్లోజీ మాస్కు లెటరు

ఇదియొక పెద్ద పట్కారువలె నుండును. ఇది వెటరినరీ ఆసుపత్రులలో నుండును. దీని వీడివద్ద కొద్ది బలము నుపయోగించిన ఎక్కువ బలముగా నొప్పిపట్టు యేర్పాటు చేయబడినదిగ నుండును. ఇది మూనినపుడు నొప్పిటకు ఏర్పాటైన భాగములు ఒక

దానికి ఒకటి సందులేకుండా కలిసికొనియుండును. అందువలన వీటిసందున ఏమియుండి నప్పటికి అదియంతయు సలిగిపోవును. దీనివల్ల ఒక్కొక్క వకమున నిమిషమాత్రము నొక్కటచేత గుల్లు హరించుకొనిపోయి జంతువులు నశ్వంశకత్తమును పొందును. ఈ ఆపరేషను అయినతరువాత ఏవిధ మైన చికిత్సయు ఆవుసరములేదు. పశువులలో ఈ ఆపరేషన్ విత్తులు తీయబండగను, నెత్తురు గ్రాసుండగను చేయవచ్చును. ఈ పనిముట్టుచే వృషణముల దగ్గరనున్న సరములు నొక్కినప్పుడు బిష్మము శబ్దము విసబడును. తరువాత బోరిక్ ఆయింటుమెంటు గాని సల్ఫర్ ఆయింటుమెంటు గాని రాచి విడిచిపెట్టుదురు. తరువాత ఒకటిరెండు దినములువాచి క్రిమిన్ తగ్గును. ఈ పశువులకు జ్వరముగాని మర యొక బాధకాని కలుగదు. కనుక పశువులలో కలుపవచ్చును. కాని యీ ఆపరేషను చేయించుటవలన పశువు బుడ్డకొట్టి గాని బలము గలదిగా నుండవని అనేక మంది రైతులు చెప్పిరి.

కాని బుడ్డకొట్టుట ఒక అపరాధము పట్టుక. ఈ పనిముట్టుచే నొక్కినచో రెండు నిమిషములు పట్టును. బుడ్డకొట్టిన జంతువు లొక్కివాంములు వాపునల్ల బాధ పొందును. చాలకాలము వరకు వాపు తీయక గడిచినట్టి కాయలకు ఎక్కువ కాలము పట్టును. పై పనిముట్టుచే చేసిన, వాపు కొదిగి వచ్చినచో, వాపు దికితీ రెండు దినములలో తగ్గును. బుడ్డ కొట్టినపుడు జంతువు పడు బాధ చూడలేదు కాని యీ పనిముట్టు వలన కలుగ బాధ చాల తక్కువ.

గిత్తల బుడ్డకొట్టుటకు నశ్వంశకత్తముల లేవడం జేయుటకు చికిత్స మనరైతులు, గిత్తలు మొదలగు వాని బీజములను పలుగొట్టుదురు. ఇట్టిచే తీసివేయుట మొదలగు పనులు మానివేయు చున్నాము. కాని నుట్టికలు పంపు బోరుధ ప్రయోగముల వలన వానికి నశ్వంశకత్తము గల్గిన పశువునకు బుడ్డకొట్టమీస యీ వాని వైద్యమునందు జెప్పబడి యున్నది.

ఆవు క్రొవ్వు పావుకేరు, నక్కల పావులను కలిపి రెండు గడియల ప్రాతెక్కిన తరువాత తినించి వజ్రని ఒక ప్రతి పంపులో ప్రాముడి యున్నది.

గొంతులో పురువులు

పశువుయొక్క గొంతుకు శుచిగా లేక పురువుల వలన గొంతులో ఒక విధ మైన నూక్కుజేవులు ప్రవేశించి నిలువడం నుంచుటవలన గాని, గాలిపంపు, మగూది మున్నగు వ్యాధులు సోపటవలన గాని ఈ పురువులు పుట్టుచుండును.

గొంతుకు వాపునల నొందవచ్చును. వీటికి ఏ ఒకవిధమైన చొంగ పడుచుం డును. నోటినుండి దుర్వాసల పచ్చని పంపులు పుట్టుచు ఎరువురంగుగా నుండును. పశువు ఆపరిమితముగా బాధపడుచుండును. గొంతులో పోట్లు పొడుచుచున్నట్లుం

పుట్టులో చల్లప ముట్టులో ముట్టుకొనేది.

డును. టోపిరీల్పుట కష్టముగా నుండును. మేత మాన్యునదానిని తినిజాలదు. జాత మొదలగు ద్రవపదార్థములను త్రాగును.

చి కి ర్న

వెదురుగొట్టముగాని, పేముడువ్వగాని పశువు నోటియం దుంచవలెను. తరువాత ఆ గొట్టముగుండా మన చేతిని పోనిచ్చి ఆ తురుపులను తాకి కనుగొనవలెను. తరువాత పక్ష్యమునకు వచ్చినచో ఆ తురుపులను చిదుపవలెను. అపైక పటికిటితో కడిగి తగిన తుండు వేయవలెను.

ఉప్పు 3 తులములు, చేడిసీరు అర్ధసేరు కలిపి త్రాగించవలెను.


లేక పాతచింతపండు రసము అర్ధసేరు త్రాగించవలెను.

లేక నాకుడుపండురసము 10 తులములు లోపలి కీయవలెను.

లేక వెల్లులిపాయ రసము 5 తులములు త్రాగించవలెను.

గొంతుకలో వస్తువు లడ్డముపడుట

అహారవాహిక పశువుయొక్క గొంతునకు ఎడమభాగమందుండును. దీనికి స్పర్శ జ్ఞాన మధికము. అహారపదార్థములు దీనికి తాకిన వెంటనే దానిని లోపలికి పోనిచ్చి



వెనుకభాగమందు ముకుడుకొనుచు దానిని ముందువపు జగువును. ఇట్లు మేత నీరు కొంత పోయినతరువాత తిరిగి వెనుకభాగము ముడుచుకొనటవలన ఇది క్రిమ ముగా జరుగదు జీర్ణాశయములోనికి బోవును. ఇది జాలరుసంచివలె నుండును. మరియు పశువునోటికి నెమరు తెచ్చుకొనుట కూడ ఈమార్గముననే. ఈగొట్టము

యొక్క లోపలిభాగమే యెల్లప్పుడు తడిగా నుండును. అందువలన ఆహారము ఈ గొట్టముగుండా జారిపోవును వెనుకపుటయందు బొమ్మను చూచిన ఆహారసాళము నుంచి ఆహారకోశమువరకును భాగములను చూడుము.

పశువులు నమలవండగ నే చెరువగడలు, దుంపలు, తాటిపండ్లు, నారదినసులు, నుడవీలికలు మొదలగువానిని ఆకుకరతో తినునప్పుడు గొంతుక్లోవిలో ఆనగా పైన చెప్పిన ఆహారసాళములో చిక్కుకొని అడ్డుతగులును. వానికి వాడిగల అంచులుగాని, టెనలుగాని యున్నయెడల గొంతునకు గాయము లేర్పదును.

లక్షణములు

జంతువుయొక్క గొంతుక నొప్పిగా నుండును. దగ్గుచుండును. చొంగ కార్పు చుండును. కడుపుబ్బును. కడుపున్నివయెడల పశువు చనిపోవచ్చును. ఆహారసాళము కొన్నిటికి వాదును. ముక్కలగుండ నీరు కార్పుచుండును. కడుపుబ్బుపండ నుండిన యెడల కొంతకాలము జీవించును.

చి కి త్న

వెటరినరీ వైద్యశాలలో ఒకవిధమైన పనిముట్టు గొంతులోనికి దూర్చి అడ్డును తొలగించుదురు. పశువు గొంతుకను ఒత్తరాదు. ఒక యినుపకడ్డీని పశువు నోటికి బోనిచ్చి జాగ్రత్తగా లోపలికిగాని బయటికిగాని లాగవలెను. లాగినతరువాత మెత్తని మేత, నూకలజావ పెట్టవలెను.

స ర్వి

ఈ వ్యాధి వారోగములోగాని, పాండురోగములోగాని, రక్తప్రసరణమునకు అటంకము గలుగుటవలనగాని, వేడిగల పదార్థములను మేపుటవలనగాని రావచ్చును. సర్పము ఏమాదిరిగా త్వరగా ఆటునిటు ప్రావచుండునో అదేమాదిరిగా ఏ సర్పి పశువు శరీరమంతటను వ్యాపించును.

లక్షణములు

అంధములో పశువునకు జ్వరము కలుగును. పశువు కంఠములోపలనో, తదితర భాగములందో ఒకవిధమైన వరువులు లేచును. ఇవి లేచినవెంటనే త్వరత్వరగా ఆయా ప్రదేశములకు ప్రావను. నోరు తెరువజాలదు. నోటివెంట ఒకవిధమైన చొంగ కారు చుండును. దాహ మెక్కువగా నుండును. వ్యాధి ముదిరినకొలది నోరు తెరువజాలక ఒకవిధమైన దుర్వాసన కొట్టును. నాలుక నటునిటు త్రిప్పుజాలక రెండు దవుడల మధ్యగా కరచుకొనియుండును. మూతిభాగమందైనచో ఆ భాగమంతయు వాదును. ఉచ్చాస్వన నిశ్వాసముల నాటంకపరుచును. క్రమేణ కంఠముదగ్గరగాని, మూతినిద

గాని, యొన్ని వాళ్ళ గంగడోలునకుదిగున ఈవిధముగా 3, 4 దినములుండి ఉచ్చాస్యన నిశ్వాసము లాడక మృతినొందును.

చి కి త్న

చేదుటికర 1 తులము తీసికొని పేసేనోకిలికి ఆ పర్పిభాగములకు రాయవలెను.

లేక నల్ల ఉమ్మెత్తావరసము రాయవచ్చును.

తప్పకుండ విశేషమునకు నుద్యుతవలెను. పటికటితో నోటిని కడుగుచుండ వలెను.

హెచ్చరిక

ఈవ్యాధి తగిలిన పశువును ప్రశ్నేసింపఁబడు దుందు టత్వవసరము. అనుభవముగల వైద్యునకు చూపించి తగిన చికిత్సచేయవలెను. కొందరు మంత్రములకు పెట్టించెదరు. ఎన్నిమంత్రములు పెట్టినప్పటికి ఆంధ్రముల నే తగినచికిత్స చేయనియెడల లాభములేదు. ఈ వ్యాధి మనుష్యులకు సోపటకంటె పశువు ను నాలుగురెట్లు విస్తరించును.

చె వి లో చీ ము

చెవిగూబలోగాని, మధ్యగూబలోగాని, వ్యాధి నలుగును. ఇవి వాతమువలనగాని, కాకవలనగాని, లోపల వ్యాధి అగుట చి ప్పి వచ్చుగా లేదు. చలిగాలి తగులుట వలన ఈవాపు ఎక్కువై లోపల ఒకటివచ్చునపుడు స్పృహవిందును. ఒకటిరెండు దినము లైన తరువాత దురదపుట్టి పశువునొచ్చి లోక్కిద్రవము కారును. దీనినే చీము అందురు. ఈ చీము వచ్చితరువాత కొద్ది కాలములకు చెవిలో వ్రణముగా లేదు ఈ వ్యాధి త్వరగా నెమ్మదిగాదు.

చి కి త్న

ఈ వ్యాధిగల పశువులో పరిచయించరాదు. చెవిలో నుండు పోషికరస్యత చెవిని కొమ్మునకు కట్టవలెను. సబ్బురీటితో విచికారీ చేయవలెను. వాతమువలన చెవులో నుంచి రిసి కారురున్న చాలకొలఁతునకుగాని తగదు.

కలబందమట్లు కౌచి రుము లసి చీములే చెవులో రెండు మూడుపూటలు పోయవలెను.

లేక గవ్వనున్నము కాల్చి పొడిచేసి మూడుగా చెవిలోవేసి, తరువాత నిమ్మ తులును అరకులము పోయవలెను.

లేక వేపనూనె 10, 15 దుక్కలు పోయును.

లేక పటిక 2 తులములు, పసుపు 1 తులము కలిపి పొడిచుదును.

మాలపున్నమముగల మాదిగవ్యాధిన చల్లఁడు.

లేక గంజాయికూరరసము చెవిలో పోయుము.

లేక నిమ్మపండురసము $\frac{1}{2}$ తు, వేపచెక్కరసము $\frac{1}{2}$ తు, రసకర్పూరము $\frac{1}{4}$ తు కలిపి తేలిలో పోయుము.

లేక నీరుల్లిపాయల రసము 3 తు, మిరియపగంధం $\frac{1}{2}$ తు కలిపి పోయవలెను.

చెవిలో యేవ్యాధివలన నైన పురుగులుపడినచో పండుజిల్లేడాకుల రసము పోయుము.

లేక సారాయి 5, 6 చుక్కలు పోయవలెను.

లేక పసుపు, తురకవేపాకురసము కలిపి పోయవలెను.

పంటి నొప్పి

పంటియొక్క నగము లేకుదల నొందుటవలనగాని, దెబ్బతగులుట వలనగాని, ఈనొప్పి కలుగుచుండును. పండ్లమధ్య నుండెడి ఆహారము ద్రవ్యుటవలనను, నోటియందుండెడి పుట్టకొమ్మజాతి సంబంధముగ నొక పురుగు పన్నులవావరించి పంటినితీనును. ఇంక నివ్యాధి వాతకోగమువలన కూడా రావచ్చును.

చికిత్స

చిక్రిమాలము వేరురసము నొప్పిగల భోజనమునకు పట్టించిన తర్గును.

లేక టింక్చర్ ఫెర్రి-పర్ ఫ్లోరైడ్ 4, 5 తులము దూదితోముంచి పంటినొప్పి నైన పెట్టుము.

లేక పొగాకుపొడి అంటించిన యెడలతగ్గును.

లేక పిప్పరమెంటులూ 4, 5 చుక్కలు దూదితో ముంచి పండ్లపండున పెట్టుము.

లేక మార్కొండావ పసరు పట్టించుము.

ప్రక్కదంతములు

పశువు పండ్లు సమానములేక హెచ్చు తగ్గులుగా పెరుగుటచే మేత సరిగా తిన జాలదు. దవ్వడంబు నొప్పికలుగును. వాతకోగమువలనకూడా దంతములు హెచ్చుతగ్గులుగా కలుగవచ్చును. లేక దంతము ప్రక్రియ సరిక దంతము కలుగవచ్చును.

కారా:—ఇటువంటి దంతములను తీసివేయుటగాని లేక అవకాశితో అరగ తీయుటగాని మంచిది. పశువులను కొనువారు పండ్లుగాని, దంతములుగాని కదలుచున్న పశువులను కొనుట తగదనియు చాలజాగ్రత్తగా ఆలోచించి కొనుటమంచిదనియు నాయభిప్రాయము.

దంతముల రంగు మారుట

కొన్ని పశువుల దంతముల రంగుమారి నలుపుగా నుండును. దంతములందలి రక్తముచెడి రంగుమారును. ఈరంగు ముడినకొలది దంతములు గుల్లయై ఒకవిధమైన ద్రవము గలుగును. క్రమక్రమముగా ఆగుల్లలో పురుగులుపడి పశువు బాధనొందును.

చి కి త్స

ఇంగుపను నూరి ఆదంతములో పెట్టుము.

లేక పురుగులుపడిన యెడల జాగ్రత్తగా వగరుసితితో కడిగి ఇదివరకు చెప్పిన పురుగులకు వాడుమందు లుపయోగించవలెను.

దంతములు కదలుట

వారకోగమువలనగాని, నిక్కాకవలనగాని, యేదైన దెబ్బకగులుటవలనగాని, గట్టి పదార్థములు తినుటవలనగాని, వృద్ధాప్యము వచ్చిన పశువులకుగాని దంతములు కదలును. దప్రదధాగములకు వాతలు వెయుటవలన తగ్గును.

తా మ ర (Eczema)

పశువు శరీరములోనుండు రక్తము చెడుటవలన ఈవ్యాధి కలుగుచున్నది. పంగా యుడ్ అను నూక్కిజీవివలన కూడ ఈవ్యాధి కలుగుచున్నది. ఇది లేతజంతువులకు తరచుగా వచ్చుచుండును. పశువుతలమీదను, ముఖము, కాళ్ళు, మెడ మొదలగు భాగములందును లేచును. చర్మముమీద మచ్చలుపడి నలుపువర్ణముగా నుండును. ఈ మచ్చలు గుండ్రముగానుండి ఒకనాణెము పరిమాణము కలిగియుండును. ఈవ్యాధి గాలివలనను, తాగుదువలనను మనుష్యులకు కూడ వ్యాపించును.

చి కి త్స

పశువు కేవలము బలము చెడియుండినయెడల విరేచనమునకు మందీయవలెను. మరుగాదు పశువుదేహము సబ్బుతో కడిగి ఆరిన తరువాత 2½ గు. గంధకపు పొడిని, అర్ధశీర నూనెలో కలిపి రాయవలెను. ప్రతిదినము జౌషధప్రమాణముగా గంధకము కడుపులోనికి యిచ్చుట మంచిది. పశువు గుక్కిలి శుష్కించినయెడల అన్న భేది, నేల నేము, సొంటి, ఉప్పు కలిపి ప్రతిదినము బలము వచ్చువరకు పెట్టుచుండవలయును. ఉప్పును మాత్రము మేతతో చేర్చి తప్పుక పెట్టవలెను.

లేక పశువులకు తామరపన్ను ఒకటియుండును. అది అనుభవము గలవారితో తీయించిన తామరసోవును. ఈపన్ను ప్రత్యేకముగా ఒక ప్రక్రియ విధిగానుండును.

X జి

ఇది పశువులకు సంభవించును. ఒకానొక చెడుగాలివలన యీ నూత్నజీవులు పశువుదేహములోపల ప్రవేశించును. ఈపురుగులను “ఫారెస్టెటు” జీవులందురు. ఇవి చర్మములోనుండు రోగపదార్థము తిని చర్మమును తొలచి లోపల గ్రుడ్లుపెట్టి పొదుగును. ఇది వేడిరోగపదార్థముండలమువలన కూడ కలుగును. కొన్ని పశువులకు ఈగజ్జి దట్టముగానుండి దురద వచ్చుగా నుండును. ఇది మెత్తని దేహమునందెక్కువగా వ్యాపించును. ఈవ్యాధి ఎక్కువగా మగపశువులకు కలుగును. వెండ్రుకలు రాలిపోవును. పొక్కులులేచి పక్కమై చగిలి పసిమివర్ణముగల ద్రవము కారును. ఇది ఎక్కువైనకొలది గోడలకు కట్టుగొయ్యలను రుద్దుకొనుచుండును.

చి కి త్స

గంధకము 1 తు, మైలతుత్తం $\frac{1}{2}$ తు, బోరికాసిడ్ 2 తు, వ్యానులైను 4 తు కలిపి రాయవలెను.

లేక నన్నని గోనెపట్టాతునక తెచ్చి కాల్చి మసిజేసి ఆముదములో కలిపి రాయవలెను.

లేక పెరుగుతో తుపాకిమందు కలిపి రాయవలెను.

లేక పచ్చిపొగాకురసము పట్టించిన నుంచది.

లేక కామంచాకుపసరు పట్టించుము.

కాలిన బొబ్బలు (Burns)

సాధారణముగ పశువుశరీరమునూడ వేడినీరు, వేడిగంజి యెర్రగా కాలిన యిహప వస్తువులు మున్నగునవి ఆకస్మికముగా పడినపుడు గంధకద్రావకము మొదలైన ద్రావకములు తగులునపుడు, పశువుశరీరము కాలును. దేహమునూడ తేలికగా కాలినచో యెట్లుబడును. దేహము మాడకాలినచో బొబ్బలగును. పశువుదేహము యెక్కువగా కాలినయెడల దాని కపాయముకూడ సంభవింపవలెను. శరీరమునూడ పుండ్లు పడినపుడు నూత్నజీవులు గాలివలన లోపలికి ప్రవేశించును. జాగ్రత్తగా కాపాడవలయును. బొబ్బలను చిదుపరాదు.

చి కి త్స

మన్ను ప్రసీరు కొబ్బరినూనెతో సమానముగ కలిపి చేతితో గిలకొట్టగా వచ్చిన విషవంటి పదార్థమును రాయుము.

మజ్జిగలో పీడకబూడిదను (కచ్చికి) కలిపిరాయుము.

మంట అమడము వీసెడు, తడిరాతి సున్నము వీసెడు, ఏరు అడ్డడు తీసికొని ముందు ఏటిలో అవస్తపులను వేసి చేతితో గిలకొట్టగా వచ్చిన వెన్నవంటి పదార్థము రాయుము.

కాలిన ప్రదేశమున మనుష్యుని వీరుడు అరగా అరగా పోసిన మొదల మంట అగిపోవును.

సుసిమిరి (Mague)

ఈ వ్యాధి పేనుసంబంధ మైసటియు, బూజాసంబంధ మైసటియు, నూత్నుజీవులవలన పశువులకు కలుగుచున్నది. ఇది అంటుకోగము. ఇది ఉష్ణోగపదార్థ మండలమువలన ఉత్పత్తియగును. మొదట పశువుశరీరమునం దక్కడక్కడ ఈ సుసిమిరి తుట్టి క్రమేపి వృద్ధియగుచుండును. పశువునకు ఎక్కువగా దురద, మంట వుట్టి అప్పు డప్పుడు ఈ పండ్లతో గీరుకొనుచుండును. బొబ్బలుకూడ వుట్టవచ్చును. క్రమముగ నల్లమచ్చలుగి మారి అవి గ్రుడ్డుపోసి పలుచని ద్రవము ప్రసరింపజేయును. వెండ్రుకలు రాలిపోవును. ఈవ్యాధి గిత్తలకు తరుచుగా వచ్చుచుండును. పశువు అప్పుడప్పుడు సుసిమిరియున్న చోట గోడలకు, గుంజకు, కట్టుగొయ్యకు వేసి రుద్దుకొను చుండును. పశువు ఆకారము చెడి క్షీణించుచు కాలి తగ్గును. ఈ వ్యాధియదిరిగి తగ్గుట చాలకష్టము.

చి కి త్తు

సింధవలవణము కలబందమట్టరసముతో కలిపి రాయవలెను.

మేకవదరు వేడియైనది తీసికొనివచ్చి శరీరమునకు చూడు నాలుగు పూతలుపెట్టి తరువాత వేడినీటితో కడుగవలెను.

2 తులముల పసుపు, అర్ధసేరు అవుపాలతో కలిపి ఒకపూట త్రాగించిన తరువాత అడ్డసగపు విత్తులు, సువ్వు, ఉప్పు, కొట్టుపపుపు, వెట్టివుచ్చవేళ్ళు, బాపంచాలు, జలేడుమొగలు ఒక్కొక్కటి తులమునకును తీసికొనివచ్చి మెత్తగానూరి వేపనూనెతో కలిపి సుసిమిరియున్నచోట రాయవలెను. చూడవనాడు మేకపాట్లలో నుండు వెచ్చని వదరు రుద్ది నాలవనాడు వేడినీటితో శరీరమంతయు కడుగవలెను. శరీరమంతా వ్యాపించి మచ్చలుపడి బాధజెందు సుసిమిరి తగ్గుట చాలాకష్టము.

తో క ను సి మి రి

వేడ మన్ను మొదలగు కల్పవృషదార్థములు పశువుతోకల అంటుకొని యుండుట చేతను రైతులు వానిని పరిశుభ్రముగా కడుకిగ పోవుట చేతను ఈవ్యాధి కలుగుచున్నది. ఒక విధమైన బూజా సంబంధమైన నూత్నుజీవులు తోకలోపలిభాగమున ప్రవేశించి దురదను వుట్టించును. తోక నల్లపడి వెండ్రుకలూడిపోవును. ఈవ్యాధి పశువుతోక

తక్కువ పెద్దాగముననే యుండును. ఇది యెక్కువగా వ్యాపించిన కొంది పశువుతోక సరిగా నెత్తలేక తక్కుతో నటునిటు విసరుకొనును.

చి కి ర్న

మొత్తులము పావుతులము, గంధకము 1 రు, వస 1 రు, వ్యానులైను 2 రు కలిపి నుసిమిరికి రుద్దవలెను.

లేక ఒక పిడకవంటలేచ్చి తోకపైనున్న నుసిమిరిపై ఎట్టుబడునట్లు రుద్దవలెను. తరువాత దానిపైని పసుపు మిగడ కలిపి రాయవలెను. ఇట్లు రెండుమాడు దినములు చేసిన నెమ్మదియగును.

పసుపు నల్లరుతో కలిపి బాగుగా రుద్దవలెను.

విషబొద్ది కొబ్బరినూనెలో కలిపి రాయవలెను.

చెన్నతో ముర్దారుసింగు కలిపి రుద్దవలెను.

ఆముదత్ర పలుకులు, నూరేకారము, ఉప్పు పెత్తగానూరి పెరుగుతో కలిపి రాయుము.

పొడలు - మచ్చలు (Scabs)

పశువు శరీరముమీద గుబురు గుబురుగ ఒకవిధముగ మచ్చలేర్పడును. కాని వీరి వలన ప్రమాదములేదు. పశువు ఆకారము చెడును. వాటంతటవి పుట్టుచుండును. ఇవి చలిగాలి సోకగానే పోవుచుండును.

చి కి ర్న

విధూతి, పుల్లనుజ్జిక కలిపి నాలుగైదుదినములు రాయవచ్చును. మజ్జికలో పిడక బూడిదకలిపి రాయవచ్చును. అనునాలో వెల్లులిపాయలు వేసి కాచి రాయవచ్చును. వేపాకు కాల్చిన బూడిదలో నెయ్యి కలిపి రాయవచ్చును. రావిచెక్క బూడిద కొత్త రదినున్నముతో కలిపి రాయవలెను.

వెంట్రుక లూడిపోవుట

పశువునకు పెద్దరోగము, జ్వరము, గాలికుంటు మొదలగు రోగములు తగిలి నెమ్మదించిన తరువాతను, పశువు ఈనిసరెరువారను లేతమాడలకు దుర్బలత్వముచేతను వెంట్రుకలూడిపోవుట తలసిండును. పొట్టివెండ్రుకలను కత్తిరించవలెను.

తరువాత పొకచెక్క నీటితో కడిగి నీలిమందుతో ఉమ్మిచేర్చి రాయవలెను.

లేక వ్యానులైనులో నీలిమందు తగినంత కలిపి రాయుము.

లేక ముసాంబ్రము ఘాటుసారాయిలో కలిపి రాయుము.

లేక వెల్లులిపాయల పొట్టు కాల్చి నీడునూనెలో కలిపి రాయుము.

హస్తలో అడ్డెడు కావు.

గోమారులు, జుడ్డవుంజాలు

ఈ గోమారులు కాలముకువులనుబట్టి పుట్టుచుండును. మరల వాటంతటవి పోవుచుండును, కాని ఇవి పశువును పట్టుకొని నెత్తురును వీల్చుటచేత పశువు దుర్బలత్వము చెంది పలువిధ సంకటముల పాలగుచున్నది. కాబట్టి వెంటనే వీటికి తగు చికిత్స చేయవలెను. గోమారులు బహు మొండికాతి. వీటికి పశువు శరీరమును తొలుచుకొని పోవునంతటి కత్తిగలదు. ఈ గోమారులున్న పశువును చూచిన మనకు చాల అసహ్య భరముగ నుండును. ఈ గోమారులవలల రక్తమాత్రమును వ్యాధి సోపనని ఇదివరకే ఈ గ్రంథములో చెప్పియుంటిని. పశువు పొనుగుమీదను, కాళ్ళమీదను, కండ్లరెప్పలమీదను వీలులేని సలమలమీదను పట్టి బాధించును.

చికిత్స

ఫిసెల్ అర్థసేరు, ఫ్లొందివాన్సీను పావుసేరు, కార్బాలిక్ 1 రులము, గంధపు పొడి 4 రులములు, వేడినీరు నేరు కలిపి దీనిని గుడ్డతో మంచి రాయవలెను.

లేక మంచిమాన దేనామంతటికి రాచి యెండలో నుంచినయెడల చావవుగాని ఊడిపోవును. కాబట్టి ఈ చికిత్స చేయు పశువును దూరముగా నుండు ప్రత్యేకసలమ దుంచి చికిత్స చేయవలెను.

హెచ్చరిక

గోమారులున్న కొట్టములలో పశువుల నుంచి చిన్న మంటవేయుదురు. ఇది చాల ప్రమాదకరమైన విషయము. నేను ఈ గోమారులవలన తగులబడిన కొట్టములను శ్రత్యక్షముగా చూచియున్నాను. కాబట్టి ఇటువంటి ప్రమాదకరమైన పనులు చేయుటచేత కొన్ని పశువులు కూడ మరణించివి.

శ్రీటరోగము

ఈ వ్యాధి పశువునకు ఒకవిధమైన పురుగువలన కలుగును. చక్కము అడుగుభాగమున ఈ పురుగు లుండి అన్ని అవయవములకు దురద కలిగించును. ఈ దురద పశువు సహించలేక ఏ చెట్టునో, ఏ గోడనో వేసి రుద్దుకొనును. వెంటనే యెట్టిని పుండ్లగును. ఈ పుండ్లపైన ఈగలు వారి చీము పట్టును. దదురు దదురుగా శరీరమంత పొక్కును. ఈ దదురు ఎట్టగానై వాపుకొని పుండ్లుమాడ పడవచ్చును. శరీరకాంతి తగ్గును. మల బద్ధక ముండును.

చికిత్స

ఈగలను వ్రాలవలెను. చమురుగుడ్డతో అన్నివైపుల అద్దుచుండవలెను. పశువును శుభ్రమైన సలమనం దుంచవలెను. కార్బాలిక్ అసిడ్ ఒకపాతా, కొబ్బరినూనె మాడుపాళ్ళ కలిపి రాయవలెను.

హస్తలో అడ్డెడు చల్లుటకంటె చిత్తలో చిట్టెడు చల్లుట మేలు.

లేక నేపాళవీర్లు మెత్తగా నూరి పెరుగులో కలిపి కాచి ఒక గంటసేపుంచి తరువాత కడగవలెను. లేక అవిసె ఆకురసము పూయుము. లేక ముప్పిణిచెట్టు చిగురు ఉప్పు కలిపి నూరి రాయవలెను.

పశువుదేహమును ఉడుకెత్తుట

పశువును అతిశీఘ్రమైన ఎండలో పనిచేయించు చుండుటవలనను అసమతుల్యము లోనే దాచా మెక్కునై శరీరము ఉడుకెత్తి యుండునపుడు చచ్చిల్పో దేహము కడు గుటచేతను, జ్వరముకలిగి యుండునపుడు ఎండలో పనిచేయించుటచేతను, అవ్యాధి కలుగును. పశువు ఎండలో నూడజాలదు. వగర్చుచుండును. నీడకుపోవుచుండును. ఒకానొకప్పుడు నీటిలోకూడ పడును. దేహ మంతయు మంటలెక్కును.

చి కి త్స

నూరేకారము 2 తులములు నీటిలోకలిపి త్రాగించవలెను.

చచ్చిటిలో గుడ్డ ముంచి తలకు కొట్టవలెను.

శరీరముపైన కూడ చచ్చిటికాపులు తీయవచ్చును.

దో మ లు (Musquitoes)

పల్లవుప్రదేశములలోను, మారికిగుంటలలోను ఇవి ఎక్కువగా నుండును. వీటి వలననే పశువులకు అనేక విధములైన వ్యాధులు ప్రబలుచుండును. కాబట్టి వీటినిర్మూలమునకు తగిన చికిత్స చేయవలెను. దోమలు పశువులకు మిక్కిలి హానిని కలిగించు శత్రువులు. కొన్ని దోమలు విషకరమైన కొటుగలవి. వీరుగుకాలు అను వ్యాధి వీటి వలననే కలుగుచున్నది. కాని వానిని పరీక్ష చేయుట కష్టము. కనుక నన్నిదోమలును విషము గలవని తలంచి జాగ్రత్త తీసికొనుట యుక్తము. ఈగలవలెనే దోమలకు జన్మ పారంపర్య మున్నది. మారుగుకాలువలు, బురదచేలలు దోమలకు మిగుల నిష్ఠము. వడిలి తొట్లలోను, పగిలిపోయిన డబ్బాలలోను నీరు నిలిచియుండకుండ జూడవలెను.

చి కి త్స

ఆవుకేడతోకలిపిన చెత్తను తేచ్చి దానిలో గవ్వసాగ్రాహి అమరకలి గంధకము కలిపి పొగవేసి మరల నవి రాజాలవు. లేక దాల్చినఆరఖు లవంగాలఆరఖు నీటిలో కలిపి చల్లిన దోమలు రావు.

లేక భూకులనీచెట్లను కొట్టములలో కట్టిన రాజాలవు.

పే లు

ఇవి మనుష్యుల తలలోనుండు పేలకంటె కొంచెమెక్కువ పరిమాణము కలిగి యుండును. ఇవి వట్టినచోట దగ్గురుపుట్టి చర్మము వాచును. వాటిని తేలికగా చంపవచ్చును. కాని ఈవి తీసినయుట కష్టము.

చిత్తలో చల్లితే చిత్తగా పండును.

చికిత్స

కొబ్బరిచిప్పలను కాల్చి తీసినచేత మరల పేలుననుచోట రాయవలెను.

లేక వెల్లులిపాయల రసము వ్రాయుము.

జోరీగలు

జోరీగలు పశువుకడుపున కడుగు భాగమునను, తదితర భాగములందును, వందల కొలదిగా వేసవికాలపు చివరదినములలో ఎక్కువగా కాన్పించును. జోరీగపిల్లలను పశువు మ్రొంగినపుడు గుండునూది పరిమాణము గలిగియుండును, కాని రెండునెలల పిమ్మట యవి పెద్దవై జూన్ జూలైవరకు లోపలనేయుండి రరువారే మలముతోపాటు బైటికి వచ్చును. ఈపురుగులు కడుపు లోపలిభాగముననుండి యేమైన హనిచేయునదియు, లేనిదియు పశువైద్యులైమియు చెప్పజాలరు. పశువు కఠిరము వెలుపల నివసించు జోరీగలు చర్మముపైన గ్రుడ్డుపెట్టి సంశాసవృద్ధిని పెంపొందించును. పశువురక్తమును వీల్చుచుండును. ఇవి ఎక్కువగానున్న పశువు క్రమేపి క్షీణించుచుండును. పశువునకు దురద వ్రట్టును. ఇవి అంటువ్యాధులను వ్యాపింపజేయును.

చికిత్స

పిటి కింతవరకు సరియైన చికిత్స కుదురలేదు.

ఫిన్ల 1 భాగము, నీరు 2 భాగములు కలిపి దేహమంతయు రాయవలెను.

లేక కర్పూరతైలముగాని, తారుగాని ఆయాభాగములందు రాయవలెను.

మిన్నలులు (hleaas)

కొన్నిదూడలకు మిన్నలులు పట్టి రాధించును. వెండ్రుకలు రాలిపోవును. పుండ్లుపడి దూడ నాశనమగుచుండును. ఈరాధ ఎక్కువైనకొలది దూడచనిపోవును. ఇవి పాలదూడలకు తరచుగా పట్టుచుండును. మిన్నలులు చర్మమునందు రంధ్రముల వేసి గ్రుడ్డుపెట్టును. ఆగ్రుడ్డు పిల్లలై చర్మముపై దురదకు వ్రట్టించును. ఇవి రోగములు గల పశువురక్తమును వీల్చి యితరపశువుల దేహములలో దీనిని విడుచుటవలన అంటు వ్యాధులు కలుగుచుండును.

చికిత్స

ఫిన్ల 1 భాగము, నీరు 2 భాగములు కలిపి కఠిరమునకు పట్టించుము.

లేక వేపనూనె 1 భాగము, కిరసనాయిల్ 2 భాగములు కలిపి పట్టించిన వెంటనే తగును.

లేక వేపాకు పిటితోవేసి మరగకాది అపిటితో దూడను కడుగవలెను.

సంపూర్ణము

తూనికలు - కొలతలు

- 30 చిన్నముల ఎత్తు—1 తులము
 3 తులములు—1 ఫలము
 8 ఫలములు—1 నేరు
 12 తులములు—1 అర్ధనేరు
 5 నేరు—1 పీసె

2

- 5 తులములు ఎత్తు—1 గడ్డ
 2 గడ్డలు—1 అరసోల
 2 అరసోలలు—1 సోల
 2 సోలలు—1 తప్ప
 2 తప్పలు—1 మానిక
 2 మానికలు—1 అడ్డకు
 2 అడ్డకులు—1 కుంచము

3

- 60 చుక్కలు—1 డ్రాము

- 8 డ్రాములు—1 బొమ్మ
 20 బొమ్మలు—1 పైంటు
 24 బొమ్మలు—1 క్వార్టర్
 8 పైంటు—1 గాలను

4

- 2 పడ్లగింజల ఎత్తు—1 గ్రేయసు
 20 గ్రేయసులు—1 స్క్రాపీలు
 3 స్క్రాపీలు—1 డ్రాము
 8 డ్రాములు—1 బొమ్మ
 12 బొమ్మలు—1 పాను
 21 బొమ్మలు—1 తులము
 180 గ్రేయసు—1 తులము
 5 తులములు—1 చటాకు
 16 చటాకులు—1 నేరు

N. B:- ఈ చింతామణిలో నున్న చికిత్సలుగాక ఇంకొక కావలసిన శారీరక గలవారికి పశువైద్య బోధక యోగావళి (అను) గ్రంథము చూడుడు.

సహదేవ పశువైద్యఫార్మసీ (రిజిష్టరు)

ఈ అనుభవ పశువైద్య చింతామణిని చదివి అనుభవము సంపాదించిన తరువాతను, మీ గ్రామములో నరియగు మూలికలు వగైరా దొరకనప్పుడు ఈ దిగువ మందులకు తెప్పించుకొని వాడుట మంచిది. శ్రీరాములుగారు వారి అనుభవముతో పరిశోధించిరి. ఈ మందులు నోరు లేనిపశువులకు ఎంతో లాభకరముగానున్నవని ఆంధ్ర దేశములోని రైతు లెందరో తెలుపుచున్నారు, ఏజెన్సీలుకూడ తీసికొని డాక్టర్లవలె గ్రామాలలో పాటుపడుచున్నారు గాన కావలసిన వారు ఫార్మసీవారి కేట్రాగునకు వ్రాసి సలహాలు తీసికొనండి.

ఫార్మసీ మేనేజర్, తెనాలి.

పశువైద్య ఔషధములు

1. జంతురక్షణి

కింక, కొమ్మ, గురక, కరమ, జెబ్బిపావు మున్నగునవి మీ గ్రామములో నున్నపుడు మంచి పశువులకు రోగపశువులకు ఈ రక్షణిని యిచ్చిన చాలును. కాస్త్రసమ్యక్ముగా తయారైన లేహ్యము.

2. పశుబలవర్ధని

పశువులకు, గొట్టెలకు, మేకలకు, బలము, దురుతుడనము, సత్తువ రావలెననిన ఈ బలవర్ధని పక్షమురోజులు అనుపాసపత్రికలో ప్రకారము వాడిన చాలును. ఎంతో మంది వాడిరి.

3. అశ్వబలవర్ధని

గొట్టెములు బలియుటకు, నరపటుశ్వము గలుగుటకు దీనికి మించిన మందులేదు. మసాలాకంటె బాగుగా పనిచేయును.

4. క్షీరోజన్

పాడిపశువుల రోగములకు, పాలెక్కువ యిచ్చుటకు రుచిగలుగుటకు ఈ క్షీరోజన్ పక్షము దినములు వాడిన చాలును.

5. పశుమిత్ర

కడుపుబ్బు, అజీర్తి, కడుపునొప్పి, వివిధహూలులు వగైరా వ్యాధులన్నిటికి ఈ మందు బాగుగా పనిచేయును.

6. వాతారి

రోగవారము, నక్క, ఎండు, రోళ్ల పక్షవారములు వగైరా లన్నిటికి ఈ వాతారి క్షిండుటలో పెట్టినదివేరు.

7. సాన్ టాల్

నీరుచురుకు, రక్తమాత్రము, అధికమాత్రము, ఉచ్చబుడ్డలోనొప్పి, శుక్లశబ్దము మున్నగు రోగములలో పనిచేయును.

8. బేల్ పౌడర్

నిరేచనములు, రక్తవిరేచనములు, జిగటవిరేచనములలో ఈ పౌడర్ ను వాడిన చాలును.

9. విబ్రా

చూడిపశువులకు వచ్చురోగములలోను, పిండ మభివృద్ధి నొందుటకు ఈ మందు బాగుగా పనిచేయును.

10. క్రిమిహర్

లేగ దూడలకు, తుక్కలకు వివిధరకముల పురుగులు మలముగుండ పడుచుండును. అట్టి పురుగులకు ఈ క్రిమిహర్ చాలును.

11. క న కా న వ

గుట్టములకు, పశువులకు వచ్చు వగర్పు, గుండెవగర్పు తుర్చిక్వాసల నణచుటలో కనకానవకు మించినదిలేదు.

12. ఉల్బం

పశువులకు మాచి పడనప్పుడా, మేయిరాగానే త్రోసిన తరువాత ముక్కుదు గలిగినపుడు ఈ ఉల్బంను వాడిన ఆత్యద్భుతముగా పనిచేయును.

13. విషఘ్ని

పశువులకు పిచ్చికుక్క నక్కలు కగచినపుడు విషవస్తువులు తినినపుడు ఉంగిడికి ఈ విషఘ్నిని వాడిన తగును.

14. గర్భక

గొడ్డుబోతు పశువులు మరల చూడికట్టి ఈయటకు ఈ గర్భక పెట్టినది వేరు. అనుభవయోగము.

15. అనోడైన్

చెవిలో తురువులు, చెవి వాలుడు, చెవి వాపు మున్నగువాటికి బాగుగా పని చేయును.

16. గ్లొమూల్

కాలిన పుండ్లకు, చర్మపుషగుళ్ళకు, పొక్కిన భాగములకు పనిచేయును.

17. కార్నెక్సు

కొమ్ములు విరుగుట, పై తొడుగుడుట, కస్త్రముచేసిన కొమ్ము, గాయములకు పనిచేయును.

18. ప్రోక్సాల్

గోమారులు, మిన్నలులు, తుండీగలు పశువుల చర్మమును బాధించునపుడు ఈ మలమును పట్టించిన చచ్చును.

19. పశు నేత్రాంజనము నెం. 1

పువ్వులు, కంటికిలెపులు, కొయ్యగండలకు బాగుగా పనిచేయును.

20. పశు నేత్రాంజనము నెం. 2

కండనుండి నీరు కాదుట, ఎరుపులకు, శోగపశువులకు కలికము వేయుటకు వీరిని వాడవలెను.

21. హిలా

వివిధ రకముల గాయములకు, కత్తిచెబ్బలు, కాలుగొట్టు పుండ్లకు బాగుగా పనిచేయును.

22. కీటారి

తలనసిమిరి, ఆకునసిమిరి, తామర మున్నగు చర్మవ్యాధులకు పనిచేయును.

23. వెటరినరీపాషర్

అర్రు వాపులకు, పంపరకు, కల్లవాపులకు, కురిమిడికి ఈ ప్లాష్టరు బాగుగా పనిచేయును.

24. స్పెయిన్ కిల్లర్

బెబుకులు, మిడిపట్టుట, వాతనొప్పులు, కీళ్ళవాపులకు, కాళ్ళ పట్టుపట్టి కుంటు నపుడు ఈ తైలము బాగుగా పనిచేయును.

25. ధన్ ధన్

పశువులు వాటి మూత్రము ఆవియే త్రాగుచు కృశించునపుడు ధన్ ధన్ ను వాడిన బాగుగా పనిచేయును.

షరా:- కావలసినవారు కేట్లాగునకు వ్రాసిన ధరలు తెలుపబడును.
ఈ రీతిగనే గుఱ్ఱములకు కూడ మందులు గలవు.

వీటిలో కొన్ని ప్రేదమార్కు చేయించితిమి



ప్రింటగుచున్న గ్రంథములు

1. అశ్వవైద్య శాస్త్రము
2. పశువైద్య ఔషధ యోగావళి
3. కోళ్ళ పరిశ్రమ
4. ప్రాచీన పశు నంజీవి
5. శునక వైద్యము

